


DICTIONNAIRE
UNIVERSEL
DES PLANTES.

TOME IV.



DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES PLANTES, ARBRES ET ARBUSTES DE LA FRANCE;

CONTENANT une Description raisonnée de tous les Végétaux du Royaume , considérés relativement à l'Agriculture , au Jardinage , aux Arts & à la Médecine des Hommes & des Animaux.

Par M. PIERRE-JOSEPH BUCHOZ , Médecin Naturaliste Lorrain , & de feu Sa Majesté le Roi de Pologne , Duc de Lorraine & de Bar ; Aggrégé du Collège Royal des Médecins de Nancy , & de la Faculté de Médecine de Lorraine ; ancien Démonstrateur de Botanique audit Collège ; Associé des Académies de Mayence, de Chaalons, d'Angers , de Dijon, de Béziers , de Caen , de Bordeaux & de Metz ; Correspondant de celles de Rouen & de Toulouse.

TOME QUATRIÈME



A PARIS,



Chez J. P. COSTARD, Libraire, rue S. Jean-de-Beauvais.

M. DCC. LXXI.

Avec Approbation & Privilège du Roi.



FLORA GALLICA.



CLASSE QUINZIÈME.

Des Tétradynamiques.

1035. *Myagrum sylvestre*. *Myagrum* siliculis biarticulatis dispermis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis. *Linn. Sp. plant.* 892. *Rapistrum monospermum. Pin.*

Rapistre pérennel.

1036. *Myagrum perfoliatum*. *Myagrum* siliculis obcordatis subfiliibus, foliis amplexicantibus, siliculis obcordatis. *Linn. Sp. plant.* 893. *Myagrum monospermum latifolium. Pin.*

Myagrum à larges feuilles.

1037. *Myagrum sativum*. *Myagrum* siliculis obovatis pedunculatis polyspermis. *Linn. Sp. plant.* 894. *Myagrum sylvestre. Pin.*

Cameline.

1038. *Myagrum paniculatum*. *Myagrum* siliculis lentiformibus orbiculatis punctato rugosis. *Linn. Sp. plant.* 894. *Myagrum similis filiqua rotunda. Pin.*

Myagrum hérissé, à filiques rondes.

1039. *Myagrum saxatile*. *Myagrum* siliculis-lentiformi-obovatis glabris, foliis oblongis serratis scabris, caule paniculato. *Linn. Sp. plant.* 894. *Thlaspi saxatile rotundifolium. Pin.*

Thlaspi des rochers à feuilles rondes.

Tome IV.

A

1040. Subularia. Subularia aquatica. *Linn. Sp. plant.* 896. Alyssum palustre, folio junci. *Burb.*

Alysson des marais à feuilles de jonc.

1041. Draba alpina. Draba scapo nudo simplici, foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 896. Bursa pastoris alpina rosea lutea. *Morif*

Bourse à pasteur des Alpes à fleurs jaunes.

1042. Draba verna. Draba scapis nudis, foliis lanceolatis subincisis. *Linn. Sp. plant.* 896. Bursa pastoris minor loculo oblongo. *Pin.*

Alysson vulgaire à feuilles de renouée & à tiges nues.

1043. Draba pyrenaica. Draba scapo nudo, foliis cuneiformibus trilobis. *Linn. Sp. plant.* 896. Alysson pyrenaicum perenne minimum, foliis trifidis. *Tourn.*

Alysson des Pyrénées.

1044. Draba muralis. Draba caule ramoso, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus. *Linn. Sp. plant.* 897. Bursa pastoris major loculo oblongo. *Pin.*

Grande Bourse à pasteur.

1045. Draba hirta. Draba scapo unifolio, foliis subhirsutis, filiculis obliquis pedicellatis. *Linn. Sp. plant.* 897. Bursa pastoris alpina hirsuta. *Pin.*

Bourse à pasteur des Alpes hérissé.

1046. Draba incana. Draba foliis caulinis numerosis incanis, filiculis oblongis obliquis. *Linn. Sp. plant.* 897. Leucoium seu lunaria vasculo oblongo incano. *Pluk.*

1047. Lepidium nudicaule. Lepidium scapo nudo simplicissimo, floribus tetrandris. *Linn. Sp. plant.* 898. Nasturtium minimum vernal, foliis tantum circa radicem. *Magn.*

Cresson printanier de la petite espèce.

1048. Lepidium procumbens. Lepidium foliis pinnatifidis impari majore, scapo nudo, caulibus prostratis racemiferis. *Linn. Sp. plant.* 898. Nasturtium foliis omnibus alternatim pinnatis. *Dalib.*

Cresson à feuilles alternativement ailées.

1049. Lepidium latifolium. Lepidium foliis ovato lanceolatis integris serratis. *Linn. Sp. plant.* 899. Lepidium latifolium. *Pin.*

Passerage.

Flora Gallica.

1050. *Lepidium ruderales*. *Lepidium* floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato pinnatis; ramiferis linearibus integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 900. *Nasturtium sylvestre* osyridis folio. *Pin.*

Cresson à feuilles étroites.

1051. *Lepidium iberis*. *Lepidium* floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis serratis; superioribus linearibus integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 900. *Iberis* latiore folio. *Pin.*

1052. *Thlaspi arvense*. *Thlaspi* siliculis orbiculatis; foliis oblongis dentatis glabris. *Linn. Sp. plant.* 901. *Thlaspi arvense* siliquis latis. *Pin.*

Thlaspi champêtre à siliques larges.

1053. *Thlaspi saxatile*. *Thlaspi* siliculis subrotundis; foliis lanceolato linearibus carnosis obtusis. *Linn. Sp. plant.* 901. *Thlaspi parvum* saxatile, flore rubente. *Pin.*

Petit Thlaspi à fleurs rouges.

1054. *Thlaspi hircum*. *Thlaspi* siliculis subrotundis pilosis; foliis caulinis sagittatis villosis. *Linn. Sp. plant.* 901. *Thlaspi* capsulis hirsutis. *Bauh. hist.*

Thlaspi à siliques rondes poilues.

1055. *Thlaspi campestre*. *Thlaspi* siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *Linn. Sp. plant.* 902. *Thlaspi arvense*, vaccariæ incano folio, majus. *Pin.*

Thlaspi champêtre.

1056. *Thlaspi montanum*. *Thlaspi* siliculis obcordatis foliis glabris radicalibus carnosis obovatis integerrimis, caulinis amplexicaulibus, corollis calyce majoribus. *Linn. Sp. plant.* 902. *Thlaspi alpinum* bellidis crulex folio. *Pin.*

Thlaspi des Alpes à feuilles de marguerite.

1057. *Thlaspi perfoliatum*. *Thlaspi* siliculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris subdentatis, petalis longitudine calycis, caule ramoso. *Linn. Sp. plant.* 902. *Thlaspi arvense* perfoliatum majus. *Pin.*

Grand Thlaspi champêtre perforé.

1058. *Thlaspi bursa pastoris*. *Thlaspi* siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Linn. Sp. plant.* 903. *Bursa pastoris* major folio sinuato. *Pin.*

Bourse à pasteur de la grande espèce.

1059. *Cochlearia officinalis*. *Cochlearia* foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. *Linn. Sp. plant.* 903. *Cochlearia* folio subrotundo. *Pin.*

Herbe aux cuilleres à feuilles rondes.

1060. *Cochlearia coronopus*. *Cochlearia* foliis pinnatifidis. *Linn. Sp. plant.* 904. *Ambrosia campestris repens*. *Pin.*

Ambrosie rampante.

1061. *Cochlearia armoracia*. *Cochlearia* foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incis. *Linn. Sp. plant.* 904. *Raphanus rusticanus*. *Pin.*

Grand Raifort.

1062. *Cochlearia draba*. *Cochlearia* foliis caulinis lanceolatis dentatis amplexicaulibus. *Linn. Sp. plant.* 904. *Lepidium glastifolium*. *Pin.*

Lepidium annuel.

1063. *Cochlearia draba*. *Cochlearia* foliis caulinis lanceolatis dentatis amplexicaulibus. *Linn. Sp. plant.* 904. *Draba umbellata* seu *major*, capitulis donata. *Pin.*

1064. *Iberis saxatilis*. *Iberis* suffruticosa, foliis lanceolato linearibus carnosis acutis integerrimis ciliatis. *Linn. Sp. plant.* 905. *Thlaspi saxatile* vermiculato folio. *Pin.*

Thlaspi des rochers.

1065. *Iberis amara*. *Iberis* herbacea, foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus racemosis. *Linn. Sp. plant.* 906. *Thlaspi umbellatum arvense*. bellidis folio. *Pin.*

Thlaspi ombellifere champêtre amer.

1066. *Iberis pinnata*. *Iberis* herbacea, foliis linearibus pinnatifidis. *Linn. Sp. plant.* 907. *Thlaspi umbellatum*, nasturtii folio, *Montpeliacum*. *Pin.*

Thlaspi ombellifere de Montpellier à feuilles de cresson.

1067. *Iberis nudicaulis*. *Iberis* herbacea, foliis sinuatis, caule nudo simplic. *Linn. Sp. plant.* 907. *Bursa pastoris* minor foliis incis. *Pin.*

Petite Bourse à pasteur à feuilles découpées.

1068. *Alyssum spinosum*. *Alyssum* ramis floreis senilibus

spiniformibus nudis. *Linn. Sp. plant. 907.* Thlaspi fruticosum spinosum. *Pin.*

Thlaspi épineux en arbre.

1069. Alyssum montanum. Alyssum ramulis suffruticosis diffusis, foliis punctato echinatis. *Linn. Sp. plant. 907.*

Thlaspi de montagnes à fleurs jaunes.

1070. Alyssum halimifolium. Alyssum foliis lanceolato-linearibus acutis integerrimis : caulibus procumbentibus perennantibus. *Linn. Sp. plant. 907.* Thlaspi halimifolio semper virens. *Herm. Lugdb.*

1071. Alyssum incanum. Alyssum caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymbofis. *Linn. Sp. plant. 908.* Thlaspi incanum fruticosum. *Pin.*

Thlaspi en arbre blanchâtre.

1072. Alyssum lycinum. Alyssum caulibus herbaceis, staminibus omnibus dentatis, calycibus persistentibus. *Linn. Sp. plant. 908.* Thlaspi alysson dictum campestre majus. *Pin.*

Thlaspi surnommé Alysson champêtre.

1073. Alyssum campestre. Alyssum caule herbaceo, staminibus stipatis pari setarum, calycibus deciduis. *Linn. Sp. plant. 909.* Alyssum incanum, serpilli folio, fructu nudo. *Tourn.*

Alysson à feuilles de serpolet.

1074. Alyssum clypeatum. Alyssum caule erecto herbaceo, siliculis sessilibus ovalibus compresso planis, petalis acumina-
tis. *Linn. Sp. plant. 909.* Lunaria leucoii folio, siliqua oblonga majori.

Lunaire à siliques oblongues.

1075. Clypeola jonthlaspi. Clypeola siliculis unilocularibus monospermis. *Linn. Sp. plant. 910.* Thlaspi clypeatum serpilli folio. *Pin.*

Thlaspi à feuilles de serpolet.

1076. Clypeola maritima. Clypeola siliculis bilocularibus ovatis dispermis. *Linn. Sp. plant. 910.* Thlaspi alysson dictum maritimum. *Pin.*

Alysson maritime.

1077. Biscutella auriculata. Biscutella calycibus nectario utrinque gibbis, siliculis in stylum coeuntibus. *Linn. Sp.*

plant. 911. *Thlaspidium biscutatum villosum*, flore calcarato donato *Pin.*

Biscutelle à oreilles.

1078. *Biscutella didyma*. *Biscutella filiculis orbiculato-didymis à stylo divergentibus*. *Linn. Sp. plant.* 911. *Thlaspi biscutatum asperum hieraci folium majus*. *Pin.*

Grand Thlaspi à feuilles de chichoracée.

1079. *Lunaria rediviva*. *Lunaria foliis alternis*. *Linn. Sp. plant.* 911. *Viola lunaria major*, siliqua oblonga. *Pin.*

Grande Lunaire à siliques oblongues.

1080. *Lunaria annua*. *Lunaria foliis oppositis*. *Linn. Sp. plant.* 911. *Lunaria major*, siliqua rotundiorè. *Bauh. hist.*

Grande Lunaire à siliques rondes.

1081. *Dentaria bulbifera*. *Dentaria foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus*. *Linn. Sp. plant.* 912. *Dentaria heptaphyllos bacifera*. *Pin.*

Dentaire bulbeuse.

1082. *Dentaria pentaphyllos*. *Dentaria foliis summis digitatis*. *Linn. Sp. plant.* 912. *Dentaria pentaphyllos*. *Pin.*

Dentaire à feuilles supérieures en main.

1083. *Cardamine resedifolia*. *Cardamine foliis inferioribus indivisis, superioribus trilobis*. *Linn. Sp. plant.* 913. *Nasturtium alpinum minus, resedæ folio*. *Pin.*

Petit Cresson des Alpes à feuilles de reseda.

1084. *Cardamine impatiens*. *Cardamine foliis pinnatis incisus stipulatis, floribus apetalis*. *Linn. Sp. plant.* 914. *Sisymbrium cardamines, species quædam insipida*. *Bauh. hist.*

Cardamine à feuilles ailées laciniées.

1085. *Cardamine parviflora*. *Cardamine foliis pinnatis exstipulatis lanceolatis obtusis, floribus corollatis*. *Linn. Sp. plant.* 914. *Nasturtium pratense parvo flore*. *Bauh. prodr.*

Cresson des prés à petites fleurs.

1086. *Cardamine hirsuta*. *Cardamine foliis pinnatis, floribus tetrandris*. *Linn. Sp. plant.* 915. *Nasturtium aquaticum minus*. *Pin.*

Petit Cresson aquatique.

1087. *Cardamine pratensis*. *Cardamine foliis pinnatis; foliis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis*. *Linn. Sp.*

plant. 915. Nasturtium pratense, magno flore. Bauh. pin.
Cresson des prés à grandes fleurs.

1088. Cardamine amara. Cardamine foliis pinnatis, axillis stoloniferis. Linn. Sp. plant. 915. Nasturtium aquaticum majus & amarum. Pin.

Grand Cresson aquatique amer.

1089. Sisymbrium nasturtium aquaticum. Sisymbrium filiquis declinatis, foliis pinnatis : foliolis subcordatis. Linn. Sp. plant. 916. Nasturtium aquaticum supinum. Pin.

Cresson de fontaine.

1090. Sisymbrium pyrenaicum. Sisymbrium filiquis subovatis, foliis inferioribus lyratis, superioribus bipinnatifidis amplexicaulibus, stylis filiformibus. Linn. Sp. plant. 916. Alyssum foliis pinnatis multiformibus, floribus racemosis luteis. Allion.

Sisymbrie des Pyrénées.

1091. Sisymbrium sylvestre. Sisymbrium filiquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis serratis. Linn. Sp. plant. 916. Eruca palustris, nasturtii folio, filiqua oblonga. Pin.

Roquette des marais à feuilles de cresson, à filiques oblongues.

1092. Sisymbrium amphibium. Sisymbrium filiquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis serratis. Linn. Sp. plant. 917. Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisis. Pin. Raphanus aquaticus, rapistri folio. Pin. Sisymbrium aquaticum, foliis variis. Vaili.

Sisymbrie amphibie.

1093. Sisymbrium tenuifolium. Sisymbrium foliis integerrimis, infimis tripinnatifidis, supremis integerrimis. Linn. Sp. plant. 917. Sinapi crucez folio. Pin.

Roquette pérennelle à petites feuilles.

1094. Sisymbrium supinum. Sisymbrium filiquis axillaribus subsessilibus solitariis, foliis dentato sinuatis. Linn. Sp. plant. 917. Erysimum caule decumbente, filiqua laterali subsessili. Dalib.

Sisymbrie à tiges inclinées.

1095. Sisymbrium murale. Sisymbrium subacaule, foliis lanceolatis sinuato serratis breviusculis, scapis subsessilibus ad-

dentibus. *Linn. Sp. plant.* 918. *Eruca viminca*, *iberidis folio*, flore luteo. *Parr.*

Sisymbrie des murailles.

1096. *Sisymbrium manense*. *Sisymbrium acaule*, foliis pinato dentatis subpilosis. *Linn. Sp. plant.* 918. *Eruca perennis* & saxatilis, radice crassa à rupe victoriz. *Tourn.*

Roquette pérennelle de la montagne de Ste Vidoire.

1097. *Sisymbrium vimineum*. *Sisymbrium acaule*, foliis lyratis laxibus, scapis adscendentibus, floribus minutis. *Linn. Sp. plant.* 919. *Eruca minimo flore monspeliensis*. *Bauh. hist.*

Roquette de Montpellier à petites fleurs.

1098. *Sisymbrium asperum*. *Sisymbrium filiquis scabris* foliis pinnatifidis : pinnis lineari-lanceolatis subdentatis, corollis calyce longioribus. *Linn. Sp. plant.* 920. *Sinapi parvum*, filiqua aspera. *Pin.*

1099. *Sisymbrium sophia*. *Sisymbrium petalis* calyce minoribus, foliis decomposito pinnatis. *Linn. Sp. plant.* 920. *Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum*. *Pin.*

Cresson sauvage à feuilles finement découpées.

1100. *Sisymbrium irio*. *Sisymbrium foliis runcinatis dentatis nudis*, caule lævi, filiquis erectis. *Linn. Sp. plant.* 921. *Erysimum latifolium majus glabrum*. *Pin.*

Grand Velar à larges feuilles.

1101. *Erysimum officinale*. *Erysimum filiquis spicæ adpressis*, foliis runcinatis. *Linn. Sp. plant.* 922. *Erysimum vulgare*. *Pin.*

Velar commun.

1102. *Erysimum barbarea*. *Erysimum foliis lyratis extimo subrotundo*. *Linn. Sp. plant.* 922. *Eruca lutea latifolia*, seu *barbarea*. *Pin.*

L'Herbe de sainte Barbe.

1103. *Erysimum alliaria*. *Erysimum foliis cordatis*. *Linn. Sp. plant.* 922. *Alliaria*. *Pin.*

Alliaire.

1104. *Erysimum cheiranthoides*. *Erysimum foliis lanceolatis integerrimis*. *Linn. Sp. plant.* 923. *Myagrum filiqua longa*. *Pin.*

Cameline à filiques longues.

1105. *Erysimum hieracifolium*. *Erysimum* foliis lanceolatis serratis. *Linn. Sp. plant.* 923. *Leucoium sylvestre luteum hieraci folium*. *Pin.*

Velar à feuilles de chichoracée.

1106. *Cheiranthus erysimoides*. *Cheiranthus* foliis lanceolatis dentatis, caule recto, siliquis tetragonis. *Linn. Sp. plant.* 923. *Leucoium sylvestre luteum angustifolium*. *Pin.*

Leucoium sauvage à fleurs jaunes & à feuilles étroites.

1107. *Cheiranthus cheiri*. *Cheiranthus* foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis. *Linn. Sp. plant.* 924. *Leucoium luteum vulgare*. *Pin.*

Violier.

1108. *Cheiranthus tristis*. *Cheiranthus* foliis linearibus subfinuatis, floribus sessilibus: petalis undulatis, caule suffruticoso. *Linn. Sp. plant.* 925. *Leucoium minus*, lavendula folio, obsoleto flore. *Bosc.*

Petit Leucoium à feuilles de lavande.

1109. *Cheiranthus littoreus*. *Cheiranthus* foliis lanceolatis subdentatis subtomentosis subcarnosis, petalis emarginatis, siliquis tomentosis. *Linn. Sp. plant.* 925. *Leucoium maritimum angustifolium*. *Pin.*

Leucoium maritime à feuilles étroites.

1110. *Cheiranthus sinuatus*. *Cheiranthus* foliis tomentosis obtusis subfinuatis: rameis integris, siliquis muricatis. *Linn. Sp. plant.* 926. *Leucoium maritimum sinuato folio*. *Pin.*

Leucoium maritime à feuilles sinuées.

1111. *Hesperis inodora*. *Hesperis* caule simpliciter erecto, foliis subhastatis, dentatis, petalis obtusis. *Linn. Sp. plant.* 927. *Hesperis sylvestris inodora*. *Pin.*

Leucoium sauvage sans odeur.

1112. *Hesperis verna*. *Hesperis* caule erecto ramoso, foliis cordatis amplexicaulibus serratis villosis. *Linn. Sp. plant.* 928. *Leucoium maritimum latifolium*. *Pin.*

Leucoium maritime à larges feuilles.

1113. *Arabis thaliana*. *Arabis* foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 929. *Bursa pastoris* similis siliquosa major. *Pin.*

Petite Piloselle à siliques.

1114. *Arabis turrita*. *Arabis* foliis amplexicaulibus, siliquis

decurvis planis linearibus , calycibus subrugosis. *Linn. Sp. plant.* 930. *Leucoium hesperidis folio.* *Tourn.*

Chou sauvage à fleurs blanchâtres, à siliques flottantes.

1115. *Turritis glabra.* *Turritis foliis radicalibus dentatis hispida, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris.* *Linn. Sp. plant.* 930. *Brassica sylvestris, foliis circa radicem chichoraceis.* *Pin.*

Chou sauvage à feuilles radicales de chichoracée.

1116. *Brassica orientalis.* *Brassica foliis cordatis amplexicaulibus glabris radicalibus scabris integerrimis, siliquis tetragonis.* *Linn. Sp. plant.* 931. *Brassica campestris perfoliata, flore albo.* *Pin.*

Chou à fleurs blanches.

1117. *Brassica campestris.* *Brassica radice cauleque tenui, foliis caulinis reniformibus cordatis sessilibus.* *Linn. Sp. plant.* 931. *Brassica campestris perfoliata, flore luteo.* *Laf. pruss.* 29.

Chou champêtre.

1118. *Brassica napus.* *Brassica caule caulescente fusiformi.* *Linn. Sp. plant.* 931. *Napus sylvestris.* *Pin.*

Navet sauvage.

1119. *Brassica rapa.* *Brassica radice caulescente orbiculari depressa carnosa.* *Linn. Sp. plant.* 931. *Rapa sylvestris.* *hist. Bauh.*

Rave.

1120. *Brassica oleracea.* *Brassica radice caulescente tereti carnosa.* *Linn. Sp. plant.* 932.

Chou de toutes espèces.

1121. *Brassica erucastrum.* *Brassica foliis dentato-pinnatifidis, caule hispido, siliquis lævibus.* *Linn. Sp. plant.* 932. *Eruca sylvestris major lutea, caule aspero.* *Pin.*

Grande Roquette sauvage à tiges rudes.

1122. *Sinapis arvensis.* *Sinapis siliquis multangulis toroso turgidis rostro longioribus.* *Linn. Sp. plant.* 933. *Rapistrum flore luteo.* *Pin.*

Rapistre à fleurs jaunes.

1123. *Sinapis alba.* *Sinapis siliquis hispida, rostro oblique longissimo.* *Linn. Sp. plant.* 933. *Sinapi apii folio.* *Pin.*

Moutarde à feuilles d'ache.

1124. *Sinapis nigra*. *Sinapis* filiquis glabris apice tetragonis. *Linn. Sp. plant.* 933. *Sinapi-rapi folio*. *Pin.*

Moutarde commune.

1125. *Sinapis pyrenaica*. *Sinapis* filiquis striatis scabris, foliis ruminatis lævibus. *Linn. Sp. plant.* 934. *Erysimum dentis leonis folio*, perenne pyrenaicum. *Tourn.*

Velar des Pyrénées.

1126. *Sinapis incana*. *Sinapis* filiquis racemo appressis lævibus, foliis inferioribus lyratis scabris : summis lanceolatis, caule scabro. *Linn. Sp. plant.* 934. *Erysimum* foliis subincanis, filiquis brevissimis. *Vault.*

1127. *Raphanus raphanistrum*. *Raphanus* filiquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Linn. Sp. plant.* 635. *Rapistrum* flore albo filiqua articulata. *Pin.*

Rapistre à fleurs blanches, à filiques articulées.

1128. *Bunias crucago*. *Bunias* siliculis tetragonis : angulis bicristatis. *Linn. Sp. plant.* 935. *Bunias* foliis antrorsum sinuatis. *Sauv.*

Roquette de Montpellier à filiques quadrangulaires.

1129. *Bunias cakile*. *Bunias* siliculis ovariis lævibus ancipitibus. *Linn. Sp. plant.* 936. *Eruca maritima italica*, filiqua hastæ cuspidi simili. *Pin.*

Roquette maritime d'Italie.

1130. *Isatis tinctoria*. *Isatis* foliis radicalibus crenatis : caulinis sagittatis, siliculis oblongis. *Linn. Sp. plant.* 936. *Isatis sylvestris* seu *angustifolia*. *Pin.*

Pastel.

1131. *Crambe maritima*. *Crambe* foliis cauleque glabris. *Linn. Sp. plant.* 937. *Brassica maritima monospermos*. *Pin.*

Chou maritime.

CLASSE XVI.

Des Monadelphiques.

1132. **G**ERANIUM cinctarium. *Geranium* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisifs obtusis. *Linn.*

Sp. plant. 951. *Geranium cicutæ folio*, minus & supinum.
Pin.

Bec de grue à feuilles de ciguë.

1133. *Geranium malacoides*. *Geranium* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis. *Linn.*

Sp. plant. 952. *Geranium folio althææ.*

Geranion à feuilles de guimauve.

1134. *Geranium ciconium*. *Geranium* pedunculis multifloris floribus pentandris, foliis pinnatis pinnatifidis obtusis. *Linn.*

Sp. plant. 952. *Geranium cicutæ folio*, acu-longissima. *Pin.*

Geranion à feuilles de ciguë & à bec de ciguë.

1135. *Geranium nodosum*. *Geranium* pedunculis bifloris, foliis caulinis trilobis integris serratis, summis subsessilibus. *Linn.*

Sp. plant. 953. *Geranium nodosum*. *Pin.*

Geranion nouveau.

1136. *Geranium sylvaticum*. *Geranium* pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso serratis, caule erecto, petalis emarginatis. *Linn.* *Sp. plant.* 954. *Geranium batrachioides*, folio aconiti. *Pin.*

Geranion à feuilles d'aconit.

1137. *Geranium pratense*. *Geranium* pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis pinnato-laciniatis rugosis acutis, petalis integris. *Linn.* *Sp. plant.* 954. *Geranium batrachioides*, gratia Dei Germanorum. *Pin.*

La Grace de Dieu des Allemands.

1138. *Geranium robertianum*. *Geranium* pedunculis bifloris calycibus pilosis decemangulatis. *Linn.* *Sp. plant.* 955. *Geranium robertianum primum*. *Pin.*

Herbe à Robert.

1139. *Geranium lucidum*. *Geranium* pedunculis bifloris, calycibus pyramidalis angulatis elevato rugosis, foliis quinquelobis rotundatis. *Linn.* *Sp. plant.* 955. *Geranium lucidum saxatile*. *Pin.*

Geranion luisant.

1140. *Geranium molle*. *Geranium* pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis caule ramoso erectiusculo, calycibus muticis arillis lævibus. *Linn.* *Sp. plant.* 955. *Geranium columbinum villosum*, petalis bifidis purpureis. *Vaill.*

Petit Geranion à grandes fleurs.

1141. *Geranium dissectum*. *Geranium pedunculis bifloris*, foliis quinque partito trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. *Linn. Sp. plant.* 956. *Geranium foliis ad nervum quinquedidis, pediculis brevioribus, caule erecto. Haller.*

Geranion dissecté.

1142. *Geranium columbinum*. *Geranium pedunculis bifloris*, flore longioribus, foliis quinque partito multifidis: laciniis acutis, arillis glabris, calycibus aristatis. *Linn. Sp. plant.* 956. *Geranium columbinum, foliis dissectis, pediculis florum longissimis. Vahl.*

1143. *Geranium rotundifolium*. *Geranium pedunculis bifloris*, petalis integris obtusissimis longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incis. *Linn. Sp. plant.* 957. *Geranium folio malvæ rotundo. Pin.*

Geranion à feuilles rondes de mauve.

1144. *Geranium pusillum*. *Geranium pedunculis bifloris*, petalis bifidis, caule diffuso, foliis reniformibus palmatis uncinatis acutis. *Linn. Sp. plant.* 957. *Geranium folio malvæ rotundo. Pin.*

Geranion à feuilles rondes de mauve.

1145. *Geranium sanguineum*. *Geranium pedunculis unifloris*, foliis quinque partitis trilobis orbiculatis. *Linn. Sp. plant.* 958. *Geranium sanguineum maximo flore. Pin.*

Geranion sanguin.

1146. *Althæa officinalis*. *Althæa foliis simplicibus tomentosis. Linn. Sp. plant.* 966. *Althæa Dioscoridis & Plinii. Pin. Guimauve.*

1147. *Althæa cannabina*. *Althæa foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis. Linn. Sp. plant.* 966. *Alcea cannabina. Pin.*

Alcé à feuilles de chanvre.

1148. *Althæa hirsuta*. *Althæa foliis trifidis piloso hispida supra glabris. Linn. Sp. plant.* 966. *Alcea hirsuta. Pin. Alcée hérissée.*

1149. *Malva rotundifolia*. *Malva caule prostrato, foliis cordato orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructi-*

feris declinatis. *Linn. Sp. plant.* 969. *Malva sylvestris*, foliis subrotundo. *Pin.*

Mauve sauvage à feuilles rondes.

1150. *Malva sylvestris*. *Malva* caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. *Linn. Sp. plant.* 969. *Malva sylvestris*, folio sinuato. *Pin.*

Mauve sauvage à feuilles sinuées.

1151. *Malva alcea*. *Malva* caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. *Linn. Sp. plant.* 971. *Alcea vulgaris major*. *Pin.*

La grande Alcée.

1152. *Malva moschata*. *Malva* foliis radicalibus reniformibus incis, caulinis quinque partitis, pinnato multifidis. *Linn. Sp. plant.* 971. *Alcea* folio rotundo laciniato. *Pin.*

Alcée à feuilles rondes laciniées.

1153. *Malva tournefortiana*. *Malva* foliis radicalibus quinque partitis trilobis linearibus, pedunculis folio caulino longioribus, caule procumbente. *Linn. Sp. plant.* 971.

Mauve maritime de la Provence.

1154. *Lavatera olbia*. *Lavatera* caule fruticoso, foliis quinquelobo hastatis, floribus solitariis. *Linn. Sp. plant.* 972. *Althæa frutescens*, folio acuto, parvo flore. *Pin.*

Althæa en arbre à feuilles aiguës & à petites fleurs.

1155. *Lavatera trimestris*. *Lavatera* foliis glabris, caule serabro herbaceo, pedunculis unifloris, fructibus orbiculatis. *Linn. Sp. plant.* 974. *Malva* folio vario. *Pin.*

Mauve triennelle.

CLASSE XVII.

Des Diadelphiques.

1156. **F**UMARIA bulbosa. *Fumaria* caule simplici, bracteis longitudine florum. *Linn. Sp. plant.* 985. *Fumaria bulbosa* radice cava major. *Pin.*

Fumeterre bulbeuse.

1157. *Fumaria capnoides*. *Fumaria* siliquis linearibus tetra-

gonis caulibus diffusis acutangulis. *Linn. Sp. plant.* 984. *Fumaria lutea*. *Pin.*

Fumeterre jaune.

1158. *Fumaria officinalis*. *Fumaria pericarpis monospermis racemosis*, caule diffuso. *Linn. Sp. plant.* 984. *Fumaria officinarum & dioseoridis*. *Pin.*

Fumeterre des boutiques.

1159. *Fumaria spicata*. *Fumaria pericarpis monospermis spicatis*, caule erecto, foliis filiformibus. *Linn. Sp. plant.* 985. *Fumaria minor tenuifolia*. *Clus.*

Petite Fumeterre à feuilles menues.

1160. *Fumaria capreolata*. *Fumaria pericarpis monospermis racemosis*, foliis scandentibus subcirrhosis. *Linn. Sp. plant.* 985. *Fumaria major scandens*, flore pallidiore. *Rai. hist.*

Fumeterre à vrilles.

1161. *Polygala vulgaris*. *Polygala floribus cristatis racemosis*, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linearis lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 986. *Polygala vulgaris*. *Pin.*

Polygale commun.

1162. *Polygala amara*. *Polygala foliis cristatis racemosis*, caulibus erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. *Linn. Sp. plant.* 987. *Polygala huximinoris foliis*. *Vaill.*

Polygala à feuilles de petit buis.

1163. *Polygala monspeliaca*. *Polygala floribus cristatis racemosis caule erecto*, foliis lanceolato-linearibus acutis. *Linn. Sp. plant.* 987. *Polygala acutioribus foliis monspeliaca*. *Pin.*

Polygala de Montpellier.

1164. *Polygala chamæbuxus*. *Polygala floribus imberbibus sparsis*: carina apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 989. *Chamæbuxus flore coluteæ*. *Pin.*

Faux buis à feuilles de baguenaudier.

1165. *Spartium junceum*. *Spartium ramis oppositis teretibus apice floriferis*, foliis lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 995. *Genista juncea*. *Bauh. hist.*

Le Genest en forme de jonc.

1166. *Spartium scorpius*. *Spartium ramis spinosis patentibus*.

bus, foliis ovatis. *Linn. Sp. plant.* 995. Genista spartium spinosum majus flore luteo. *Pin.*

Grand Genest épineux à fleurs jaunes ; Jonc marin.

1167. Spartium complicatum. Spartium foliis ternatis foliolis conduplicatis, caulibus inermibus prostratis glabris, leguminibus scabris. *Linn. Sp. plant.* 996. Cytisus foliis incanis angustis quasi complicatis. *Pin.*

Cytise à feuilles blanches.

1168. Spartium scoparium. Spartium foliis ternatis solitariisque ramis inermibus angulatis. *Linn. Sp. plant.* 996. Genista angulosa & scoparia. *Pin.*

Genest anguleux.

1169. Spartium spinosum. Spartium foliis ternatis, ramis angulatis spinosis. *Linn. Sp. plant.* 997. Acacia trifolia. *Pin.*

Acacia à trois feuilles.

1170. Genista candicans. Genista foliis ternatis subtus villosis, pedunculis lateralibus subquinquefloris foliatis, leguminibus hirsutis. *Linn. Sp. plant.* 997. Cytisus sylvestris candicans. *Ces.*

Cytise de Montpellier.

1171. Genista sagittalis. Genista ramis ancipitibus articulatis, foliis ovato lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 998. Chamægenista sagittalis. *Pin.*

Genest en herbe.

1172. Genista tinctoria. Genista foliis lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. *Linn. Sp. plant.* 998. Genista tinctoria germanica. *Pin.*

Genest commun des teinturiers.

1173. Genista pilosa. Genista foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. *Linn. Sp. plant.* 999. Genista ramosa, foliis hyperici. *Pin.*

Genest rameux à feuilles de millepertuis.

1174. Genista purgans. Genista spinis terminalibus, ramis teretibus striatis, foliis lanceolatis simplicibus pubescentibus. *Linn. Sp. plant.* 999. Genista seu spartium purgans. *Bauh. hist.*

Genest purgatif.

1175. Genista hispanica. Genista spinis decompositis, ramis floriferis

floriferis inermibus , foliis linearibus pilosis. *Linn. Sp. plant.* 999. Genista spinosa minor hispanica villosissima. *Pin.*

Genest épineux d'Espagne.

1176. Ononis antiquorum. Ononis floribus solitariis foliolo majoribus , foliis inferioribus ternatis , ramis laviusculis spinosis. *Linn. Sp. plant.* 1006. Anonis legitima antiquorum. *Tour.*
L'Arrête-bœuf des anciens.

1177. Ononis spinosa. Ononis floribus racemosis geminis , foliis ternatis , superioribus solitariis , ramis inermibus subvillosis. *Linn. Sp. plant.* 1006. Anonis spinosa flore putpurco. *Pin.*

Arrête-bœuf épineux à fleurs rouges.

1178. Ononis minutissima. Ononis floribus subsessilibus lateralibus , foliis ternatis glabris , stipulis setaceis , calycibus aristatis corolla longioribus. *Linn. Sp. plant.* 1007. Anonis spinosa lutea minor. *Pin.*

Arrête-bœuf épineux à fleurs jaunes.

1179. Ononis cherleri. Ononis floribus sessilibus lateralibus , foliis omnibus ternatis petiolatis pilosis , stipulis serratis membranaceis. *Linn. Sp. plant.* 1007. Anonis pusilla & viscosa , purpurascente flore. *Tourn.*

Arrête-bœuf visqueux à fleurs purpurines.

1180. Ononis natrix. Ononis pedunculis unifloris aristatis , foliis ternatis ovatis , stipulis integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 1008. Ononis viscosa spinis carens lutea major. *Pin.*

Arrête-bœuf à fleurs jaunes.

1181. Ononis pinguis. Ononis pedunculis unifloris aristatis , foliis ternatis lanceolatis , stipulis integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 1009. Anonis non spinosa , flore luteo variegato. *Pin.*

Arrête-bœuf sans épines à fleurs jaunes variées.

1182. Ononis viscosa. Ononis pedunculis unifloris aristatis , foliis simplicibus : infimis ternatis. *Linn. Sp. plant.* 1009. Anonis viscosa spinis carens lutea. *Mag.*

Arrête-bœuf à fleurs jaunes & sans épines.

1183. Ononis fruticosa. Ononis fruticosa , floribus paniculatis , pedunculis subtrifloris , stipulis vaginalibus , foliis ter-

natis lanceolatis serratis. *Linn. Sp. plant.* 1010. Anonis montana piceox purpurea frutescens. *Dodart.*

Arrête-bœuf en arbre.

1184. Ononis reclinata. Ononis pedunculis unifloris muticis, fructibus cernuis, foliis ternatis subrotundis crenatis. *Linn. Sp. plant.* 1011. Anonis purpurea non spinosa minor. *Barr. Leon.*

Arrête-bœuf annuel à fleurs purpurines.

1185. Anthyllis vulneraria. Anthyllis herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Linn. Sp. plant.* 1012. Loto affinis vulneraria pratensis. *Pin.*

Vulnéraire des prés.

1186. Anthyllis montana. Anthyllis herbacea, foliis pinnatis æqualibus, capitulo terminali secundo, floribus obliquatis. *Linn. Sp. plant.* 1012. Loto affinis Astragalus villosus, floribus globosis. *Pin.*

Astragale à fleurs purpurnes

1187. Lupinus varius. Lupinus calycibus semiverticillatis appendiculatis: labio superiore bifido, inferiore subtridentato. *Linn. Sp. plant.* 1015. Lupinus sylvestris, flore cæruleo. *Pin.*

Lupin sauvage à fleurs bleues.

1188. Pisum sativum. Pisum petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Linn. Sp. plant.* 1026. Pisum hortense majus. *Pin.*

Grand pois des jardins.

1189. Pisum arvense. Pisum petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedunculis unifloris. *Linn. Sp. plant.* 1027. Pisum pulchrum, folio anguloso. *Bauh. hist.*

Pois des champs.

1190. Orobus luteus. Orobus foliis pinnatis ovato oblongis stipulis rotundato lunatis dentatis, caule simpliciter. *Linn. Sp. plant.* 1028. Orobus alpinus latifolius. *Pin.*

Orobe des Alpes à larges feuilles.

1191. Orobus vernus. Orobus foliis pinnatis ovatis, stipulis semi sagittatis integerrimis, caule simpliciter. *Linn. Sp. plant.* 1028. Orobus sylvaticus purpureus vernus. *Pin.*

Orobe printanier.

1192. Orobus tuberosus. Orobus foliis pinnatis lanceolatis stipulis semi-sagittatis integerrimis, caule simpliciter. *Linn.*

Sp. plant. 1028. *Astragalus sylvaticus*, foliis oblongis glabris.
Pin.

Orobe à racines tubéreuses.

1193. *Orobus niger*. *Orobus* caule ramoso, foliis sexjugis ovato oblongis. *Linn. Sp. plant.* 1028. *Orobus sylvaticus* vicie foliis. *Pin.*

Orobe des bois à feuilles de vesce.

1194. *Orobus pyrenaicus*. *Orobus* caule ramoso, foliis bijugis lanceolatis nervosis, stipulis subspinosis. *Linn. Sp. plant.* 1029.

Orobe des Pyrénées à feuilles nerveuses.

1195. *Orobus sylvaticus*. *Orobus* caule ramoso hirsuto decumbente, foliis sub septem jugis. *Linn. Sp. plant.* 1029. *Orobus sylvaticus* nostras. *Ad. Paris.*

Orobe des bois.

1196. *Lathyrus aphaca*. *Lathyrus* pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, stipulis sagittato cordatis. *Linn. Sp. plant.* 1029. *Vicia lutea*, foliis convolvuli minoris. *Pin.*

Vesce jaune.

1197. *Lathyrus nissolia*. *Lathyrus* pedunculis unifloris, foliis symplicibus, stipulis subulatis. *Linn. Sp. plant.* 1029. *Lathyrus sylvestris* minor. *Pin.*

Petite Gesse sauvage.

1198. *Lathyrus sativus*. *Lathyrus* pedunculis unifloris cirrhis diphyllis retraphyllisque, leguminibus ovatis compressis dorso bimarginatis. *Linn. Sp. plant.* 1030. *Lathyrus annuus*, flore caruleo, ochri siliqua. *Herm.*

Gesse cultivée.

1199. *Lathyrus setifolius*. *Lathyrus* pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis sericeo linearibus. *Linn. Sp. plant.* 1031. *Lathyrus sylvestris* major, angustissimo folio. *Pin.*

Grande Gesse sauvage à feuilles très-étroites.

1200. *Lathyrus angulatus*. *Lathyrus* pedunculis unifloris aristatis, cirrhis diphyllis, foliolis linearibus. *Linn. Sp. plant.* 1031. *Lathyrus angustissimo folio*, semine anguloso. *Tourn.*

Gesse à semences anguleuses.

1201. *Lathyrus articulatus*. *Lathyrus* pedunculis subunifloris, cirrhis polyphyllis; foliolis alternis. *Linn. Sp. plant.* 1031.

Lathyrus angustissimo folio, *americanus variegatus*. *Pin.*
Gesse articulée.

1202. *Lathyrus annuus*. *Lathyrus pedunculis bifloris*, *cirrhis diphyllis*; *foliis ensiformibus*, *leguminibus glabris*, *stipulis bipartitis*. *Linn. Sp. plant.* 1030. *Lathyrus hispanicus* *flore luteo*. *Herm. Ingd. b.*

Gesse annuelle.

1203. *Lathyrus hirsutus*. *Lathyrus pedunculis bifloris*, *cirrhis diphyllis*, *foliis linearis lanceolatis*, *leguminibus hirsutis*, *seminibus scabris*. *Linn. Sp. plant.* 1032. *Lathyrus angustifolius* *siliqua hirsuta*. *Pin.*

Gesse à siliques hérissées.

1204. *Lathyrus tuberosus*. *Lathyrus pedunculis multifloris*, *cirrhis diphyllis*, *foliis ovalibus*, *internodiis nudis*. *Linn. Sp. plant.* 1033. *Lathyrus arvensis repens tuberosus*. *Pin.*

Minfon.

1205. *Lathyrus pratensis*. *Lathyrus pedunculis multifloris* *cirrhis diphyllis simplicissimis*; *foliis lanceolatis*. *Linn. Sp. plant.* 1033. *Lathyrus sylvestris luteus*, *foliis vicæ*. *Pin.*

Gesse sauvage à fleurs jaunes & à feuilles de vesce.

1206. *Lathyrus sylvestris*. *Lathyrus pedunculis multifloris*, *cirrhis diphyllis*; *foliis ensiformibus*, *internodiis membranaceis*. *Linn. Sp. plant.* 1033. *Lathyrus sylvestris major*. *Pin.*

Grande Gesse sauvage.

1207. *Lathyrus latifolius*. *Lathyrus pedunculis multifloris*, *cirrhis diphyllis*; *foliis lanceolatis*, *internodiis membranaceis*. *Linn. Sp. plant.* 1033. *Lathyrus latifolius*. *Pin.*

Gesse à larges feuilles.

1208. *Lathyrus heterophyllus*. *Lathyrus pedunculis multifloris*, *cirrhis diphyllis* *tetraphyllisque foliis lanceolatis*, *internodiis membranaceis*. *Linn. Sp. plant.* 1034. *Lathyrus major narbonensis angustifolius*. *Bauh. hist.*

Grande Gesse des environs de Narbonne.

1209. *Lathyrus palustris*. *Lathyrus pedunculis multifloris*; *cirrhis polyphyllis*, *stipulis lanceolatis*. *Linn. Sp. plant.* 1034. *Lathyrus peregrinus*, *foliis vicæ*, *flore subcæruleo*, *pallideve purpurascente flore*. *Pin.*

Gesse des marais.

1210. *Vicia dumetorum*. *Vicia pedunculis multifloris*, *se-*

liolis reflexis ovatis mucronatis , stipulis subdentatis. *Linn. Sp. plant.* 1035. Vicia maxima dumetorum. *Pin.*

Grande Vesce des bois.

1211. Vicia sylvatica. Vicia pedunculis multifloris , foliolis ovalibus , stipulis dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1033. Vicia multiflora maxima perennis , tetro odore , floribus albescentibus , lincis caeruleis notatis. *Pluk. alm.*

Vesce des bois.

1212. Vicia cracea. Vicia pedunculis multifloris , floribus imbricatis , foliolis lanceolatis pubescentibus , stipulis integris. *Linn. Sp. plant.* 1035. Vicia sylvestris spicata. *Pin.*

Vesce sauvage à épis.

1213. Vicia onobrychioides. Vicia pedunculis multifloris , floribus distantibus , foliolis linearibus , stipulis inferne denticulatis. *Linn. Sp. plant.* 1036. Vicia onobrychoidis folio. *Pin.*

Vesce à feuilles de sainfoin.

1214. Vicia sativa. Vicia leguminibus sessilibus subbinatis erectis , foliis retusis , stipulis notatis. *Linn. Sp. plant.* 1037. Vicia sativa vulgaris semine nigro. *Pin.*

Vesce commune à semences noires.

1215. Vicia lutea. Vicia leguminibus sessilibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis , corollæ vexillis glabris. *Linn. Sp. plant.* 1037. Vicia sylvestris lutea , siliqua hirsuta. *Pin.*

Vesce sauvage à fleurs jaunes.

1216. Vicia hybrida. Vicia leguminibus sessilibus reflexis pilosis pentaspermis , corollæ vexillis villosis. *Linn. Sp. plant.* 1037.

Vesce bâtarde.

1217. Vicia peregrina. Vicia leguminibus subsessilibus pendulis glabris tetraspermis , foliolis linearibus emarginatis. *Linn. Sp. plant.* 1038. Vicia angustifolia purpureo-violacea , siliqua lœve glabra. *Magn.*

Vesce à fleurs d'un pourpre violet.

1218. Vicia sepium. Vicia leguminibus pedicellatis subquaternis erectis foliolis ovatis integerrimis : exterioribus decrecentibus. *Linn. Sp. plant.* 1038. Vicia sepium , folio rotundiore acuto. *Pin.*

Vesce des hayes.

1219. Vicia narbonensis. Vicia leguminibus subsessilibus

subternatis erectis, foliolis senis subovatis, stipulisque denticulatis. *Linn. Sp. plant.* 1038. Faba sylvestris fructu rotundo atro. *Pin.*

Vesce de Narbonne.

1220. Ervum lens. Ervum pedunculis subbifloris, seminibus compressis convexis. *Linn. Sp. plant.* 1039. Lens vulgaris. *Pin.*

Lentille.

1221. Ervum tetraspermum. Ervum pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *Linn. Sp. plant.* 1039. Vicia segetum, singularibus filiquis glabris. *Pin.*

Petite Vesce des bleds.

1222. Ervum hirsutum. Ervum pedunculis multifloris, seminibus globosis. *Linn. Sp. plant.* 1040. Vicia segetum cum filiquis plurimis hirsutis. *Pin.*

Ers hérissé.

1223. Ervum soloniense. Ervum pedunculis subbifloris aristatis, petiolis acuminatis, foliolis obtusis. *Linn. Sp. plant.* 1040. Vicia minima præcox parisiensium. *Tourn.*

La plus petite Vesce printanière des environs de Paris.

1224. Ervum ervilia. Ervum germinibus undato-plicatis, foliis impari pinnatis. *Linn. Sp. plant.* 1040. Orobus filiquis articulatis flore majore. *Pin.*

Orobe à filiques articulées.

1225. Cytisus nigricans. Cytisus racemis symplicibus erectis, foliolis ovato-oblongis. *Linn. Sp. plant.* 1041. Cytisus glaber nigricans. *Pin.*

Cytise noirâtre.

1226. Cytisus sessilifolius. Cytisus racemis erectis, calycibus bractea triplici, foliis floralibus sessilibus. *Linn. Sp. plant.* 1041. Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis. *Pin.*

Cytise à filiques larges.

1227. Cytisus supinus. Cytisus floribus umbellatis terminatilibus, ramis decumbentibus, foliolis ovatis. *Linn. Sp. plant.* 1040.

Cytise incliné.

1228. Cytisus argenteus. Cytisus floribus subsessilibus, foliis

tomentosis, caulibus herbaceis, stipulis minutis. *Linn. Sp. plant.* 1043. *Lorus fruticosus incanus filiquosus. Pin.*

Cytise à feuilles argentées.

1229. *Colutea arborescens. Colutea arborea*, foliolis obcordatis. *Linn. Sp. plant.* 1045. *Colutea vesicaria. Pin.*

Baguenaudier en arbre.

1230. *Ulex europæus. Ulex foliis villosis acutis*, spinis sparsis. *Linn. Sp. plant.* 1045. *Genista spinosa major*, longioribus aculeis. *Pin.*

Grand Genêt épineux, à jonc.

1231. *Glycyrrhiza glabra. Glycyrrhiza leguminibus glabris*, stipulis nullis. *Linn. Sp. plant.* 1046. *Glycyrrhiza vulgaris. Dod.*

Réglisse commun.

1232. *Coronilla emerus. Coronilla fruticosa*, pedunculis subtrifloris, corollarum unguibus calyce triplo longioribus caule angulato. *Linn. Sp. plant.* 1046. *Colutea filiquosa*, seu *scorpiosa major. Pin.*

Grand Baguenaudier en forme de scorpion.

1233. *Coronilla juncea. Coronilla fruticosa*, foliis quinatis ternatisque linearilanceolatis subcarnosis obtusis. *Linn. Sp. plant.* 1047. *Colutea caule genistæ fungoso. Bauh. hist.*

Baguenaudier à tiges de genêt.

1234. *Coronilla glauca. Coronilla fruticosa*, foliis septenis, stipulis lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 1047. *Coronilla maritima glauco folio. Tourn.*

Coronille maritime.

1235. *Coronilla coronata. Coronilla fruticosa*, foliis novenis obovatis: foliolis intimis caule approximatis, stipulis oppositi-foliis bipartitis. *Linn. Sp. plant.* 1047.

Petit Baguenaudier à feuilles de scorpion.

1236. *Coronilla minima. Coronilla procumbens*, foliolis novenis lanceolatis, stipulis oppositi foliis emarginatis, leguminibus angulatis nodosis. *Linn. Sp. plant.* 1049. *Ferrum equinum filiquis in summitate. Pin.*

Coronille de la plus petite espèce.

1237. *Coronilla varia. Coronilla herbacea*, leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris.

Linna. Sp. plant. 1048. *Securidaca dumetorum* major, flore vatio, siliquis articulatis. *Pin.*

Coronille à fleurs panachées.

1238. *Ornithopus perpusillus*. *Ornithopus* foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis. *Linna. Sp. plant.* 1049. *Ornithopodium majus*. *Pin.*

Pied d'Oiseau de la grande espèce.

1239. *Ornithopus scorpioides*. *Ornithopus* foliis ternatis subsessilibus: impari maximo. *Linna. Sp. plant.* 1049. *Telephium dioscoridis* seu *scorpioides*. *Pin.*

Scorpioide à feuilles de pourpier.

1240. *Hippocrepis multifiliquosa*. *Hippocrepis* leguminibus pedunculatis confertis, margine altero lobatis. *Linna. Sp. plant.* 1050. *Ferrum equinum* siliqua multiplici. *Pin.*

Fer de cheval à plusieurs filiques.

1241. *Hippocrepis comosa*. *Hippocrepis* leguminibus pedunculatis confertis, margine exteriori repandis. *Linna. Sp. plant.* 1050. *Ferrum equinum germanicum* siliquis in summitate. *Pin.*

Fer de cheval chevelu.

1242. *Astragalus glycyphyllos*. *Astragalus* caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. *Linna. Sp. plant.* 1067. *Glycyrrhiza sylvestris*, floribus luteo pallefcentibus. *Pin.*

Réglisse sauvage à fleurs d'un jaune pâle.

1243. *Astragalus hamosus*. *Astragalus* caulescens procumbens, leguminibus subulatis recurvatis glabris. *Linna. Sp. plant.* 1067. *Astragalus monspeliacus*. *Cus.*

Astragale de Montpellier.

1244. *Astragalus sesameus*. *Astragalus* caulescens diffusus, capitulis subsessilibus lateralibus, leguminibus erectis subulatis acumine reflexis. *Linna. Sp. plant.* 1068. *Ornithopodio* affinis hirsuto, fructu stellato. *Pin.*

Astragale annuel à feuilles étroites & à petites fleurs bleues.

1245. *Astragalus epiglottis*. *Astragalus* caulescens procumbens, leguminibus capitatis cordatis acutis hirsutis complicatis. *Linna. Sp. plant.* 1069. *Astragaloides incana*, flore purpureo lentis siliqua. *Barr.*

Astragale d'Espagne.

1246. *Astragalus vesicarius*. *Astragalus acaulos*, scapis folio longioribus laxè spicatis, calycibus leguminibusque inflatis hirsutis. *Linn. Sp. plant.* 1071. *Astragalus alpinus*, tragacantha folio, vesicarius. *Tourn.*

Astragale des Alpes.

1247. *Astragalus monspessulanus*. *Astragalus acaulis*, scapis declinatis, longitudine foliorum, leguminibus subulatis teretibus subarcuatis glabris. *Linn. Sp. plant.* 1072. *Astragalus monspessulanus*. *Bauh. hist.*

Astragale de Montpellier.

1248. *Astragalus incanus*. *Astragalus acaulis*, scapis declinatis foliis tomentosis, leguminibus subulatis subarcuatis, subtomentosis apice reflexo. *Linn. Sp. plant.* 1072. *Astragalus incanus* siliqua incurva. *Magn.*

Astragale blanchâtre.

1249. *Astragalus depressus*. *Astragalus acaulis*, scapis folio brevioribus, leguminibus cernuis, foliolis subemarginatis nudis. *Linn. Sp. plant.* 1073. *Astragalus supinus minor*, flosculis albis. *Pin.*

Petite Astragale panchée, à petites fleurs blanches.

1250. *Biserrula pelecinus*. *Biserrula*. *Linn. Sp. plant.* 1073. *Securidaca* siliquis planis utrinque dentatis. *Pin.*

Astragale à fleurs purpurines & annuelles.

1251. *Pforalea bituminosa*. *Pforalea* foliis omnibus ternatis: pedunculis capitatis. *Linn. Sp. plant.* 1075. *Trifolium bitumen* redolens. *Pin.*

Trèfle à odeur de bitume.

1252. *Trifolium melilotus officinalis*. *Trifolium* leguminibus racemosis, nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. *Linn. Sp. plant.* 1038. *Trifolium odoratum* seu *melilotus*. *Dod.*

Melilot.

1253. *Trifolium melilotus ornithopodioides*. *Trifolium* leguminibus nudis cerospermis subternis calyce duplo longioribus caulis declinatis. *Linn. Sp. plant.* 1078. *Trifolium* siliquosum, loto affine, siliquis ornithopodii. *Rat.*

Melilot à forme de pieds d'oiseau.

1254. *Trifolium hybridum*. *Trifolium* capitulis umbellari-

bus leguminibus tetraspermis , caule adscendente. *Linn. Sp. plant.* 1080. *Trifolium pratense corymbosum.* *Mich.*

Trèfle des prés en bouquets.

1255. *Trifolium repens.* *Trifolium capitulis umbellaribus , leguminibus tetraspermis , caule repente.* *Linn. Sp. plant.* 1080. *Trifolium pratense album.* *Pin.*

Trèfle des prés.

1256. *Trifolium alpinum.* *Trifolium scapo nudo , leguminibus dispermis pendulis , foliis lineari lanceolatis.* *Linn. Sp. plant.* 1080. *Trifolium alpinum , flore magno , radice dulci.* *Pin.*

Trèfle des Alpes à grandes fleurs.

1257. *Trifolium subterraneum.* *Trifolium capitulis vix quinquefloris , involucri centrali reflexo rigido fructum obvolvante.* *Linn. Sp. plant.* 1080. *Trifolium pratense supinum cathobleps.* *Barr.*

Trèfle couché sur terre.

1258. *Trifolium cherleri.* *Trifolium capitulis villosis hemisphericis terminalibus bractea subcalyculatis calycibus omnibus fertilibus.* *Linn. Sp. plant.* 1081. *Trifolium globosum repens.* *Pin.*

Trèfle globuleux rampant.

1259. *Trifolium rubens.* *Trifolium spicis villosis longis , corollis monopetalis , caule erecto , foliis ferrulatis.* *Linn. Sp. plant.* 1081. *Trifolium montanum , spica longissima rubente.* *Pin.*

Trèfle de montagnes à épis longs & rouges.

1260. *Trifolium pratense.* *Trifolium spicis subvillosis , cinctis stipulis oppositis membranaceis , corollis monopetalis.* *Linn. Sp. plant.* 1082. *Trifolium pratense purpureum.* *Pin.*

Trèfle des prés.

1261. *Trifolium alpestre.* *Trifolium spicis subglobosis villosis terminalibus sessilibus , caule erecto , foliis lanceolatis ferrulatis.* *Linn. Sp. plant.* 1082. *Trifolium montanum purpureum majus.* *Pin.*

Grand Trèfle de montagnes.

1262. *Trifolium lappaceum.* *Trifolium spicis globosis subsessilibus terminalibus , calycibus setis rigidis terminatis , caule erecto.* *Linn. Sp. plant.* 1082.

Trèfle globuleux.

1263. *Trifolium angustifolium*. *Trifolium* spicis villosis conico oblongis, dentibus calycinis setaceis subæqualibus, foliis linearibus *Linn. Sp. plant.* 1083. *Trifolium montanum angustifolium spicatum. Pin.*

Trèfle de montagnes à feuilles étroites & en épis.

1264. *Trifolium arvense*. *Trifolium* spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis æqualibus. *Linn. Sp. plant.* 1083. *Trifolium arvense humile spicatum sculagopus. Pin.*

Trèfle nain des champs en épis.

1265. *Trifolium stellatum*. *Trifolium* spicis pilosis, calycibus patentibus, caule diffuso, foliolis obcordatis. *Linn. Sp. plant.* 1083. *Trifolium stellatum. Pin.*

Trèfle étoilé.

1266. *Trifolium scabrum*. *Trifolium* capitulis sessilibus lateralibus ovatis, calycibus inæqualibus rigidis persistentibus. *Linn. Sp. plant.* 1084. *Trifolium capitulo oblongo aspero. Pin.*

Trèfle à tête oblongue raboteuse.

1267. *Trifolium striatum*. *Trifolium* capitulis sessilibus sublateralibus ovatis, calycibus striatis rotundatis. *Linn. Sp. plant.* 1085.

Trèfle striée.

1268. *Trifolium spumosum*. *Trifolium* spicis ovatis calycibus inflatis glabris quinque dentatis, involucriis universalibus pentaphyllis. *Linn. Sp. plant.* 1085. *Trifolium capitulo spumoso lavi. Pin.*

Trèfle à tiges nues.

1269. *Trifolium tomentosum*. *Trifolium* capitulis sessilibus globosis tomentosis, calycibus inflatis obtusis. *Linn. Sp. plant.* 1086. *Trifolium fragiferum tomentosum. Magn.*

Trèfle cotonneux.

1270. *Trifolium fragiferum*. *Trifolium* capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repensibus. *Linn. Sp. plant.* 1086. *Trifolium fragiferum friscum. Pin.*

Trèfle qui porte des fraises.

1271. *Trifolium montanum*. *Trifolium* spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarscentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Linn. Sp. plant.* 1087. *Trifolium montanum album. Pin.*

Trèfle de montagnes à fleurs blanches.

1272. *Trifolium agrarium*. *Trifolium* spicis ovalibus imbricatis vexillis deflexis persistentibus , calycibus nudis , caule erecto. *Linn. Sp. plant.* 1087. *Trifolium agrarium*. *Dod.*

Tréfle des prés à fleurs jaunes à tête de houblon.

1273. *Trifolium spadiceum*. *Trifolium* spicis ovalibus imbricatis , vexillis deflexis persistentibus , calycibus pilosis , caule erecto. *Linn. Sp. plant.* 1087. *Trifolium pratense* , flore rufescente. *Vaill.*

Tréfle des prés à fleurs roussâtres.

1274. *Trifolium procumbens*. *Trifolium* spicis ovalibus imbricatis , vexillis deflexis persistentibus , caulibus procumbentibus. *Linn. Sp. plant.* 1088. *Trifolium pratense* luteo croceum. *Vaill.*

Tréfle des prés d'un jaune de safran.

1275. *Lotus maritimus*. *Lotus* leguminibus solitariis membranaceo-quadrangulatis , foliis glabris bracteis lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 1089. *Lotus siliquosa* lutea , siliquis pinnatis strictioribus & longioribus. *Rai. hist.*

Lotier maritime.

1276. *Lotus conjugatus*. *Lotus* leguminibus conjugatis membranacea-quadrangulis , bracteis oblongo ovatis. *Linn. Sp. plant.* 1089. *Lotus luteus* , siliqua angulosa. *Boerr.*

Lotier à fleurs jaunes à siliques anguleuses.

1277. *Lotus peregrinus*. *Lotus* leguminibus subbinatis linearibus compressis nutantibus. *Linn. Sp. plant.* 1090. *Lotus siliquis* geminis peregrina. *Boerr. lugd.*

Lotier étranger à silique double.

1278. *Lotus angustifolius*. *Lotus* leguminibus subbinatis linearibus strictis erectis , caule erecto , pedunculis alternis. *Linn. Sp. plant.* 1090. *Lotus pentaphyllos* minor hirsutus , siliqua angustissima. *Pin.*

Lotier à feuilles étroites.

1279. *Lotus hirsutus*. *Lotus* capitulis hirsutis , caule erecto hirsuto , leguminibus ovatis. *Linn. Sp. plant.* 1091. *Lotus pentaphyllos* siliquosus villosus. *Pin.*

Lotier à tête hérissée.

1280. *Lotus testus*. *Lotus* capitulis subglobosis , caule erecto , leguminibus erectis glabris. *Linn. Sp. plant.* 1092. *Lotus siliquosus* glaber , flore rotundo. *Pin.*

Lotier à siliques & à fleurs rondes.

1281. *Lotus corniculatus*. *Lotus* capsulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Linn. Sp. plant.* 1092. *Trifolium corniculatum*. *Dod.*

Trèfle cornu.

1282. *Lotus dorycnium*. *Lotus* capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis. *Linn. Sp. plant.* 1093. *Trifolium album angustifolium*, floribus veluti in capitulum congestis. *Pin.*

Trèfle blanc à feuilles étroites.

1283. *Trigonella polycerata*. *Trigonella* leguminibus subsessilibus congestis erectis, subrectis longis linearibus, pedunculis communibus muticis. *Linn. Sp. plant.* 1093. *Fœnum græcum sylvestre* alterum polycration. *Pin.*

Fenugrec sauvage.

1284. *Trigonella monspeliaca*. *Trigonella* leguminibus sessilibus congestis arcuatis divaricatis inclinatis brevibus, pedunculis molliter mucronatis. *Linn. Sp. plant.* 1095. *Hedysarum minimum*. *Datech.*

Fenugrec de Montpellier.

1285. *Trigonella fœnum græcum*. *Trigonella* leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. *Linn. Sp. plant.* 1095. *Fœnum græcum sativum*. *Pin.*

Fenugrec cultivé.

1286. *Medicago sativa*. *Medicago* pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Linn. Sp. plant.* 1096. *Medica legitima*. *Clus.*

Foin de Bourgogne.

1287. *Medicago falcata*. *Medicago* pedunculis racemosis, leguminibus lunosis, caule prostrato. *Linn. Sp. plant.* 1096. *Trifolium sylvestre luteum*, siliqua cornuta. *Pin.*

Trèfle sauvage à fleurs jaunes & à siliques cornues.

1288. *Medicago lupulina*. *Medicago* spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente. *Linn. Sp. plant.* 1097. *Trifolium pratense luteum*, capitulo brevior. *Pin.*

Trèfle des prés à fleurs jaunes.

1289. *Medicago marina*. *Medicago* pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis spinosis, caule procumbente tomentoso. *Linn. Sp. plant.* 1097. *Trifolium cochleatum maritimum* tomentosum. *Pin.*

Trèfle maritime cotonneux.

1290. *Medicago polymorpha*. *Medicago* leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Linn. Sp. plant.*
1097. *Trifolium cochleatum*, fructu nigro hispido. *Pin.*

Trèfle en coquille.

1291. *Medicago orbicularis*. *Medicago* leguminibus solitariis cochleatis compressis planis, stipulis ciliatis, caule diffuso. *Linn. Sp. plant.* 1097. *Medicago orbiculata*. *Bauh. hist.*

Luzerne orbiculaire.

1292. *Medicago scutellata*. *Medica* cochleata major dicarpus, capsula rotunda globosa scutellata. *Linn. Sp. plant.*
1097. *Medica scutellata*. *Bauh. hist.*

Luzerne en écuelle.

1293. *Medicago coronata*. *Medicago* fructu minimo coronulam utrinque dentatam referente. *Linn. Sp. plant.* 1098. *Medica coronata cherleri parva*. *Bauh. hist.*

Luzerne couronnée.

1294. *Medicago rigidula*. *Medicago* triphylla, leguminibus spinosis, foliolis interioribus cuneiformibus retusis, superioribus subrotundis. *Linn. Sp. plant.* 1098. *Trifolium* fructu compresso spinis horrido. *Pin.*

Trèfle à fruit applati & épineux.

1295. *Medicago hirsuta*. *Medicago* leguminibus solitariis globosis, brevissime echinatis, stipulis serratis. *Linn. Sp. plant.* 1099. *Trifolium echinatum arvense*. *Pin.*

Trèfle champêtre hérissé.

1296. *Medicago laciniata*. *Medicago* leguminibus cochleatis spinosis, stipulis contortis, foliis oblongis duplicato serratis. *Linn. Sp. plant.* 1099. *Medicago* fructu echinato, foliis linearibus dentatis. *Succ.*

Luzerne laciniée.

1297. *Medicago minima*. *Medicago* leguminibus cochleatis aculeis vacinatis alternis externa donatis, stipulis integris. *Linn. Sp. plant.* 1099. *Medica echinata minima*. *Bauh. hist.*

Petite Luzerne.



CLASSE XVIII.

Des Polyadelphiques.

1298. **H**YPERICUM ascyron. Hypericum floribus pentagynis, caule tetragono herbaceo erecto simpliciter, foliis laxibus integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 1102. Ascyron magno flore. *Pin.*
Millepertuis à grandes fleurs.

1299. Hypericum androsæum. Hypericum floribus trigynis, pericarpis baccatis, caule fruticoso ancipiti. *Linn. Sp. plant.* 1102. Androsæum maximum frutescens. *Pin.*
Millepertuis en arbre.

1300. Hypericum quadrangulum. Hypericum floribus trigynis caule quadrato herbaceo. *Linn. Sp. plant.* 1104. Hypericum vulgare minus, caule quadrangulo, foliis non perforatis. *Pin.*

Millepertuis à tiges quadrangulaires.

1301. Hypericum perforatum. Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido punctatis. *Linn. Sp. plant.* 1103. Hypericum vulgare. *Pin.*

Millepertuis commun.

1302. Hypericum humifusum. Hypericum floribus trigynis axillaribus solitariis, caulibus ancipitibus prostratis filiformibus foliis glabris. *Linn. Sp. plant.* 1105. Hypericum minus supinum seu supinum glabrum. *Pin.*

Millepertuis incliné.

1303. Hypericum montanum. Hypericum floribus trigynis, calycibus serraturis glandulosis, caule tereti erecto glabro, foliis ovatis. *Linn. Sp. plant.* 1105. Ascyrum. *Fusch.*

Millepertuis de montagnes.

1304. Hypericum hirsutum. Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. *Linn. Sp. plant.* 1105. Androsæum hirsutum. *Pin.*

Millepertuis hérissé.

1305. Hypericum tomentosum. Hypericum floribus trigynis,

calycibus serrato glandulosis , foliis semi-amplexicaulibus flexuosis tomentosis , caulibus prostratis. *Linn. Sp. plant.* 1106. *Hypericum supinum tomentosum majus & hispanicum. Pin.*

Millepertuis cotonneux.

1306. *Hypericum eloides. Hypericum floribus trigynis , caule tereti repente foliisque villosis subrotundis. Linn. Sp. plant.* 1106. *Aseyrum supinum villosum palustre. Pin.*

Millepertuis des marais.

1307. *Hypericum pulchrum. Hypericum floribus trigynis : calycibus serrato glandulosis , caule tereti , foliis perfoliatis cordatis glabris. Linn. Sp. plant.* 1106. *Hypericum minus erectum. Pin.*

Millepertuis de la belle espèce.

1308. *Hypericum nummularium. Hypericum floribus trigynis : calycibus serrato glandulosis , foliis cordato orbiculatis glabris. Linn. Sp. plant.* 1106. *Hypericum nummulariæ folio. Pin.*

Millepertuis à feuilles de nummulaire.

CLASSE XIX.

Des Syngenésiques.

1309. **T**RAGOPOGON pratense. *Tragopogon calycibus corollæ radium æquantibus , foliis integris strictis. Linn. Sp. plant.* 1109. *Tragopogon pratense luteum majus. Pin.*

Barbe de bouc des prés.

1310. *Tragopogon porrifolium. Tragopogon calycibus corollæ radio sesquialongioribus , foliis integris strictis , pedunculis superne incrassatis. Linn. Sp. plant.* 1110. *Tragopogon alterum seu barba hirci. Dalech.*

Barbe de bouc à feuilles de porreau.

1311. *Tragopogon crocifolium. Tragopogon calycibus corollæ radio longioribus , foliis integris , radicalibus pedunculisque basi villosis. Linn. Sp. plant.* 1110. *Tragopogon purpureo cæruleum crocifolium. Pin.*

Barbe de bouc à feuilles de safran.

1312. *Tragopogon dalechampii. Tragopogon calycibus*
monophyllis

monophyllis corollâ brevioribus inermibus , foliis runcinatis. *Linn. Sp. plant.* 1110. Hieracium asperum , flore magno dentatis leonis. *Pin.*

Grande Chichoracée.

1313. Tragopogon pictoides. Tragopogon calycibus monophyllis corolla brevioribus aculeatis , foliis runcinatis denticulatis. *Linn. Sp. plant.* 1111. Hieracium majus ; folio sonchi ; semine incurvo. *Pin.*

Laitron à feuilles laciniées de Crete.

1314. Tragopogon asperum. Tragopogon calycibus corolla brevioribus hispidis , foliis integris : caulinis oblongis. *Linn. Sp. plant.* 1111. Sonchus asper , subrotundo folio , major & minor. *Pin.*

Grand & petit Laitron à feuilles ob rondes.

1315. Scorzonera humilis. Scorzonera caule subnudo unifloro , foliis lato lanceolatis nervosis planis. *Linn. Sp. plant.* 1112. Scorzonera humilis latifolia nervosa. *Pin.*

Petite Scorfonere.

1316. Scorzonera angustifolia. Scorzonera foliis subulatis integris , pedunculo incrassato , caule simplicissimo basi villoso. *Linn. Sp. plant.* 1113. Scorzonera angustifolia prima. *Pin.*

Scorfonere à feuilles étroites.

1317. Scorzonera laciniata. Scorzonera foliis linearibus dentatis acutis , caule erecto : squamis calycinis patulo mucronatis. *Linn. Sp. plant.* 1114. Scorfonera foliis laciniatis. *Tourn.*

Scorfonere à feuilles laciniées.

1318. Scorzonera pictoides. Scorfonera foliis superioribus amplexicaulibus integerrimis , inferioribus runcinatis , pedunculis squamatis. *Linn. Sp. plant.* 1114. Sonchus lavis angustifolius. *Pin.*

Laitron lisse à feuilles étroites.

1319. Pictis echioides. Pictis perianthis exterioribus pentaphyllis interiore aristato majoribus. *Linn. Sp. plant.* 1114. Hieracium echioides capitulis cardui benedicti. *Pin.*

Chichoracée à tête de chardon benit.

1320. Pictis hieracioides. Pictis perianthis laxis , foliis integris. *Linn. Sp. plant.* 1115. Cichorium pratense luteum hirsutius asperum. *Pin.*

Chichorée des prés à fleurs jaunes.

1321. *Picris pyrenaica*. *Picris perianthis laxis*, caule piloso, foliis dentato sinuatis. *Linn. Sp. plant.* 1115. *Hieracium pyrenaicum*, *blattarix folio*, minus pilosum. *Herm. parod.*

Chichoracée des Pyrénées à feuilles de blattaire.

1322. *Sonchus palustris*. *Sonchus pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis*, foliis runcinatis basi sagittatis. *Linn. Sp. plant.* 1116. *Sonchus asper arboreescens*. *Pin.*

Laitron des marais.

1323. *Sonchus arvensis*. *Sonchus pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis*, foliis runcinatis basi cordatis. *Linn. Sp. plant.* 1116. *Hieracium majus*, folio sonchi, seu hieracium sonchites. *Pin.*

Laitron des champs.

1324. *Sonchus maritimus*. *Sonchus pedunculo nudo*, foliis lanceolatis amplexicaulibus indivisis retrorsum argute dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1116. *Chondrilla palustris longifolia sinuata laeviter spinosa*. *Rall.*

Laitron maritime.

1325. *Sonchus oleraceus*. *Sonchus pedunculis tomentosis*, calycibus glabris. *Linn. Sp. plant.* 1116. *Sonchus lavis laciniatus latifolius*. *Pin.*

Laitron lacinié à larges feuilles.

1326. *Sonchus tenerrimus*. *Sonchus pedunculis tomentosis*, calycibus pilosis. *Linn. Sp. plant.* 1117. *Chondrilla lutea*. *Bauh. hist.*

Laitron à petites déchiquetures.

1327. *Sonchus plumieri*. *Sonchus pedunculis nudis*, floribus paniculatis, foliis runcinatis. *Linn. Sp. plant.* 1117. *Lactuca alpina glabra*, acanthi folio, flore magno caeruleo. *Vaill.*

Laitron des Alpes à feuilles d'Acanthe.

1328. *Lactuca virosa*. *Lactuca foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis*. *Linn. Sp. plant.* 1119. *Lactuca sylvestris odore viroso*. *Pin.*

Laitue sauvage.

1329. *Lactuca saligna*. *Lactuca foliis hastato linearibus sessilibus carina aculeatis*. *Linn. Sp. plant.* 1119. *Lactuca sylvestris angusto laciniato folio*. *Magn.*

Laitue sauvage à feuilles étroites laciniées.

1330. *Lactuca perennis*. *Lactuca foliis linearibus dentato*

pinnatis : laciniis sursum dentatis. *Linn. Sp. plant. 1120.*
Chondrilla cærulea latifolia laciniata. Pin.

Laitue pérennelle.

1331. *Chondrilla juncea. Chondrilla. Linn. Sp. plant. 1120.*
Chondrilla juncea viscosa arvensis. Pin.

Chondrille en forme de jonc.

1332. *Prenanthes tenuifolia. Prenanthes foliis linearibus integerrimis. Linn. Sp. plant. 1120. Chondrilla angustissima longissimo integroque folio. Jussieu.*

Chondrille à feuilles entières très-longues & très-étroites.

1333. *Prenanthes viminea. Prenanthes foliorum ramentis cauli adnatis. Linn. Sp. plant. 1120. Chondrilla viminea viscosa montpeliaca. Pin.*

Chondrille de Montpellier.

1334. *Prenanthes purpurea. Prenanthes flosculis quinis, foliis lanceolatis denticulatis. Linn. Sp. plant. 1121. Lactuca montana purpurea cærulea minor. Pin.*

Chondrille de montagnes à fleurs pourpre bleues.

1335. *Prenanthes muralis. Prenanthes flosculis quinis, foliis runcinatis. Linn. Sp. plant. 1121. Sonchus lavis laciniatus muralis, parvis floribus. Pin.*

Laitron des murailles lacinié à petites fleurs.

1336. *Leontodon taraxacum. Leontodon calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulis laevibus. Linn. Sp. plant. 1121. Dens leonis latiore folio. Pin.*

Dent de lion à larges feuilles.

1337. *Leontodon bulbosum. Leontodon foliis oblongo ovatis subdentatis glabris, calyce laevi, scapo superne hirsuto. Linn. Sp. plant. 1122. Chondrilla bulbosa. Pin.*

Chondrille bulbeuse.

1338. *Leontodon autumnale. Leontodon caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. Linn. Sp. plant. 1123. Hieracium minus. Fusch.*

Petite Chichoracée.

1339. *Leontodon hastile. Leontodon scapo calyceque laevi foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. Linn. Sp. plant.*

1123. Taraxaconoides chondrilla glabro virenti folio. *Vaill.*

Dent de lion à feuilles étroites & longues & à petites fleurs.

1340. Leontodon tuberosum. Leontodon foliis runcinatis scabris, calyce hirsuto. *Linn. Sp. plant.* 1123. Dens leonis asphodeli bulbulis. *Pin.*

Dent de lion à racines tubéreuses.

1341. Leontodon hirtum. Leontodon calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis : pilis simplicissimis. *Linn. Sp. plant.*

1123. Hieracium, dentis leonis folio, hirsutie asperum magis laciniatum. *Pin.*

Petite Chichoracée à feuilles hérissées.

1342. Leontodon hispidum. Leontodon calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hispidis : pilis fulcatis. *Linn. Sp. plant.*

1124. Hieracium montanum, dentis leonis folio, seu laciniatum, lanuginoso folio. *Pin.*

Chichoracée de montagnes laciniée, à feuilles lanugineuses.

1343. Hieracium alpinum. Hieracium foliis oblongis integris dentatis, scapo subnudo unifloro, calyce piloso. *Linn. Sp. plant.*

1124. Hieracium alpinum pumilum, folio lanuginoso. *Pin.*

Chichoracée des Alpes.

1344. Hieracium pilosella. Hieracium foliis integerrimis ovatis, subtus tomentosis, caule repente, scapo unifloro. *Linn. Sp. plant.*

1125. Pilosella major repens hirsuta. *Pin.*

Grande Piloselle.

1345. Hieracium auricula. Hieracium foliis integerrimis lanceolatis, scapo nudo multifloro, stolonibus reptantibus. *Linn. Sp. plant.*

1126. Pilosella major erecta altera. *Pin.*

Grande Piloselle à tiges élevées.

1346. Hieracium cymosum. Hieracium foliis lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, floribus subumbellatis. *Linn. Sp. plant.*

1126. Pilosella montana hispida, parvo flore. *Pin.*

Piloselle de montagnes à petites fleurs.

1347. Hieracium murorum. Hieracium caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis ; caulino minori. *Linn. Sp. plant.*

1128. Hieracium murorum, folio pilosissimo. *Pin.*

Chichoracée des murs à feuilles très-poileuses.

1358. Hieracium paludosum. Hieracium caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. *Linn. Sp. plant.* 1129. Hieracium montanum latifolium glabrum minus. *Pin.*

Chichoracée à feuilles de chichorée.

1349. Hieracium cerinthoides. Hieracium foliis radicalibus obovatis denticulatis, caulinis oblongis semi-amplexicaulibus. *Linn. Sp. plant.* 1129. Hieracium pyrenaicum, foliis cerinthæ latifolium. *Tourn.*

Chichoracée des Pyrénées.

1350. Hieracium blattarioides. Hieracium foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis, floribus solitariis, calycibus laxis. *Linn. Sp. plant.* 1130. Hieracium pyrenaicum, blattariæ folio, minus hirsutum. *Tourn.*

Chichoracée à feuilles de blattaire.

1351. Hieracium villosum. Hieracium caule ramoso folioso, foliis hirtis : radicalibus lanceolato ovatis dentatis : caulinis amplexicaulibus cordatis. *Linn. Sp. plant.* 1130. Hieracium alpinum latifolium villosum magniflore. *Pin.*

Chichoracée des Alpes à larges feuilles & à grandes fleurs.

1352. Hieracium glutinosum. Hieracium foliis lanceolatis runcinatis scabriusculis, floribus umbellatis. *Linn. Sp. plant.* 1130. Hieracium dentis leonis folio, floribus parvis. *Pin.*

Chichoracée à feuilles de dent de lion & à petites fleurs.

1353. Hieracium umbellatum. Hieracium foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. *Linn. Sp. plant.* 1131. Hieracium fruticosum angustifolium majus. *Pin.*

Grande Chichoracée en arbre à feuilles étroites.

1354. Crepis barbata. Crepis involucris calyce longioribus : squamis setaceis sparsis. *Linn. Sp. plant.* 1131. Hieracium proliferum fulcatum *Pin.*

Chichoracée à calice barbu.

1355. Crepis foetida. Crepis foliis runcinato pinnatis hirtis, petiolis dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1133. Senecio hirsutus. *Pin.*

Chichoracée à odeur de castoreum.

1356. Crepis diofcoridis. Crepis foliis radicalibus runcinatis,

caulinis hastatis , calycibus subtoментosis. *Linn. Sp. plant.* 1133. *Hieracium majus erectum angustifolium* , caule lævi. *Pin.*

Grande Chichoracée élevée à feuilles étroites & à tige uni.

1137. *Crepis pulchra*. *Crepis* foliis sagittatis dentatis , caule paniculato , calycibus pyramidalis glabris. *Linn. Sp. plant.* 1134. *Hieracium annuum montanum* , caule canaliculato. *Morif.*

Chichoracée de montagnes annuelle , à tige cannelée.

1158. *Crepis testorum*. *Crepis* foliis lanceolato-runcinatis sessilibus lævibus : inferioribus dentatis , caule glabro. *Linn. Sp. plant.* 1135. *Hieracium chondrillæ folio hirsutum*. *Pin.*

Chichoracée hérissée à feuilles de chondrille.

1159. *Crepis biennis*. *Crepis* foliis runcinato pinnatifidis scabris : basi superne dentatis , calycibus muricatis. *Linn. Sp. plant.* 1186. *Hieracium erucæ folio hirsutum*. *Bauh. hist.*

Chichoracée hérissée à feuilles de roquette.

1160. *Andryala integrifolia*. *Andryala* foliis integris ovato oblongis tomentosis. *Linn. Sp. plant.* 1136. *Sonchus villosus luteus major*. *Pin.*

Laitron couvert de laine.

1161. *Andryala sinuata*. *Andryala* foliis runcinatis. *Linn. Sp. plant.* 1137. *Sonchus villosus minor*. *Pin.*

Petit Laitron velu à fleurs jaunes.

1162. *Hyoseris radiata*. *Hyoseris* scapis unifloris nudis , foliis glabris runcinatis , angulis dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1137. *Dens leonis minor* , foliis radiatis. *Pin.*

Petite dent de lion à feuilles radiées.

1163. *Hyoseris minima*. *Hyoseris* caule diviso nudo , pedunculis incrassatis. *Linn. Sp. plant.* 1138. *Hieracium minus* , folio subrotundo. *Pin.*

Petite Chichoracée à feuilles ob rondes.

1164. *Hyoseris hedypnois*. *Hyoseris* fructibus ovatis glabris , caule ramoso. *Linn. Sp. plant.* 1138. *Hieracium capitulum inclinans* , semine adunco. *Pin.*

Chichoracée à tête panchée.

1165. *Hypochaeris maculata*. *Hypochaeris* caule subnudo : ramo solitario , foliis ovato oblongis integris dentatis. *Linn.*

Sp. plant. 1140. *Hieracium alpinum latifolium hirsutius incanum*, flore magno. *Pin.*

Chichoracée des Alpes à larges feuilles.

1366. *Hypochaeris radicata*. *Hypochaeris* foliis runcinatis obtusis scabris, caule ramoso nudo lævi, pedunculis squamosis. *Linn. Sp. plant.* 1140. *Hieracium dentis leonis folio*, bulbosum. *Pin.*

Chichoracée à racines bulbeuses & à dent de lion.

1367. *Lapsana communis*. *Lapsana* calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Linn. Sp. plant.* 1141. *Lampfana*. *Dod. pempt.*

Lampfane.

1368. *Lapsana stellata*. *Lapsana* calycibus fructus undique patentibus : radiis subulatis, foliis canlinis lanceolatis indivisis. *Linn. Sp. plant.* 1141. *Hieracium filiqua falcata*. *Pin.*

Lampfane étoilée.

1369. *Catananche cœrulea*. *Catananche* squamis calycinis inferioribus ovatis. *Linn. Sp. plant.* 1142. *Chondrilla cœrulea cyari capitulo*. *Pin.*

Chondrille bleue à tête de bluets.

1370. *Cichorium intybus*. *Cichorium* floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Linn. Sp. plant.* 1142. *Cichorium sylvestre seu officinarum*. *Pin.*

Chichorée sauvage.

1371. *Cichorium endivia*. *Cichorium* floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Linn. Sp. plant.* 1142. *Cichorium latifolium seu endivia vulgaris*. *Pin.*

Endive.

1372. *Scolymus maculatus*. *Scolymus* foliis margine attenuatis. *Linn. Sp. plant.* 1143. *Scolymus theophrasti narbonensis*. *Clus.*

Epine jaune de Narbonne.

1373. *Scolymus hispanicus*. *Scolymus* foliis margine incrassatis. *Linn. Sp. plant.* 1143. *Scolymus chrysanthemos*. *Pin.*

Epine jaune d'Espagne.

1374. *Arctium lappa*. *Arctium* foliis cordatis incrimibus petiolatis. *Linn. Sp. plant.* 1143. *Lappa major seu arctium dioecoridis*. *Pin.*

Grande Bardane.

1375. *Serratula tinctoria*. *Serratula* foliis lyrato pinnatifidis, pinna terminali maxima, flosculis conformibus. *Linn. Sp. plant.* 1144. *Serratula*. *Pin.*

La Sarrette des teinturiers.

1376. *Serratula arvensis*. *Serratula* foliis dentatis spinosis. *Linn. Sp. plant.* 1149. *Carduus* in avena proveniens. *Pin.*

Chardon des vignes rampant, à feuilles de laitron.

1477. *Carduus leucographus*. *Carduus* foliis decurrentibus dentatis spinosis, pedunculis nudis longissimis unifloris, calycibus spinosis inclinatis. *Linn. Sp. plant.* 1149.

Chardon de Marie hérissé, à petite tête.

1378. *Carduus lanceolatus*. *Carduus* foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis, laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *Linn. Sp. plant.* 1149. *Carduus lanceolatus latifolius*. *Pin.*

Chardon lancéolé & à larges feuilles.

1379. *Carduus nutans*. *Carduus* semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis : squamis calycinis superne patentibus. *Linn. Sp. plant.* 1150. *Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris*. *Pin.*

Chardon flottant.

1380. *Carduus acanthoides*. *Carduus* foliis decurrentibus sinuatis margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. *Linn. Sp. plant.* 1150. *Carduus acanthoides*. *Bauh. hist.*

Chardon à feuilles d'acanthé.

1381. *Carduus crispus*. *Carduus* foliis decurrentibus sinuatis margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus inermibus. *Linn. Sp. plant.* 1150. *Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris*. *Læs. pruss.*

Chardon crépu.

1382. *Carduus palustris*. *Carduus* foliis decurrentibus dentatis : margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Linn. Sp. plant.* 1151. *Carduus palustris*. *Pin.*

Chardon des marais.

1383. *Carduus dissectus*. *Carduus* foliis decurrentibus lanceolatis, denticulis inermibus, calyce spinoso. *Linn. Sp. plant.* 1151. *Cirsium majus*, singulari capitulo magno, seu incanum varie dissectum. *Pin.*

Chardon découpé.

1384. *Carduus monspessulanus*. *Carduus* foliis decurrentibus lanceolatis subrepandis glabris inæqualiter ciliatis , pedunculis alternis , calycibus inermibus. *Linn. Sp. plant.* 1152. *Cirsium* foliis non hirsutis , floribus compactis. *Pin.*

Chardon de Montpellier.

1385. *Carduus defloratus*. *Carduus* foliis decurrentibus lanceolatis ferratis subsinuso ciliatis nudis , pedunculis longissimis lanuginosis unifloris. *Linn. Sp. plant.* 1152. *Cirsium* seu *carduus angustifolius*. *Pin.*

Chardon à feuilles étroites.

1386. *Carduus marianus*. *Carduus* foliis amplexicaulibus hastato pinnatifidis spinosis , calycibus aphyllis : spinis canaliculatis duplicato spinosis. *Linn. Sp. plant.* 1152. *Carduus* albis maculis notatus vulgaris. *Pin.*

Chardon de Marie.

1387. *Carduus crispus*. *Carduus* foliis sessilibus biseriam pinnatifidis : laciniis alternis erectis , calycibus globosis villosis. *Linn. Sp. plant.* 1153. *Carduus* capite rotundo tomentoso. *Pin.*

Chardon à têtes rondes cotonneuses.

1388. *Carduus tuberosus*. *Carduus* foliis petiolatis subdecurrentibus subpinnatifidis spinosis , caule inermi , floribus solitariis. *Linn. Sp. plant.* 1154.

Chardon à racines tubéreuses.

1389. *Carduus heterophyllus*. *Carduus* foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatisque , caule subunifloro , calyce inermi. *Linn. Sp. plant.* 1154. *Cirsium* maximum asphodeli radice. *Pin.*

Grand Chardon à racines d'asphodèle.

1390. *Carduus ferratuloïdes*. *Carduus* foliis amplexicaulibus lanceolatis integris : serraturis spinoso setaceis , pedunculis unifloris. *Linn. Sp. plant.* 1155. *Cirsium angustifolium* non laciniatum. *Pin.*

Chardon à forme de sarrette.

1391. *Carduus acaulis*. *Carduus* acaulis , calyce glabro. *Linn. Sp. plant.* 1156. *Carduus* acaulis , minore purpureo folio. *Pin.*

Chardon sans tiges.

1392. *Cnicus oleraceus*. *Cnicus* foliis pinnatifidis carinatis

nudis bracteis subcoloratis integris concavis. *Linn. Sp. plant.* 1156. *Carduus pratensis latifolius. Pin.*

Chardon des prés à larges feuilles.

1393. *Cnicus erisithales. Cnicus foliis amplexicaulibus pinnatifidis hirsutis, calycibus nutantibus glutinosis. Linn. Sp. plant.* 1157. *Cirsium acanthoides montanum, flore purpurascente. Tour.*

Chardon des prés à petites feuilles laciniées.

1394. *Cnicus centauroides. Cnicus foliis pinnatifidis, squamis calycinis membranaceis. Linn. Sp. plant.* 1157. *Centaurium majus, foliis cinaræ cornuti. Moris.*

Grande Centaurée à feuilles d'artichaut.

1395. *Onopordum acanthium, Onopordum calycibus squarrosis: spinis subulatis, foliis ovato oblongis sinuatis. Linn. Sp. plant.* 1158. *Spina alba tomentosa latifolia sylvestris. Pin.*

Chardon cotonneux à feuilles d'acanthé.

1396. *Onopordum illyricum. Onopordum calycibus squarrosis: spinis lanceolatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. Linn. Sp. plant.* 1158. *Spina tomentosa altera spinosior. Pin.*

Chardon cotonneux plus épineux.

1397. *Onopordum arabicum. Onopordum calycibus imbricatis. Linn. Sp. plant.* 1159. *Carduus tomentosus acanthi folio, altissimus lusitanicus. Tour.*

Chardon cotonneux de Portugal à feuilles d'acanthé.

1398. *Cynara scolymus. Cynara foliis subspinosis pinnatis indivisisque, calycinis squamis ovatis. Linn. Sp. plant.* 1159. *Cinara sylvestris latifolia. Pin.*

Artichaut.

1399. *Carlina acaulos. Carlina caule uniflora flore brevior. Linn. Sp. plant.* 1160. *Carlina acaulos magno flore albo. Pin.*

Carlina sans tige.

1400. *Carlina lanata. Carlina caule submultiflora lanato: calycibus radio purpureis. Linn. Sp. plant.* 1160. *Carlina flore purpureo rubente patulo Garid.*

Carlina à fleurs purpurines.

1401. *Carlina corymbosa. Carlina caule multiflora subdiviso, floribus sessilibus, calycibus radio flavis. Linn. Sp. plant.* 1160. *Carlina sylvestris flore aureo perennis. Tour.*

Carlina sauvage pérennelle à fleurs dorées.

1402. *Carlina vulgaris*. *Carlina* caule multifloro corymboso , floribus terminalibus , calycibus radio albis. *Linn. Sp. plant.*
1161. *Carlina sylvestris vulgaris*. *Clasf.*

Carlina commune.

1403. *Carlina pyrenaica*. *Carlina* caule multifloro , foliis decurrentibus. *Linn. Sp. plant.* 1161. *Carduus tomentosus pyrenaicus spinosissimus flore albo*. *Burf.*

Carlina des Pyrénées.

1404. *Carthamus lanatus*. *Carthamus* caule piloso : superne lanato , foliis inferioribus pinnatifidis , summis amplexicaulibus dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1163. *Atracthylis lutea*. *Pin.*

Carthame à tige poileuse.

1405. *Carthamus mitissimus*. *Carthamus* foliis inermibus : radicalibus dentatis , caulinis pinnatis. *Linn. Sp. plant.* 1164. *Carthamoides caerulea humilis & mitior* *Vaill.*

Carthame nain à fleurs bleues.

1406. *Carthamus carduncellus*. *Carthamus* foliis caulinis linearibus pinnatis longitudine plantæ. *Linn. Sp. plant.* 1164. *Eryngium montanum minimum* , capitulo magno. *Pin.*

Petit Eryngium de montagnes.

1407. *Bidens tripartita*. *Bidens* foliis trifidis , calycibus sub foliosis , seminibus erectis. *Linn. Sp. plant.* 1165. *Cannabina aquatica folio tripartitum diviso*. *Pin.*

Chanvre aquatique à feuilles découpées en trois.

1408. *Bidens minima*. *Bidens* foliis lanceolatis sessilibus floribus seminibusque erectis. *Linn. Sp. plant.* 1165. *Verbesina minima*. *Dill.*

Chardon aquatique à feuilles lancéolées sans queues.

1409. *Bidens cernua*. *Bidens* foliis lanceolatis amplexicaulibus , floribus cernuis , seminibus erectis. *Linn. Sp. plant.* 1163. *Cannabina aquatica folio non diviso*. *Pin.*

Chanvre aquatique à feuilles non divisées.

1410. *Cacalia saraunica*. *Cacalia* caule herbaceo , foliis lanceolatis serratis decurrentibus. *Linn. Sp. plant.* 1169. *Senecio vulgaris* , solidaginis folio. *Vaill.*

Conyse de montagnes à feuilles plus longues en forme de scie , & à fleurs couleur de soufre blanchâtre.

1411. *Cacalia alpina*. *Cacalia* foliis reniformibus acutis

denticulatis , calycibus subtrifloris. *Linn. Sp. plant.* 1170. Tussilago caule ramposo. *Sauvage.*

Pas d'âne à tiges rameuses.

1412. Eupatorium cannabinum. Eupatorium foliis digitatis. *Linn. Sp. plant.* 1173. Eupatorium cannabinum. *Pin.*

Eupatoire à feuilles de chanvre.

1413. Sthœchelina dubia. Sthœchelina foliis linearibus denticulatis, squamis calycinis lanceolatis, pappo calytibus duplo longiore. *Linn. Sp. plant.* 1176. Elychrysium sylvestre, flore oblongo. *Pin.*

Stœchas à odeur & à fleurs purpurines.

1414. Chrysocoma lynosyris. Chrysocoma herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus laxis. *Linn. Sp. plant.* 1178. Linaria folioso capitulo luteo, major & minor. *Pin.*

Linaires à tête jaune feuillue.

1415. Athanasia maritima. Athanasia pedunculis unifloris subcorymbosis, foliis lanceolatis indivisis crenatis obtusis tomentosis. *Linn. Sp. plant.* 1180. Gnapholium maritimum. *Pin.*

Pied de chat maritime.

1416. Artemisia campestris. Artemisia foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Linn. Sp. plant.* 1185. Abrotanum campestre. *Pin.*

Aurone champêtre.

1417. Artemisia maritima. Artemisia foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis femineis ternis. *Linn. Sp. plant.* 1186. Absynthium seriphium belgicum. *Pin.*

Armoise maritime.

1418. Artemisia absynthium. Artemisia foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis : receptaculo villoso. *Linn. Sp. plant.* 1188. Absynthium ponticum seu romanum, officinarum seu dioscoridis. *Pin.*

Petite Absynthe.

1419. Artemisia vulgaris. Artemisia foliis pinnatifidis planis incisfis : subtus tomentosis, racemis simplicibus, floribus ovatis : radio quinquefloro. *Linn. Sp. plant.* 1189. Artemisia vulgaris major. *Pin.*

Armoise commune.

1420. Artemisia caeruleascens. Artemisia foliis caulinis lan-

ceolaris integris ; radicalibus multifidis , flosculis fœminicis ternis. *Linn. Sp. plant.* 1189. *Absynthium maritimum* lavendulæ folio. *Pin.*

Absynthe maritime à feuilles de lavande.

1421. *Gnaphalium sordidum*. *Gnaphalium fruticosum* , foliis linearibus , pedunculis subtrifloris , calycinis squamis lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 1193. *Elychrysum sylvestre* angustifolium , capitulis conglobatis. *Pin.*

Pied de chat sauvage à petites feuilles à têtes conglobées.

1422. *Gnaphalium stœchas*. *Gnaphalium fruticosum* , foliis linearibus , ramis virgatis , corymbo composito. *Linn. Sp. plant.* 1193. *Elychrysum* seu *stœchas citrina* angustifolia. *Pin.*

Stœchas citrin à feuilles étroites.

1423. *Gnaphalium arenarium*. *Gnaphalium herbaceum* , foliis lanceolatis : inferioribus obtusis , caule simplicissimo ; corymbo composito. *Linn. Sp. plant.* 1195. *Elychrysum* seu *stœchas citrina* latifolia. *Pin.*

Stœchas citrin à larges feuilles.

1424. *Gnaphalium luteo album*. *Gnaphalium herbaceum* , foliis semi-amplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus , floribus conglomeratis. *Linn. Sp. plant.* 1196.

Pied de chat à fleurs d'un blanc jaunâtre.

1425. *Gnaphalium dioicum*. *Gnaphalium sarmentis* procumbentibus caule amplissimo , corymbo simplici terminali , floribus dioicis. *Linn. Sp. plant.* 1199. *Gnaphalium montanum* flore rotundiore. *Pin.*

Pied de chat de montagnes à fleurs rondes.

1426. *Gnaphalium sylvaticum*. *Gnaphalium* caule simplicissimo floribus sparsis. *Linn. Sp. plant.* 1200. *Gnaphalium majus* angusto oblongo folio , alterum.

Pied de chat des bois.

1427. *Gnaphalium uliginosum*. *Gnaphalium herbaceum* , caule ramoso diffuso , floribus confertis terminalibus. *Linn. Sp. plant.* 1200. *Gnaphalium annuum* serotinum , capitulis nigricantibus in humidis gaudens. *Morif*

1418. *Xeranthemum annuum*. *Xeranthemum herbaceum* ; foliis lanceolatis patentibus , caule herbaceo. *Linn. Sp. plant.* 1201. *Xeranthemum* , olex folio , capitulis simplicibus , incanum færens , flore purpurascente minore. *Morif.*

Jacée à feuilles d'olivier à petite fleur.

1419. *Conysa squarrosa*. *Conisa* foliis lanceolatis acutis , caule annuo corymboso. *Linn. Sp. plant.* 1205. *Conisa* major vulgaris. *Pin.*

Grande Conyse commune.

1430. *Erigeron viscosum*. *Erigeron* pedunculis unifloris lateralibus , foliis lanceolatis denticulatis calycibus squarrosis , cotollis radiatis. *Linn. Sp. plant.* 1209. *Conisa* mas theophrasti , major dioscoridis. *Pin.*

Grande Conyse mâle.

1431. *Erigeron graveolens*. *Erigeron* ramis lateralibus multifloris , foliis lanceolatis integerrimis , calycibus squarrosis. *Linn. Sp. plant.* 1210. *Conysa* fœmina theophrasti , minor dioscoridis. *Pin.*

Conyse femelle.

1432. *Erigeron ficulum*. *Erigeron* calycinis squamis inferioribus laxis florem superantibus. *Linn. Sp. plant.* 1210. *Conysa* species foliis virgæ aureæ. *Bauh. Hist.*

Conyse annuelle de Sicile.

1433. *Erigeron acre*. *Erigeron* pedunculis alternis unifloris. *Linn. Sp. plant.* 1212. *Conysa* cærulea acris. *Pin.*

Conyse âcre à fleurs bleues.

1434. *Erigeron tuberosum*. *Erigeron* foliis linearibus , ramis unifloris , caule suffruticoso. *Linn. Sp. plant.* 1212. *Erigeron* caule subunifloro , foliis lanceolato linearibus rigidis ; radice tuberosa. *Sauvage.*

Chondrille à racines bulbeuses.

1435. *Tussilago farfara*. *Tussilago* scapo imbricato unifloro foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Linn. Sp. plant.* 1214. *Tussilago* vulgaris. *Pin.*

Pas d'âne.

1436. *Tussilago alba*. *Tussilago* thyrsis fastigiato , flosculis fœmineis nudis paucis. *Linn. Sp. plant.* 1214. *Petasites* minor. *Pin.*

Petasite à fleurs blanches.

1417. *Tussilago petasites*. *Tussilago thyrso ovato*, flosculis omnibus hermaphroditis. *Linn. Sp. plant.* 1215. *Petasites major & vulgaris*. *Pin.*

Grand Petasite commun.

1438. *Senecio vulgaris*. *Senecio corollis nudis*, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. *Linn. Sp. plant.*

1217. *Senecio minor vulgaris*. *Pin.*

Petit Seneçon commun.

1439. *Senecio viscosus*. *Senecio corollis revolutis*, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Linn. Sp. plant.* 1217. *Senecio incanus pinguis*. *Pin.*

Seneçon visqueux.

1440. *Senecio sylvaticus*. *Senecio corollis revolutis*, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymbose erecto. *Linn. Sp. plant.* 1217. *Senecio minor latiore folio seu montanus*. *Pin.*

Seneçon de montagnes.

1441. *Senecio nebrodensis*. *Senecio corollis recurvatis*, foliis lyratis sinuatis obtusis petiolatis, caule hirsuto. *Linn. Sp. plant.* 1217. *Jacobæa montana senecionis pallido parvo flore*. *Barr.*

Jacobée de montagnes à petites feuilles de seneçon.

1442. *Senecio crucifolius*. *Senecio corollis radiantibus*, foliis pinnatifidis dentatis subhirsutis, caule erecto. *Linn. Sp. plant.* 1218. *Jacobæa artemisiæ folio*, radice repente. *Vaill.*

La Jacobée à feuilles d'armoise.

1443. *Senecio abrotanifolius*. *Senecio corollis radiantibus*, foliis pinnato multifidis linearibus nudis acutis, floribus corymbosis. *Linn. Sp. plant.* 1219. *Senecio foliis decompositis*. *Gutt.*

Seneçon à feuilles d'aurone.

1444. *Senecio jacobæa*. *Senecio corollis radiantibus*, foliis pinnato lyratis : lacinis laciniatis, caule erecto. *Linn. Sp. plant.* 1220. *Jacobæa vulgaris laciniata*. *Pin.*

Jacobée vulgaire laciniée.

1445. *Senecio paludosus*. *Senecio corollis radiantibus*, foliis ensiformibus acute serratis subtus villosis, caule stricto. *Linn. Sp. plant.* 1220. *Conysa palustris serratifolia*. *Pin.*

Seneçon des marais.

1446. *Senecio nemorensis*. *Senecio corollis radiantibus octo-*

nis, foliis lanceolatis biferratis subtus villosis, caule ramoso, Linn. Sp. plant. 1221. Jacobaea nemorensis, latiore rigidior & hirsuto folio. Rupp.

Senecion des bois.

1447. Senecio doria. Senecio corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis subdecurrentibus lanceolatis serratis: superioribus sensim minoribus. Linn. Sp. plant. 1221. Virga aurea major seu doria. Pin.

Grande Verge d'or.

1448. Senecio saracenicus. Senecio corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabresculis. Linn. Sp. plant. 1221. Virga aurea angustifolia serrata. Pin.

Verge d'or à feuilles étroites & en forme de scie.

1449. Senecio doronicum. Senecio corollis radiantibus, caule indiviso subunifloro, foliis indivisis serratis: radicalibus ovatis subtus villosis. Linn. Sp. plant. 1212. Doronicum longifolium hirsutie asperum. Pin.

Doronic à longues feuilles hérissées.

1450. Aster alpinus. Aster foliis lanceolatis hirtis: radicalibus obtusis, caule simplicissimo unifloro. Linn. Sp. plant. 1226. Aster montanus caeruleus, magno flore, foliis oblongis. Pin.

Aster de montagnes à grandes fleurs bleues & à feuilles oblongues.

1451. Aster tripolium. Aster foliis lanceolatis integerrimis carnosissimis glabris, ramis inæquatis, floribus corymbosis. Linn. Sp. plant. 1226. Tripolium majus caeruleum. Pin.

Aster maritime.

1452. Aster amellus. Aster foliis lanceolatis obtusis scabris trinerviis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis. Linn. Sp. plant. 1226. Aster atticus caeruleus vulgaris. Pin.

Aster bleu commun.

1453. Aster acris. Aster foliis lanceolato linearibus strictis integerrimis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pedunculis foliolosis. Linn. Sp. plant. 1228. Aster tripolii flore. Pin.

Aster acre.

1454. Solidago virga aurea Solidago caule subflexuoso angulato,

angulato , racemis paniculatis erectis confertis *Linn. Sp. plant.* 1235. Virga aurea latifolia ferrata. *Pin.*

Verge d'or à larges feuilles en forme de scie.

1455. Solidago minuta. Solidago caule simplicissimo , foliis caulinis integerrimis , pedunculis axillaribus unifloris. *Linn. Sp. plant.* 1235. Virga aurea humilis alpina. *Morif.*

Petite Verge d'or des Alpes.

1456. Inula helenium. Inula foliis amplexicaulibus ovatis rugosis : subtus tomentosis , calicum squamis ovatis. *Linn. Sp. plant.* 1236. Helenium vulgare. *Pin.*

Aulnée.

1457. Inula bifrons. Inula foliis oblongis decurrentibus denticulatis , floribus congestis terminalibus subsessilibus. *Linn. Sp. plant.* 1236. Conyza latifolia viscosa suaveolens , flore aureo e gallo provincia. *Garid.*

Conyse des Pyrénées à feuilles de primevère.

1458. Inula odora. Inula foliis amplexicaulibus dentatis hirsutissimis : radicalibus ovatis , caulinis lanceolatis , caule paucifloro. *Linn. Sp. plant.* 1236. Aster luteus , radice odora. *Pin.*

Aster jaune à racines odorantes.

1459. Inula dysenterica. Inula foliis amplexicaulibus cordato oblongis subtomentosis , caule villosa paniculato , squamis calycinis setaceis. *Linn. Sp. plant.* 1237. Aster pratensis autumnalis , conyza folio. *It. Gotl.*

Aster des prés automnal à feuilles de conyse.

1460. Inula pulicaria. Inula foliis amplexicaulibus undulatis caule prostrato , floribus subglobosis. *Linn. Sp. plant.* 1238. Conyza major flore globoso. *Pin.*

Grande Conyse à fleurs globuleuses.

1461. Inula salicina. Inula foliis sessilibus lanceolatis recurvis serrato scabris , floribus inferioribus altioribus , ramis subangulatis glabris. *Linn. Sp. plant.* 1238. Aster montanus luteus , salicis glabro folio. *Pin.*

Aster de montagnes jaune à feuilles de saule.

1462. Inula hirta. Inula foliis sessilibus lanceolatis recurvatis subserrato scabris , floribus inferioribus altioribus , caule teretiusculo subpiloso. *Linn. Sp. plant.*

Aster jaune à feuilles hérissées de saule.

1463. *Inula squarrosa*. *Inula* foliis ovalibus lævibus reticulato venosis subcrenatis, calycibus squarosis. *Linn. Sp. plant.* 1240. *Aster conyzoides odoratus luteus. Tour.*

Aster odorant jaune à forme de conyse.

1464. *Inula crithmoides*. *Inula* foliis linearibus carnosissimis tricuspidatis. *Linn. Sp. plant.* 1240. *Crithmum maritimum*, colore asteris attici. *Pin.*

Aster à forme de crithme maritime.

1465. *Inula provincialis*. *Inula* foliis subserratis subtus tomentosis : radicalibus petiolatis ovatis, caule erecto unifloro. *Linn. Sp. plant.* 1241. *Jacobæa rotundifolia incana. Pin.*

Jacobée blanchâtre à feuilles rondes.

1466. *Inula montana*. *Inula* foliis lanceolatis hirsutis integerrimis, caule unifloro, calyce brevi imbricato. *Linn. Sp. plant.* 1241. *Aster angustifolius luteus. Bauh.*

Aster à feuilles étroites jaune.

1467. *Cineraria palustris*. *Cineraria* floribus corymbosis, foliis lato-lanceolatis dentato sinuatis, caule villosa. *Linn. Sp. plant.* 1243. *Conyza aquatica laciniata. Pin.*

Conyse aquatique laciniée.

1468. *Cineraria alpina*. *Cineraria* umbella involucreta, pedunculo communi nudiusculo, foliis oblongis villosis. *Linn. Sp. plant.* 1243. *Othonna foliis lanceolatis integris subdentatis villosis, floribus umbellatis. Gouan.*

Conyse blanchâtre.

1469. *Cineraria maritima*. *Cineraria* floribus paniculatis, foliis pinnatifidis tomentosis : laciniis sinuatis, caule frutescente. *Linn. Sp. plant.* 1244. *Jacobæa maritima. Pin.*

Jacobée maritime.

1470. *Arnica montana*. *Arnica* foliis ovatis integris : caulinis geminis oppositis. *Linn. Sp. plant.* 1245. *Doronicum plantaginifolio alterum. Pin.*

Doronic à feuilles de plantain.

1471. *Doronicum plantagineum*. *Doronicum* foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis. *Linn. Sp. plant.* 1247. *Doronicum plantaginifolio. Pin.*

Petit Doronic des boutiques.

1472. *Bellis perennis*. *Bellis* scapo nudo. *Linn. Sp. plant.* 1248. *Bellis sylvestris minor. Pin.*

Petite Marguerite sauvage.

1473. *Bellis annua*. *Bellis* caule subfolioso *Linn. Sp. plant.*
1474. *Bellis maritima* foliis agerati. *Pin.*

Petite Marguerite annuelle.

1474. *Chrysanthemum leucanthemum*. *Chrysanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis : superne ferratis , inferne dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1251. *Bellis sylvestris*, caule folioso , major. *Pin.*

Grande Marguerite sauvage à tige feuillue.

1475. *Chrysanthemum montanum*. *Chrysanthemum* foliis imis spatulato-lanceolatis ferratis , summis linearibus *Linn. Sp. plant.* 1252. *Bellis montana minor*. *Magn.*

Petite Marguerite de montagnes.

1476. *Chrysanthemum graminifolium*. *Chrysanthemum* foliis linearibus subintegerrimis , caule simplicissimo. *Linn. Sp. plant.* 1252. *Leucanthemum gramineo folio*. *Tourn.*

Marguerite de montagnes à feuilles de chiendent.

1477. *Chrysanthemum monspeliense*. *Chrysanthemum* foliis imis palmatis , foliolo linearibus pinnatifidis. *Linn. Sp. plant.* 1252. *Leucanthemum montanum*, foliis *chrysanthemi*. *Tour.*

La grande Marguerite de montagnes de Montpellier.

1478. *Chrysanthemum inodorum*. *Chrysanthemum* foliis pinnatis multifidis , caule ramoso diffuso. *Linn. Sp. plant.* 1253. *Chamæmelum inodorum* seu *cotula non foetida* *Bauh. hist.* *Chamæmelum maritimum*. *Iter Goth.*

Camomille maritime.

1479. *Chrysanthemum segetum*. *Chrysanthemum* foliis amplexicaulibus , superne laciniatis , inferne dentato ferratis. *Linn. Sp. plant.* 1254. *Chrysanthemum segetum*. *Cus.*

Grande Marguerite jaune à feuilles profondément découpées.

1480. *Matricaria parthenium*. *Matricaria* foliis compositis planis : foliolis ovatis incisifs , pedunculis ramosis. *Linn. Sp. plant.* 1255. *Matricaria vulgaris* seu *sativa*. *Pin.*

Matricaire commune.

1481. *Matricaria maritima*. *Matricaria* receptaculis hemisphaericis , foliis bipinnatis subcarnosis : supra convexis , subtus carinatis. *Linn. Sp. plant.* 1256. *Chamæmelum maritimum*

perenne humilis , foliis brevioribus crassis obscure virentibus.
Rai.

Matricaire maritime.

1482. *Matricaria chamomilla*. *Matricaria* receptaculis conicis. radiis parvis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Linn. Sp. plant.* 1256. *Chamæmelum* vulgare seu *leucanthemum* *dioscoridis*. *Pin.*

Camomille commune.

1483. *Matricaria suaveolens*. *Matricaria* receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Linn. Sp. plant.* 1256. *Matricaria leucanthemos* annua *suaveolens*, *chamæmeli* folio, ovatis albicantibus. *Vaill.*

Camomille à odeur agréable.

1484. *Corula aurea*. *Corula* foliis pinnato setaceis multifidis, corollis radio destitutis. *Linn. Sp. plant.* 1257. *Anthemis chrysanthemum* *herbariorum*. *Lob.*

Camomille jaune étrangère, à tête sans feuilles.

1486. *Anthemis altissima*. *Anthemis* erecta, foliorum apicibus subspinosis. *Linn. Sp. plant.* 1259. *Chamæmelum leucanthemum hispanicum*, magno flore. *Pin.*

Grande Marguerite d'Espagne.

1486. *Anthemis maritima*. *Anthemis* foliis pinnatis dentatis carnosius nudis punctatis, caule prostrato, calycibus subcimentosis. *Linn. Sp. plant.* 1259. *Matricaria maritima*. *Pin.*

Camomille maritime.

1487. *Anthemis mixta*. *Anthemis* foliis simplicibus dentato laciniatis. *Linn. Sp. plant.* 1260. *Chamæmelum* annuum ramosum, coronopi folio, flore albo. 1260.

Camomille annuelle rameuse, à feuilles de corne de cerf.

1488. *Anthemis nobilis*. *Anthemis* foliis pinnato compositis linearibus acutis subvillosis. *Linn. Sp. plant.* 1260. *Chamæmelum nobile* seu *leucanthemum odoratum*. *Pin.*

Camomille à odeur; ou Camomille romaine.

1489. *Anthemis arvensis*. *Anthemis* receptaculis conicis, paleis setaceis: seminibus coronato marginatis. *Linn. Sp. plant.* 1261. *Chamæmelum inodorum*. *Pin.*

Camomille sans odeur.

1490. *Anthemis cotula*. *Anthemis receptaculis conicis : paleis setaceis , seminibus nudis. Linn. Sp. plant. 1261. Chamæmelum foetidum. Pin.*

Camomille puante.

1491. *Anthemis pyrethrum*. *Anthemis caulibus simplicibus unifloris decumbentibus , foliis pinnato multifidis Linn. Sp. plant. 1262. Pyrethrum flore bellidis. Pin.*

Pyrethre à fleurs de marguerite.

1492. *Anthemis valentina*. *Anthemis caule ramoso , foliis pubescentibus tripinnatis , calycibus villosis pedunculatis. Linn. Sp. plant. 1262. Chamæmelum foetidum maritimum. Vaill.*

Camomille puante maritime.

1493. *Achillea ageratum*. *Achillea foliis lanceolatis obtusis acute serratis. Linn. Sp. plant. 1264. Ageratum foliis serratis.*

Agerate à feuilles en forme de scie.

1494. *Achillea tomentosa*. *Achillea foliis pinnatis hirsutis ; pinnis linearibus dentatis. Linn. Sp. plant. 1264. Millefolium tomentosum luteum. Pin.*

Millefeuille cotonneuse à fleurs jaunes.

1495. *Achillea mactrophylla*. *Achillea foliis pinnatis planis inciso serratis : extimis majoribus coadunatis. Linn. Sp. plant. 1265. Dracunculus alpinus foliis scabiosis. Pin.*

Ptarmique des Alpes à feuilles de scabieuse.

1496. *Achillea ptarmica*. *Achillea foliis lanceolatis acuminate argute serratis. Linn. Sp. plant. 1266. Dracunculus pratensis , serrato folio. Pin.*

Ptarmique commune.

1497. *Achillea millefolium*. *Achillea foliis bipinnatis nudis : laciniis linearibus dentatis , caulibus sulcatis. Linn. Sp. plant. 1267. Millefolium vulgare album. Pin.*

Millefeuille commune blanche.

1498. *Achillea nobilis*. *Achillea foliis bipinnatis : inferioribus nudis planis , superioribus obtusis tomentosis , corymbis convexis confertissimis. Linn. Sp. plant. 1268. Tonanthum minus album , odore camphoræ. Pin.*

Petite Tanaisie blanche à odeur de camphre.

1499. *Achillea odorata*. *Achillea* foliis bipinnatis ovalibus nudiusculis, corymbis fastigiatis confertis. *Linn. Sp. plant.*
 1268. *Millefolium odoratum minus monspeliensium*. *Moriz.*
Petite Millefeuille odorante de Montpellier.

1500. *Buphtalmum spinosum*. *Buphtalmum* calycibus acute foliosis, foliis alternis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis, caule herbaceo. *Linn. Sp. plant.* 1274. *Aster* legitimus clusii alter seu spinosus luteus. *Barr.*

Œil de bœuf épineux.

1501. *Buphtalmum aquaticum*. *Buphtalmum* calycibus obtuse foliosis sessilibus axillaribus, foliis alternis oblongis obtusis, caule herbaceo. *Linn. Sp. plant.* 1274. *Chrysanthemum conyzoides lusitanicum*. *Breyn*

Œil de bœuf aquatique.

1502. *Buphtalmum maritimum*. *Buphtalmum* calycibus obtuse foliosis pedunculatis, foliis alternis spatulatis, caule herbaceo. *Linn. Sp. plant.* 1274. *Aster* luteus supinus. *Pin.*
Aster maritime pérennel.

1503-1504. *Buphtalmum salicifolium*. *Buphtalmum* foliis alternis lanceolatis subserratis villosis, calycibus nudis, caule herbaceo. *Linn. Sp. plant.* 1275. *Aster* luteus major; foliis succisæ. *Pin.*

Œil de bœuf à feuilles de saule.

1505. *Buphtalmum grandiflorum*. *Buphtalmum* foliis alternis lanceolatis subdenticulatis glabris, calycibus nudis, caule herbaceo. *Linn. Sp. plant.* 1275. *Aster* luteus angustifolius. *Pin.*

Aster jaune à feuilles étroites.

1506. *Coreopsis bidens*. *Coreopsis* foliis lanceolatis ferratis oppositis amplexicaulibus. *Linn. Sp. plant.* 1231. *Eupatorium cannabinum chrysanthemum*. *Barr. Ico.*

Eupatoire à feuilles de chanvre.

1507. *Centaurea crupina*. *Centaurea* calycibus inermibus squamis lineari subulatis, foliis pinnatis ferratis. *Linn. Sp. plant.* 1285. *Chondrilla* foliis laciniatis ferratis, purpurascens flore. *Pin.*

Chondrille à feuilles laciniées.

1508. *Centaurea pectinata*. *Centaurea* calycibus erectis

plumosis, foliis lyratis denticulatis : rameis lanceolatis integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 1287. *Jacea montana incana aspera, capitulis hispidis. Pin.*

Jacée de montagnes blanchâtres, laciniée, à tête hérissée.

1509. *Centaurea nigra.* *Centaurea calycibus ciliatis : squamula ovata : ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato angulatis, floribus flosculis. Linn. Sp. plant.* 1288. *Jacea nigra laciniata. Pin.*

Jacée noire à feuilles laciniées.

1510. *Centaurea pullata.* *Centaurea calycibus ciliatis verticillato foliolis, foliis lyratis dentatis obtusis. Linn. Sp. plant.* 1288. *Jacea humilis alba, hieracii folio. Pin.*

Jacée rampante presque sans tige, à fleurs blanches.

1511. *Centaurea cyanus.* *Centaurea calycibus ferratis : foliis linearibus integerrimis : infimis dentatis. Linn. Sp. plant.* 1289. *Cyanus segetum. Pin.*

Bluet.

1512. *Centaurea paniculata.* *Centaurea calycibus ciliatis : squamis planis, foliis bipinnatifidis, rameis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. Linn. Sp. plant.* 1289. *Centaureis majoris speciestenuifolia. Bauh. hist.*

Grande Centaurée à feuilles menues.

1513. *Centaurea scabiosa.* *Centaurea calycibus ciliatis foliis pinnatifidis : pinnis lanceolatis. Linn. Sp. plant.* 1261. *Scabiosa major, squammatis capitulis. Pin.*

Grande Scabieuse.

1514. *Centaurea amara.* *Centaurea calycibus scariosis : caulis decumbentibus, foliis lanceolatis integerrimis. Linn. Sp. plant.* 1292.

Bluet rampant à larges feuilles.

1515. *Centaurea jacea.* *Centaurea calycibus scariosis laceris, foliis lanceolatis : radicalibus sinuato dentatis, ramis angulatis. Linn. Sp. plant.* 1293. *Jacea nigra pratensis latifolia. Pin.*

Jacée commune.

1516. *Centaurea conifera.* *Centaurea calycibus scariosis foliis tomentosis : radicalibus lanceolatis, caulinis pinnatifidis.*

caule simplici. *Linn. Sp. plant.* 1294. *Jacea montana incana capite pini. Pin.*

Jacée de montagnes blanchâtre , à tête de pin.

1517. *Centaurea fonceifolia. Centaurea calycibus palmato spinosis , foliis decurrentibus spinulosis repando dentatis. Linn. Sp. plant.* 1294. *Jacea laciniata sonchi folio , seu jacea latifolia purpurea capite spinoso. Pin.*

Jacée laciniée à feuilles de jonc.

1518. *Centaurea aspera. Centaurea calycibus squamis palmato quinquespinois , foliis lanceolatis dentatis. Linn. Sp. plant.* 1296. *Storbe squamis asperis. Pin.*

Jacée à feuilles menues , à têtes épineuses , & à fleurs purpurines.

1519. *Centaurea calcitrapa. Centaurea calycibus subduplicato spinosis sessilibus , foliis linearibus pinnatifidis lateribus dentatis , caule piloso. Linn. Sp. plant.* 1297. *Carduus stellatus seu calcitrapa. Bauh. hist.*

Chardon étoilé.

1520. *Centaurea calcitrapoides. Centaurea calycibus subduplicato spinosis , foliis amplexicaulibus lanceolatis indivisis serratis. Linn. Sp. plant.* 1297. *Carduus stellatus foliis integris serratis. Magnol.*

Chardon étoilé à feuilles en scie.

1521. *Centaurea solstitialis. Centaurea calycibus duplicato spinosis solitariis , foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis radicalibus , lyrato pinnatifidis. Linn. Sp. plant.* 1297. *Carduus stellatus luteus , foliis cyani Pin.*

Chardon étoilé jaune , à feuilles de bluet.

1522. *Centaurea centauroides. Centaurea calycibus ciliatis spinosis , foliis lyrato pinnatis integerrimis : lacinia impari majore. Linn. Sp. plant.* 1298. *Jacea lutea spinosa centauroides. Pin.*

Jacée jaune épineuse , à forme de centaurée.

1523. *Centaurea collina. Centaurea calycibus ciliatis inermispinosis , foliis bipinnatis , caule angulato. Linn. Sp. plant.* 1298. *Jacea lutea , capite spinoso. Pin.*

Jacée jaune à tête épineuse.

1524. *Centaurea salmontica. Centaurea calycibus serula reflexa spinosis glabris , foliis lyrato runcinatis , serratis. Linn.*

Sp. plant. 1299. *Jacea major*, foliis chichoraceis mollibus lanuginosis. *Pin.*

Grande Jacée à feuilles de chichorée.

1525. *Centaurea nudicaulis*. *Centaurea* calycibus setaceo spinosis, foliis indivisis: superioribus subdentatis, caule sympleci nudiusculo uniflora. *Linn. Sp. plant.* 1300. *Jacea* foliis cerinthes, purpurascente flore à rupe victoriz.

Jacée à feuilles de cerinthe & à fleurs purpurines.

1526. *Centaurea galactites*. *Centaurea* calycibus setaceo spinosis, foliis decurrentibus sinuatis spinosis. *Linn. Sp. plant.* 1300. *Carduus tomentosus*, capitulo minore. *Pin.*

Chardon cotonneux à petite tête.

1527. *Calendula arvensis*. *Calendula* seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis: extimis erectis protentis. *Linn. Sp. plant.* 1303. *Caltha arvensis*. *Pin.*

Soucy champêtre.

1528. *Calendula officinalis*. *Calendula* seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Linn. Sp. plant.* 1304. *Caltha vulgaris*. *Pin.*

Soucy commun.

1529. *Filago pygmaea*. *Filago* floribus sessilibus terminalibus, foliis floralibus majoribus. *Linn. Sp. plant.* 1311. *Gnaphalium roseum hortense*. *Pin.*

Pied de chat des jardins à feuilles de rose.

1530. *Filago germanica*. *Filago* panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirsutis, foliis acutis. *Linn. Sp. plant.* 1311. *Gnaphalium vulgare majus*. *Pin.*

Le grand Pied de chat commun.

1531. *Filago montana*. *Filago* caule erecto diviso, floribus conicis lateralibus axillaribus. *Linn. Sp. plant.* 1311. *Gnaphalium minus repens*. *Pin.*

Petit Pied de chat de montagnes.

1532. *Filago gallica*. *Filago* caule erecto dichotomo, floribus subulatis axillaribus, foliis filiformibus. *Linn. Sp. plant.* 1312. *Gnaphalium vulgare medium*. *Morif.*

Pied de chat commun.

1533. *Filago arvensis*. *Filago* floribus conicis lateralibus caule paniculato. *Linn. Sp. plant.* 1312. *Filago incana tomentosa erecta*. *Vaill.*

Grand Pied de chat à feuilles oblongues étroites.

1334. *Micropus erectus*. *Micropus* caule erecto , calycibus edentulis solitariis, *Linn. Sp. plant.* 1313. *Gnaphalium minus repens*. *Magn.*

Petit Pied de chat rampant.

1335. *Echinops ritro*. *Echinops* capitulo globoso ; foliis supra glabris, *Linn. Sp. plant.* 1314. *Carduus sphærocephalus cæruleus minor*. *Pin.*

Chardon à tête sphérique & à fleurs bleues.

1336. *Jasione montana*. *Jasione*. *Linn. Sp. plant.* 1317. *Rapunculus scabiofæ capitulo cæruleus*. *Pin.*

Raiponce à tête bleue de scabieuse.

1337. *Lobelia dortmanna*. *Lobelia* foliis linearibus bilocularibus integerrimis caule subnudo. *Linn. Sp. plant.* 1318. *Gladiolus stagnalis dortmanni*. *Clus.*

Clayeul des étangs.

1338. *Lobelia urens*. *Lobelia* caule erectiusculo , foliis inferioribus subrotundis crenatis , superioribus lanceolatis serratis , floribus racemosis. *Linn. Sp. plant.* 1320. *Rapuntium urens soloniense*. *Morif.*

Lobelle.

1339. *Viola hirta*. *Viola* acaulis , foliis cordatis piloso hispidis. *Linn. Sp. plant.* 1324. *Viola martia hirsuta inodora*. *Morif.*

Violette hérissée.

1340. *Viola palustris*. *Viola* acaulis , foliis reniformibus. *Linn. Sp. plant.* 1324. *Viola palustris rotundifolia glabra*. *Morif.*

Violette des marais.

1341. *Viola odorata*. *Viola* acaulis , foliis cordatis , stolonibus reptantibus. *Linn. Sp. plant.* 1324. *Viola martia purpurea*, flore simplici odore. *Pin.*

Violette à odeur.

1342. *Viola canina*. *Viola* caule adultiore adscendente foliis oblongo cordatis. *Linn. Sp. plant.* 1324. *Viola martia inodora sylvestris*. *Pin.*

Violette sauvage sans odeur.

1343. *Viola cornuta*. *Viola* caule elongato , florum nectario subulato petalis longiore , foliis oblongo ovatis stipulis den-

tatis. *Linn. Sp. plant.* 1325. *Viola pyrenaica folio teucris, ferotina. Rai.*

Violette des Pyrénées.

1544. *Viola calcarata. Viola caule abbreviato, floris nectario subulato petalis longiore, foliis subovatis, stipulis dentatis. Linn. Sp. plant.* 1325. *Viola alpina purpurea, exiguis foliis. Pin.*

Violette des Alpes à fleurs purpurines.

1545. *Viola tricolor. Viola caule triquetto diffuso, foliis oblongis incis, stipulis dentatis. Linn. Sp. plant.* 1326. *Viola bicolor arvensis. Pin. Viola tricolor hortensis repens. Pin.*

Pensée.

1546. *Impatiens noli me tangere. Impatiens pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumens. Linn. Sp. plant.* 1329. *Balsamina lutea seu noli me tangere. Pin.*

C L A S S E X X.

Des Gynandriques.

1547. **O** RCHIS bifolia. *Orchis bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo petalis patentibus. Linn. Sp. plant.* 1330. *Orchis alba bifolia minor, calcar oblongo. Pin.*

Orchide à deux feuilles.

1548. *Orchis pyramidalis. Orchis bulbis indivisis, nectarii labio trifido æquali integerrimo: cornu longo, petalis sub lanceolatis. Linn. Sp. plant.* 1330. *Cynosorchis militaris montana, spica rubente conglomerata. Pin.*

Orchide pyramidale.

1549. *Orchis coriophora. Orchis bulbis indivisis, nectarii labio trifido reflexo crenato: cornu brevi, petalis conniventibus. Linn. Sp. plant.* 1330. *Orchis odore hirci minor. Pin.*

Petite Orchide à odeur de bouc.

1550. *Orchis morio. Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso, petalis omnibus conni-*

ventibus. *Linn. Sp. plant.* 1333. *Orchis morio* fœmina. *Pin. Orchide femelle.*

1551. *Orchis mascula*. *Orchis* bulbis indivisis , nectarii labio quadrilobo crenulato ; cornu obtuso , petalis dorsalibus reflexis. *Linn. Sp. plant.* 1333. *Orchis morio* mas foliis non maculatis. *Pin.*

Orchide mâle à feuilles non maculées.

1552. *Orchis ustulata*. *Orchis* bulbis indivisis , nectarii labio quadrifido punctis scabro : cornu obtuso , petalis distinctis. *Linn. Sp. plant.* 1333. *Orchis militaris* pratensis humilior. *Vaill.*

Orchide des prés.

1553. *Orchis latifolia*. *Orchis* bulbis subpalmatis rectis , nectarii cornu conico : labio trilobo lateribus reflexo , bracteis flore longioribus. *Linn. Sp. plant.* 1334. *Orchis palmata* pratensis latifolia , longis calcaribus. *Pin.*

Orchide à larges feuilles.

1554. *Orchis sambucina*. *Orchis* bulbis subpalmatis rectis , nectarii cornu conico , labio ovato subtrilobo , bracteis longitudine florum. *Linn. Sp. plant.* 1334. *Orchis palmata* , sambuci odore. *Pin.*

Orchide à odeur de sureau.

1555. *Orchis incarnata*. *Orchis* bulbis palmatis nectarii cornu conico : labio obsolete trilobo serrato , petalis dorsalibus reflexis. *Linn. Sp. plant.* 1335. *Orchis palmata* lutœa , floris labio maculato. *Seg.*

Orchide palmée à fleurs jaunes.

1556. *Orchis maculata*. *Orchis* bulbis palmatis patentibus nectarii cornu germinibus brevior : labio plano , petalis dorsalibus patulis. *Linn. Sp. plant.* 1335. *Orchis palmata* pratensis maculata. *Pin.*

Orchide palmée des prés à feuilles maculées.

1557. *Orchis odoratissima*. *Orchis* bulbis palmatis , nectarii cornu recurvo ; labii ovato acuto , foliis linearibus. *Linn. Sp. plant.* 1335. *Orchis palmata* angustifolia minor odoratissima. *Pin.*

Orchide très-odorante.

1558. *Orchis conopsea*. *Orchis* bulbis palmatis nectarii cornu scetaceo germinibus longiore : labio trifido ; petalis duobus

patentissimis. *Linn. Sp. plant.* 1335. *Orchis palmata minor*,
calcaribus oblongis. *Pin.*

Petite Orchide palmée à éperons oblongs.

1559. *Orchis abortiva*. *Orchis* bulbis fasciculatis filiformi-
bus, nectarii labio ovato integerrimo. *Linn. Sp. plant.* 1336.
Orchis abortiva violacea. Pin.

Orchide abortive violette.

1560. *Satyrium hircinum*. *Satyrium* bulbis indivisis, foliis
lanceolatis, nectarii labio trifido : intermedia lineari elongata
obliqua præmorsa. *Linn. Sp. plant.* 1337. *Orchis barbata*
fœtida. *Bauh. hist.*

Orchide barbue puante.

1561. *Satyrium viride*. *Satyrium* bulbis palmatis, foliis
oblongis obtusis : nectarii labio lineari trifido : intermedia
obsoleta. *Linn. Sp. plant.* 1337. *Orchis palmata*, flore viridi.
Pin.

Orchide palmée à fleurs vertes.

1562. *Satyrium repens*. *Satyrium* bulbis fibrosis, foliis
ovatis radicalibus, floribus secundis. *Linn. Sp. plant.* 1339.
Pseudo orchis. Pin.

Petite Orchide à fleurs blanches.

1563. *Ophris nidus avis*. *Ophris* bulbis fibroso fasciculatis,
caule vaginato, nectarii labio trifido. *Linn. Sp. plant.* 1339.
Orchis abortiva fusca. Pin.

Nid d'oiseau.

1564. *Ophris corallorhiza*. *Ophris* bulbis ramosis flexuosis,
caule vaginato, nectarii labio trifido. *Linn. Sp. plant.* 1339.
Orobanche radice coralloïde. Pin.

Orobanche à racine de coralloïde.

1565. *Ophris spiralis*. *Ophris* bulbis aggregatis oblongis,
caule subfolioso, floribus secundis ; nectarii labio indiviso
crenato. *Linn. Sp. plant.* 1340. *Triorchis alba odorata minor.*
Pin.

Ophrise spirale.

1566. *Ophris ovata*. *Ophris* bulbo fibroso, caule bifolio,
foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Linn. Sp. plant.* 1340.
Ophris bifolia. Pin.

Ophrise à deux feuilles.

1567. *Ophris cordata*. *Ophris* bulbo fibroso, caule bifolio,

foliis cordatis. *Linn. Sp. plant.* 1340. *Ophris minima. Pin.*

Ophrise à feuilles en forme de cœur.

1568. *Ophris monorchis. Ophris bulbó globoso , scapo nudo, nectarii labio trifido cruciato. Linn. Sp. plant.* 1341. *Ophris odorata moschata seu monorchis. Pin.*

Ophrise à odeur musquée.

1569. *Ophris antropophora. Ophris bulbis subrotundis , scapo folioso , nectarii labio lineari tripartito : medio elongato bifido. Linn. Sp. plant.* 1343. *Orchis flore nudi hominis effigiem representans , fœmina. Pin.*

Ophrise représentant un homme nud.

1570. *Ophris insectifera. Ophris bulbis subrotundis scapo folioso , nectarii labio subquincelobo. Linn. Sp. plant.* 1343. *Orchis muscarn referens prima. Pin. Orchis ataneam referens. Pin*

Orchide représentant des insectes.

1571. *Serapias helleborine. Serapias bulbis fibrosis , floribus erectis bractea brevioribus. Linn. Sp. plant.* 1343. *Helleborine latifolia montana. Pin.*

Helleborine de montagnes à larges feuilles.

1572 *Serapias lingua. Serapias bulbis subrotundis , nectarii labio trifido acuminato petalis longiore glabro. Linn. Sp. plant.* 1344. *Orchis montana italica , flore ferrugineo , lingua oblonga. Pin.*

Orchide de montagnes d'Italie , à fleurs ferrugineuses.

1573. *Serapias longifolia. Serapias bulbis fibrosis , floribus erectis bractea longioribus. Linn. Sp. plant.* 1345. *Helleborine montana angustifolia spicata. Pin.*

Helleborine de montagnes à petites feuilles en épis.

1574. *Cypripedium calceolus. Cypripedium radicibus fibrosis , foliis ovato lanceolatis caulinis. Linn. Sp. plant.* 1346. *Helleborine flore rotundo seu calceolus. Pin.*

Sabot de Marie.

1575. *Passiflora capsulatis. Passiflora foliis bilobis cordatis oblongis petiolatis. Linn. Sp. plant.* 1357. *Gtenadilla fructu rubente , folio bicorni. Barr.*

Grenadille à capsules.

1576. *Aristolochia pistolochia. Aristolochia foliis cordatis*

crenulatis subtus reticulatis petiolatis, floribus solitariis. *Linn. Sp. plant.* 1364. *Aristolochia pistolachia* dicta. *Pin.*

Aristoloehe pistalochier.

1577. *Aristolochia rotunda*. *Aristolochia* foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis. *Linn. Sp. plant.* 1364. *Aristolochia rotunda* flore ex purpurea nigro. *Pin.*

Aristoloehe ronde.

1578. *Aristolochia longa*. *Aristolochia* foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo, floribus solitariis. *Linn. Sp. plant.* 1364. *Aristolochia longa* vera. *Pin.*

Aristoloehe longue.

1579. *Aristolochia clematitis*. *Aristolochia* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Linn. Sp. plant.* 1364. *Aristolochia clematitis* recta. *Pin.*

Aristoloehe clematite.

1580. *Arum maculatum*. *Arum* acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice cavato. *Linn. Sp. plant.* 1370. *Arum* vulgare maculatum & non maculatum. *Pin.*

Pied de veau maculé.

1581. *Arum tenuifolium*. *Arum* acaule, foliis lanceolatis, spadice setaceo declinato. *Linn. Sp. plant.* 1370. *Arum angustifolium*. *Pin.*

Pied de veau à feuilles étroites.

1582. *Arum arisarum*. *Arum* acaule, foliis cordato oblongis, spatha bifida, spadice incurvo. *Linn. Sp. plant.* 1370. *Arisarum latifolium* majus. *Pin.*

Arisarum à larges feuilles.

1583. *Zostera marina*. *Zostera*. *Linn. Sp. plant.* 1374. *Alga angustifolia vitriariorum*. *Pin.*

L'Algue des verrèrs.



CLASSE XXI.

Des Monœciques.

1584. **Z**ANNICHELLIA palustris. Zannichellia. *Linn. Sp. plant.* 1375. Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis. *Pin.*

L'Alyoïde commune.

1585. Lemna trifulca. Lemna foliis petiolatis lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 1376. Lenticula aquatica trifulca. *Pin.*

Petite Lentille d'eau à trois sillons.

1586. Lemna minor. Lemna foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Linn. Sp. plant.* 1376. Lens palustris. *Cam.*

Petite Lentille des marais.

1587. Lemna gibba. Lemna foliis sessilibus subtus hemisphericis, radicibus solitariis. *Linn. Sp. plant.* 1377. Lenticula palustris major: inferne magis convexa, fructu polyspermo. *Mich.*

La grandé Lentille d'eau.

1588. Lemna polyrrhiza. Lemna foliis sessilibus radicibus confertis. *Linn. Sp. plant.* 1377. Lenticula palustris major. *Rai angl.*

La grande Lentille de marais.

1589. Typha latifolia. Typha foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *Linn. Sp. plant.* 1377. Typha palustris major. *Pin.*

La masse d'eau à larges feuilles.

1590. Typha angustifolia. Typha foliis semi-cylindricis, spica mascula femineaque remotis. *Linn. Sp. plant.* 1377. Typha palustris minor. *Pin.*

Masse d'eau à feuilles étroites.

1591. Sparganium natans. Sparganium foliis decumbentibus planis. *Linn. Sp. plant.* 1378. Sparganium non ramosum minus. *Dill.*

Platanaire flottante.

1591. *Carex dioica*. *Carex spica symplici dioica*. *Linn. Sp. plant.* 1379. *Gramen cyperoides minus*, *ranunculi capitulo longiore*. *Raii.*

Petit Chiendent à forme de fouchet, à têtes longues de renoncule.

1593. *Carex pulicaris*. *Gramen spica symplici androgyna*, *supreme mascula*, *capsulis divaricatis retroflexis*. *Linn. Sp. plant.* 1380. *Gramen cyperoides minimum*, *feminibus deorsum reflexis puliciformibus*.

Petit Chiendent en forme de fouchet, à un seul épis.

1594. *Carex arenaria*. *Carex spica composita*, *spiculis androgynis*; *inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis*, *culmo triquetro*. *Linn. Sp. plant.* 1381. *Gramen cyperoides à monte Ballon simile humilior*, *in arenosis nascens*. *Pluk.*

Chiendent en forme de fouchet du mont Ballon.

1595. *Carex leporina*. *Carex spica composita*, *spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis*. *Linn. Sp. plant.* 1381. *Gramen cyperoides palustre majus spica divisa*. *Pin.*

Grand Chiendent des marais à forme de fouchet, à épis divisé en plusieurs autres.

1596. *Carex brizoides*. *Carex spica composita disticha nuda*; *spiculis androgynis*, *oblongis contiguis*, *culmo nudo*. *Linn. Sp. plant.* 1381. *Gramen cyperoides elegans*, *spica composita alperiore*. *Rai.*

Chiendent en forme de fouchet d'une forme élégante, à épis composé.

1597. *Carex vulpina*. *Carex spica supra decomposita inferne laxiore*, *spiculis androgynis ovatis sessilibus glomeratis*; *superne masculis*. *Linn. Sp. plant.* 1382. *Gramen cyperoides palustre majus*, *spica compacta*. *Pin.*

Grand Chiendent des marais en forme de fouchet à épis serré, ou Chiendent des renards.

1598. *Carex muricata*. *Carex spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis*, *capsulis acutis divergentibus spinosis*. *Linn. Sp. plant.* 1382. *Gramen nemorosum*, *spicis parvis asperis*. *Pin.*

Chiendent des bois à petits épis raboteux.

1599. *Carex axillaris*. *Carex spiculis ovatis sessilibus remotis androgynis*, *bracteis culmum æquantibus*. *Linn. Sp. plant.*

1382. Gramen cyperoides angustifolium spicis parvis sessilibus in foliorum alis.

Chiendent en forme de fouchet à épis placés aux aisselles des feuilles.

1600. Carex remota. Carex spiculis ovatis subsessilibus remotis androgynis, foliis caulinis culmum æquantibus. *Linn. Sp. plant.* 1383. Cyperoides angustifolium, spicis sessilibus in foliorum alis. *Morif.*

Chiendent en forme de fouchet à épis sans tiges.

1601. Carex elongata. Carex spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis acutis. *Linn. Sp. plant.* 1383. Gramen cyperoides angustifolium, spicis longis erectis. *Pin.*

Chiendent en forme de fouchet à feuilles étroites, & à épis longs & élevés.

1602. Carex paniculata. Carex spiculis androgynis, racemo composito. *Linn. Sp. plant.* 1383. Cyperus longus inodorus sylvaticus. *Pin.*

Souchet long des bois sans odeur.

1603. Carex flava. Carex spicis confertis subsessilibus subrotundis : mascula lineari, capsulis acutis recurvis. *Linn. Sp. plant.* 1384. Gramen cyperoides aculeatum germanicum seu minus. *Pin.*

Petit Chiendent pointue en forme de fouchet.

1604. Carex digitata. Carex spicis linearibus erectis : mascula breviora inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. *Linn. Sp. plant.* 1384. Gramen caryophyllatum montanum, spica varia. *Pin.*

Chiendent de montagnes à épis panachés.

1605. Carex montana. Carex spicis femineis sessilibus subsolitariis ovatis masculæ approximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. *Linn. Sp. plant.* 1385. Cyperoides montanum, foliis angustis parvis, spica spadicea divisa. *Scheuch.*

Chiendent de montagnes en forme de fouchet.

1606. Carex globularis. Carex spica mascula oblonga, feminea sessili ovata, foliolo floralis breviori approximata. *Linn. Sp. plant.* 1385. Carex spica mascula à feminea in ala folioli remota. *Flor. lap.*

Chiendent en forme de fouchet globuleux.

1607. *Carex filiformis*. *Carex* spica mascula oblonga femineis sessilibus oblongis, inferiore foliolo proprio brevior. *Linn. Sp. plant.* 1385. *Cyperoides sylvaticum tenuifolium*, spicis parvis tenuibus spadiceo viridibus. *Scheuch. gram.*

Chiendent en forme de fouchet à feuilles menues.

1608. *Carex pilulifera*. *Carex* spicis terminalibus confertis subrotundis: masculina oblonga.; *Linn. Sp. plant.* 1385. *Gramen cyperoides tenuifolium*, spicis ad summum caulis sessilibus globulorum acaulis. *Pluk. alm.* 178.

Chiendent en forme de fouchet qui porte des especes de pilulles.

1609. *Carex saxatilis*. *Carex* spicis tribus ovatis sessilibus alternis: mascula oblonga. *Linn. Sp. plant.* 1385. *Cyperoides alpinum saxatile*, caule cubitali rotundo triquetro nudo, spicis brevibus binis seu ternis confertim nascentibus, squamis obtuse mucronatis. *Mich. gen.*

Chiendent en forme de fouchet des Alpes.

1610. *Carex atrata*. *Carex* spicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis; fructiferis pendulis. *Linn. Sp. plant.* 1386. *Gramen alpinum pulchrum* foliis caryophyllis, spicis atris plurimis simul junctis. *Rudb.*

Beau Chiendent des Alpes à feuilles d'œillets, à plusieurs épis noirs joints ensemble.

1611. *Carex limosa*. *Carex* spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente. *Linn. Sp. plant.* 1386. *Carex* spicis seminiferis latis ovalibus pendulis. *Hall.*

Chiendent en forme de fouchet à épis portant semence.

1612. *Carex pallescens*. *Carex* spicis pendulis: mascula erecta, femineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Linn. Sp. plant.* 1386. *Cyperoides polystachyon flavicans*, spicis brevibus prope summum caulis. *Mich. gen.*

Chiendent en forme de fouchet jaunâtre.

1613. *Carex panicea*. *Carex* spicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis. *Linn. Sp. plant.* 1387. *Carex* spicis matibus gracilibus, seminibus turgidis & erectis. *Hall.*

Chiendent en forme de fouchet à semences gonflées.

1614. *Carex pseudo-cyperus*. *Carex* spicis pendulis, pedunculis geminatis. *Linn. Sp. plant.* 1387. *Gramen cyperoides spica pendula brevior*. *Pin.*

Faux fouchet.

1615. *Carex distans*. *Carex* spicis remotissimis subsessilibus bractea vaginante , capsulis angulis mucronatis. *Linn. Sp. plant.* 1387. *Carex* spicis parvis longe distantibus. *Rai.*

Chiendent en forme de fouchet à petits épis éloignés.

1616. *Carex cespitosa*. *Carex* spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus , mascula terminali , culmo triquetro. *Linn. Sp. plant.* 1388. Gramen cyperoides caryophyllatum , folio longiore & angustiore spicis sessilibus compactis erectis. *Morif.*

Chiendent en forme de fouchet caryophyllé.

1617. *Carex acuta*. *Carex* spicis masculis pluribus , femineis subsessilibus , capsulis obtusiusculis. *Linn. Sp. plant.* 1388. *Carex nigra verna vulgaris*. *Flor. lapp.* Gramen cyperoides spica rufa seu caule triangulo. *Pin.*

Chiendent en forme de fouchet à tige triangulaire.

1618. *Carex vesicaria*. *Carex* spicis masculis pluribus , femineis pedunculatis , capsulis inflatis acuminatis. *Linn. Sp. plant.* 1389. Gramen cyperoides angustifolium , spicis longis erectis. *Pin.*

Chiendent en forme de fouchet à feuilles étroites & à épis longs & droits.

1619. *Carex hirta*. *Carex* spicis remotis : masculis pluribus , femineis subpedunculatis erectis , capsulis hirtis. *Linn. Sp. plant.* 1389. Cyperoides polystachon lanuginosum. *Morif.*

Chiendent lanugineux en forme de fouchet.

1620. *Betula alba*. *Betula* foliis ovatis acuminatis serratis. *Linn. Sp. plant.* 1393. *Betula*. *Pin.*

Bouleau.

1621. *Buxus sempervirens*. *Buxus*. *Linn. Sp. plant.* 1394. *Buxus arborescens*. *Pin.*

Buis en arbre.

1622. *Urtica pilulifera*. *Urtica* foliis oppositis ovatis serratis , amentis fructiferis globosis. *Linn. Sp. plant.* 1395. *Urtica urens pilulas ferens*. *Pin.*

Ortie brulante qui porte des espèces de pilules.

1623. *Urtica urens*. *Urtica* foliis oppositis ovalibus. *Linn. Sp. plant.* 1396. *Urtica urens minor*. *Pin.*

Petite Ortie brulante.

1624. *Urtica dioica*. *Urtica* foliis oppositis cordatis , racemis

geminis, *Linn. Sp. plant.* 1396. *Urtica urens maxima. Pin.*
La grande Ortie brulante.

1625. *Morus nigra. Morus foliis cordatis scabris. Linn. Sp. plant.* 1398. *Morus fructu nigro. Pin.*
Mûrier noir.

1626. *Xanthium spinosum. Xanthium spinis ternatis. Linn. Sp. plant.* 1400. *Xanthium spinosum amplici folio. Moris.*
Petite Bardane ou Lampourde épineuse.

1627. *Amaranthus blitum. Amaranthus glomerulis latera- libus trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. Linn. Sp. plant.* 1605. *Amaranthus sylvestris & vulgaris. Tourn.*
Amaranthe sauvage.

1628. *Amaranthus viridis. Amaranthus glomerulis triandris floribus masculis trifidis, foliis ovatis emarginatis, caule erecto. Linn. Sp. plant.* 1405. *Blitum album minus. Pin.*
Amaranthe verd.

1629. *Ceratophyllum demersum. Ceratophyllum foliis di- chotomo-bigeminis fructibus trispinosis. Linn. Sp. plant.* 1409. *Hydroceratophyllum folio aspero quatuor cornibus armato. Vaill.*

Hydroceratophyllum à feuilles rudès.

1630. *Ceratophyllum submersum. Ceratophyllum foliis di- chotomo-trigeminis, fructibus muticis. Linn. Sp. plant.* 1409. *Hydroceratophyllum folio lævi octo cornibus armato. Vaill.*
Hydroceratophyllum à feuilles lisses.

1631. *Myriophyllum spicatum. Myriophyllum floribus mas- culis interrupte spicatis. Linn. Sp. plant.* 1409. *Millefolium aquaticum pennatum spicatum. Pin.*

Millefeuille aquatique à épis.

1632. *Myriophyllum verticillatum. Myriophyllum floribus omnibus verticillatis. Linn. Sp. plant.* 1410. *Millefolium aquaticum minus. Guss.*

Millefeuille aquatique à fleurs disposées aux nœuds des feuilles.

1633. *Sagittaria sagittifolia. Sagittaria foliis sagittatis acu- tis. Linn. Sp. plant.* 1410. *Sagitta aquatica minor latifolia. Pin.*

Sagittaire aquatique.

1634. *Theligonum gynocrambe*. *Theligonium*, Linn. *Sp. plant.* 1411. *Conocrambe Dioscoridis*. Pin.

Cynocrambe à feuilles d'alsine.

1635. *Poterium sanguisorba*. *Poterium inerme*, caulibus subangulosis. Linn. *Sp. plant.* 1411. *Pimpinella sanguisorba minor hirsuta*. Pin.

La petite Pimprenelle.

1636. *Poterium hybridum*. *Poterium inerme*, caulibus teretibus strictis. Linn. *Sp. plant.* 1412. *Pimpinella agrimonoides*. Moris.

Pimprenelle à odeur & à feuilles d'aigremoine.

1637. *Poterium spinosum*. *Poterium spinis ramosis*. Linn. *Sp. plant.* 1412. *Pimpinella spinosa*. Moris.

Pimprenelle épineuse.

1638. *Quercus ilex*. *Quercus foliis ovato oblongis indivisis ferratisque petiolatis subtus incanis*, cortice integro. Linn. *Sp. plant.* 1412. *Ilex oblongo ferrato folio*. Pin.

Chêne verd.

1639. *Quercus gramuntia*. *Quercus foliis oblongo-ovatis sinuato spinosis sessilibus subtus tomentosis*, glandibus pedunculatis. Linn. *Sp. plant.* 1413. *Ilex foliis rotundioribus & spinosis*, è luco gramuntio. Magn.

Chêne de gramont.

1640. *Quercus suber*. *Quercus foliis ovato oblongis indivisis ferratis subtus tomentosis*, cortice rimoso fungoso. Linn. *Sp. plant.* 1413. *Suber latifolium sempervirens*. Pin.

Liège.

1641. *Quercus coccifera*. *Quercus foliis ovatis indivisis spinoso dentatis glabris*. Linn. *Sp. plant.* 1413. *Ilex aculeata cocciglandifera*. Pin.

Le Kermes.

1642. *Quercus robur*. *Quercus foliis deciduis oblongis superne latioribus & sinubus acutioribus : angulis obtusis*. Linn. *Sp. plant.* 1414. *Quercus cum longo pediculo*. Pin.

Chêne.

1643. *Fagus castanea*. *Fagus foliis lanceolatis acuminato ferratis subtus nudis*. Linn. *Sp. plant.* 1416. *Castanea sylvestris*. Pin.

Châtaignier.

1644. *Fagus sylvatica* *Fagus foliis ovatis obsolete ferratis.*
Linn. Sp. plant. 1416. *Fagus. Pin.*

Hêtre.

1645. *Carpinus betulus.* *Carpinus squamis strobilorum planis.* *Linn. Sp. plant.* 1416. *Carpinus. Dod.*

Charme.

1646. *Corylus avellana.* *Corylus stipulis ovatis obtusis.*
Linn. Sp. plant. 1417. *Corylus sylvestris. Pin.*

Noisetier sauvage.

1647. *Pinus sylvestris.* *Pinus foliis geminis : primordialibus solitariis glabris.* *Linn. Sp. plant.* 1418. *Pinus sylvestris. Pin.*

Pin sauvage.

1648. *Pinus pinea.* *Pinus foliis geminis : primordialibus solitariis ciliatis.* *Linn. Sp. plant.* 1419. *Pinus sativa. Pin.*

Pin cultivé.

1649. *Pinus abies.* *Pinus foliis solitariis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis.* *Linn. Sp. plant.* 1421. *Picea. Cam.*

Pesse.

1650. *Pinus larix.* *Pinus foliis fasciculatis obtusis.* *Linn. Sp. plant.* 1420. *Larix. Pin.*

Meleze.

1651. *Pinus picea.* *Pinus foliis solitariis emarginatis.* *Linn. Sp. plant.* 1420. *Abies conis sursum spectantibus seu mas. Pin.*

Sapin.

1652. *Croton tinctorium.* *Croton foliis rhombeis repandis capsulis pendulis, caule herbaceo.* *Linn. Sp. plant.* 1425. *Heliotropium tricoceum. Pin.*

Tournefol.

1653. *Momordica elaterium.* *Momordica pomis hispidis, cirthis nullis.* *Linn. Sp. plant.* 1434. *Cucumis sylvestris asinus dictus. Pin.*

Concombre sauvage.

1654. *Bryonia alba.* *Bryonia foliis palmatis utrinque calloso scabris* *Linn. Sp. plant.* 1438. *Bryonia alba, baccis nigris. Pin.*

Bryone.

CLASSE XXII.

Des Diœciques.

1655. **N**AJAS marina, Najas. *Linn. Sp. plant.* 1441. Fluvialis vulgaris latifolia, *Vaill.*

Nayade.

1656. Vallisneria spiralis, Vallisneria. *Linn. Sp. plant.* 1441.
Vallisnaire.

1657. Salix pentandra, Salix foliis ferratis glabris, flosculis pentandris. *Linn. Sp. plant.* 1442. Salix vulgaris rubens, *Pin.*
Saule rouge.

1658. Salix vitellina, Salix foliis ferratis ovatis acutis glabris : ferraturis cartilagineis, petiolis calloso punctatis. *Linn. Sp. plant.* 1442. Salix sativa lutea, folio crenato. *Pin.*

Saule jaune.

1659. Salix amygdalina, Salix foliis ferratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus. *Linn. Sp. plant.* 1443. Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. *Pin.*

Saule à feuilles d'amandier.

1660. Salix fragilis, Salix foliis ferratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato glandulosis. *Linn. Sp. plant.* 1443. Salix fragilis. *Pin.*

Saule cassant.

1661. Salix halix Salix foliis ferratis glabris lanceolato-linearibus : superioribus oppositis obliquis. *Linn. Sp. plant.* 1444. Salix vulgaris nigricans, folio non serrato. *Pin.*

Saule commun noirâtre.

1662. Salix glauca Salix foliis integerrimis, subtus villosis nitidis, stipulis ovatis acutis. *Linn. Sp. plant.* 1446. Salix alpina pyrenaica. *Pin.*

Saule des Pyrénées.

1663. Salix aurita, Salix foliis integerrimis utrinque villosis obovatis appendiculatis. *Linn. Sp. plant.* 1446. Salix folio rotundo minore. *Rai.*

Saule à petites feuilles rondes.

1664. *Salix arenaria*. *Salix* foliis integris ovatis acutis : supra subvillosis , subtus tomentosis. *Linn. Sp. plant.* 1447. *Salix pumila* , foliis utrinque candicantibus & lanuginosis. *Pin.*

Saule nain à feuilles blanchâtres & lanugineuses.

1665. *Salix incubacea* *Salix* foliis integerrimis lanceolatis subtus villosis nitidis , stipulis ovatis acutis. *Linn. Sp. plant.* 1447. *Salix* foliis integris ovatis aliquot linearum longis , caulibus vix assurgentibus. *Guett.*

Saule nain à feuilles entières ovales.

1666. *Salix fusca*. *Salix* foliis integerrimis ovatis : subtus villosis nitidis. *Linn. Sp. plant.* 1447. *Salix pumila* , folio utrinque glabro. *Bauh. hist.*

Saule brunâtre.

1667. *Salix rosmarini folia*. *Salix* foliis integerrimis lanceolato-linearibus strictis sessilibus subtus tomentosis. *Linn. Sp. plant.* 1448. *Salix humilis angustifolia*. *Pin.*

Saule à feuilles de romarin.

1668. *Salix caprea*. *Salix* foliis ovatis rugosis : subtus tomentosis , undatis superne denticulatis. *Linn. Sp. plant.* 1448. *Salix latifolia* torunda. *Pin.*

Saule à feuilles larges & rondes.

1669. *Salix viminalis*. *Salix* foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis , ramis virgatis. *Linn. Sp. plant.* 1448. *Salix* folio longissimo angustissimo utrinque albido. *Pin.*

Osier.

1670. *Salix cinerea*. *Salix* foliis subserratis oblongo ovatis : subtus subvillosis , stipulis dimidiato cordatis. *Linn. Sp. plant.* 1449. *Salix* foliis integris glabris lanceolato ovatis. *Flor. tapp.*

Saule cendré.

1671. *Salix alba*. *Salix* foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus : serraturis infimis glandulosis. *Linn. Sp. plant.* 1449. *Salix vulgaris alba arborescens*. *Pin.*

Saule commun blanc.

1672. *Empetrum nigrum*. *Empetrum* procumbens. *Linn. Sp. plant.* 1450. *Erica baccifera* procumbens nigra. *Pin.*

Bruyere à bayes.

1673. *Osyris alba*. *Osyris*. *Linn. Sp. plant.* 1450. *Osyris frutescens baccifera*. *Pin.*

Casie poétique de Montpellier.

1674. Viscum album. Viscum foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillatibus. *Linn. Sp. plant.* 1451. viscum baccis albis. *Pin.*

Guy à baies blanches.

1675. Hippophaë rhamnoides. Hippophaë foliis lanceolatis *Linn. Sp. plant.* 1452. Rhamnus salicis folio angustiore, fructu flavescente. *Pin.*

Rhamnoïde à feuilles de saule.

1676. Myrica gale. Myrica foliis lanceolatis subserratis, caule suffruticoso. *Linn. Sp. plant.* 1453. Rhus myrtifolia belgica. *Pin.*

Faux Buis.

1677. Pistacia Narbonensis. Pistacia foliis pinnatis ternatisque suborbiculatis. *Linn. Sp. plant.* 1454. Pistacia foliis sepius quinaris orbiculatis. *Sauv.*

Pistache de Narbonne.

1678. Pistacia terebinthus. Pistachia foliis impari pinnatis foliolis ovato lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 1455. Therebinthus vulgaris. *Pin.*

Thérébinthe commun.

1679. Humulus lupulus. Humulus. *Linn. Sp. plant.* 1457. Lupulus mas. *Pin.*

Houblon.

1680. Tamus communis. Tamus foliis cordatis indivisis. *Linn. Sp. plant.* 1458. Bryonia lævis seu nigra racemosa. *Pin.*

Sceau de Notre-Dame.

1681. Populus alba. Populus foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. *Linn. Sp. plant.* 1463. Populus alba majoribus foliis. *Pin.*

Peuplier blanc.

1682. Populus tremula. Populus foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Linn. Sp. plant.* 1464. Populus tremula. *Pin.*

Tremble.

1683. Populus nigra. Populus foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Linn. Sp. plant.* 1464. Populus nigra. *Pin.*

Peuplier noir.

1684. Mercurialis perennis. Mercurialis caule simplicissimo,

foliis scabris. *Linn. Sp. plant.* 1465. *Mercurialis montana testiculata. Pin.*

Mercurielle de montagnes à testicules.

1685. *Mercurialis tomentosa. Mercurialis caule suffruticoso, foliis tomentosis. Linn. Sp. plant.* 1465. *Phyllon testiculatum. Pin.*

Mercurielle cotonneuse.

1686. *Hydrocharis morsus ranz. Hydrocharis. Linn. Sp. plant.* 1466. *Nymphæa alba minima. Pin.*

Petit Nénuphar blanc.

1687. *Coriaria myrtifolia. Coriaria foliis ovato oblongis. Linn. Sp. plant.* 1467. *Rhus myrtifolia monspeliaca. Pin.*

Arbrisseau des corroyeurs.

1688. *Juniperus communis. Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. Linn. Sp. plant.* 1470. *Juniperus vulgaris fruticosa. Pin.*

Genevrier commun.

1689. *Juniperus oxycedrus. Juniperus foliis ternatis patentibus mucronatis bacca longioribus. Linn. Sp. plant.* 1470. *Juniperus major bacca rufescente. Pin.*

Grand Genevrier à baies rougeâtres,

1690. *Juniperus lycia. Juniperus foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis. Linn. Sp. plant.* 1471. *Cedrus folio cupressi, media majoribus. Bauh. pin.*

Cèdre moyen à feuilles de cyprès à grandes baies.

1691. *Juniperus phœnicea. Juniperus foliis ternis oblitteratis imbricatis obtusis. Linn. Sp. plant.* 1471. *Cedrus folio cupressi major, fructu flavescente. Pin.*

Grand Cèdre à feuilles de cyprès à fruit jaunâtre.

1692. *Taxus baccata. Taxus foliis approximatis. Linn. Sp. plant.* 1472. *Taxus. Pin.*

If.

1693. *Ephedra distachya. Ephedra pedunculis oppositis, amentis geminis. Linn. Sp. plant.* 1472. *Polygonum bacciferum maritimum minus. Pin.*

Petite Renouée maritime à baies.

1694. *Ruscus aculeatus. Ruscus foliis supra floriferis nudis. Linn. Sp. plant.* 1474. *Ruscus. Pin.*

Houx frêlon.

CLASSE XXIII.

Des Polygamiques.

1695. **C**ELTIS australis. Celtis foliis ovato lanceolatis. *Linn. Sp. plant.* 1478. Lotus fructu cerasi. *Pin.*

Lotier à fruit de cerisier.

1696. Andropogon gryllus. Andropogon paniculæ pedunculis simplicissimis trifloris, flosculo hermaphrodito aristato ciliato basi barbato. *Linn. Sp. plant.* 1480. Ægilops bromoides juba purpurascens. *Bauh. hist.*

Chiendent en forme de fétu.

1697. Andropogon ischæmum. Andropogon spicis digitatis plurimis, flosculis sessilibus; aristato muticoquis, pedicellis longeis. *Linn. Sp. plant.* 1483. Gramen dactylon spicis villosis. *Pin.*

Chiendent digité & hérissé.

1698. Holcus lanatus. Holcus glumis bifloris villosis; hermaphrodito mutico, masculo arista recurva. *Linn. Sp. plant.* 1485. Gramen pratense paniculatum molle. *Pin.*

Chiendent couvert de laine.

1699. Holcus mollis. Holcus glumis bifloris nudiusculis; flosculo hermaphrodito mutico, masculo arista geniculata. *Linn. Sp. plant.* 1485. Gramen caninum longius radiculatum. *Pin.*

Chiendent à forme de millet.

1700. Cenchrus racemosus. Cenchrus panicula spicata, glumis muticatis setis ciliaribus. *Linn. Sp. plant.* 1487. Gramen caninum maritimum, spica echinata. *Pin.*

Chiendent maritime à épis hérissés.

1701. Cenchrus capitatus. Cenchrus spica ovata simpliciter. *Linn. Sp. plant.* 1488. Gramen spica subrotunda echinata. *Pin.*

Chiendent à épis rond couvert de pointes.

1702. Ægilops ovata. Ægilops spica aristata; calycibus om-

nibus triaristatis. *Linn. Sp. plant.* 1489. Festuca altera, capitulis duris. *Pin.*

Fétuque à tête dures.

1703. *Agilops triuncialis*. *Agilops spica aristata* : calycibus inferioribus biaristatis. *Linn. Sp. plant.* 1489. Festuca altera, capitulis duris, spica triunciali. *Pin.*

Chiendent à épis longs.

1704. *Valentia muralis*: *Valentia floribus masculis trifidis hermaphroditici germini glabro insidentibus*. *Linn. Sp. plant.* 1490. *Rubeola echinata saxatilis*. *Pin.*

Petite Croisette des murailles.

1705. *Valentia aparine*. *Valentia floribus masculis trifidis pedicellatis hermaphroditici pedunculo insidentibus*. *Linn. Sp. plant.* 1491. *Aparine semine laxi*. *Vaill.*

Aparinette à semences lisses.

1706. *Valentia cruciata*. *Valentia floribus masculis quadridis pedunculis diphyllis*. 1491. *Cruciata hirsuta*. *Pin.*

Croisette hérissée.

1707. *Parietaria officinalis*. *Parietaria foliis lanceolato ovatis alternis*. *Linn. Sp. plant.* 1402. *Parietaria officinarum & dioscoridis*. *Pin.*

Pariétaire des boutiques.

1708. *Atriplex portulacoides*. *Atriplex caule fruticoso, foliis obovatis*. *Linn. Sp. plant.* 1493. *Halimus seu portulaca marina*. *Pin.*

Pourpier marin.

1709. *Atriplex glauca*. *Atriplex caule fruticoso procumbente, foliis ovatis sessilibus integerrimis; inferioribus subdentatis*. *Linn. Sp. plant.* 1493. *Atriplex maritima hispanica frutescens & procumbens*. 1493.

Arroche maritime d'Espagne en arbre.

1710. *Atriplex laciniata*. *Atriplex caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis subtus argenteis*. *Linn. Sp. plant.* 1494. *Atriplex maritima laciniata*. *Pin.*

Arroche maritime à feuilles laciniées.

1711. *Atriplex hastata*. *Atriplex caule herbaceo: valvulis femineis magnis deltoidibus sinuatis*. *Linn. Sp. plant.* 1494. *Atriplex sylvestris, folio hastato seu deltoide*. *Rai.*

Arroche sauvage à feuilles triangulaires.

1712. *Atriplex patula*. *Atriplex* caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1494. *Atriplex angusta oblongo folio. Pin.*
Arroche à feuilles oblongues étroites.

1713. *Atriplex littoralis*. *Atriplex* caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 1493. *Atriplex angustissimo & longissimo folio. Herm lugd. bat.*
Arroche maritime à feuilles très-étroites & très-longues.

1714. *Acer pseudo-platanus*. *Acer* foliis quinquelobis inæqualiter serratis, floribus racemosis, *Linn. Sp. plant.* 1495. *Acer montanum candidum. Pin.*
Grand Erable.

1715. *Acer campestre*. *Acer* foliis lobatis obtusis emarginatis. *Linn. Sp. plant.* 1497. *Acer campestre & minus, Pin.*
Petit Erable.

1716. *Acer monspessulanum*. *Acer* foliis trilobis integerrimis glabris. *Linn. Sp. plant.* 1497. *Acer trifolium. Pin.*
Erable de Montpellier.

1717. *Fraxinus excelsior*. *Fraxinus* foliolis serratis, floribus apertis. *Linn. Sp. plant.* 1509. *Fraxinus excelsior. Pin.*
Frêne.

1718. *Fraxinus ornus*. *Fraxinus* foliolis serratis, floribus corollatis. *Linn. Sp. plant.* 1510. *Fraxinus humilior* seu altera theophrasti minore & tenuiore folio. *Pin.*
Frêne nain.

1719. *Diospyros lotus*. *Diospyros* foliorum paginis discoloribus. *Linn. Sp. plant.* 1510. *Lotus africana latifolia. Pin.*
Lotier d'Afrique à larges feuilles.

1720. *Ficus carica*. *Ficus* foliis palmatis. *Linn. Sp. plant.* 1513. *Ficus communis. Pin.*
Figuier.



CLASSE XXIV.

Des Chryptogamiques.

1721. **E**QUISETUM sylvaticum. Equisetum caule spicato , frondibus compositis. *Lin. Sp. plant.* 1516. Equisetum sylvaticum , tenuissimis setis. *Pin.*

Prêle des bois.

1722. Equisetum arvense. Equisetum scapo fructificante nudo : sterili frondoso. *Lin. Sp. plant.* 1516. Equisetum arvense , longioribus setis. *Pin.*

Prêle des champs.

1723. Equisetum palustre. Equisetum caule angulato , frondibus simplicibus. *Lin. Sp. plant.* 1516. Equisetum palustre brevioribus setis. *Pin.*

Prêle des marais.

1724. Equisetum fluvatile. Equisetum caule striato , frondibus subsimplicibus. *Lin. Sp. plant.* 1517. Equisetum palustre , longioribus setis. *Pin.*

Prêle des rivières.

1725. Equisetum limosum. Equisetum caule subnudo lævi. *Lin. Sp. plant.* 1517. Equisetum scapo nudo simplicissimo. *Rai. Lugd. bat.* Equisetum foliis nudum ramosum. *Pin.*

Prêle rameux sans feuilles.

1726. Ophioglossum vulgatum. Ophioglossum fronde ovata. *Lin. Sp. plant.* 1518. Ophioglossum vulgatum. *Pin.*

Ophioglosse commun.

1727. Osmunda lunaria. Osmunda scapo caulino solitario , frondibus verticillatis lanceolatis indivisis. *Lin. Sp. plant.* 1519. Lunaria racemosa minor & vulgaris. *Pin.*

Lunaire commun.

1728. Osmunda regalis. Osmunda frondibus bipinnatis apice racemiferis. *Lin. Sp. plant.* 1521. Osmunda ramosa non dentata florida. *Pin.*

Osmonde royale.

1729. Osmunda spicant. Osmunda frondibus lanceolatis

pinnatifidis : laciniis confluentibus integerrimis parallelis.
Linn. Sp. plant. 1522. *Lonchitis minor. Pin.*

Petite Lonchite.

1730. *Osmunda crispa. Osmunda* frondibus supradecompositis , pinnis alternis subrotundis incis. *Linn. Sp. plant.*
Adiantum album alpinum crispum. Rai.

Adiante à feuilles légèrement découpées en long à pédicule verd.

1731. *Acrostichum septentrionale. Acrostichum* frondibus nudis linearibus laciniatis. *Linn. Sp. plant.* Filicula saxatilis corniculata. *Pin.* 358.

Fougere des rochers.

1732 *Acrostichum thelypteris. Acrostichum* frondibus pinnatis : pinnis pinnatifidis integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 1528. Filix mollis seu glabra , vulgari mari non ramosa accedens. *Bauh. hist.*

Fougere molle.

1733. *Pteris aquilina. Pteris* frondibus supradecompositis : foliolis pinnatis ; pinnis lanceolatis : infimis pinnatifidis , superioribus minoribus. *Linn. Sp. plant.* 1533. Filix ramosa major , pinnulis obtusis non dentata. *Pin.*

Fougere femelle.

1734. *Asplenium scolopendrium Asplenium* frondibus simplicibus cordato lingulatis integerrimis , stipitibus hirsutis. *Linn. Sp. plant.* 1537. *Lingua cervina officinarum. Pin.*

Langue de cerf des boutiques.

1735. *Asplenium ceterach. Asplenium* frondibus pinnatifidis lobis alternis confluentibus. *Linn. Sp. plant.* 1538. *Ceterach officinarum. Pin.*

Ceterac.

1736. *Asplenium trichomanes. Asplenium* frondibus pinnatis : pinnis subrotundis crenatis. *Linn. Sp. plant.* 1540. *Trichomanes seu polytrichum officinarum. Pin.*

Politric.

1737. *Asplenium marinum. Asplenium* frondibus pinnatis : pinnis obovatis serratis superne gibbis obtusis basi cuneatis. *Linn. Sp. plant.* 1581. *Chamaefilix marina anglica. Moris.*

Petite Fougere maritime.

1738. *Asplenium ruta muraria. Asplenium* frondibus alternatis

alternatim decompositis , foliolis cuneiformibus crenulatis.

Linn. Sp. plant 1541. Ruta muraria. *Pin.*

Rhue de murailles.

1739. Asplenium adiantum nigrum. Asplenium frondibus subtripinnatis foliolis alternis ; pinnis lanceolatis inciso serratis. *Linn. Sp. plant.* 1541. Adiantum pulcherrimum. *Bauh. hist.*

Adiante noir.

1740. Polypodium vulgare. Polypodium frondibus pinnatifidis pinnis oblongis subserratis obtusis , radice squamata. *Linn. Sp. plant.* 1544 Polypodium vulgare. *Pin.*

Polypode commun.

1741. Polypodium cambricum. Polypodium frondibus pinnatifidis pinnis lanceolatis lacero-pinnatifidis serratis. *Linn. Sp. plant.* 1548. Filix amplissima , lobis foliorum laciniatis , cambrica. *Pluk.*

Grande fougere dont les lobes des feuilles sont laciniés.

1742. Polypodium lonchitis. Polypodium frondibus pinnatis : pinnis lunulatis ciliato serratis declinatis , stipitibus strigosis. *Linn. Sp. plant.* 1548. Lonchitis aspera. *Pin.*

Grande Lonchite.

1743. Polypodium fontanum. Polypodium frondibus bipinnatis lanceolatis : foliolis subrotundis argute incis , stipite lævi. *Linn. Sp. plant.* 1550. Filicula fontana major. *Pin.*

Petite Fougere de montagnes.

1744. Polypodium cristatum. Polypodium frondibus bipinnatis : foliolis ovato-oblongis , pinnis obtusiusculis apice acute serratis. *Linn. Sp. plant.* 1551. Filix mas ramosa , pinnulis dentatis. *Pluk.*

Fougere rameuse.

1745. Polypodium filix mas. Polypodium frondibus bipinnatis : pinnis obtusis crenulatis , stipite paleaceo. *Linn. Sp. plant.* 1551. Filix mas non ramosa dentata. *Pin.*

Fougere mâle.

1746. Polypodium filix femina. Polypodium frondibus bipinnatis : pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Linn. Sp. plant.* 1552. Filix mas non ramosa , pinnulis angustis rarioribus profundè dentatis. *Morif.* 120.

Fougere femelle.

1747. Polypodium aculeatum. Polypodium frondibus bipin-

natis : pinnis innatis ciliato-dentatis , stipite strigoso. *Linn. Sp. plant.* 1552. *Filix aculeata major. Pin.*

Grande Fougere pointue.

1748. *Polypodium rheticum.* *Polypodium* frondibus bipinnatis foliolis pinnisque remotis lanceolatis : ferraturis acum. natis. *Linn. Sp. plant.* 1550. *Filicula montana major seu adiantum album , filicis folio. Pin.*

Adiante blanc.

1749. *Polypodium fragile.* *Polypodium* frondibus bipinnatis : foliolis remotis : pinnis subrotundis incis. *Linn. Sp. plant.* 1553. *Filix saxatilis non ramosa nigris maculis punctata. Pin.*

Fougere des rochers sans rameaux, pointillé de taches noires.

1750. *Polypodium regium.* *Polypodium* frondibus bipinnatis foliolis suboppositis : pinnis laciniatis. *Linn. Sp. plant.* 1553. *Filix regia, fumarie pinnulis. Vaill.*

Fougere royale.

1751. *Polypodium leptophyllum.* *Polypodium* frondibus bipinnatis : sterilibus brevissimis , pinnis cuneiformibus lobatis. *Linn. Sp. plant.* 1553. *Adiantum minimum folio vario.*

Petit Adiante à feuilles panachées.

1752. *Polypodium dryopteris.* *Polypodium* frondibus superdecompositis : foliolis ternis bipinnatis. *Linn. Sp. plant.* 1555. *Filix ramosa minor , pinnulis dentatis. Pin.*

Petite Fougere rameuse à feuilles dentelées.

1753. *Adiantum capillus veneris.* *Adiantum* frondibus decompositis : foliolis alternis : pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Linn. Sp. plant.* 1558. *Adiantum foliis coriandri. Pin.*

Capillaire.

1754. *Marsilea quadrifoliata.* *Marsilea* foliis quaternis. *Linn. Sp. plant.* 1563. *Lenticula palustris quadrifolia. Pin.*

Lentille des marais à quatre feuilles.

1755. *Pilularia globulifera.* *Pilularia.* *Linn. Sp. plant.* 1561. *Pilularia palustris juncifolia. Vaill.*

Pillulaire des marais à feuilles de jonc.

1756. *Isoetes lacustris.* *Isoetes.* *Linn. Sp. plant.* 1563. *Clamaria folio longiore & gracilior. Dill. musc.*

Isoete.

1757. *Lycopodium clavatum*. *Lycopodium* foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. *Linn. Sp. plant.* 1564. *Muscus terrestris clavatus*. *Pin.*

Lycopode commun à poils, & rampant.

1758. *Lycopodium selaginoides*. *Lycopodium* foliis sparsis ciliatis lanceolatis, spicis solitariis terminalibus foliosis. *Linn. Sp. plant.* 1565. *Selaginoides* foliis spinosis. *Dal.*

Lycopode à tiges rampantes & à feuilles épineuses.

1759. *Lycopodium inundatum*. *Lycopodium* foliis sparsis integerrimis, spicis terminalibus foliosis. *Linn. Sp. plant.* 1565. *Lycopodium palustre repens*, clava singulari. *Vaill.*

Lycopode rampant des marais.

1760. *Lycopodium selago*. *Lycopodium* foliis sparsis teretibus, caule dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis. *Linn. Sp. plant.* 1565. *Muscus erectus ramosus saturate viridis*. *Pin.*

Mousse élevée en forme de sapin.

1761. *Lycopodium annotinum*. *Lycopodium* foliis sparsis quinquefariis subserratis, surculis annotino articulatis, spicis terminalibus, glabris erectis. *Linn. Sp. plant.* 1566. *Muscus terrestris repens*, clavis singularibus erectis. *Pluk.*

Mousse terrestre rampante à masses droites.

1762. *Lycopodium alpinum*. *Lycopodium* foliis quadrifariam imbricatis acutis, surculis erectis dichotomis, spicis teretibus sessilibus. *Linn. Sp. plant.* 1567. *Muscus clavatus foliis cupressi*. *Rai. hist.*

Mousse en masse à feuilles de cyprès.

1763. *Lycopodium complanatum*. *Lycopodium* foliis bifariis connatis: superficialibus solitariis, spicis geminis pedunculatis. *Linn. Sp. plant.* 1567. *Muscus terrestris ramosus pulcher*. *Bank. hist.*

Belle mousse terrestre rameuse.

1764. *Sphagnum palustre*. *Sphagnum* ramis deflexis. *Linn. Sp. plant.* 1569. *Muscus palustris in ericetis nascens*. *Vaill.*

Mousse des marais.

1765. *Phascum acaulon*. *Phascum* acaule, anthera sessili, foliis ovatis acutis conniventibus. *Linn. Sp. plant.* 1570. *Muscus trichodes acaulos minor latifolius*. *Vaill.*

Petite Mousse sans tiges à larges feuilles.

1766. *Phascum subulatum*. *Phascum* acaule, anthera sessili,

foliis subulato setaceis patulis. *Linn. Sp. plant.* 1570. Muscus trichodes minor acaulos, capillaceis foliis. *Vaill.*

Petite Mouffe sans tiges à feuilles capillaires.

1767. Fontinalis antipyrretica. Fontinalis foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Linn. Sp. plant.*

1571. Muscus aquaticus denticulatus. *Læs. pruss.*

Mouffe aquatique dentelée.

1768. Fontinalis squamosa. Fontinalis foliis imbricatis subulato lanceolatis, capitulis lateralibus. *Linn. Sp. plant.* 1571.

Fontinalis minor lucens. *Bauh. hist.*

Petite Fontinelle luisante.

1769. Fontinalis pennata. Fontinalis foliis bifariis patentibus, capsulis lateralibus. *Linn. Sp. plant.* 1571. Muscus terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. *Vaill.*

Grande Mouffe terrestre à rameaux applatis, & à feuilles crépues à la superficie.

1770. Splachnum ampullaceum. Splachnum umbraculo ampullaceo obconico. *Linn. Sp. plant.* 1572. Muscus capillaceus minor, capitulis geminatis. *Vaill.*

Petite Mouffe capillaire à double tête.

1771. Polytrichum commune. Polytrichum caule simpliciter, anthera parallelepipedâ. *Linn. Sp. plant.* 1573. Polytrichum aureum majus. *Pin.*

Grand Politrice doré.

1772. Polytrichum urnigerum. Polytrichum caule ramosissimo, pedunculis axillaribus. *Linn. Sp. plant.* 1573. Muscus ramosus erectus, calyptra villosa. *Vaill.*

Mouffe rameuse élevée, à coiffe velue.

1773. Mnium pellucidum. Mnium caule simpliciter, foliis ovatis. *Linn. Sp. plant.* 1574. Muscus coronatus minimus capillaceis foliis, capitulis oblongis. *Vaill.*

Tres-petite Mouffe couronnée à feuilles capillaires, à têtes oblongues.

1774. Mnium palustre. Mnium caule dichotomo, foliis subulatis. *Linn. Sp. plant.* 1574. Muscus palustris flavesceus erectus, capillaceo folio. *Vaill.*

Mouffe élevée & jaunâtre des marais à feuilles en forme de cheveux.

1775. *Mnium androgynum*. *Mnium* caule ramoso , androgynum. *Linn. Sp. plant.* 1574. *Muscoides* : muscus capillaris minimus , capitulo minimo pulverulento. *Vaill.*

Petite Mouffe capillaire à petite tête poudrée.

1776. *Mnium hygrometricum*. *Mnium* acaule , anthera nutante , calyptra reflexa *Linn. Sp. plant.* 1575 *Muscus* foliis scutellatis , capitulo pyriformi nutante. *Vaill.*

Mouffe à feuilles en forme d'écuelle , à tête flottante & imitant une poire.

1777. *Mnium purpureum*. *Mnium* caule dichotomo : axillis pedunculiferis , anthera erecta , foliis carinatis. *Linn. Sp. plant.* 1575 *Muscus* trichodes parvus , foliis musci vulgaris , capitulis longis acutis. *Morif.*

Mni pourpre.

1778. *Mnium setaceum*. *Mnium* antheris erectis , operculis filiformibus longitudine antherarum. *Linn. Sp. plant.* 1575. *Bryum* stellare nitidum pallidum , capsulis tenuissimis. *Dill.*

Mni à antheres droites.

1779. *Mnium circatum*. *Mnium* foliis arefactione revolutis. *Linn. Sp. plant.* 1575. *Muscus* muralis minimus roseus stellaris. *Vaill.*

Très-petite Mouffe des murs étoilée.

1780. *Mnium annotinum*. *Mnium* foliis ovatis acuminatis pellucidis pedunculis subradicalibus , anthera nutante. *Linn. Sp. plant.* 1576. *Bryum* annotinum lanceolatum pellucidum , capsulis oblongis pendulis. *Dill.*

Mni à feuilles ovales pointues.

1781. *Mnium hornum*. *Mnium* antheris pendulis , pedunculo curvato , sacculo simplici , foliolis margine scabris. *Linn. Sp. plant.* 1576 *Muscus* capillaceus major stellatus. *Vaill.*

Grande Mouffe étoilée & capillacée.

1782. *Mnium crudum*. *Mnium* antheris pendulis , calyptra recurvata , foliis pellucidis. *Linn. Sp. plant.* 1576. *Bryum* pendulum hornum molle , foliis & lanceolatis & gramineis. *Dill.*

Mni crud.

1783. *Mnium pyriforme*. *Mnium* antheris pendulis turbulatis , stipite filiformi , floribus femineis setiferis. *Linn. Sp.*

plant. 1576. *Bryum trichodes aureum*, capitulis pyriformibus nutantibus. *Dillen.*

Mni en forme de poire.

1784. *Mnium polytrichoides*. *Mnium calyptra villosa*. *Linn. Sp. plant.* 1576. *Muscus capillaceus minor calyptra tomentosa*. *Vaill.*

Petite Mouffe capillacée à coëffe cotonneuse.

1785. *Mnium serpyllifolium*. *Mnium pedunculis aggregatis*, foliis patentibus pellucidis. *Linn. Sp. plant.* 1577. *Mnium punctatum*. *Mnium pedunculis aggregatis foliis obovatis integerrimis obtusis punctatis*. *Linn. Sp. plant.* 1577. *Muscus folio lato subrotundo*, capitulo singulari nutante, pediculo longo subrubenti insidente. *Vaill.* *Mnium cuspidarum*. *Mnium pedunculis aggregatis*, foliis alternis acutis serratis. *Linn. Sp. plant.* 1577. *Muscus palustris foliis subrotundis*. *Vaill.* *Mnium prolyferum*. *Mnium pedunculis aggregatis*, foliis rosaceo congestis lanceolatis acutis. *Linn. Sp. plant.* 1578. *Muscus stellaris roseus*. *Pin.* *Mnium undulatum*. *Mnium pedunculis aggregatis*, foliis oblongis undulatis. *Linn. Sp. plant.* 1578. *Muscus roseus polycephalus*, linearis foliis undulatis. *Vaill.*

Mni à feuilles de serpolet.

1786. *Mnium fissum*. *Mnium foliis distichis bifidis*. *Linn. Sp. plant.* 1579. *Mnium trichomanis facie*, foliolis bifidis. *Dill.*

Mni à forme d'adiante.

1787. *Mnium jungermannia*. *Mnium foliis distichis*, pinnis subtus auriculatis. *Linn. Sp. plant.* 1579. *Lichenastrum alpinum purpureum*, foliis autitis & cochleariformibus. *Dill.*

Mni jongerman.

1788. *Bryum apocarpum*. *Bryum antheris sessilibus terminalibus*, calyptra minima. *Linn. Sp. plant.* 1579. *Muscus apocarpos hirsutus saxis adnascens*, capitulis obscure rubris. *Vaill.* *Muscus squamosus saxatilis tortuosus ac nodosus*. *Vaill.*

Mouffe écailleuse des rochers.

1789. *Bryum striatum*. *Bryum antheris subsessilibus sparsis*, calyptris striatis sursum ve pilosis. *Linn. Sp. plant.* 1579. *Muscus apocarpos arboreus tamosus*. *Vaill.* *Muscus capillaceus minimus acaulos*, calyptra striata. *Idem.* *Muscus capillaceus minimus*, calyptra villosa. *Idem.*

Petite Mouffe capillaire, à coëffe fourrée.

1790. *Bryum pomiforme*. *Bryum antheris erectis sphaericis*. *Linn. Sp. plant.* 1580. *Muscus trichodes minimus sericeus capillaceus, capitulis sphaericis*. *Vaill.*

Bri à capsules sphériques.

1791. *Bryum pyriforme*. *Bryum antheris erectis obovatis, calyptra subulatâ, furculis acaulibus, foliis ovatis mucicis*. *Linn. Sp. plant.* 1580. *Muscus capillaceus minimus capitulis pyriformibus turgidis*. *Vaill.*

Très-petite Mouffe capillacée à tête gonflée en forme de poire.

1792. *Bryum extinctorium*. *Bryum anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis aequalibus*. *Linn. Sp. plant.* 1581. *Muscus capillaceus minimus, calyptra longa conoide nitida*. *Vaill.*

Très-petite Mouffe capillaire à coëffe longue luisante.

1793. *Bryum subulatum*. *Bryum antheris erectis subulatis furculis acaulibus*. *Linn. Sp. plant.* 1581. *Muscus capillaris corniculis longissimis incurvis*. *Vaill.*

Bri en forme d'âlène.

1794. *Bryum rurale*. *Bryum antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis*. *Linn. Sp. plant.* 1581. *Muscus capillaris tectorum, densis caespitibus nascens, capitulis oblongis, foliis in pilum longum desinentibus*. *Vaill.*

Mouffe des toits.

1795. *Bryum murale*. *Bryum antheris erectis, foliis puliferis rectiusculis, furculis simplicibus caespitosis*. *Linn. Sp. plant.* 1581. *Muscus capillaris omnium vulgarissimus non villosus*. *Vaill.*

Mouffe capillaire non velue la plus commune de toutes.

1796. *Bryum scoparium*. *Bryum antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato*. *Linn. Sp. plant.* 1582. *Muscus capillaceus major pediculo & capitulo tenuioribus*. *Vaill.*

Grande Mouffe capillaire.

1797. *Bryum undulatum*. *Bryum antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus serratis*. *Linn. Sp. plant.* 1582. *Muscus erectus, linariae folio major*. *Vaill.*

Grande Mouffe élevée à feuilles de linair.

1798. *Bryum glaucum*. *Bryum antheris erectiusculis* ; operculo arcuato , foliis erectis imbricatis , surculis ramosis. *Linn. Sp. plant.* 1582. *Muscus erectus capillaceus densissimus* , glauco folio. *Vaill.*

Mousse capillacée élevée très-épaisse , à feuilles d'un verd de mer.

1799. *Bryum pellucidum*. *Bryum antheris erectiusculis* , foliis recurvis acutis , caule hirsuto. *Linn. Sp. plant.* 1583. *Bryum palustre pellucidum* , capsulis & foliis brevibus recurvis. *Dill.*

Bri luisant.

1800. *Bryum flexuosum*. *Bryum antheris erectis foliis setaceis* , pedunculis flexuosis. *Linn. Sp. plant.* 1583. *Bryum pilosum molle* , setis intortis. *Dill.*

Bri à poils.

1801. *Bryum heteromallum*. *Bryum antheris erectis foliis setaceis secundis*. *Linn. Sp. plant.* 1583. *Muscus capillaceus* , foliis unam partem spectantibus. *Vaill.*

Mousse capillacée à feuilles tournées d'un même côté.

1802. *Bryum truncatum*. *Bryum antheris erectis subrotundis* ; operculo mucronato. *Linn. Sp. plant.* 1584. *Muscus capillaceus omnium minimus*. *Vaill.*

Mousse capillacée la plus petite de toutes.

1803. *Bryum viridulum*. *Bryum antheris erectis ovatis* , foliis lanceolatis acuminatis imbricato patulis. *Linn. Sp. plant.* 1584. *Muscus capillaceus omnium minimus* , foliis longioribus & angustioribus. *Vaill.*

Mousse capillacée la plus petite de toutes , à feuilles plus longues & plus étroites.

1804. *Bryum paludosum*. *Bryum acaulon* , foliolis setaceis , antheris obtusissimis patulis. *Linn. Sp. plant.* 1584. *Bryum trichodes acaulon palustre minimum* , setis & capsulis brevissimis. *Dill.*

Bri des marais.

1805. *Bryum hypnoides*. *Bryum antheris erectis caule erectiusculo* , ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Linn. Sp. plant.* 1584. *Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum*. *Dill.*

Mousse terrestre lanugineuse semblable à la commune.

1306. *Bryum verticillatum*. *Bryum* antheris erectis, pedunculis siccitare contortis, foliis piliferis, surculis fastigiatis. *Linn. Sp. plant.* 1385. *Bryum pilosum verticillatum*. *Dill.*

Bri verticillé à poils.

1307. *Bryum æstivum*. *Bryum* antheris erectis subrotundis axillaribus, foliis subulatis distantibus. *Linn. Sp. plant.* 1385. *Bryum palustre æstivum* conservæ facie. *Dill.*

Bri d'été.

1308. *Bryum squarrosum*. *Bryum* antheris obliquis, foliis quinquefariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo tomentoso. *Linn. Sp. plant.* 1385. *Muscus palustris*, foliis reflexis cauliculos quinquangulos formantibus. *Buxb.*

Bri raboteux.

1309. *Bryum argenteum*. *Bryum* antheris pendulis surculis cylindricis imbricatis laxibus. *Linn. Sp. plant.* 1386. *Muscus squamosus argenteus*, ericæ folio. *Vaill.*

Mousse écailleuse argentée à feuilles de bruyère.

1310. *Bryum pulvinatum*. *Bryum* antheris subrotundis pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Linn. Sp. plant.* 1386. *Muscus capillaceus minimus lanuginosus*. *Vaill.*

Très-petite Mousse capillacée lanugineuse.

1311. *Bryum caespitium*. *Bryum* antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-setaceis, pedunculis longissimis. *Linn. Sp. plant.* 1386. *Muscus capillaceus minimus* capitulo nutante, pediculo purpureo. *Vaill.*

Très-petite Mousse capillacée à tête flottante & à pédicule purpurin.

1312. *Bryum capillare*. *Bryum* antheris pendulis, foliis ovatis setiferis catinatis, pedunculis longissimis. *Linn. Sp. plant.* 1386. *Muscus capillaceus major*, capitulis crassioribus cylindraceis nutantibus. *Vaill.*

Bri capillaire.

1313. *Bryum carneum*. *Bryum* antheris pendulis subglobosis, foliis acutis alternis. *Linn. Sp. plant.* 1387. *Muscus stellaris humilis* capitulis pendulis. *Buxb.*

Mousse basse étoilée à tête panchée.

1314. *Bryum simplex*. *Bryum* antheris oblongis nutantibus, foliis subulatis, surculo simplicissimo medio pedunculifero.

Linn. Sp. plant. 1587. *Bryum trichoides*, capsulis rubris cernuis. *Dill.*

Bri simple.

1815. *Hypnum taxifolium*. *Hypnum* fronde simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculifera. *Linn. Sp. plant.* 1587. *Hypnum* taxiforme minus : basi capsulifera. *Dill.*

Mousse ailée à tête d'adiante.

1816. *Hypnum denticularum*. *Hypnum* fronde pinnata simplici : pinnis duplicatis basi pedunculifera. *Linn. Sp. plant.* 1588. *Muscus pennatus denticularis minor*. *Vaill.*

Petite Mousse ailée dentelée.

1817. *Hypnum bryoides*. *Hypnum* fronde simplicissima pinnata lanceolata apice pedunculifera. *Linn. Sp. plant.* 1588. *Muscus polytrichoides*, exiguis capitulis in summis furculis, seu foliis subrotundis erectis. *Vaill.*

Très-petite Mousse terrestre à feuilles ailées.

1818. *Hypnum adianthoides*. *Hypnum* fronde pinnata ramosa erecta medio pedunculifera. *Linn. Sp. plant.* 1588. *Muscus taxiformis ramosus*. *Vaill.*

Mousse rameuse à forme d'if.

1819. *Hypnum complanatum*. *Hypnum* fronde pinnata ramosa, foliolis imbricatis æutis complicatis compressis. *Linn. Sp. plant.* 1588. *Muscus trichomanoides filicifolius splendens*. *Vaill.*

Mousse brillante à feuilles de fougere.

1820. *Hypnum lucens*. *Hypnum* furculis ramosis, frondibus subpinnatis, foliolis punctatis. *Linn. Sp. plant.* 1589. *Hypnum* pennatum aquaticum lucens, longis, latisque foliis. *Dill.*

Mousse luisante aquatique ailée à feuilles longues & larges.

1821. *Hypnum crispum*. *Hypnum* furculis ramosis, frondibus undulatis planis. *Linn. Sp. plant.* 1589. *Muscus* terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. *Morif*

Grande Mousse terrestre à petits rameaux aplatis, à feuilles crépues.

1822. *Hypnum triquetrum*. *Hypnum* ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Linn. Sp. plant.* 1589. *Muscus* ramosus major spermatophorus. *Vaill.*

Grande Mousse rameuse.

1823. *Hypnum rutabulum*. *Hypnum* ramis vagis subreptu-

ribus , foliolis ovatis mucronatis imbricatis. *Linn. Sp. plant.* 1590. Muscus myosuroides rutabili folio. *Vaill.*

Hypne dentelé très-commun.

1824. *Hypnum filicinum.* *Hypnum* furculis pinnatis ramulis distantibus , foliolis imbricatis incurvis acutis secundis. *Linn. Sp. plant.* 1590. Muscus filicus palustris. *Vaill.*

Mouffe à fougere des marais.

1825. *Hypnum proliferum.* *Hypnum* furculis proliferis plano pinnatis , pedunculis aggregatis. *Linn. Sp. plant.* 1590. Muscus filicinus major. *Morif.*

Grande Mouffe à fougere.

1826. *Hypnum parietinum.* *Hypnum* furculis plano pinnatis continuatis , pedunculis aggregatis. *Linn. Sp. plant.* 1590. *Hypnum filicinum* , tamarisci foliis majoribus splendentibus. *Dill.*

Hypne des murailles.

1827. *Hypnum prolongum.* *Hypnum* furculis subbipinnatis decumbentibus : ramulis remotis , foliolis ovatis , antheris cernuis. *Linn. Sp. plant.* 1591. Muscus terrestris minor foliis crispis. *Buxb.*

Petite Mouffe terrestre à feuilles crépues.

1828. *Hypnum crista castrensis.* *Hypnum* furculis pinnatis : ramulis approximatis : apicibus recurvis. *Linn. Sp. plant.* 1591. Muscus terrestris repens subulatus , foliolis crispis minoribus , ramulisque densius confertis. *Vaill.*

Grande Mouffe ailée à tiges rameuses.

1829. *Hypnum abietinum.* *Hypnum* furculis pinnatis tertiusculis remotis inæqualibus. *Linn. Sp. plant.* 1591. *Hypnum lutescens* , alis subulatis tenacibus. *Dill.*

Hypne des sapins.

1830. *Hypnum plumosum.* *Hypnum* furculis pinnatis repentibus , ramis confertis , foliis imbricatis subulatis , antheris erectis. *Linn. Sp. plant.* 1592. *Hypnum repens filicinum plumosum.* *Dill.*

Hypne plumeux.

1831. *Hypnum cupressi forme.* *Hypnum* furculis subpinnatis , foliis secundis recurvis apice subulatis. *Linn. Sp. plant.* 1592. Muscus squamosus ramosus minor & crispus.

Petite Mouffe à cailleuse, rameuse & crépue.

1832. *Hypnum aduncum*. *Hypnum* furculis erectiusculis subramosis, foliis secundis recurvatis subulatis, ramis recurvatis. *Linn. Sp. plant.* 1592. *Muscus squamosus*, viticulis longioribus glabris. *Vaill.*

Mousse écailleuse, à vrilles plus longues sans poils.

1834. *Hypnum squarrosum*. *Hypnum* ramis vagis, foliis ovatis apice subulatis undique reflexis. *Linn. Sp. plant.* 1593. *Muscus erectus*, foliis reflexis. *Vaill.*

Mousse élevée à feuilles repliées.

1835. *Hypnum palustre*. *Hypnum* furculis reptantibus, ramis confertis erectis, foliolis ovatis secundis, antheris erectiusculis. *Linn. Sp. plant.* 1593. *Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens*. *Dill.*

Hypne des marais.

1836. *Hypnum loreum*. *Hypnum* furculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis secundis, antheris subrotundis. *Linn. Sp. plant.* 1593. *Muscus montanus*.

Mousse de montagnes.

1837. *Hypnum dendroides*. *Hypnum* furculo erecto ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis antheris erectis. *Linn. Sp. plant.* 1593. *Muscus squamosus ramosus erectus alopecuroides*. *Tourn.*

Mousse écailleuse, rameuse élevée.

1838. *Hypnum alopecurum*. *Hypnum* furculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus subdivisis, antheris subnutantibus. *Linn. Sp. plant.* 1594. *Muscus squamosus alopecuroides*, flagellis recurvis. *Vaill.*

Mousse écailleuse à franges recourbées.

1839. *Hypnum curtipendulum*. *Hypnum* furculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis. *Linn. Sp. plant.* 1594. *Hypnum dentatum curtipendulum* viticulis rigidis. *Dill.*

Hypne à tiges cylindriques, à feuilles ovales aiguës ouvertes, & à anthères inclinées.

1840. *Hypnum purum*. *Hypnum* furculis pinnato sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis conniventibus. *Linn. Sp. plant.* 1594. *Muscus squamosus cupressiformis*. *Vaill.*

Mousse écailleuse à forme de cyprès.

1841. *Hypnum illecebrum*. *Hypnum* furculis ramisque vagis teretibus erectiusculis obtusis. *Linn. Sp. plant.* 1594. *Hyp-*

num cupressiforme rotundius , vel illecebræ æmulum. *Dill.*

Hypne à forme de cyprès.

1842. *Hypnum riparium.* *Hypnum* furculis teretibus ramosis , foliolis acutis parvis distantibus. *Linn. Sp. plant.* 1595. *Hypnum* ramosum silitans pennatum. *Rai.*

Hypne rameux , flottant & ailé.

1843. *Hypnum cuspidatum.* *Hypnum* furculis vagis , apice foliis convolutis acuminatis. *Linn. Sp. plant.* 1595. *Muscus saxatilis repens*, coma sparsa *Burb.*

Moussè rampante des rochers à chevelure éparse.

1844. *Hypnum sericeum.* *Hypnum* furculo repente , ramis confertis erectis , foliis subulatis , antheris erectis. *Linn. Sp. plant.* 1595. *Muscus arboreus splendens sericeus.* *Vaill.*

Moussè luisante d'arbre.

1845. *Hypnum velutinum.* *Hypnum* furculo repente , ramis confertis erectis , foliis subulatis , antheris subnutantibus. *Linn. Sp. plant.* 1595. *Muscus squamosus ramosus tenuior* , capitulis incurvis. *Vaill.*

Moussè écailleuse , rameuse , tenue à têtes recourbées.

1846. *Hypnum serpens.* *Hypnum* furculis repentibus , ramis filiformibus , foliis oblitteratis. *Linn. Sp. plant.* 1596. *Muscus terrestris omnium omninus* , capitulis majusculis oblongis erectis. *Vaill.*

Moussè terrestre la plus petite de toutes.

1847. *Hypnum sciuroides.* *Hypnum* furculis erectis ramosis incurvatis. *Linn. Sp. plant.* 1596. *Hypnum arboreum sciuroides.* *Dill.*

Moussè d'arbre brillante.

1848. *Hypnum myosuroides.* *Hypnum* furculis ramosissimis , ramis subulatis utrinque attenuatis teretibus. *Linn. Sp. plant.* 1596. *Muscus squamosus minor myosuroides* capitulis incurvis. *Vaill.*

Petite Moussè écailleuse à tête recourbée.

1849. *Hypnum clavellatum.* *Hypnum* repens , ramulis erectis confertissimis , antheris incurvis , operculis inflexis. *Linn. Sp. plant.* 1596. *Hypnum clavellatum parvum repens* , setis brevibus. *Dill.*

Hypne clavellé.

1850. *Jungermannia asplemoides.* *Jungermannia* frondibus

simpliciter pinnatis : foliolis ovatis subciliatis. *Linn. Sp. plant.* 1597. *Hepaticoides polytrichi facie. Vaill.*

Jongerman à forme de ceterach.

1831. *Jungermannia viticulosa.* *Jungermannia* frondibus simpliciter pinnatis : foliolis subulatis. *Linn. Sp. plant.* 1597. *Lichenastrum trichomanis facie*, à basi & medio florens. *Dill.*

Jongerman à vrilles.

1832. *Jungermannia polyanthos.* *Jungermannia* frondibus simpliciter pinnatis ; foliolis integerrimis imbricatis connexis. *Linn. Sp. plant.* 1597. *Lichenastrum trichomanes facie*, polyanthemum breve & repens. *Dill.*

Jongerman à feuilles simplement ailées, dont les folioles sont faites en forme de thuile.

1833. *Jungermannia lanceolata.* *Jungermannia* frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis apice floriferis, foliolis integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 1597. *Jungermannia palustris minima repens*, foliis subrotundis densissimis late virentibus. *Mich.*

Jongerman lanceolé.

1834. *Jungermannia bidentata.* *Jungermannia* frondibus simpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Sp. plant.* 1598. *Hepaticoides, polytrichi facie*, foliis bifidis, major. *Vaill.*

Jongerman à double dents.

1835. *Jungermannia bicuspidata.* *Jungermannia* frondibus simpliciter pinnatis medio floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Sp. plant.* 1598. *Lichenastrum*, pinnulis acutissime bifidis, minimum. *Dill.*

Jongerman doublement pointu.

1836. *Jungermannia quinque dentata.* *Jungermannia* fronde pinnata ramosa apice florifera, foliolis quinque dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1598. *Lichenastrum multifidum majus ab extremitate florens.* *Dill.*

Jongerman à cinq dents.

1837. *Jungermannia undulata.* *Jungermannia* frondibus supra bipinnatis apice floriferis, foliolis subrotundis integerrimis. *Linn. Sp. plant.* 1598. *Hepatica saxatilis undulata seminifera.* *Vaill.*

Hépatique des rochers portant semences.

1838. *Jungermannia nemorosa.* *Jungermannia* frondibus supra bipinnatis apice floriferis, foliolis ciliatis. *Linn. Sp.*

pl. et. 1598. Lichenastrum auriculatum, pinnis minoribus crenatis. *Dill.*

Jongerman des bois.

1859. Jungermannia resupinata. Jungermannia frondibus supra bipinnatis inferne floriferis, foliolis crenulatis imbricatis rotundis. *Linn. Sp. plant.* 1599. Lichenastrum imbricatum, pinnulis rotundis, crispum. *Dill.*

Jongerman renversé.

1860. Jungermannia albicans. Jungermannia frondibus supra bipinnatis apice floriferis, foliolis linearibus recurvatis. *Linn. Sp. plant.* 1599. Hepaticoides albescens, foliis pinnatis. *Vaill.*

Jongerman blanchâtre.

1861. Jungermannia reptans. Jungermannia frondibus subtus bipinnatis apice reptantibus, foliolis quadridentatis. *Linn. Sp. plant.* 1599. Lichenastrum multifidum exiguum ad basin florens per siccitatem imbricatum. *Dill.*

Jongerman rampant.

1862. Jungermannia complanata. Jungermannia furculis repentibus : foliolis inferne auriculatis duplicato imbricatis, ramis aequalibus. *Linn. Sp. plant.* 1600. Lichenastrum imbricatum majus, squamis compressis & planis. *Dill.*

Jongerman applati.

1863. Jungermannia dilatata. Jungermannia furculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato imbricatis, ramis apice latioribus. *Linn. Sp. plant.* 1600. Lichenastrum imbricatum minus squamis convexo concavis. *Dill.*

Jongerman ouvert.

1864. Jungermannia tamarisci. Jungermannia foliis imbricatis serie duplici; superioribus rotundis convexis obtusis quadruplo majoribus. *Linn. Sp. plant.* 1600. Lichenastrum imbricatum tamarisci narbonensis facie. *Dill.*

Jongerman du tamarisc.

1865. Jungermannia platyphylla. Jungermannia furculis procumbentibus subtus imbricatis, foliolis cordatis acutis. *Linn. Sp. plant.* 1600. Lichenastrum arboris vitæ facie, foliis minus rotundis. *Dill.*

Especie de Mouffe écailluse d'un verd noirâtre, à feuilles ob rondes.

1866. Jungermannia palustris. Jungermannia furculis repen-

tibus, foliolis duplicato imbricatis, inferne auriculatis ciliatis; *Linn. Sp. plant.* 1601. Muscus palustris absynrhii folio. *Vaill.*

Mousse des marais à feuilles d'absynthe.

1867. *Jungermannia varia*. *Jungermannia* furculis erectiusculis bifarium, imbricatis, foliis bipartitis. *Linn. Sp. plant.* 1601. *Lichenastrum* foliis variis. *Dill.*

Jongerman panachée.

1868. *Jungermannia rupestris*. *Jungermannia* furculis teretibus, foliolis subulatis secundis. *Linn. Sp. plant.* 1701. *Lichenastrum alpinum nigricans*, foliis capillaceis reflexis. *Dill.*

Jongerman des rochers.

1869. *Jungermannia trichophylla*. *Jungermannia* furculis teretibus, foliolis capillaceis aequalibus. *Linn. Sp. plant.* 1601. *Lichenastrum trichodes minimum* in extremitate flores. *Dill.*

Jongerman à rejettons cylindriques, à folioles capillacées égales.

1870. *Jungermannia epiphylla*. *Jungermannia* acaulis, foliis frondi innato. *Linn. Sp. plant.* 1602. *Lichen petraeus*, caliculo calceato. *Pin.*

Lichen de rochers.

1871. *Jungermannia pinguis*. *Jungermannia* acaulis, fronde oblonga sinuata pingui. *Linn. Sp. plant.* 1602. *Lichen parim erectus*, foliis profunde laciniatis. *Pluk.*

Petit Lichen élevée à feuilles profondément laciniés,

1872. *Jungermannia furcata*. *Jungermannia* acaulis, fronde lineari ramosa extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Linn. Sp. plant.* 1602. *Hepatica arborea globulifera*. *Vaill.*

Hépatique d'arbre globuleuse.

1873. *Jungermannia usilla*. *Jungermannia* acaulis, fronde subpinnatifida, lobis imbricatis, perichætio plicato. *Linn. Sp. plant.* 1603. *Lichenastrum exiguum*, capitulis nigris lucidis et cotylis parvis nascentibus. *Linn. Sp. plant.* 1603.

Jongerman sans tiges à feuilles ailées, à lobes en forme de tuiles.

1874. *Marchantia polymorpha*. *Marchantia* calyce communi decemfido. *Linn. Sp. plant.* 1603. *Lichen petraeus latifolius* seu *hepatica fontana*. *Pin.*

Hépatique de fontaine.

1875. *Marchantia cruciata*. *Marchantia* calyce communi quadripartito,

quadripartito, laciniis tubulosis. *Linn. Sp. plant.* 1604. Lichen hepaticus capitulis quadrifidis. *Burb.*

Hépatique à tête divisée en quatre.

1876. *Marchantia hemispherica*. *Marchantia* calyce communi quinquesido hemispherico, perichætio nullo. *Linn. Sp. plant.* 1604. *Hepatica medica*, capitulo hemispherico. *Mich.*

Hépatique moyenne à tête hémisphérique.

1877. *Marchantia conica*. *Marchantia* calyce communi quinqueloculari subovato. *Linn. Sp. plant.* 1604. *Hepatica vulgaris major* seu officinarum italix. *Mich.*

Grande Hépatique commune.

1878. *Blasia pusilla* *Blasia*. *Linn. Sp. plant.* 1605. *Mnium lichnis facie*. *Dill.*

Mni à forme de lichnide.

1879. *Riccia cristallina*. *Riccia* frondibus superficie papillofis. *Linn. Sp. plant.* 1605. Lichen palustris, ruthe folio. *Dill.*

Lichen des marais à feuilles de rhue.

1880. *Riccia minima*. *Riccia* frondibus glabris bipartitis acutis. *Linn. Sp. plant.* 1605. *Riccia minima nitida*, segmentis angustioribus acutis. *Mich. Gen.*

Le plus petit de tous les Lichens.

1881. *Riccia glauca*. *Riccia* frondibus glabris canaliculatis bilobis obtusis. *Linn. Sp. plant.* 1605. *Hepatica palustris bifurca*, locis brevioribus carinatis. *Vaill.* Lichen terrestris minor, foliis rutæ. *Burb.*

Petit Lichen terrestre à feuilles de rhue.

1882. *Riccia fluitans*. *Riccia* frondibus dichotomis linearifiliformibus. *Linn. Sp. plant.* 1606. *Hepatica palustris dichotoma*, segmentis angustioribus. *Vaill.*

Hépatique flottant à feuilles menues.

1883. *Anthoceros laxus*. *Anthoceros* frondibus indivisis sinuatis laxibus. *Linn. Sp. plant.* 1606. *Anthoceros* foliis majoribus minus laciniatis. *Dill.*

Lichen hépatique à pedicule de chien-dent.

1884. Lichen scriptus. Lichen leptosus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus. *Linn. Sp. plant.* 1606. Lichenoides crusta tenuissima, peregrinis veluti litteris inscripta. *Dill.*

Lichen imitant l'écriture étrangère.

1885. Lichen geographicus. Lichen leprosus flavescens, lineolis nigris mappam referens. *Linn. Sp. plant.* 1607. Lichenoides nigro flavum tabulæ geographicæ instar pictum. *Dill.*
Lichen géographique.

1886. Lichen rugosus. Lichen leprosus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis. *Linn. Sp. plant.* 1607. Lichenoides punctatum & rugosum minus. *Dill.*
Lichen ridé.

1887. Lichen sanguineus. Lichen leprosus cinereo virefcens, tuberculis atris. *Linn. Sp. plant.* 1607. Lichenoides leprosum, crusta cinereo virefcente, tuberculis integerrimis. *Dill.*
Lichen sanguin.

1888. Lichen fusco ater. Lichen leprosus fuscus, tuberculis atris. *Linn. Sp. plant.* 1607.
Lichen d'un brun noirâtre.

1889. Lichen calcareus. Lichen leprosus candidus, tuberculis atris. *Linn. Sp. plant.* 1607. Lichenoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis atris. *Dill.*
Lichen éperonné.

1890. Lichen atro virens. Lichen leprosus ater, tuberculis viridibus confertis. *Linn. Sp. plant.* 1607.
Lichen d'un verd noirâtre.

1891. Lichen atro albus. Lichen leprosus niger, tuberculis albis. *Linn. Sp. plant.* 1607.
Lichen d'un blanc noirâtre.

1892. Lichen ventosus. Lichen leprosus flavus tuberculis rubris. *Linn. Sp. plant.* 1607.
Lichen venteux.

1893. Lichen fagineus. Lichen leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. *Linn. Sp. plant.* 1608.
Lichen du hêtre.

1894. Lichen carpineus. Lichen leprosus cinereus, tuberculis albidis rugosis. *Linn. Sp. plant.* 1608.
Lichen du charme.

1895. Lichen ericetorum. Lichen leprosus candidus, tuberculis incarnatis. *Linn. Sp. plant.* 1608. Coralloides fungiforme carneum, basi leprosa. *Dill.*

Coralloïde charnu à forme de champignon, à base lépreuse.

1896. Lichen candelarius. Lichen crustaceus flavus, scutellis luteis. *Linn. Sp. plant.* 1602. Byssus farinacea flava. *Iter. Æland.*

Lichen à forme de chandelier.

1897. Lichen tartareus. Lichen crustaceus ex albedo virens, scutellis flavescens; margine albo. *Linn. Sp. plant.* 1608. Lichenoides tartareum farinaceum, scutellatum umbone fusco. *Dill.*

Lichen de Tartarie.

1898. Lichen pallescens. Lichen crustaceus albicans, scutellis pallidis. *Linn. Sp. plant.* 1608. Lichenoides crustosum orbiculare incanum. *Dill.*

Lichen pâle.

1899. Lichen subfuscus. Lichen crustaceus albicans, scutellis subfuscis, margine cinereo subcrenato. *Linn. Sp. plant.* 1609. Lichenoides crustaceum & leprosum scutellis subfuscis. *Dill.*

Lichen d'un brun tanné.

1900. Lichen centrifugus. Lichen imbricatus, foliolis multifidis obsolete lævibus albidis centrifugis, scutellis rufo fuscis. *Linn. Sp. plant.* 1609. Lichen imbricatus viridans scutellis badis. *Dill.*

Lichen centrifuge.

1901. Lichen saxatilis. Lichen imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus. *Linn. Sp. plant.* 1609. Lichen opere phrygio ornatus. *Vaill.*

Lichen des rochers.

1902. Lichen omphalodes. Lichen imbricatus, foliolis multifidis glabris obtusis incanis, punctis vagis eminentibus. *Linn. Sp. plant.* 1609. Lichen nigricans omphalodes. *Vaill.*

Lichen omphalode.

1903. Lichen olivaceus. Lichen imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis. *Linn. Sp. plant.* 1610. Lichen crustæ modo arboribus adnascens olivaceus. *Vaill.*

Lichen sinuée.

1904. Lichen fahlunensis. Lichen imbricatus : foliolis linearibus dichotomis planiusculis acutis nigris, scutellis atris. *Linn. Sp. plant.* 1610. Lichenoides tinctorium atrum, foliis minimis crispis. *Dill.*

Lichen noir des teinturiers à très-petites feuilles crépues.



Flora Gallica.

1905. Lichen parietinus. Lichen imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Linn. Sp. plant.* 1610. Lichenoides vulgare sinuosum, foliis & scutellis luteis. *Dillen.*
Lichen des murailles.

1906. Lichen physoides. Lichen imbricatus laciniis obtusis subinflatis. *Linn. Sp. plant.* 1610. Lichenoides ceratophyllum obtusius & minus ramosum. *Dill.*

Lichen en forme de thuiles, à déchiquetures laciniées obtusées.

1907. Lichen stellaris. Lichen imbricatus : foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. *Linn. Sp. plant.* 1611. Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. *Dill.*

Lichen étoilé.

1908. Lichen ciliaris. Lichen foliaceus erectiusculus : laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Linn. Sp. plant.* 1611. Lichen cinereus arboreus, marginibus pilosis major. *Vaill.*

Lichen cendré des arbres.

1909. Lichen pulmonaris. Lichen foliaceus laciniatus obtusus glaber : supra lacunofus, subtus tomentosus. *Linn. Sp. plant.* 1612. Muscus pulmonarius. *Pin.*

Pulmonaire de chêne.

1910. Lichen furfuraceus. Lichen foliaceus decumbens furfuraceus : laciniis acutis : subtus lacunosis atris. *Linn. Sp. plant.* 1612. Muscus amarus, absynthii folio. *Bauh. hist.*

Mousse amère à feuilles d'absynthe.

1911. Lichen farinaceus. Lichen foliaceus erectus compressus ramosus farinaceus : lateribus verrucosis. *Linn. Sp. plant.* 1613. Lichen cinereus angustior, scutis in marginibus segmentorum. 1613.

Lichen farineux.

1912. Lichen calicaris. Lichen foliaceus erectus linearis ramosus lacunofus convexus mucronatus. *Linn. Sp. plant.* 1613. Lichen cinereus latifolius ramosus. *Vaill.*

Lichen cendré à larges feuilles, & rameux.

1913. Lichen fraxineus. Lichen foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunofus glaber, scutellis subpedunculatis. *Linn. Sp. plant.* 1614. Lichenoides longifolium rugosum rigidum. *Dill.*

Lichen de frêne.

1914. Lichen prunastri. Lichen foliaceus erectiusculus lacunosus : subtus tomentosus albus. *Linn. Sp. plant.* 1614. Lichen cinereus vulgatissimus cornua damæ referens. *Vaill.*

Lichen du prunier sauvage.

1915. Lichen juniperinus. Lichen foliaceus laciniatus crispus fulvus, peltis lividis. *Linn. Sp. plant.* 1614. Lichen fulvus sinibus dædaleis laciniatus. *Flor. Lapp.*

Lichen du genévrier.

1916. Lichen glaucus. Lichen foliaceus depressus lobatus glaber : margine crispo farinaceo. *Linn. Sp. plant.* 1615. Lichenoides endiviæ foliis crispis splendentibus subtus nigricantibus. *Dill.*

Lichen à feuilles crépues d'endive, brillantes & noîrâtres par-dessus.

1917. Lichen resupinatus. Lichen foliaceus repens lobatus, peltis marginalibus posticis. *Linn. Sp. plant.* 1615. Lichenoides fuscum, peltis posticis ferrugineis. *Dill.*

Lichen renversé.

1918. Lichen venosus. Lichen foliaceus repens ovatus planus subtus venosus villosus, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. Sp. plant.* 1615. Lichenoides parvum virescens, peltis nigricantibus planis. *Dill.*

Lichen veineux.

1919. Lichen aphtosus. Lichen foliaceus repens lobatus obtusus planus, verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. *Linn. Sp. plant.* 1616. Lichenoides digitatum læte virens, verrucis nigris notatum. *Dill.*

Lichen à aphthe.

1920. Lichen caninus. Lichen foliaceus repens lobatus obtusus planus subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente. *Linn. Sp. plant.* 1616. Lichen pulmonarius saxatilis digitatus. *Vaill.*

Lichen pulmonaire, digité des rochers.

1921. Lichen pustulatus. Lichen foliaceus umbilicatus subtus lacunosus. *Linn. Sp. plant.* 1617. Lichenoides crustæ modo saxi adnascens verrucosus cinereus & velati decustus. *Vaill.*

Lichen plein de pustules.

1922. Lichen deustus. Lichen foliaceus umbilicatus undique lævis. *Linn. Sp. plant.* 1618. Lichen pulmonarius saxatilis à cinereo fuscus minimus. *Vaill.*

Lichen brûlé.

1923. Lichen polyphyllus. Lichen foliaceus polyphyllus utrinque lævis crenatus. *Linn. Sp. plant.* 1618. Lichenoides tenuipullum, foliis utrinque glabris. *Dill.*

Lichen gris, menu.

1924. Lichen cocciferus. Lichen scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Linn. Sp. plant.* 1618. Coralloides scyphiforme, tuberculis coccineis. *Dill.*

Coralloïde à forme de verre.

1925. Lichen pyxidatus. Lichen scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Linn. Sp. plant.* 1619. Lichen pyxidatus major. *Tourn.*

Lichen en forme de boîte.

1926. Lichen fimbriatus. Lichen scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. *Linn. Sp. plant.* 1619. Lichen pyxidatus minor. *Vaill.*

Lichen frangé.

1927. Lichen gracilis. Lichen scyphifer ramosus denticulatus filiformis. *Linn. Sp. plant.* 1619. Coralloides scyphiforme ferratum elatius, caulibus gracilibus glabris. *Dill.*

Lichen grêle.

1928. Lichen digitatus. Lichen scyphifer ramosissimus: ramis cylindricis, calycibus integris nodosis. *Linn. Sp. plant.* 1620. Coralloides ramulosum, tuberculis coccineis. *Dill.*

Lichen digité.

1929. Lichen deformis. Lichen scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1620. Coralloides crassius subincanum, calycibus dentatis. *Dill.*

Lichen difforme.

1930. Lichen rangiferinus. Lichen fruticulofus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Linn. Sp. plant.* 1620. Lichen alpestris. Lichen caule erecto tereti ramosissimo, alis perforatis. *Linn. Sp. plant.* 1620. Coralloides montanum, fruticuli specie ubique candicans. *Dill.* Lichen sylvaticus. Lichen caule ramoso, alis perforatis, ramis capitatis. *Linn. Sp. plant.* 1621. Mucos terrestris coralloides erectus, corniculis rufescentibus. *Pin.*

Lichen des Alpes & des bois.

1931. Lichen uncialis. Lichen fruticulofus perforatus, 12°

ramulis brevissimis acutis. *Linn. Sp. plant.* 1621. *Coralloides perforatum minus molle & tenue. Dill.*

Lichen d'un pouce.

1932. *Lichen subulatus.* *Lichen fruticulosus subdichotomus*, ramis simplicibus subulatis. *Linn. Sp. plant.* 1621. *Muscus corniculatus. Bauh. hist.*

Lichen en forme d'alène.

1933. *Lichen fragilis.* *Lichen fruticulosus solidus*, ramulis teretibus obtusis. *Linn. Sp. plant.* 1621. *Coralloides alpinum corallinæ minoris facie. Dill.*

Lichen fragile.

1934. *Lichen plicatus.* *Lichen filamentosus pendulus ramis implexis*, scutellis radiatis. *Linn. Sp. plant.* 1622. *Muscus arboreus*, usnea officinarum. *Pin.*

L'Usnée des boutiques.

1935. *Lichen barbatus.* *Lichen filamentosus pendulus subarticulatus*: ramis patentibus. *Linn. Sp. plant.* 1622. *Muscus capillaceus longissimus. Pin.*

Mouffe capillacée très-longue.

1936. *Lichen jubatus.* *Lichen filamentosus pendulus*: axillis compressis. *Linn. Sp. plant.* 1622. *Usnea jubata nigricans. Dill.*

Lichen à poils.

1937. *Lichen lanatus.* *Lichen filamentosus ramosissimus decumbens implicatus opacus.* *Linn. Sp. plant.* 1623. *Usnea lanæ nigræ instar saxi adhærens. Dill.*

Lichen laineux.

1938. *Lichen chalybeiformis.* *Lichen filamentosus subramosus decumbens implicato flexuosus.* *Linn. Sp. plant.* 1623. *Usnea rigida horsum versus extensa. Dill.*

Lichen en forme de fil de fer.

1939. *Lichen vulpinus.* *Lichen filamentosus ramosissimus erectus fastigiatus inæquali angulosus.* *Linn. Sp. plant.* 1623. *Usnea capillacea citrina*, fruticuli specie. *Dill.*

Lichen de renard.

1940. *Lichen articulatus.* *Lichen filamentosus articulatus*, ramulis tenuissimis. *Linn. Sp. plant.* 1623. *Muscus arboreus nodosus. Pin.*

Mouffe d'arbre à nœuds.

1941. Lichen floridus. Lichen filamentosus ramosus erectus; scutellis radiatis. *Linn. Sp. plant.* 1624. Muscus arboreus cum orbiculis. *Pin.*

Lichen fleuri.

1942. Chara tomentosa. Chara aculeis caulinis ovatis. *Linn. Sp. plant.* 1624. Equisetum fragile majus subcinereum aquis immersum. *Morif.*

Grande Prêle fragile cendrée, plongée dans l'eau.

1943. Chara vulgaris. Chara caulibus lævibus, frondibus interne dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1624. Chara vulgaris foetida. *Vaill.*

Prêle puante.

1944. Chara hispida. Chara aculeis caulinis capillaribus confertis. *Linn. Sp. plant.* 1624. Chara major, caulibus spinosis. *Vaill.*

Prêle rampante sur l'eau.

1945. Chara flexilis. Chara caulium articulis inermibus diaphanis superne latioribus. *Linn. Sp. plant.* 1624. Chara transfuens minor flexilis. *Rai. ang.*

Prêle flexible.

1946. Tremella juniperina. Tremella sessilis membranacea auriformis vulva. *Linn. Sp. plant.* 1625. Byssus gelatinosa fugax, junipero innascens. *Flor. Lap.*

Tremelle du genévrier.

1947. Tremella nostoc. Tremella plicata undulata. *Linn. Sp. plant.* 1625. Nostoc paracelsi. *Ad. Paris.*

Nostoch.

1948. Tremella auricula. Tremella sessilis membranacea auriformis cinerea. *Linn. Sp. plant.* 1625. Fungus membranaceus, auriculam judæ referens seu sambucinus. *Pin.*

Agaric de sureau.

1949. Tremella lichenoides. Tremella frondibus erectis planis: marginibus crispo lacinulato. *Linn. Sp. plant.* 1625. Lichen terrestris membranaceus mollior fuscus. *Mich.*

Tremelle à forme de Lichen.

1950. Tremella verrucosa. Tremella tuberculosa solida rugosa. *Linn. Sp. plant.* 1625. Tremella fluviatilis gelatinosa & uterculosa. *Dill.*

Tremelle à verrues.

1951. *Tremella hemispherica*. *Tremella hemispherica* sparsa. *Linn. Sp. plant.* 1626.

Tremelle hémisphérique.

1952. *Tremella purpurea*. *Tremella subglobosa sessilis solitaria glabra*. *Linn. Sp. plant.* 1626. *Lichenoides tuberculosum amare purpureum*. *Dill.*

Tremelle purpurine.

1953. *Tremella difformis*. *Tremella subrotunda sinuosa difformis gelatinosa*. *Linn. Sp. plant.* 1626.

Tremelle difforme.

1954. *Tremella adnata*. *Tremella rotunda imbricata livida*. *Linn. Sp. plant.* 1626.

Tremelle ronde livide en forme de thuille.

1955. *Fucus serratus*. *Fucus fronde plana dichotoma serrata ad apices tuberculata*. *Linn. Sp. plant.* 1626. *Fucus seu alga latifolia major dentata*. *Morif.*

Algue à larges feuilles dentelées.

1956. *Fucus ceranoides*. *Fucus fronde dichotoma plana integra: apicibus bifidis vesiculosus*. *Linn. Sp. plant.* 1626. *Fucus humilis dichotomus ceranoides latioribus foliis ut plurimum verrucosis*. *Morif.*

Fucus nain à larges feuilles couvertes de verrues.

1957. *Fucus volubilis*. *Fucus fronde spirali: margine dilatato repando dentato*. *Linn. Sp. plant.* 1627. *Alga spiralis maritima*. *Bocc.*

Algue spirale maritime.

1958. *Fucus excisus*. *Fucus dichotomus linearis: axillis divaricatis*. *Linn. Sp. plant.* 1627. *Fucus pumilus dichotomus: segmentis ex una parte gibbosis, ex altera excavatis*. *Rai.*

Fucus ou veru coupé.

1959. *Fucus concatenatus*. *Fucus caule tereti ramosissimo, fructificationibus oblongis concatenatis*. *Linn. Sp. plant.* 1628.

Fucus ou veru à chaîne.

1960. *Fucus natans*. *Fucus caule tereti ramosissimo, foliis lanceolatis serratis, fructificationibus globosis pedunculatis subaristatis*. *Linn. Sp. plant.* 1628. *Fucus folliculaceus, serrato folio*. *Pin.*

Fucus flottant.

1061. *Fucus filiquosus*. *Fucus* caule tereti ramosissimo, pedunculis alternis vesiculis oblongis acuminatis. *Linn. Sp. plant.*
 1629. *Fucus maritimus* alter, tuberculis paucissimis. *Pin.*

Fucus à filiques.

1961. *Fucus barbatus*. *Fucus* vesiculis oblongis pedunculatis : terminatis foliolis linearibus. *Linn. Sp. plant.* 1629 *Fucus maritimus* : foliis tumidis barbatis. *Pin.*

Fucus barbu.

1963. *Fucus foeniculaceus*. *Fucus* vesiculis ovatis alternis pedunculatis : terminatis foliis linearibus. *Linn. Sp. plant.*
 1629. *Fucus folliculaceus*, foeniculi foliis brevioribus. *Pin.*

Fucus à forme de fenouil.

1964. *Fucus palmatus*. *Fucus* frondibus planis palmatis. *Linn. Sp. plant.* 1630. *Fucus membranaceus* ceranoides. *Bauh. prod.*

Fucus palmé.

1965. *Fucus rubens*. *Fucus* caule tereti ramoso, frondibus oblongis undulatis sinuatis. *Linn. Sp. plant.* 1630. *Alga minor* suave rubens variè divisa. *Mart.*

Fucus rougedtre.

1966. *Fucus pavonius*. *Fucus* fronde sessili reniformi decussite striata. *Linn. Sp. plant.* 1630. *Fucus maritimus* gallo pavonis pennas referens. *Bauh. prod.*

Algue marine semblable aux plumes de paon.

1967. *Fucus ericoides*. *Fucus* filiformis ramosissimus hirtus. *Linn. Sp. plant.* 1631. *Tamarisco* similis maritima. *Pin.*

Fucus à feuilles de bruyère.

1968. *Fucus aculeatus*. *Fucus* ramosissimus lineari filiformis compressus, marginibus lateralibus denticulis alternis erectis. *Linn. Sp. plant.* 1632. *Fucus tenuifolius* foliis dentatis. *Morif.*

Fucus pointu.

1969. *Ulva intestinalis*. *Ulva* tubulosa symplex. *Linn. Sp. plant.* 1632. *Tremella marina* tubulosa intestinorum figura. *Dill.*

Tremelle intestinale.

1970. *Ulva compressa*. *Ulva* tubulosa ramosa compressa. *Linn. Sp. plant.* 1732. *Tremella marina* tenuissima & compressa. *Dill.*

Tremelle marine très-menue & applatie.

1971. *Ulva confervoides*. *Ulva filiformis articulata* : articulis alternatim compressis. *Linn. Sp. plant.* 1632. *Conferva marina fistulosa*. *Dill.*

Conserve marine fistuleuse.

1972. *Ulva latissima*. *Ulva oblonga plana undulata membranacea viridis*. *Linn. Sp. plant.* 1632. *Fucus longissimo, latissimo, tenuique folio*. *Pin.*

Fucus à feuilles très-longues, très-larges & menues.

1973. *Ulva lactuca*. *Ulva palmata prolifera membranacea, ramentis inferne angustatis*. *Linn. Sp. plant.* 1632. *Muscus marinus lactucæ similis*. *Pin.*

Mouffe marine semblable à de la laitue.

1974. *Ulva umbilicalis*. *Ulva fronde dilatata subinnuata, centro radicata*. *Linn. Sp. plant.* 1633. *Tremella marina umbilicata*. *Dill.*

Tremelle marine ombiliquée.

1975. *Ulva linza*. *Ulva fronde oblonga bullata*. *Linn. Sp. plant.* 1633. *Muscus lactucæ marinæ similis*. *Pin.*

Mouffe semblable à la laitue marine.

1976. *Ulva granulata*. *Ulva sphaerica aggregata*. *Tremella palustris, vesiculis sphaericis fungiformibus*. *Linn. Sp. plant.* 1633. *Tremella palustris, vesiculis sphaericis fungiformibus*. *Dill.*

Tremelle des marais à vésicules sphériques en forme de fungus.

1977. *Conferva rivularis*. *Conferva filamentis simplicissimis æqualibus longissimis*. *Linn. Sp. plant.* 1633. *Conferva capillaris simplicissima anodis*. *Guett.*

Conserve des ruisseaux.

1978. *Conferva fontinalis*. *Conferva filamentis simplicissimis æqualibus digito brevioribus*. *Linn. Sp. plant.* 1633. *Conferva minima byssi facie*. *Dill.*

Conserve des fontaines.

1679. *Conferva bullosa*. *Conferva filamentis æqualibus ramosis, bullas æreas includens*. *Linn. Sp. plant.* 1634. *Conferva palustris bombycina*. *Dill.*

Conserve à bulle d'air.

1980. *Conferva canalicularis*. *Conferva filamentis æqualibus*

bafin versus ramosioribus. *Linn. Sp. plant.* 1634. Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *Pia.*

Conserve des canaux de fontaine.

1981. *Conferva amphibia.* *Conferva filamentis æqualibus ramosis, exsiccatione coeuntibus in aculeos. Linn. Sp. plant.* 1634. *Conferva amphibia fibrillosa & spongiosa. Dill.*

Conserve amphibie.

1982. *Conferva littoralis.* *Conferva filamentis æqualibus ramosissimis elongatis scabriusculis. Linn. Sp. plant.* 1634. *Conferva marina capillacea longa ramosissima. Dill.*

Conserve marine capillaée.

1983. *Conferva scoparia.* *Conferva filamentis proliferis fastigiatis hirtis. Linn. Sp. plant.* 1633. *Conferva marina pennata. Dill.*

Conserve marine aillée.

1984. *Conferva reticulata.* *Conferva filamentis reticulatim coadunatis. Linn. Sp. plant.* 1635. *Conferva reticulata. Dill.*

Conserve reticulée.

1985. *Conferva fluviatilis.* *Conferva filis simplicissimis setiformibus rectis : geniculis crassioribus angularis. Linn. Sp. plant.* 1635. *Conferva fluviatilis lubrica setosa, equiseti facie. Dill.*

Conserve des rivières.

1986. *Conferva gelatinosa.* *Conferva filis ramosis moniliformibus : articulis globosis gelatinosis. Linn. Sp. plant.* 1635. *Corallina pinguis ramosa viridis. Vaill.*

Conserve gelatineuse.

1987. *Conferva capillaris.* *Conferva filis geniculatis simplicibus : articulis alternatim compressis. Linn. Sp. plant.* 1636. *Conferva filamentis longis geniculatis simplicibus. Dill.*

Conserve capillaire.

1988. *Conferva coralloïdes.* *Conferva filis geniculatis dichotomis. Linn. Sp. plant.* 1636. *Conferva marina gelutinosa, corallinae instar geniculata crassior. Dill.*

Conserve en forme de coralline.

1989. *Conferva polymorpha.* *Conferva filamentis geniculatis, ramis fasciculatis. Linn. Sp. plant.* 1636. *Conferva marina geniculata nigra palmata. Dill.*

Conserve marine noire, genouillée & palmée.

1990. *Conferva vagabunda*. *Conferva filamentis geniculatis flexuosis*, ramis ramulisque brevioribus. *Linn. Sp. plant.* 1637. *Conferva marina trichodes*, lanx instar expansa. *Dill.*

Conferve errante.

1991. *Conferva glomerata*. *Conferva filamentis geniculatis*, ramulis brevioribus multifidis. *Linn. Sp. plant.* 1637. *Alga fontalis trichodes*. *Pin.*

Conferve conglomérée.

1992. *Conferva rupestris*. *Conferva filamentis geniculatis ramosissimis viridibus*. *Linn. Sp. plant.* 1637. *Conferva marina trichodes ramosior*. *Dill.*

Conferve de rochers.

1993. *Byssus flos aquæ*. *Byssus filamentis plumosis natantibus*. *Linn. Sp. plant.* 1637. *Byssus farinacea virescens aquæ inspersa*. *Guett.*

Fleur d'eau.

1994. *Byssus phosphorea*. *Byssus lanuginosa violacea lignis adnascens*. *Linn. Sp. plant.* 1638.

Bysse phosphorique.

1995. *Byssus velutina*. *Byssus filamentosa viridis*. *Linn. Sp. plant.* 1638. *Byssus tenerrima viridis velutum referens*. *Dill.*

Bysse filamenteuse verte.

1996. *Byssus antiquitatis*. *Byssus pulverulenta atra*. *Linn. Sp. plant.* 1638.

Bysse poudrée noire.

1997. *Byssus saxatilis*. *Byssus pulverulenta cinerea rupes operiens*. *Linn. Sp. plant.* 1638.

Bysse des rochers.

1998. *Byssus lactea*. *Byssus pulverulento crustacea albidissima*. *Linn. Sp. plant.* 1639. *Byssus candidissima*, calcis instar muscos vestiens. *Dill.*

Bysse lactée.

1999. *Agaricus cantharellus*. *Agaricus stipitatus*, lamellis ramosis decurrentibus. *Linn. Sp. plant.* 1639. *Elvela pediculata pileata*, pileo subtus reticulato. *Guett.* 1639.

La Chanterelle.

2000. *Agaricus quinquepartitus*. *Agaricus stipitatus*, pileo subflavescente partito, lamellis albidioribus interne dentato

connexis. *Linn. Sp. plant.* 1640. *Agaricus caulescens*, pileo cinereo quinque partito, lamellis albis. *Flor. succ.*

Agaric partagé en cinq.

2001. *Agaricus integer*. *Agaricus stipitatus*, lamellis omnibus magnitudine æqualibus. *Linn. Sp. plant.* 1640. *Agaricus major*, pediculo longo modice crasso, lamellis albis creberrimis superne ad margines apparentibus. *Rai sup.*

Agaric entier.

2002. *Agaricus muscarius*. *Agaricus stipitatus*, lamellis dimidiatis solitariis, stipite volvato : apice dilatato, basi ovato. *Linn. Sp. plant.* 1640. Fungorum perniciosorum genus 12. n.º 4. *Clus. hist.* 2.

Agaric à têtes larges.

2003. *Agaricus dentatus*. *Agaricus stipitatus*, pileo convexo, lamellis basi mucrone dentatis. *Linn. Sp. plant.* 1640. *Agaricus caulescens*, pileo flavo lævi margine inflexo, lamellis pallidioribus, basi angulatis. *Flor. succ.*

Agaric denté.

2004. *Agaricus deliciosus*. *Agaricus stipitatus*, pileo testaceo, succo lutescente. *Linn. Sp. plant.* 1641. Fungus perniciosus, lateritio colore varians, succum acrem & croceum fundens. *Mich.*

Agaric délicieux à suc jaune.

2005. *Agaricus lactifluus*. *Agaricus stipitatus*, pileo plano carneo lutescente, lamellis rufis, stipite longo carneo. *Linn. Sp. plant.* 1641. Fungus flavo rufus in medio depressus, lacte non acri manans. *Hall.*

Agaric à suc blanc.

2006. *Agaricus piperatus*. *Agaricus stipitatus*, pileo planiusculo lactescente : margine deflexo, lamellis incarnato pallidis. *Linn. Sp. plant.* 1641. Fungus albus acris. *Pin.*

Champignon blanc, acre.

2007. *Agaricus campestris*. *Agaricus stipitatus*, pileo convexo squamato albido, lamellis rufis. *Linn. Sp. plant.* 1641. Fungus campestris albus superne, inferne rubens. *Pin.*

Agaric champêtre.

2008. *Agaricus violaceus*. *Agaricus stipitatus*, pileo rimoso : margine violaceo tomentoso, stipite carulescente lana ferru-

gineà. *Linn. Sp. plant.* 1641. Fungus caeruleus major. *Buxb. cant.* 4.

Agaric violet.

2009. *Agaricus cinnamomus*. *Agaricus stipitatus*, pileo ferdido flavo, lamellis luteo ruffis. *Linn. Sp. plant.* 1642. *Agaricus caulescens flavus*, pileo plano. *Flor. lapp.*

Agaric jaune à tige & à tête plate.

2010. *Agaricus viscidus*. *Agaricus stipitatus*, pileo purpurafcente fulco viscido, lamellis fusco purpurafcentibus. *Linn. Sp. plant.* 1642. *Agaricus caulescens*, pileo convexo purpurafcente, lamellis ruffis, fipite brevi craffiusculo albo. *Flor. lapp.*

Agaric visqueux.

2011. *Agaricus equeftris*. *Agaricus fipitatus*, pileo pallido : difco ftellatum luteo, lamellis fulphureis. *Linn. Sp. plant.* 1642.

Agaric équeftré.

2012. *Agaricus georgii*. *Agaricus fipitatus*, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Linn. Sp. plant.* 1642. Fungus orbicularis ex albida pratensis. *Pin.*

Grand Champignon couleur de fafran.

2013. *Agaricus mammosus*. *Agaricus fipitatus*, pileo convexo acuminato grifeo, lamellis convexis grifeis crenatis, fipite nudo. *Linn. Sp. plant.* 1642. Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente, pediculo longiore. *Buxb.*

Agaric mammeux.

2014. *Agaricus clypeatus*. *Agaricus fipitatus*, pileo hemifphérico viscido acuminato, lamellis albis fipite longo cylindrico. *Linn. Sp. plant.* 1642. Fungus viscidus papillaris ftriatus terreus, fubtus albus. *Hall.*

Agaric à bouclier.

2015. *Agaricus extingtorius*. *Agaricus fipitatus*, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niveis, fipite fubbulbofo fubulato nudo. *Linn. Sp. plant.* 1643. *Agaricus caulescens albus*, petiolo longiffimo, pileo conico. *Flor. lapp.*

Agaric blanc à long pétiole, à tête conique.

2016. *Agaricus campanulatus*. *Agaricus fipitatus*, pileo campanulato ftriato pellucido, lamellis afcendentibus, fipite

nudo. *Linn. Sp. plant.* 1643. Fungus multiplex obtuse conicus, colore griseo murino. *Vaill.*

Agaric en forme de cloche.

1017. *Agaricus separatus*. *Agaricus stipitatus*, pileo lxxi livido, lamellis nigricantibus separatis, stipite bulboso volvato. *Linn. Sp. plant.* 1643.

Agaric séparé.

1018. *Agaricus fragilis*. *Agaricus stipitatus*, pileo convexo viscido pellucido lamellisq. luteis, stipite nudo. *Linn. Sp. plant.* 1643. Fungus pileo crocei splendoris particeps. *Vaill.*

Champignon fragile.

1019. *Agaricus umbelliferus*. *Agaricus stipitatus*, pileo plicato membranaceo, lamellis basi latioribus. *Linn. Sp. plant.* 1643. Fungus minimus totus albus, pileo hemispherico utrinque striato, lamellis rarioribus. *Micà.*

Agaric à ombelle.

1020. *Agaricus androsaceus*. *Agaricus stipitatus* albus, pileo plicato membranaceo, stipite nigro. *Linn. Sp. plant.* 1644. Fungus pileo candicante, lamellis flavis, pediculo fusco splendente. *Vaill.*

Agaric androsacé.

1021. *Agaricus clavus*. *Agaricus stipitatus*, pileo luteo convexo striato, lamellis stipiteque albis. *Linn. Sp. plant.* 1644. Fungus minimus aurantius mammillaris. *Vaill.*

Agaric d'orange mammillaire.

1022. *Agaricus quercinus*. *Agaricus acaulis*, lamellis labyrinthiformibus. *Linn. Sp. plant.* 1644. *Agarico-fungus lamellis crassissimis rigidis*. *Hall.*

Agaric de chêne.

1023. *Agaricus betulinus*. *Agaricus acaulis coriaceus villosus* : margine obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus. *Linn. Sp. plant.* 1645.

Agaric de bouleau.

1024. *Agaricus alneus*. *Agaricus acaulis*, lamellis bifidis pulverulentis. *Linn. Sp. plant.* 1645. *Agarico-fungus lamellis bifidis pulverulentis*. *Hall.*

Bouleau d'Aulne.

1025. *Boletus tuberosus*. *Boletus acaulis pulvitanus* albus lxxv, poris acutis difformibus. *Linn. Sp. plant.* 1645. *Boletus acaulis*

æcaulis coriaceo-convexus villosus albus, poris difformibus rotundis, flexuosisque. *Flor. Suec.*

Morille tubéreuse.

2026. *Boletus fomentarius*. *Boletus* acaulis pulvinatus inæquali-obtusius, poris teretibus æqualibus glaucis. *Linn. Sp. plant.* 1645.

Morille de bouleau.

2027. *Boletus igniarius*. *Boletus* acaulis pulvitanus lævis, poris tenuissimis. *Linn. Sp. plant.* 1645. *Agaricus* pedis equini facie. *Tourn.*

Agaric à forme de pied de cheval.

2028. *Boletus versicolor*. *Boletus* acaulis fasciis dicoloribus poris albis. *Linn. Sp. plant.* 1645. *Agarico-polyporus* versicoloribus lineis variis, poris albis tenuissimis. *Hall.*

Morille panachée.

2029. *Boletus suaveolens*. *Boletus* acaulis, superne lævis, salicinus. *Linn. Sp. plant.* 1646.

Morille à odeur agréable.

2030. *Boletus perennis*. *Boletus* stipitatus perennis : pileo utrinque planiusculo. *Linn. Sp. plant.* 1646. *Fungus* lignosus fasciatus. *Vaill.*

Agaric d'arbres pourris.

2031. *Boletus viscidus*. *Boletus* stipitatus, pileo pulvinato viscido, poris teretibus convexis immeris destitatis, stipite lacero. *Linn. Sp. plant.* 1646. *Boletus* caulescens, pileo luteo, poris teretibus distinctis lividis stipite lacero. *Flor. Suec.*

Morille visqueuse.

2032. *Boletus luteus*. *Boletus* stipitatus, pileo pulvinato subviscido, poris rotundatis convexis flavissimis, stipite albido. *Linn. Sp. plant.* 1646. *Fungus* porosus autumnalis viscidus. *Burb.*

Champignon poreux & visqueux autumnal.

2033. *Boletus bovinus*. *Boletus* stipitatus, pileo glabro pulvinato marginato, poris compositis acutis : porulis angulatis brevioribus. *Linn. Sp. plant.* 1646. *Boletus* julii mentis. *Dill.*

Morille du mois de juillet.

2034. *Boletus granulatus*. *Boletus* stipitatus, pileo viscido pulvinato, poris teretibus subangulatisque truncatis : angulo granulato. *Linn. Sp. plant.* 1647.

Morille grainée.

2035. *Boletus subtomentosus*. *Boletus stipitatus*, pileo flavo subtomentoso, poris subangulatis difformibus fulvis planis, stipite flavo. *Linn. Sp. plant.* 1647.

Morille cotonneuse.

2036. *Boletus subsquamosus*. *Boletus stipitatus*, pileo albido, poris difformibus oblongo flexuosis niveis. *Linn. Sp. plant.* 1647.

Morille écailleuse.

2037. *Hydnum imbricatum*. *Hydnum stipitatum*, pileo convexo imbricato. *Linn. Sp. plant.* 1647. *Erinaceus esculentus* albus crassus. *Mich.*

Hydne thuié.

2038. *Hydnum repandum*. *Hydnum stipitatum*, pileo convexo laevi flexuoso. *Linn. Sp. plant.* 1647. *Erinaceus esculentus* pallide luteus. *Mich.*

Hydne recourbé.

2039. *Hydnum tomentosum*. *Hydnum stipitatum*, pileo plano infundibuliformi. *Linn. Sp. plant.* 1647.

Hydne cotonneur.

2040. *Hydnum auriscalpium*. *Hydnum stipitatum*, pileo dimidiato. *Linn. Sp. plant.* 1648. *Fungus erinaceus* parvus in conis abietis nascens. *Burb.*

Hydne des cônes du sapin.

2041. *Hydnum parasiticum*. *Hydnum acaule* arcuato-rugosum tomentosum. *Linn. Sp. plant.* 1648.

Hydne parasite.

2042. *Phallus esculentus*. *Phallus* pileo ovato celluloso nudo rugoso. *Linn. Sp. plant.* 1648. *Boletus esculentus* rugosus. *Mich.*

Morille raboteuse bonne à manger.

2043. *Phallus impudicus*. *Phallus* volvatus stipitatus, pileo celluloso. *Linn. Sp. plant.* 1648. *Fungus foetidus* penis imaginem referens. *Pin.*

Champignon puant.

2044. *Helvelia mitra*. *Helvelia* pileo deflexo adnato lobato difformi. *Linn. Sp. plant.* 1649. *Fungus autumnalis* velut apex staminis. *Mentz.*

Champignon autumnal en forme de sommet d'étamines.

2045. *Helvella pineti*. *Helvella acaulis*. *Linn. Sp. plant.* 1649. *Agaricus acaulis* utrinque planiusculus. *Flor. Lap.*

Agaric du pin.

2046. *Peziza lentifera*. *Peziza campanulata lentifera*, *Linn. Sp. plant.* 1649. *Peziza calyce campanulato*, *Hort. Cliff.*

Champignon en forme de calice qui porte semence.

2047. *Peziza punctata*. *Peziza turbinata truncata*, disco punctato. *Linn. Sp. plant.* 1650. *Museus minimus lignosus*, disco punctato. *Bosc. mus.*

Le plus petit des Champignons.

2048. *Peziza cornucopioides*. *Peziza infundibuliformis*, disco patente sinuato punctato. *Linn. Sp. plant.* 1650. *Fungoides nigricans majus cornucopiae forma*. *Vaill.*

Pezî en forme d'entonnoir.

2049. *Peziza cyathoides*. *Peziza cyathiformis*: margine obtuso erecto. *Linn. Sp. plant.* 1651. *Peziza lutca parva*, marginibus lævibus. *Rai.*

Pezî en forme de verre.

2050. *Peziza cupularis*. *Peziza globosa campanulata* margine crenato. *Linn. Sp. plant.* 1651. *Fungoides glandis cupulam referens*, margine dentato. *Vaill.*

Pezî à capsule de gland.

2051. *Peziza scutellata*. *Peziza plana*, margine convexo piloso. *Linn. Sp. plant.* 1651. *Fungoides*, qui fungus minimus scutellatus, coloris aurantii. *Vaill.*

Pezî en forme d'écuelle.

2052. *Clavaria pistillaris*. *Clavaria claviformis simplicissima*. *Linn. Sp. plant.* 1651. *Clavaria alba pistilli forma*. *Vaill.*

Clavaire à pistiles.

2053. *Clavaria miliaris*. *Clavaria clavata integerrima*, capite squamoso. *Linn. Sp. plant.* 1650. *Clavaria militaris crocea*. *Vaill.*

Clavaire à couleur de safran.

2054. *Clavaria ophioglossoides*. *Clavaria clavata integerrima compressa obtusa*. *Linn. Sp. plant.* 1652. *Clavaria ophioglossoides nigra*. *Vaill.*

Clavaire en forme de langue de serpent.

2055. *Clavaria digitata*. *Clavaria ramosa lignea nigra*. *Linn. Sp. plant.* 1652. *Agaricus digitatus niger*. *Tourn. Agaric noir digité.*

2056. *Clavaria hypoxylon*. *Clavaria ramosa cornuta compressa*. *Linn. Sp. plant.* 1652. *Fungus ramosus niger compressus parvus apicibus albidis*. *Rai. Angl. Clavaire rameuse, cornue & applatie.*

2057. *Clavaria coralloïdes*. *Clavaria ramis confertis ramosissimis inæqualibus*. *Linn. Sp. plant.* 1752. *Corallo-fungus flavus*. *Vaill. Coralloïde d'un jaune blanc.*

2058. *Clavaria fastigiata*. *Clavaria ramis confertis ramosissimis fastigiatis obtusis luteis*. *Linn. Sp. plant.* 1652. *Fungoides fungiforme luteum foetidum & minus ramosum*. *Rai. Angl. Clavaire pointue.*

2059. *Clavaria muscoides*. *Clavaria ramis ramosis acuminatis inæqualibus luteis*. *Linn. Sp. plant.* 1650. *Fungus parvus ramosus luteus*. *Rai. Angl. Clavaire en forme de mouffe.*

2060. *Lycoperdon tuber*. *Lycoperdon globosum solidum muricatum, radice destitutum*. *Linn. Sp. plant.* 1653. *Tuber. Matt. Truffe.*

2061. *Lycoperdon cervinum*. *Lycoperdon globosum solidiusculum lacerum centro farinifero, radice instructum*. *Linn. Sp. plant.* 1653. *Tubera cervina*. *Pin. Truffe de cerf.*

2062. *Lycoperdon bovista*. *Lycoperdon subrotundum, lacerato dehiscens*. *Linn. Sp. plant.* 1653. *Lycoperdon vulgare*. *Tourn. Vesse-lou ordinaire.*

2063. *Lycoperdon aurantium*. *Lycoperdon sphæroidale basi rugosum stipitatum : laciniis obtuse emarginatis dehiscens*. *Linn. Sp. plant.* 1652. *Lycoperdon aurantiæ coloris, ad basin rugosum*. *Vaill. Vesse-lou orangé.*

2064. *Lycoperdon stellatum*. *Lycoperdon vulva multifida patente, capitulo glabro : ore acuminato dentato*. *Linn. Sp.*

plant. 1653. *Lycoperdon stellatum* calyce inverso. *Buxb.*

Vesse-lou étoilée.

2065. *Lycoperdon pedunculatum*. *Lycoperdon* stipite longo , capitulo globoso glabro : ore cylindrico integerrimo. *Linn. Sp. plant.* 1654. *Lycoperdon pariliense* minimum pediculo donatum. *Tourn.*

Vesse-lou à péduncule.

2066. *Lycoperdon epidendrum*. *Lycoperdon* cortice farinaque purpurea. *Linn. Sp. plant.* 1654. *Lycoperdon epidendron* , minutum pulverem fundens. *Hall.*

Vesse-lou sanguin.

2067. *Lycoperdon epiphyllum*. *Lycoperdon* aggregatum parasiticum : ore multifido lacero : pulvere fulvo. *Linn. Sp. plant.* 1655.

Vesse-lou parasite.

2068. *Mucor sphærocephalus*. *Mucor* perennis , stipite filiformi nigro : capitulo globoso cinereo. *Linn. Sp. plant.* 1655. *Sphærocephalos niger* , villo ochroleuco. *Hall.*

Moississure à tête sphérique.

2069. *Mucor lichenoides*. *Mucor* perennis : stipite subulato nigro , capitulo lenticulari cinereo. *Linn. Sp. plant.* 1655. *Coralloides fungiforme arborum nigrum* vix crustosum. *Dill.*

Moississure en forme de lichen.

2070. *Mucor embolus*. *Mucor* seta nigra , villo fusco. *Linn. Sp. plant.* 1655. *Embolus nigerrimus* villo albo aspersus. *Hall.*

2071. *Mucor mucedo*. *Mucor* stipitatus , capsula globosa. *Linn. Sp. plant.* 1655. *Mucor vulgaris* , capitulo lucido per maturitatem nigro , pediculo griseo. *Mich.*

Moississure noirâtre.

2072. *Mucor leprosus*. *Mucor* setaceus , seminibus radicalibus. *Linn. Sp. plant.* 1656. *Aspergillus cespitosus* densissimus , initio niveus : deinde aureus , seminibus ovatis. *Mich.*

Moississure à semences radicales.

2073. *Mucor glaucus*. *Mucor* stipitatus , capitulo subrotundo aggregato. *Linn. Sp. plant.* 1657. *Aspergillus capitatus* , capitulo glauco , seminibus rotundis. *Mich.*

Moississure verdâtre.

2074. *Mucor crustaceus*. *Mucor* stipitatus , spicis digitatis.

Linn. Sp. plant. 1656. Botrytis non ramosa alba seminibus rotundis. Mich.

Moississure coureuse.

2075. *Mucor cespitosus. Mucor stipite ramoso, spicis ternatis. Linn. Sp. plant. 1656. Aspergillus albus tenuissimus, graminis dactyloïdes facie, seminibus rotundis. Mich.*

Moississure à tige rameuse à épis terné.

2076. *Mucor erysiphe. Mucor albus capitulis fuscis sessilibus. Linn. Sp. plant. 1656.*

Moississure blanche, à tête brune.

A P P E N D I X.

2077. *Alopecurus bulbosus. Alopecurus culmo erecto; spica cylindrica radice bulbosa. Linn. Sp. plant. 1665. Gramen myosuroides nodosum. Rai.*

Chiendent en masse, bulbeux & à nœuds.

2078. *Avena pubescens. Avena subspicata, calycibus subtrifloris basi pilosis, foliis planis pubescentibus. Linn. Sp. plant. 1665. Festuca dumetorum. Pin.*

Fétuque.

2079. *Avena bromoides. Avena subspicata, spiculis binatis: altera pedunculata: aristis divaricatis, calycibus octofloris. Linn. Sp. plant. 1666. Gramen alpinum avenaceum glabrum angustifolium, locustis aristatis in spicam dispositis. Linn. Sp. plant. 1666.*

Avoine à forme de droue.

2080. *Sium angustifolium. Sium foliis pinnatis umbellis axillaribus pedunculatis, involucreo universali pinnatifido. Linn. Sp. plant. 1672. Sium verum. Matth. Dalech.*

Sion à feuilles étroites.

Fin de la première partie du Flora.

T A B L E

Des genres qui se trouvent rapportés dans le
Flora Gallica.

*On a désigné par une étoile les plantes dont on
a fait mention dans le Dictionnaire.*

- A* *CANTHUS*, * 1034.
Acer, * 1714-1716.
Achillæa, 1493-1499.
Aconitum, * 867-868.
Acorus, 362.
Acrostichum, 1731-1732.
Adæa, * 835.
Adiantum, * 1753.
Adoxa, * 636.
Adonis, * 890-891.
Æthusa, 462.
Agaricus, * 1990-2024.
Agrimonia, * 755.
Agrostemma, 734.
Agrostis, * 114-121.
Aira, * 122-130.
Ajuga, 920-921.
Alchemilla, * 252-253.
Alifina, 591-594.
Allium, * 524-532.
Alopecurus, 106-110, 2077.
Alfina, * 500-501, 749.
Althæa, * 1146-1148.
Alyssum, * 1068-1074.

Amaranthus, * 1627-1628.

Ammi, * 426-427.

Anagallis, * 309.

Anchusa, * 283-284.

Andromeda, 648.

Andropogon, * 1696-1697.

Androsaca, 293-294.

Andryala, 1360-1361.

Anemone, * 894-880.

Anethum, * 483.

Angelica, * 452.

Anthemis, * 1486-1492.

Anthericum, * 549-551.

Anthoceros, 1883.

Anthoxanthum, * 48-49.

Anthyllis, * 1185-1186.

Antirrhinum, * 1008-1023.

Aphanes, 254.

Aphyllanthes, 523.

Apium, * 487.

Aquilegia, * 869.

Arabis, 1113-1114.

Arbutus, * 649-650.

Arctium, * 1374.

Arenaria, 707-708.

Aristolochia, * 1576-1579.

Arnica, * 1470.

Arthemisia, * 1717-1720.

Arum, * 1580-1582.

Arundo, * 173-177.

Asarum, * 750.

Asclepias, * 362-363.

Asparagus, * 552.

Asperugo, * 289.

Asperula, * 214-218.

Asphodelus, * 547-548.

Asplenium, * 1734-1739.

After, * 1450-1453.
Astragalus, * 1242-1249.
Astrantia, 404-405.
Athemantha, 433-436.
Athanasia, 1415.
Atriplex, 1708-1713.
Avena, 167-170, 2078-2079.
Azalea, 310.

B.

BALLOTA, 964-965.
Bartisia, 988.
Bellis, * 1472-1473.
Berberis, * 575.
Beta, * 379.
Betonica, * 955-956.
Betula, * 1620.
Bidens, * 1407-1409.
Biscutella, 1078.
Biserrula, * 1250.
Blasia, 1878.
Blittum, * 7.
Boletus, * 2025-2036.
Brassica, * 1116-1121.
Brixa, 144.
Bromus, 157-163.
Bryonia, * 1654.
Bryum, 1788-1914.
Bufo, 255.
Bunias, * 1128-1129.
Bunium, * 428.
Buphtalmum, * 1500-1505.
Buplevrum, * 406-412.
Butomus, * 640.
Buxus, * 1621.
Byssus, 1993-1998.

C.

- CACALIA*, * 1410-1411.
Cachris, 442.
Calendula, * 1527-1528.
Callitriche, 5-6.
Caltha, * 919.
Campanula, * 318-327.
Camphorosma, * 251.
Capparis, * 834.
Cardamine, * 1083-1088.
Carduus, * 1377-1391.
Carex, * 1593-1619.
Carlina, * 1399-1403.
Carpinus, * 1645.
Carthamus, * 1404-1406.
Carum, * 484.
Catananche, * 1369.
Caucalis, * 418-421.
Celtis, * 1695.
Cenchrus, 1700-1701.
Centaurea, 1507-1526.
Centunculus, 245.
Cerastium, * 739-745.
Ceratophyllum, * 4630.
Cercis, 641.
Chara, * 1942-1945.
Chærophyllum, * 469-471.
Cheiranthus, * 1106-1110.
Chelidonium, * 836-839.
Chenopodium, * 366-378.
Chondrilla, * 1331.
Chrysanthemum, * 1474-1479.
Chrysocoma, 1414.
Chrysosplenium, * 656-657.
Cichorium, * 1370-1371.

- Cicuta*, * 462.
Cineraria, 1467-1469.
Circæa, * 14-14.
Cistus, * 848-863.
Clavaria, * 2052-2059.
Clematis, * 881-884.
Clinopodium, * 971-972.
Clypeola, 1075-1077.
Cneorum, 60.
Cnicus, * 1392-1394.
Cochlearia, * 1059-1063.
Colchicum, * 590.
Colutea, * 1229.
Comarum, * 833.
Conserva, * 1977-1992.
Conium, * 429.
Convallaria, * 553-557.
Convolvulus, * 312-316.
Coryza, * 1429.
Coreopsis, 1506.
Coriaria, 1687.
Coris, 337.
Cornus, * 247.
Coronilla, * 1232-1237.
Corrigiola, * 499.
Corylus, * 1646.
Coryspermum, 4.
Cotula, 1484.
Crambe, * 1131.
Cratægus, * 791-794.
Crepis, 1354-1359.
Crithmum, * 441.
Crocus, * 62.
Croton, 1652.
Crucianella, 230-233.
Cucubalus, 689-692.
Cunila, 41.

Cuscuta, * 256.*Cyclamen*, 300.*Cynanchum*, 362.*Cynara*, * 1398.*Cynoglossum*, * 285.*Cynosurus*, * 146-148.*Cyperus*, * 74-77.*Cypripedium*, 1574.*Cytisus*, 1225-1228.

D.

DACTYLIS, 145.*Daphne*, * 615-621.*Daucus*, * 422-425.*Delphinium*, * 865-866.*Dentaria*, * 1081-1082.*Dianthus*, 679-688.*Diſtamnus*, * 642.*Digitalis*, * 1027-1028.*Diospyros*, 1719.*Dipsacus*, 200-202.*Doronicum*, 1471.*Draba*, 1040-1046.*Droſera*, 516.

E.

ECHINOPHORA, 413.*Echinops*, 1535.*Echium*, * 292.*Elatine*, 637-638.*Elæagnus*, 250.*Elymus*, 181-182.*Empetrum*, 1672.*Ephedra*, * 1693.*Epilobium*, 597-601.*Equisetum*, * 1721-1725.

Erica, * 606-614.
Erigeron, 1430-1434.
Eringium, * 399-401.
Eriophorum, 89-91.
Ervum, * 1220-1224.
Erysimum, * 1101-1105.
Evonymus, * 351.
Eupatorium, * 1412.
Euphorbia, * 762-781.
Euphrasia, 991-995.
Erinus, 1029.

F.

F *AGUS*, * 1643-1644.
Ferula, * 443-444.
Festuca, * 149-156.
Ficus, * 1720.
Filago, * 1529-1533.
Faniculum, * 440.
Fontinalis, 1767-1769.
Fragaria, * 818.
Frankenia, 576-577.
Fraxinus, * 1717-1718.
Fritillaria, * 535-536.
Fucus, * 1935-1968.
Fumaria, * 1156-1160.

G.

G *ALEOPSIS*, * 952-954.
Galium, * 219-229.
Garidella, 719.
Genista, * 1170-1174.
Gentiana, * 387-398.
Geranium, * 1132-1145.
Geum, * 830-832.
Gladiolus, * 63.

Glaux, 358.

Glecoma, * 948.

Globularia, * 196-199.

Glycyrrhiza, * 1231.

Gnaphalium, * 1421-1427.

Gratiola, * 35.

Gypsophilla, * 672-675.

H.

HEDERA, * 354.

Heliotropium, * 275.

Helleborus, * 913.

Helvelia, * 2040-2041.

Heracleum, * 450-451.

Herniaria, * 394-365.

Hesperis, * 1111-1112.

Hieracium, * 1343-1353.

Hippocrepis, * 1240-1241.

Hippophaë, 1675.

Hippuris, 3.

Holcus, 1698-1699.

Holosteum, 194.

Hordeum, * 184-188.

Horminum, * 982.

Hottonia, * 302.

Humulus, * 1679.

Hyacinthus, * 558-561.

Hydnum, 2037-2041.

Hydrochæris, 1686.

Hydrocotyle, * 402.

Hyoscoris, 1362-1364.

Hypecoum, 257-258.

Hyosciamus, * 343-344.

Hypnum, * 1815-1849.

Hypericum, * 1298-1308.

Hypochæris, * 1365-1366.

I.

- J**ASMINUM, * 8-9.
Jasione, * 1536.
Iberis, 1064-1067.
Illecebrum, * 356-357.
Impatiens, * 1546.
Imperatoria, * 472.
Inula, * 1456-1466.
Ifatis, * 1130.
Isnardia, 248.
Isoëtes, 1756.
Juncus, * 563-574.
Jungermannia, 1850-1873.
Juniperus, * 1688-1691.
Iris, * 64-68.

L.

- L**ACTUCA, * 1328-1330.
Lagurus, 171-172.
Lamium, * 950-951.
Lapsana, * 1367-1368.
Lathyrus, * 1196-1209.
Laséripitium, 445-449.
Lathræa, * 1001-1002.
Lavatera, 1154-1155.
Lavendula, * 938.
Ledum, 645.
Lemna, * 1585-1588.
Leontodon, * 1336-1342.
Leonurus, * 967-968.
Lepidium, * 1047-1051.
Leucoium, * 517.
Lichen, 1884-1941.
Ligustrum, * 10.

- Lilium*, * 533-534.
Limosella, * 1030.
Linum, * 507-515.
Lithospermum, * 279-282.
Lobelia, * 1537-1538.
Lolium, * 178-180.
Lonicera, * 331-336.
Lotus, * 1275-1282.
Lunaria, * 1079-1080.
Lupinus, * 1187.
Lychnis, * 693-703, 735-738.
Lycoperdon, * 2060-2067.
Lycopodium, * 1757-1763.
Lycopsis, 290.
Lycopus, * 40.
Lythamachia, * 303-308.
Lythrum, * 752-754.

M.

- M**ALVA, * 1149-1153.
Marchantia, * 1874-1877.
Marrubium, * 966.
Marsilea, 1754.
Matricaria, * 1480-1483.
Medicago, * 1286-1297.
Melampyrum, * 996-1000.
Melica, 131-132.
Melissa, * 978-981.
Melittis, 983.
Mentha, * 942-947.
Menyanthes, * 301.
Mercurialis, * 1684-1685.
Mespilus, * 796-801.
Micropus, 1534.
Milium, 111-113.
Mnium, 1773-1787.
Moëhringia, 624.

Momordica,

Momordica, * 1653.
Montia, 193.
Morus, * 1625.
Mucor, 2068-2076.
Myagrum, * 1035-1039.
Myosotis, * 276-278.
Myosurus, * 517.
Myrica, 1676.
Myriophyllum, 1631-1632.

N.

N
Najas, * 1655.
Narcissus, * 518-521.
Nardus, * 92-93.
Nepeta, * 937.
Nicotiana, * 345.
Nigella, * 870-872.
Nymphæa, * 845-846.

O.

O
Ogilops, 1702-1703.
Ogopodium, 488.
Oenanthe, * 458-460.
Oenothera, 596.
Olea, * 13.
Ononis, * 1176-1184.
Onopordum, * 1395-1397.
Onosma, 288.
Ophioglossum, 1726.
Ophris, * 1563-1570.
Origanum, * 973.
Ornithogallum, * 539-543.
Ornithopus, 1238-1239.
Orchis, * 1547-1559.
Orobanche, * 1031-1033.

Orobus, 1190-1195.

Osmunda, 1727-1730.

Osyris, 1673.

Oxalis, 733.

P.

P *ANCRATIUM*, 522.

Panicum, * 97-101.

Papaver, * 840-844.

Parietaria, * 1707.

Paris, 635.

Parnassia, * 502.

Passerina, * 623.

Passiflora, 1175.

Pastinaca, * 481.

Pedicularis, * 1004-1007.

Peplis, 578.

Peucedanum, * 437-439.

Peziza, 2046-2051.

Phallandrium, 461.

Phallaris, * 94-95.

Phallus, * 2042-2043.

Phascum, 1765-1767.

Phyllyrea, 12.

Phleum, 102-105.

Phlomis, 969-970.

Phyteuma, 328-329.

Picris, * 1319-1321.

Pilularia, 1755.

Pimpinella, * 485-486.

Pinguicula, * 36.

Pinus, * 1647-1651.

Pistacia, * 1677-1678.

Pisum, * 1188-1189.

Plantago, * 235-244.

Plumbago, * 311.

Poa, * 133-143.

- Pæonia*, * 864.
Polemonium, 317.
Polycarpon, 195.
Polycnemum, 61.
Polygala, * 1161-1164.
Polygonum, * 625-634.
Polypodium, * 1740-1752.
Polytrichum, * 1771-1772.
Populus, * 1680-1683.
Portulaca, * 751.
Potamogeton, 259-269.
Potentilla, 819-828.
Poterium, 1635-1637.
Prenanthes, 1332-1335.
Primula, * 295-298.
Prunella, * 985-987.
Prunus, * 784-790.
Psoralea, 1251.
Pteris, 1733.
Pulmonaria, * 286.
Pyrola, * 651-656.
Pyrus, * 802-806.

Q.

QUERCUS, * 1638-1642.

R.

- R**ANUNCULUS, * 892-917.
Raphanus, * 1127.
Reseda, * 756-761.
Rhamnus, * 348-350.
Rheum, * 649.
Rhinanthus, 989-990.
Rhododendron, 646-647.
Rhus, * 489.
Ribes, * 352-353.

Riccia, 1879-1882.

Rosa, * 806-813.

Rosmarinus, * 42.

Rubia tinctorum, * 234.

Rubus, * 814-817.

Rumex, * 180-189.

Ruppia, 270.

Ruscus, * 1694.

Ruta, 643.

S.

SAGINA, 271-272.

Sagittaria, * 1633.

Salicornia, * 1-2.

Salix, * 1657-1671.

Salsola, * 380-384.

Salvia, * 43-47.

Sambucus, * 492-494.

Samolus, * 330.

Sanguisorba, * 246.

Sanicula, * 403.

Saponaria, * 676-678.

Satureia, * 933-936.

Satyrium, 1560-1562.

Saxifraga, * 658-668.

Scabiosa, * 203-212.

Scandix, * 465-467.

Schœnus, * 69-73.

Scilla, * 544-546.

Scirpus, * 78-88.

Scleranthus, 669-671.

Scolymus, * 1372-1373.

Scorfonera, * 1315-1318.

Scrophularia, * 1024-1026.

Scutellaria, * 984.

Secale, * 183.

Sedum, * 720-732.

- Selinum*, 430-432.
Sempervivum, * 782-783.
Senecio, * 1438-1449.
Scrapias, * 1571-1573.
Serratula, * 1375-1376.
Seseli, 473-479.
Sherardia, * 213.
Sideritis, * 939-941.
Sinapis, 1122-1126.
Sison, * 456-457.
Sisymbrium, * 1089-1100.
Sium, * 455-455. 2080.
Smyrnium, * 482.
Solanum, * 347-347.
Soldanella, * 299.
Solidago, * 1454-1455.
Sonchus, * 1322-1327.
Sorbus, * 795-796.
Sparganium, 1591.
Spartium, * 1165-1169.
Spergula, * 746-748.
Sphagnum, * 1764.
Spiræa, * 804-805.
Stachys, * 957-963.
Staphillæa, * 495.
Statice, * 503-506.
Stellera, * 622.
Stellaria, * 704-707.
Stipa, * 164-166.
Silæhelina, 1413.
Stratiotes, 873.
Subularia, 1040.
Swertia, 386.
Symphitum, 287-288.

T.

- T** *AMARIX*; * 496-497.
Tamus, * 1680.
Taxus, * 1692.
Telephium, * 498.
Teucrium, * 922-934.
Thesium, 359.
Thaliætrum, 885-889.
Thalpsia, 480.
Thlaspi, 1052-1058.
Thymus, * 974-977.
Tilia, * 847.
Tillæa, 273-274.
Tordylium, 414-416.
Tormentilla, * 829.
Tozzia, 1003.
Tragopogon, * 1309-1314.
Trapa, * 249.
Tremella, * 1946-1954.
Tribulus, * 644.
Tridentalis, 595.
Trifolium, * 1252-1274.
Trigonella, 1283-1285.
Triticum, * 189-192.
Tulipa, * 538.
Turritis, * 1115.
Tussilago, * 1435-1437.
Typha, * 1589-1590.

V.

- V** *ACCINIUM*, * 602-605.
Valentia, * 1704-1706.
Valeriana, * 50-59.
Valezia, 579.
Vallisneria, 1656.

Verbascum, * 338-342.

Verbena, * 39.

Veronica, * 16-34

Viburnum, * 490-491.

Vicia, * 1210-1219.

Vinca, * 360-361.

Viola, * 1339-1345.

Viscum, * 1674.

Vitis, 355.

Ulex, * 1230.

Ulmus, 385.

Ulva, * 1969-1976.

Urtica, * 1622-1624.

Utricularia, 37-38.

Uvularia, * 537.

X.

X *ANTHIUM*, * 1626.

Xeranthemum, * 1428.

Z.

Z *ANNICHELLIA*, 1584.

Zostera, 1583.

T A B L E

Des noms synonymes du Flora Gallica.

A.

A *BIES*, 1651.

Abrotanum, 1416.

Abfynthium, 1417-1418, 1420.

Acacia, 1169.

Acanthus, 1034.

Acer, 1714-1716.

Acetosa, 586, 588-589.

Aconitum, 834, 867-868.

Acorus, 66, 562.

Adiantum, 1730, 1739, 1751, 1753.

Adonis, 890-891.

Agarico fungus, 2024.

Agarico polyporus, 2028.

Agaricus, 2000-2001, 2003, 2009-2010, 2015, 2017,
2045.

Ageratum, 1029, 1493.

Alcea, 1147-1148.

Alchemilla, 252, 670.

Alga, 1583, 1957, 1961, 1980, 1991.

Alliaria, 1103.

Allium, 524, 526-527, 529-532.

Alnus, 349.

Aloë, 873.

Alfinastrum, 637.

Alfine, 31-34, 248, 272, 500-501, 578, 624, 686,
704, 707, 709, 711-717, 744, 746, 748-749.

Althæa, 1146, 1154.

Alypum, 196.

Alyssum, 1040, 1043, 1073, 1090.

Amaranthus, 1627.

Ambrosia, 1060.

Ammi, 426-427.

Anagallis, 25, 245, 304, 309, 330.

Anchusa, 284, 288.

Androsæmum, 1299, 1304.

Anemone, 877-879.

Angelica, 452, 488.

Anonis, 1176-1184.

Anthemis, 1484.

Anthoceros, 1883.

Anthyllis, 195, 577.

- Anthirrinum*, 1011-1012, 1021-1022.
Aparine, 221, 1705.
Apium, 430, 435, 441, 479, 487.
Aquilegia, 869.
Arbutus, 649.
Argemone, 840-841.
Aristolochia, 1576-1579.
Arisarum, 1582.
Artemisia, 1419.
Arum, 1580-1581.
Arundo, 173-174.
Asarum, 750.
Aselepias, 362.
Ascyrum, 1298, 1303, 1306.
Asparagus, 552.
Aspergillus, 2072-2073, 2075.
Asperula, 214-215.
Asphodelus, 547-548.
Aster, 1450, 1452-1453, 1458-1459, 1461, 1463, 1466, 1500, 1503, 1505.
Astragalus, 1192, 1243, 1246-1249.
Astragaloides, 1245.
Atractylis, 1404.
Atriplex, 7, 368-369, 371, 373, 375-376, 1709-1713.
Avena, 167, 170.

B.

- B** *ALLOTTA*, 965.
Balsamine, 1546.
Barba Capræ, 805.
Bellis, 1472-1475.
Berberis, 575.
Beta, 379.
Betonica, 955.
Betonicæ folio, 956.
Betula, 1620.

- Distorta*, 625.
Blitum, 377, 1628.
Boletus, 2025, 2031, 2033, 2042.
Botrys, 374, 922.
Botrytis, 2074.
Brassica, 1115-1117, 1131.
Brunella, 985-987.
Bryonia, 1654, 1680.
Bryum, 1778, 1782-1783, 1799-1800, 1804-1807, 1814.
Buglossum, 282-283, 289-290.
Bulbocastanum, 428.
Bunias, 1128.
Buplevrum, 409-411.
Bursa pastoris similis, 1112.
Bursæ pastoris, 1041-1042, 1044-1045, 1058, 1067.
Buxus, 1621.
Byssus, 1826, 1946, 1993, 1995, 1998.

C.

- C***ALAMIYTHA*, 945, 979-981.
Calamaria, 1756.
Caltha, 919, 1527-1528.
Campanula, 318, 321-323, 325-326, 511.
Camphorata, 61, 251.
Cannabina, 1407, 1409.
Capparis, 834.
Carduus, 1376, 1378-1382, 1386-1387, 1391-1393, 1397, 1403, 1519-1521, 1526, 1535.
Carex, 1606, 1611, 1613, 1615.
Carlina, 1400-1402.
Carpinus, 1645.
Carthamoides, 1405.
Carvi, 478.
Carum, 484.
Caryophyllata, 830-832.

- Caryophyllus*, 130, 194, 503, 523, 672-673, 675,
679-683, 685-686, 688, 702, 705-706, 741, 745.
Castanea, 1645.
Caucalis, 414-421, 425.
Cauda muris, 517.
Cedrus, 1690-1691.
Centaurium, 393-394, 397-398, 1394, 1512.
Ceraso affinis, 785.
Cerasus, 784, 786-787.
Ceterach, 1735.
Chærophyllo similis, 254.
Chamæbuxus, 1164.
Chamæcerasus, 333-334, 336.
Chamæcistus, 310, 853-855, 861-862.
Chamædrys, 20, 27-30, 926, 928-930, 990.
Chamæfilix, 1737.
Chamægenista, 1171.
Chamælea, 60, 618.
Chamælinum, 515.
Chamæmelum, 1478, 1481-1482, 1486-1490, 1492.
Chamæpytis, 923-924.
Chamærubus, 817.
Chærophyllosum, 465, 470.
Chara, 1943-1945.
Chelidonia, 898.
Chelidonium, 836.
Chenopodium, 61, 367, 370, 372.
Chondrilla, 1324, 1326, 1330-1333, 1337, 1369.
1507.
Chrysanthemum, 1479-1501.
Cichorium, 1320-1371.
Cicuta, 429, 462.
Cicutaria, 461, 469, 471.
Cinara, 1398.
Cirsium, 1383-1385, 1389-1390, 1393.
Cistus, 468, 645, 848-852, 846-857, 863.
Clandestina, 1301.

- Clavaria*, 2052-2055.
Clematis, 360-361.
Clematidis, 881-883.
Clinopodium, 971, 976-977.
Cochlearia, 1059.
Colchicum, 590.
Colutea, 1229, 1232-1233.
Conocrambe, 1634.
Conserva, 1971, 1977-1979, 1981-1985, 1987-1990, 1992.
Consolida, 864, 920-921.
Convolvulus, 213-315, 633.
Conyza, 1429-1433, 1445, 1457, 1460, 1467.
Corallina, 1986.
Corallo fungus, 2057.
Coralloïdes, 1895, 1924, 1927-1931, 1933, 2069.
Cornus, 247.
Coronilla, 1234.
Coronopus, 240, 242.
Corylus, 1646.
Coryspermum, 4.
Cotoneaster, 800-801.
Cotyledon, 658.
Crithmum, 413, 440, 1464.
Crocus, 62.
Cruciata, 1706.
Cucumis, 1653.
Cuscuta, 256.
Cyanus, 1511.
Cyclamen, 300.
Cymbalaria, 1008.
Cynoglossum, 277, 285.
Cynosorchis, 1548.
Cyperoides, 1600, 1605, 1607, 1609, 1612, 1619.
Cyperus, 69, 74, 87, 1602.
Cytisus, 1167, 1170, 1225-1226.

D.

- D** *AUCUS*, 422, 424, 434, 439, 457, 476.
Dens Leonis, 1336, 1340, 1362.
Dentaria, 1003, 1081-1082.
Dianthus, 687.
Didamnus, 642.
Digitalis, 1027-1028.
Dipsacus, 200-202.
Doronicum, 1449, 1470-1471.
Draba, 1063.
Dracunculus, 1495.

E.

- E** *CHIUM*, 276, 278, 291-292.
Elatine, 1009-1010.
Elvela, 1999.
Elychrysum, 1413, 1421-1423.
Embolus, 2070.
Equisetum, 3, 638, 1721-1725, 1942.
Erica, 606-614, 1672.
Erigeron, 1434.
Erinaceus, 2037-2038.
Eruca, 1091, 1095-1097, 1102, 1121, 1129.
Eryngium, 399-401, 455, 1406.
Erysimum, 1094, 1100-1101, 1124-1126.
Evonymus, 351, 646.
Eupatorium, 755, 1412, 1506.
Euphrasia, 988, 991-995.

F.

- F** *ARA*, 1219.
Fagopyrum, 634.
Fagus, 1644.
Ferrum equinum, 1236, 1241.

Ferula, 443.

Festuca, 157, 159-160, 165-166, 168, 1702-1703,
2078.

Ficus, 1720.

Filago, 1533.

Filicula, 1731, 1743, 1748.

Filipendula, 804, 1007.

Filix, 1732-1733, 1741, 1744-1750, 1752.

Flammula, 884.

Fluvialis, 1655.

Fœniculum, 474, 483, 1285, 1285.

Fontinalis, 261, 1768.

Fragaria, 818, 827.

Fragariæ affinis, 828.

Fraxinus, 1717-1718.

Fritillaria, 535-536.

Fucus, 1955-1956, 1958, 1960-1964, 1966, 1968,
1972.

Fumaria, 1156-1160.

Fungoides, 2048, 2050, 2058.

Fungus, 1948, 2002, 2004-2008, 2012-2014, 2016,
2018-2021, 2030, 2032, 2040, 2043-2044, 2056,
2059.

G.

GAIUM, 217, 219-220, 223, 228-229.

Garidella, 715.

Genista, 1165-1166, 1168, 1172-1175, 1230.

Gentiana, 386, 388-392, 395-396.

Geranium, 1132-1145.

Gingidium, 423.

Gladiolus, 63, 67, 1537.

Glaux, 358.

Glycyrrhiza, 1231, 1242.

Gnaphalium, 1415, 1425-1427, 1529-1532, 1534.

Gramen, 48-49, 70-71, 73, 76-77, 79, 88-90, 92,
94-100, 102-129, 131-135, 138-142, 144-153.

155-156, 158, 161-164, 169, 171-172, 175-182,
188, 190-192, 270, 502, 569-574, 1592-1599,
1601, 1603-1604, 1608, 1610, 1614, 1616-1618,
1997-1701, 2077, 2079.

Gratiola, 35.

Grossularia, 352-353.

H.

HALIMUS, 1708.

Hedera, 354

Hedera terrestris, 948.

Hedysarum, 1284.

Helenium, 1456.

Helianthemum, 858.

Heliotropium, 275, 1652.

Helleborine, 1571, 1573-1574.

Helleborus, 404-405, 918.

Hepatica, 1857, 1872, 1876-1877, 1881-1883.

Hepaticoides, 1850, 1854, 1860.

Herniaria, 255.

Hesperis, 1111.

Hieracium, 1312-1313, 1319, 1321, 1323, 1338,

1341-1343, 1354, 1356-1359, 1363-1366, 1368.

Hippofelinum, 482.

Holosticum, 239, 241.

Horminum, 44-47.

Hyacinthus, 544-546, 558-561.

Hydroceratophyllum, 1629-1630.

Hyosciamus, 343-344

Hypecoi altera species, 258.

Hypericum, 1300-1302, 1305, 1307-1308.

Hypnum, 1815, 1820, 1826, 1829, 1830, 1835;

1839, 1841-1842, 1847, 1849.

Hyssopi folia, 753.

I.

- J**ACEA, 1508-1510, 1515-1517, 1522-1525.
Jacobæa, 1440, 1442, 1446, 1465, 1469.
Jasminum, 8-9.
Iberis, 1051.
Ilex, 1638-1639, 1641.
Imperatoria, 472.
Iris, 64-65, 68.
Isatis, 1130.
Juncellus, 80.
Juncus, 72, 78, 82-83, 85, 91, 565-568, 640.
Jungermannia, 1053.
Juniperus, 1688-1689.

K.

- K**ALI, 2, 378, 380-384.

L.

- L**ACTUCA, 1327-1329, 1334.
Lamium, 949-951, 954, 957.
Lampsana, 1367.
Lapathum, 366, 580-585, 587.
Lappa, 1374.
Larix, 1650.
Laserpitium, 446-447.
Lathyris, 765.
Lathyrus, 1197, 1209.
Lavendula, 938.
Laureola, 615, 619.
Ledum, 647.
Lens, 1220, 1586.
Lenticula, 5, 6, 1585, 1587-1588, 1754.
Lepidium, 311, 1049, 1062.
Leucanthemum, 1476-1477.

Leucojum;

- Leucoium*, § 17. 104§, 110§-1110, 1112, 1114.
Libanotis, 433, 442, 444-445, 475.
Lichen, 1870-1871, 1874-1875, 1879, 1881, 1888,
 1900-1901, 1908, 1911-1912, 1914-1915, 1920,
 1922, 1925-1926, 1930, 1949;
Lichenastrum, 1787, 1852, 1855-1856, 1858-1859,
 1861-1865, 1867-1869, 1873.
Lichenoides, 1884-1887, 1889, 1897-1899, 1904-
 1907, 1913, 1916-1919, 1921, 1923, 1952.
Lichnis, § 79, 677, 690-701, 703, 734, 736, 738,
 742.
Ligusticum, 448.
Ligustrum, 10.
Lilium, § 33-§ 34.
Lilium convallium, § 53, § 57.
Limonium, § 04-§ 06.
Linaria, § 59, 1013-1020, 1023, 1414.
Lingua cervina, 1734.
Linum, § 04-§ 05, § 07-§ 09, § 12-§ 14.
Lithospermum, 279-281, § 10, 622.
Lonchitis, 1729, 1742.
Loto affinis, 1185-1186.
Lotus, 1228, 1275-1280, 1695, 1719;
Lunaria, 1074, 1080, 1727.
Lupinus, 1187.
Lupulus, 1679.
Luteola, 756.
Lycoperdon, 2062-2066.
Lycopodium, 1759.
Lyfimachia, 17, § 03-§ 04, § 96-601, 752, 984.

M.

MALVA, 1149-1152, 1155.

Malus, 803.

Marrubiastrum, 963, 968.

Marrubium, 40, 962, 964, 966-967, 970.

Tome IV.

Matricaria, 1480, 1483, 1486.

Medica, 1286, 1292-1293, 1297.

Medicago, 1291, 1296.

Melampyrum, 915, 995-1000.

Melissa, 972, 978, 982-983.

Mentha, 937, 942-944.

Mercurialis, 1684.

Mespilus, 793-794, 797, 799.

Meum, 436, 473.

Millefolium, 37-38, 302, 1494, 1497, 1499, 1631-1632.

Mnium, 1786, 1878.

Mucor, 2071.

Mollugo, 224.

Moly, 525, 531.

Morus, 1625.

Muscus, 1757, 1760-1767, 1769-1770, 1772-1777,

1779, 1781, 1784-1785, 1788-1794, 1795-1798,

1801-1803, 1808-1813, 1816-1819, 1821-1825,

1827-1828, 1831-1834, 1838, 1840, 1843-1844,

1845-1846, 1848-1866, 1909-1910, 1930, 1932,

1934-1935, 1940, 1941, 1973, 1975, 2047.

Myagrosimilis, 1038.

Myagrurn, 1036-1037, 1104.

Myrrhis, 466, 468.

Myosotis, 739-740, 742.

N.

N *APUS*, 118.

Narcissus, 518, 520-522.

Nardus, 55, 93.

Nasturtium, 1047-1048, 1050, 1083, 1085-1089, 1099.

Nicotiana, 345.

Nigella, 870-872.

Nosfock, 1947.

Nummularia, 307-308.

Nymphaea, 845-846, 1686.

O.

O *GILIPS*, 1696.

Enanthe, 458-460.

Olea, 13, 250.

Onobrychis, 324.

Ophioglossum, 1726.

Orchis, 1547, 1549-1561, 1563, 1569-1570, 1572.

Ornithopus, 1238.

Origanum, 973.

Orobanche, 1002, 1031-1033, 1564.

Ophris, 1566-1568.

Ornithogallum, 539-543.

Ornithopodio affinis, 1244.

Orobis, 1190-1191, 1193, 1195, 1224.

Osmunda, 1728.

Osyris, 1673.

Othonna, 1468.

Oxyacantha, 798.

P.

P *ANICUM*, 101.

Papaver, 838-839, 842-874.

Parietaria, 1707.

Passiflora, 1575.

Pastinaca, 481.

Pedicularis, 989, 1004-1005.

Pentaphylloides, 826.

Peplis, 762-763.

Perfoliata, 406-408.

Perficaria, 627, 629-630.

Peryclimenum, 331-332.

Petasites, 1436-1437.

Peucedanum, 437.

Peziza, 2046, 2049.

Phalangium, 549-550.

Phillyrea, 11-12.

Phyllica, 350.

Phyllon, 1685.

Picea, 1649.

Pilosella, 1344-1346.

Pilularia, 1755.

Pimpinella, 246, 485, 1635-1637.

Pinus, 1647-1648.

Pistacia, 495, 1677.

Pisum, 1188-1189.

Plantago, 236-238, 591-592, 594.

Plantaginella, 1030.

Poa, 143.

Pæonia, 864.

Polifolia, 648.

Polium, 932-934.

Polygala, 356, 1161-1163.

Polygonatum, 537, 554-556.

Polygonum, 357, 364-365, 499, 576, 631-632;
669, 671, 1693.

Polypodium, 1740.

Polytrichum, 1771.

Populus, 1681-1683.

Porrum, 528.

Portulaca, 193, 751.

Potamogeton, 259-260, 262-264, 266-269, 628;
1584.

Potentilla, 820.

Primula veris, 295.

Prunus, 788-790.

Pseudo-Asphodelus, 551.

Pseudo-Orchis, 1562.

Pseudo-Stachys, 959.

Psyllium, 244.

Pulegium, 946-947.

Pulsatilla, 875-876.

Pyrethrum, 1491.

Pyrola, 595, 651-655.

Pyrus, 802.

Q.

QUERCUS, 1642.

Quinquefolium, 820-825, 833.

R.

RANUNCULUS, 402, 593, 636, 880, 892-896,
900-914, 916-917.

Rapa, 1119.

Raphanus, 1061, 1092.

Rapistrum, 1035, 1122, 1127.

Rapunculus, 319-320, 327-329, 1536.

Rapontium, 1538.

Reseda, 757-761.

Rhamnus, 348, 1675.

Rhaponticum, 639.

Rhus, 1676, 1687.

Riccia, 1880.

Rosa, 806-813.

Rosmarinus, 42.

Rossolis, 516.

Rubeola, 213, 222, 1704.

Rubia, 216, 218, 225-227, 230-231, 233-234.

Rubus, 814-816.

Ruscus, 1694.

Ruta, 643.

Ruta muraria, 1738.

S.

SAGINA, 271-272.

Sagitta, 1633.

Salicaria, 754.

- Salicornia*, 1-2.
Salix, 1658-1671.
Salvia, 43.
Sambucus, 491-494.
Sanicula, 36, 297-298, 342, 363, 660.
Saponaria, 676, 678.
Satureia, 935-936.
Saxifraga, 656-657, 659, 662.
Scabiosa, 198, 205-206, 208-202, 1513.
Scammonea, 362.
Scandix, 464, 467.
Scirpus, 81, 85, 86.
Scolymus, 1372-1373.
Scordium, 925, 927.
Scorfonera, 1315-1317.
Scrophularia, 1024-1025.
Secale, 183.
Securidaca, 1237, 1250.
Sedum, 273, 293-294, 661, 665-668, 722-728,
 731-732, 782-783.
Selaginoides, 1758.
Sempervivum, 729-730.
Senecio, 1354, 1410, 1438-1440, 1443-1444.
Serpillum, 974.
Serratula, 1375.
Seseli, 412, 414, 432, 438, 477, 486.
Sideritis, 939-941, 952, 961.
Silene, 737.
Siliqua, 641.
Sinapi, 1093, 1098, 1123-1194.
Sium, 453-454, 456, 462, 2080.
Solanifolia, 15.
Solanum, 346-347, 635.
Soldanella, 299.
Sonchus, 1314, 1318, 1322, 1325, 1335, 1360,
 1361.
Sorbus, 791-792, 795-796.

Sparganium, 1591.
Spergula, 748.
Sphærocephalus, 2068.
Sphondylium, 450-451.
Spina, 1395-1396.
Stachys, 958-960.
Stæbe, 1518.
Staphisagria, 866.
Staphylo dendron, 495.
Stellaria, 5.
Suber, 1640.
Succisa, 204.
Symphitum, 286-288, 337.

T.

T *AMARISCO similis*, 1967.
Tamariscus, 496-497.
Taxus, 1692.
Telephium, 720-721, 1239.
Thaliætrum, 885-889.
Thlaspi, 1039, 1068, 1070-1072, 1075-1076, 1078.
Therebinthus, 1678.
Thlasfia, 480.
Thlaspi, 1052-1056, 1058, 1064-1066.
Thlaspidium, 1077.
Thora, 899.
Thymelea, 616-617, 621, 623.
Thymelea affinis, 620.
Thymus, 41, 975.
Tilia, 847.
Tillæa, 274.
Tithymalus, 764, 766-781.
Tonanthum, 1498.
Tormentilla, 253, 829.
Tragopogon, 1309-1311.
Tremella, 1950, 1969-1970, 1974-1976.

Tribulus, 249, 644.

Trichomanes, 1736.

Trifolium, 8, 301, 733, 874, 1252-1251, 1263-1266, 1268-1274, 1281-1282, 1287-1290, 1294-1295.

Triorchis, 1565.

Tripolium, 1451.

Triticum, 189.

Tuber, 2060-2061.

Tulipa, 538.

Tunica, 674.

Tussilago, 144, 1435.

Typha, 159.

V.

V ALERIANA, 50-54, 56, 58-59, 317.

Valerianella, 57.

Vallisneria, 1656.

Verbascum, 338-341, 869.

Verbasculum, 296.

Verbenæ, 39.

Verbesina, 1408.

Veronica, 16-17, 19, 21, 23-24, 26.

Viburnum, 490.

Vicia, 1196, 1211-1215, 1217-1218, 1221-1223.

Viola, 1079, 1539-1545.

Virga aurea, 1447-1448, 1454-1455.

Viscum, 1674.

Vitis, 355.

Vitis idæa, 602-603, 605.

Ulmus, 385.

Urtica, 953, 1622-1624.

Usnea, 1936-1939.

Uva ursi, 650.

X.

XANTHIUM , 1626.

Xeranthemum , 1428.

Xylosteum , 335.

T A B L E

Des noms françois de ce Flora.

A.

ABSYNTHE , 1418 , 1420.

Acacia , 1169.

Acanthe , 1034.

Ache , 430 , 435 , 479 , 487.

Acorus , 66.

Adiante , 1730 , 1739 , 1748 , 1751.

Adonide , 890-891.

Agaric , 1948 , 2000-2005 , 2007-2011 , 2013-2017 ,
2019-2024 , 2027 , 2030 , 2045 , 2055.

Agerate , 1029 , 1493.

Agripaulme , 967.

Ail , 526-527 , 529-532.

Alaterne , 350.

Alcée , 1147-1148 , 1151-1152.

Algue , 1583 , 1955 , 1957 , 1966.

Alifier , 792.

Alleluia , 733.

Alliaire , 1103.

Aloës , 873.

Alfinaster , 637.

Alfine , 248 , 624 , 206-717 , 744 , 747-749.

Alyoïde , 1584.

Alyce, 196.

Alysson, 1040, 1042-1043, 1073, 1076.

Amaranthe, 1627-1628.

Ambrosie, 1060.

Amelanchier, 799.

Ammi, 426-427.

Anchole, 869.

Andromede, 648.

Anemone, 875, 877-878.

Angélique, 452.

Anthora, 868.

Aparinctte, 214-215, 221, 228, 1705.

Arbousier, 649.

Arbre de Judas, 641.

Arbrisseau des Corroyeurs, 1687.

Argemone, 840.

Armoise, 1417, 1419.

Arisarum, 1582.

Aristolochie, 1576-1579.

Arrête-bœuf, 1176-1184.

Arroche, 7, 368, 370-372, 375-376, 1709-1713.

Artichaut, 1398.

Asperges, 552.

Asphodèle, 547-548, 551.

Aster, 1450-1453, 1458-1459, 1461-1464, 1466,
1502, 1505.

Astragale, 1186, 1243-1250.

Aubépine, 793.

Aulnée, 1456.

Aulne noir, 349.

Avoine, 159, 167-170, 2079.

Aurone, 1416.

Azerolier, 794.

B.

BAGUENAUDIER, 1229, 1232-1233, 1235.

Ballotte, 965.

- Barbe de bouc, 1309-1311.
 Bardane, 1374, 1626.
 Bec de grue, 1132.
 Beccabongue, 25.
 Behen blanc, 690.
 Benoitte, 830-832.
 Bétoine, 955-956.
 Betterave, 379.
 Biscuette, 1077.
 Bistorte, 625-626.
 Bled de vache, 997.
 Bluet, 1511, 1514.
 Bois de Sainte Lucie, 785.
 Bois gentil, 615.
 Bon Henry, 366.
 Bonnet de Prêtre, 351.
 Botrys, 374, 922.
 Bouillon blanc, 338-339, 969.
 Bouillon noir, 340-341.
 Bouleau, 1620.
 Bourse à Pasteur, 1041, 1044-1045, 1058, 1067.
 Boufferoie, 650.
 Bri, 1790, 1793, 1799-1800, 1804, 1806-1808,
 1812, 1814.
 Brimbelle, 604-605.
 Brunelle, 985-987.
 Bruyère, 606-614, 1672.
 Bryone, 1654.
 Buglosse, 282-284, 288, 290.
 Euplevrum, 407, 409-411.
 Bugle, 920-921.
 Buis, 1621, 1676.
 Byssé, 1994-1998.

C.

CABARET, 750.

Caille-lait, 217, 219-221, 225, 227², 229.

Calament, 979-980.

Cameline, 1037, 1104.

Camomille, 1478, 1482-1483, 1486-1490, 1492.

Campanule, 318, 321-323, 325-326.

Camphrée, 251.

Capillaire, 1753.

Caprier, 834.

Cardamine, 1084.

Carline, 1399-1403.

Carotte, 422-424, 434, 439, 457, 476.

Carthame, 1404-1405.

Carvi, 478, 484.

Casie, 1673.

Caucalis, 415-421, 425.

Cèdre, 1690-1691.

Centauree, 1394, 1512.

Cerfeuil, 465, 470.

Cerisier, 786, 787.

Céretac, 1735.

Chamæciste, 853.

Chamædrys, 60, 926, 928-929.

Champignon, 2006, 2012, 2018, 2032, 2043-2044,
2047.

Chamæpytis, 923-924.

Chanterelle, 1999.

Chanvre, 1407, 1409.

Chardon à Bonnetier, 200-202.

Chardon, 399-401, 455, 1376-1393, 1395-1397,
1408, 1519-1521, 1526, 1536.

Charme, 1645.

Châtaigne d'eau, 249.

Châtaignier, 1643.

Chelidoine, 836, 898.

Chenopode, 61, 367, 373, 377-378.

Chêne, 1638-1639, 1642.

Chèvrefeuille, 331-332.

Chichotacée, 1312, 1319-1321, 1338, 1341-1343,
1349-1359, 1363-1366.

Chichorée , 1370.

Chiendent , 48-49 , 70-71 , 73 , 76 , 79 , 85 , 89-92 ,
94 , 96 , 101-103 , 115-129 , 131-132 , 140-141 ,
144-148 , 150-151 , 156-158 , 161-162 , 171-172 ,
181 , 270 , 1592-1601 , 1603-1613 , 1615-1619 ,
1696-1701 , 1703 , 2077.

Chiendent du Parnasse , 502.

Chondrille , 1331-1334 , 1337 , 1369 , 1434 , 1507.

Chou , 1114-1117 , 1120 , 1131.

Cicutaire , 461 , 469 , 471.

Circée , 14-15.

Ciguë , 429 , 463.

Cinanchine , 218.

Cinoglosse , 277 , 285.

Ciste , 310 , 498 , 848-852 , 854-861.

Clandestine , 1001.

Clavaire , 2052-2054 , 2056 , 2058-2059.

Clematite , 881-884.

Clinopode , 971 , 979.

Colchique , 590.

Comaret , 833.

Concombre sauvage , 1653.

Conferva , 1971 , 1978-1992.

Consoude , 287-288 , 337.

Conyse , 1410 , 1429-1433 , 1457 , 1460 , 1467-1468.

Coquelicot , 842-843.

Coralloïde , 1895 , 1924 , 2057.

Corne de Cerf , 240 , 242.

Cornouiller , 247.

Coronille , 1234 , 1236-1237.

Corrigiole , 499.

Cotyledon , 658.

Crapaudine , 939-941.

Cresson de roche , 657.

Cresson , 1047-1048 , 1050 , 1083 , 1085-1088 , 1099.

Crête de Coq , 989-990.

Croisette , 1704-1706.

Cuscute, 256.

Cymbalaire, 1008.

Cynocrambe, 1634.

Cytise, 1167-1168, 1170-1172, 1225-1228.

D.

DENTAIRE, 1081-1082.

Dent de lion, 1336, 1339-1340, 1362.

Diétamne blanc, 642.

Digitale, 1027-1028.

Dompte-venin, 363.

Doronic, 1449, 1470-1471.

Douce-amère, 346.

E.

EGLANTIER, 808.

Enanthe, 458-460.

Endive, 1371.

Epi d'eau, 259-269, 628.

Epi du vent, 114.

Epine, 1372-1373.

Epine vinette, 575.

Erable, 1714-1716.

Ers, 1222.

Eryngium, 1406.

Esule, 763 - 764, 774.

Etriepe, 164-165.

Euphorbe, 762.

Eupatoire, 755, 1412, 1506.

Euphrase, 988, 991-995, 1003.

F.

FAUX Buis, 1164.

Faux Cerisier, 336.

Faux Nérion, 567.

Féougreec , 1283-1285.

Fenouil , 440-441 , 474 , 483.

Fer du Cheval , 1240-1241.

Férule , 443-444.

Fétuque , 149 , 151-152 , 154-155 , 160 , 166 , 1702 , 2078.

Figuier , 1720.

Filipendule , 804.

Filaris , 11-12.

Fleur d'eau , 1993.

Fleur du Soleil , 862.

Foin de Bourgogne , 1286.

Fougere , 1731-1733 , 1737 , 1741 , 1743-1747 , 1749-1750 , 1752.

Fraîsier , 818 , 827-828.

Framboisier , 814.

Fraxinelle , 642.

Frêne , 1717-1718.

Fritillaire , 535-536.

Froment , 189.

Fucus , 1956 , 1958-1968.

Fumeterre , 1156-1160.

G.

GARANCE , 226 , 230-234.

Garidel , 719.

Gaude , 756.

Genêt , 1165-1166 , 1171-1175 , 1230.

Genévrier , 1688 , 1689.

Gentiane , 386-393 , 395-396.

Geranion , 1133-1136 , 1139-1141 , 1143-1145.

Germandrée , 27 , 30.

Gesse , 1197-1203 , 1205-1209.

Geum , 660.

Glaycul , 63 , 67 , 1537.

Globulaire , 197 , 199.

Grace de Dieu, 1137.

Grassette, 36.

Gratiola, 35, 984.

Grattecul, 811.

Gremil, 279-281, 310, 622.

Grenadille, 1575.

Groscillier, 352, 353.

Guimauve, 1146.

Guy, 1674.

H.

HÉLIANTHEME, 863.

Héliotrope, 275.

Hellebore, 918, 404-405.

Helleborine, 1571, 1573.

Hépatique, 1857, 1872, 1874-1877, 1882.

Herbe à Gerard, 488.

Herbe à Paris, 635.

Herbe à Robert, 1138.

Herbe aux chats, 937.

Herbe aux cuilliers, 1059.

Herbe de Sainte Barbe, 1102.

Herbe de S. Christophe, 835.

Hêtre, 1644.

Houblon, 1679.

Houx frêlon, 1694.

Hydne, 2037-2041.

Hydroceratophyllon, 1629-1630.

Hypne, 1823, 1826, 1829-1830, 1835, 1839 ;
1842 ; 1849.

I.

JACÉE, 1428, 1508-1510, 1515-1518, 1522-1525.

Jacinthe, 544-546, 558-561.

Jacobée, 1441-1442, 1444, 1465, 1469.

Jasmin, 8-9.

If, 1692.

Illeceba, 729.

Impértoire, 472.

Jonc, 72, 78, 80-83, 363-374, 640.

Jongerman, 1850-1856, 1858-1864, 1861786-9,
1873.

Iris, 64-65, 68.

Isoëte, 1756.

Jusquiame, 343-344.

K.

KALI, 381-384.

L.

LAITRON, 1313-1318, 1322-1327, 1335. 1360
1361.

Laitue, 1328-1330.

Lamier, 950-951, 954, 957, 983.

Lampourde, 1616.

Lampfane, 1367-1368.

Langue de cerf, 1734.

Lapathum, 580-585.

Laferpitium, 446-447, 449.

Lavande, 938.

Lauréole, 619.

Ledon, 647.

Lentibulaire, 38.

Lentille, 6, 1220, 1585-1588, 1754.

Lepidium, 1062.

Leucoium, 517, 1106, 1108-1111.

Libanotis, 433, 442, 445, 475.

Lichen, 1870-1871, 1879-1881, 1883-1894. 1896-
1908, 1911-1923, 1925-1933, 1936-1940.

Liège, 1640.

Lierre, 554.

Lierre terrestre, 948.

Limonium, 504-506.

Tome IV.

- Linaire, 359, 1010, 1013-1020, 1023, 1414.
 Lin, 305, 507-509, 511-514.
 Liseron, 312-316, 633.
 Lobelle, 1538.
 Lonchite, 1729, 1742.
 Lotiet, 1275-1280, 1695, 1719.
 Lunaire, 1074, 1079-1080, 1727.
 Lupin, 1187.
 Luzerne, 1291-1293, 1296-1297.
 Lychnide, 576, 677, 691-701, 703, 736-738, 742.
 Lycope, 40, 1757-1759.
 Lys, 533.
 Lyfimachie, 303-304, 598-501, 752.

M.

- M**ARGUERITE, 1472-1477, 1479, 1485.
 Marrube, 40, 962, 964, 966, 970.
 Marrubiaftre, 968.
 Martagon, 534.
 Masse d'eau, 1589-1590.
 Matricaire, 1480-1481.
 Mauve, 1149-1150, 1153-1155.
 Melampyre, 915, 996, 998-1000.
 Melcze, 1650.
 Melilot, 1252-1253.
 Melisse, 978, 981-982.
 Menthe, 942-945, 972.
 Mercurielle, 1684-1685.
 Meum, 436.
 Millefeuille, 37, 302, 1494, 1497, 1499, 1632.
 Millepertuis, 1298-1308.
 Minfon, 1204.
 Mni, 1777-1778, 1780, 1782-1783, 1785, 1878.
 Moisidure, 2068-2069, 2071-2076.
 Moly, 524-525.

Morelle, 747.

Morille, 2025-2026, 2028-2029, 2031, 2033-2036,
2042.

Mors du diable, 204.

Morsgeline, 31-33, 271, 500-501, 578, 689, 704,
718.

Moschatelline, 636.

Moschatelle, 666.

Mouron, 26, 306, 309, 330.

Moufle, 1760-1770, 1772-1776, 1779, 1781, 1784,
1788-1789, 1791-1792, 1794-1798, 1801-1803,
1805, 1809-1811, 1813, 1815, 1816-1822,
1824-1825, 1827-1828, 1831-1832, 1834, 1836-
1838, 1840-1841, 1843-1848, 1865-1866, 1910,
1935, 1940, 1973, 1975.

Moutarde, 1123-1124.

Musse de veau, 1009, 1011-1012, 1018, 1021-1022.

Muguet, 553, 557.

Mûrier, 1625.

Myagrum, 1036, 1038-1039.

Myosotique, 739-740, 743.

Myrrhis, 466-468.

Myrtille, 602 603.

N.

NAPEL, 864.

Narcisse, 518-522.

Nard, 93.

Navet, 1118.

Nayade, 1655.

Néflier, 797, 800-801.

Nénuphar, 845-846, 1686.

Nerprun, 348.

Nez coupé, 495.

Nid d'oiseau, 1563.

Nielle, 870-872.

Noisetier, 1646.

Nostoch , 1947.

Nummulaire , 307-308.

O.

OIL de bœuf , 1500-1501 , 1503.

Oillet , 130 , 194 , 503 , 523 , 672-674 , 679-688 ,
705 , 735 , 741 , 745.

Olivier , 13.

Olivier sauvage , 250.

Onagra , 596.

Ophioglosse , 1726.

Orchide , 1560-1562.

Origan , 973.

Orme , 385.

Orobanche , 1002 . 1031-1033.

Orobe , 1190-1195 , 1224.

Ophrisse , 1565-1570.

Orchide , 1547-1559 , 1572.

Oreille d'ours , 297.

Orge , 184 , 188.

Ornithogalle , 539-543.

Orobanche , 1564.

Orpin , 720-721.

Ortie , 949 , 953 , 1622-1624.

Orvale , 44-47.

Oseille , 586-588.

Osier , 1669.

Osmonde , 1728.

P.

PAIN de pourceau , 300.

Panais , 481.

Panis , 96-100.

Pariétaire , 1707.

Paronychia , 356.

Pas d'âne , 1411 , 1435.

Passerage , 1049.

- Pastel , 1130.
 Pavor , 841 , 844.
 Pavot cornu , 837-839.
 Pédiculaire , 1004-1007.
 Peigne de Vénus , 324 , 464.
 Pensée , 1545.
 Percefeuille , 406 , 408.
 Percepierre , 413.
 Persicaire , 627 , 630.
 Pervenche , 360-361.
 Pesse d'eau , 3.
 Petasite , 1436-1437.
 Peuplier , 1681 , 1683.
 Pezi , 2048-2051.
 Petite Centaurée , 393-394 , 397-398.
 Phalangium , 549-550.
 Pied d'alouette , 865.
 Pied de chat , 1415 , 1421 , 1424-1426 , 1529-1534.
 Pied de lion , 252-254 , 670.
 Pied d'oiseau , 1238.
 Pied d'oie , 399.
 Pied de veau , 1580-1581.
 Pillulaire , 1755.
 Piloselle , 1113 , 1344-1346.
 Pimprenelle , 246 , 1635-1637.
 Pin , 1647-1649.
 Pistache , 1677.
 Pivoine , 864.
 Plantain , 235-239 , 241 , 243 , 591-592 , 594 , 1030.
 Platanaire , 1591.
 Poherbe , 133-135 , 137-139 , 142.
 Poirier , 802.
 Pois , 1188-1189.
 Polygonum , 357 , 515 , 576 , 631-632 , 607.
 Polypode , 1740.
 Polium , 931-934.
 Polygale , 1161-1163.

- Polytic , 1736 , 1771.
 Pommier , 803.
 Porreau , 528.
 Potentille , 819 , 826.
 Pouliot , 946-947.
 Pourpier , 193 , 751 , 1708.
 Presse , 638 , 1721-1725 , 1943-1945.
 Primevere , 295-296 , 298.
 Pronier , 788-790.
 Psyllium , 244.
 Ptarmique , 1495-1496.
 Pulmonaire , 286 , 1909.
 Pulsatille , 876.
 Putier , 784.
 Pyracanthe , 798.
 Pyrethre , 1491.
 Pyrole , 595 , 651-655.

Q.

- Q**UEUE de pourceau , 437.
 Queue de souris , 517.
 Quintefeuille , 820-825.

R.

- R**AIFORT , 1061.
 Raiponce , 319-320 , 427-329 , 1536.
 Rapistre , 1035 , 1122 , 1127-1128.
 Rave , 1119.
 Réglisse , 1231 , 1242.
 Reine des prés , 805.
 Reine des bois , 224.
 Renoncule , 402 , 593 , 879-880.
 Renouée , 365 , 1693.
 Reseda , 757-761.
 Rhamnoide , 1675.
 Rhapontic , 639.

Rubéole, 213, 222.

Rhododendron, 646.

Rhubarbe, 587.

Rhue, 643, 1026.

Rhue de murailles, 1738.

Ris, 187.

Ronce, 815-817.

Roquette, 1091, 1093, 1096-1097, 1111, 1125.

Rose, 806-810, 812-813.

Roseau, 173-174, 177, 562.

Rosée du Soleil, 516.

Rosmarin, 42, 645.

S.

SABOT de Marie, 1574.

Safran, 60.

Sagittaire, 1633.

Salicaire, 753-754.

Salicor, 1.

Sanicle, 342, 403.

Sapin, 1651.

Saponaire, 674, 676, 678.

Sarrafin, 634.

Sarrette, 1375.

Sarriette, 935-936.

Sauge, 43, 925.

Saule, 1657-1671.

Saxifrage, 485, 659, 661-663, 665, 702.

Scabieuse, 198, 203, 205-212, 1513.

Scammonée, 362.

Sceau de Notre-Dame, 1574.

Sceau de Salomon, 537, 554-556.

Scirpe, 84, 86-89.

Scordium, 927.

Scorpioïde, 1239.

Scorfonete, 1315-1317.

Scrophulaire, 1024-1025.

Sedum, 273-274, 293-294, 667-668, 721-732, 782-783.

Seigle, 183.

Semence de punaise, 4.

Senecion, 1438-1440, 1443, 1445-1446.

Serpolet, 974.

Seseli, 412, 414, 431, 438, 448, 473, 477.

Sideritis, 952.

Sion, 453-454, 456, 462, 2080.

Sifymbrie, 1090, 1092, 1094-1095.

Smyrnium, 482.

Soldanelle, 299.

Sorbier, 791, 795-796.

Souchet, 69, 74-75, 1602, 1614.

Soucy, 1527-1528.

Sonde, 2.

Spetgule, 746.

Sphondyle, 750-751.

Stachique, 958-961, 963.

Stœchas, 1413, 1422-1423.

Staphysaigre, 865.

Stellaire, 51.

Suction, 185.

Sureau, 491, 493-494.

T.

T ABAC, 345.

Tamarisc, 496-497.

Tanaïse, 1498.

Terre-noix, 428.

Teuctium, 930.

Thaliëtron, 885-889.

Thapsie, 480.

Thérébinthe, 1678.

Thlaspi, 1039, 1052-1057, 1064-1072, 1075-1078.

- Thora , 899.
 Thym , 41 , 975 , 977.
 Thymelée , 616-618 , 621 , 633.
 Tilleul , 847.
 Tithymale , 766-769 , 771-773 , 775-781.
 Tormentille , 829.
 Tournesol , 1652.
 Tréfle , 874 , 1251 , 1254-1274 , 1281-1282 , 1287 ,
 1289-1290 , 1294-1295.
 Tréfle d'eau , 301.
 Tremble , 1682.
 Tremelle , 1946 , 1949-1970 , 1972 , 1974 , 1976.
 Tribule , 644.
 Troëscne , 10.
 Truffe , 2060-2061.
 Tulippe , 538.
 Turquette , 253 , 364.

V.

- V**ALERIANE , 50-59 , 317.
 Vallisnaire , 1656.
 Velar , 1100 , 1101 . 1105 , 1125.
 Verge d'or , 1447-1448 , 1454-1455.
 Véronique , 16-24 , 28-29 , 34.
 Verveine , 39.
 Vesce , 1196 , 1210-1219 , 1221 , 1223.
 Vesse-lou , 2062-2067.
 Vigne , 356.
 Violette , 1539-1544.
 Violier , 1107.
 Vioutne , 490.
 Viperine , 276 , 278 , 292.
 Usnée , 1934.
 Vulnéraire , 1185.

X.

XILOSTEON, 334-335.

Y.

YEPLÉ, 492.**Y**VIAC, 178-179, 434.

LISTE

Des plantes de quelques provinces de la France , dont le Flora n'a pas été imprimé , ou du moins ne l'a pas été séparément.

DANS l'avertissement que nous avons placé au commencement de notre *Flora Gallica* , nous avons annoncé que nous le diviserions en deux parties : dans la première nous devions rapporter simplement la liste des plantes , ce que nous avons réellement exécutés ; la seconde étoit destinée à une table alphabétique des différentes provinces & lieux du Royaume où se trouvent les principales , avec des renvois aux différens numéros de la première partie : l'empressement avec lequel le public désire se procurer les deux derniers volumes de cet ouvrage , nous empêche de mettre à exécution ce projet ; il nous auroit fallu plus de deux ans , tant pour rédiger cette table que pour la faire imprimer ; la difficulté de l'impression & de la correction d'autant de chiffres qui s'y seroient trouvés , auroit exigé un temps infini , & il n'en seroit pas résulté un grand avantage pour le public. Nous avons pensé , & plusieurs savans nous l'ont même conseillé , qu'il ne falloit qu'indiquer les *Flora* particuliers imprimés , qui nous avoient servis à former notre *Flora* général , pour qu'on y puisse avoir recours dans le besoin ; & quant à ceux qu'on nous avoit communiqués , & qui ne se trouvent pas imprimés , qu'il suffisoit uniquement de les faire imprimer à la suite de notre *Flora* général , plutôt que d'y joindre une table qui ne seroit pas à la portée de tout le monde , qui ennuyeroit même le lecteur , & dont le moindre

changement de chiffre pouvoit induire dans une erreur grossière. Nous allons en conséquence rapporter tous les mémoires particuliers & manuscrits qu'on nous a fournis sur les différentes provinces du Royaume, & nous marquerons en même temps notre reconnoissance aux Botanistes qui nous en ont fait part, en les faisant connoître : nous extrairons ensuite des différens traités généraux & collections Académiques tout ce qui peut nous éclaircir sur les endroits où les plantes les plus rares de la France croissent. Les *Flora* particuliers qui se trouvent actuellement imprimés sont ceux de Paris, de Montpellier, d'Alsace, de Provence, de Lorraine, des environs d'Estampes & de Dijon; ceux d'Auvergne, de Berri, du Roussillon & du diocèse de Narbonne, sont insérées dans la collection de l'Académie des Sciences, d'où nous les extrairons ici en faveur de ceux qui ne veulent pas se procurer cet excellent ouvrage. Les plantes du Poitou se trouvent indiquées dans le *Flora* des environs d'Estampes, par M. Guettard, dont nous venons déjà de parler, il sera conséquemment inutile de les rappeler ici. Nous extrairons des Instituts de Tournefort tout ce qui regarde les plantes des Alpes & des Pyrénées, pour en rédiger deux espèces de *Flora* particuliers, qui seront placés dans cet ouvrage. Les plantes des environs de Lyon sont rapportées dans les démonstrations Botaniques à l'usage des Ecoles vétérinaires, de même qu'une partie de celles du Dauphiné, nous n'en ferons donc nulle mention.



LISTE DES PLANTES

DE LA GÉNÉRALITÉ DE SOISSONS,

*Communiquée par M. Petit, Médecin ordinaire de
Monseigneur le Duc d'Orléans, & rangée
par ordre alphabétique.*

- A**
ABROTANUM campestre cauliculis albicantibus. *Pin.* 136.
Acer montanum candidum. *Pin.* 430.
Acer montanum candidum fructu rubente.
Acer campestre & minus. *Pin.* 431.
Acetosa pratensis. *Pin.* 114.
Acetosa arvensis lanceolata. *Pin.* 114.
Acetosa arvensis minima non lanceolata. *Pin.* 114.
Agaricus pedis equini facie. *Tourn.*
Agrimonia officinarum. *Tourn.*
Alcea vulgaris major. *Pin.* 316.
Alcea folio rotundo laciniato. *Pin.* 316.
Alcea amplissimo folio laciniato. *J. B.* 2. 1067.
Alcea hirsuta. *Pin.*
Alchimilla montana minima. *Col. part. 1.* 146.
Alchimilla supina gramineo folio, minore flore. *Tourn.*
Alchimilla gramineo folio, flore majore. *Tourn.*
Alchimilla linariae folio, calice florum albo. *Tourn.*
Alga graminea fluviatilis longissimo folio. *Tourn.*
Alkekengi officinarum. *Tourn.*
Allium sylvestre latifolium. *Pin.* 74.
Allium montanum capite rotundo. *Pin.* 75.
Alnus rotundifolia glutinosa viridis. *Pin.* 428.
Alnastrium gratiolae folio. *Tourn.*
Alfene media. *Pin.* 250.
Alfene minor multicaulis. *Pin.* 250.
Alfue plantaginis folio. *J. B.* 3. 364.
Alfene tenuifolia. *J. B.* 3. 364.
Alfene segetalis graminea folio glabro multiflora. *Rai. hist.* 3. 500.
Alfene hyperici folio. *Vaill.*
Alfene qui cariophyllus holosteus arvensis medius. *Rai. synop.* 307.

Alfene arenaria dicta. Hort. 16.

Alfene pratensis gramineo folio angustiore. Tourm.

Alfene verna glabra floribus umbellatis albis. Tourm.

Alfene altissima nemorum. Pin. 250.

*Alfene palustris exigua flosculis albis, foliis lanceolatis plantæ
ginellæ aquaticæ jussur. Menz.*

Alfene minima flore fugaci. Tourm.

*Alfene palustris minima flosculis albis fructu coriandri exiguo.
Menz.*

Alfene spergula dicta major. Pin.

*Alfene spergulæ facie minor, sive spergula minor flosculo sub-
cæruleo. Pin. 251.*

Alfene verna glabra. Bot. Monsp.

Alfene aquis innatans foliis longiusculis. J. B.

Althæa Dioscoridis & Plinii. Pin. 315.

Alysson perenne montanum incanum Tourm.

Alysson incanum luteum serpilli folio majus. Tourm.

Alysson incanum serpilli folio minus. Tourm.

Alysson vulgare polygoni folio caule nudo. Tourm.

Alysson segetum foliis auriculatis acutis. Tourm.

Amaranthus sylvestris & vulgaris. Tourm.

Ammi majus. Pin. 159.

*Ammi majus foliis plurimum incisus & non nihil crispis. Pin.
159.*

Anacampteros purpurea. J. B. 3. 682.

*Amblatum. Cord. hist. 29. Orobanche radice dentata major.
Pin. 28.*

Anagallis phœniceo flore. Pin. 250.

Anagallis cæruleo flore. Pin. 252.

Androsamum maximum frutescens. Pin. 280.

Angelica sylvestris minor sive epratrica. Pin. 155.

Angelica pratensis apii folio. Tourm.

Angelica pratensis apii folio altera. Tourm.

Anonis spinosa flore purpureo. Pin. 389.

Anonis viscosa spinis carens lutea major. Pin. 389.

Anonis flore luteo parvo. Hort. reg. Paris.

Antirrhinum arvense majus. Pin. 212.

Aparine vulgaris. Pin. 334.

Aparine latifolia humilior montana. Tourm.

Aparine supina pumila flore cæruleo. Tourm.

Aparine minima. Bot. Monsp.

Aphaca. Lob. Icon. 70.

Apium palustre & apium officinarum. Pin. 154.

Aquifolium sive agrifolium vulgo J. B. 1. 114.

Aquilegia sylvestris. Pin. 114.

Aristolochia clematidis recta. Pin. 307.

Artemisia vulgaris major caule & flore purpurascens. *Pin.*

137.

Arum. *J. B.* 2. 783.

Arum maculatum maculis nigris & candidis. *Pin.* 195.

Arundo sylvatica elatiore panicula molli, candida, & serici modo lucens. *Hist. Oxon.* 3.

Asarum *Dod. pempt.* 338.

Asclepias albo flore. *Pin.* 303.

Asclepias angustifolia flore flavescente. *H. r. p.*

Asparagus sylvestris tenuissimo folio. *Pin.*

Asperugo vulgaris. *Tourn.*

Asplenium sive ceterach. *J. B.* 3. 749.

Aster palustris luteus folio longiore lanuginoso. *Tourn.*

Aster arvensis caeruleus acris. *Tourn.*

Aster luteo flore, aliis conyzæ species. *Épist.* 307.

Aster pratensis autumnalis conyzæ folio. *Tourn.*

Aster palustris parvo flore globoso. *Tourn.*

Aster montanus luteus salicis folio glabro. *Pin.* 166.

Aster omnium maximus helenium dictus. *Tourn.*

Aster incanus verbasci folio villosus. *Tourn.*

Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris sive sylvestris.

Mor. hist.

Atriplex folio hastato sive deltoide. *Morif.*

Atriplex angusto oblongo folio. *Pin.* 119.

Anemone sylvestris alba major. *Pin.* 176.

Aconitum caeruleum, seu napellus. 1. *Pin.* 183.

Ballota. *Matth.* 325.

Belladonna majoribus foliis & floribus. *Tourn.*

Bellis sylvestris minor. *Pin.* 261.

Berberis dumetorum. *Pin.* 452.

Beronica purpurea. *Pin.* 325.

Betonica alba. *Pin.* 235.

Betonica arvensis annua flore ex albo flavescente. *Tourn.*

Betula. *Dod. pempt.* 339.

Bidens foliis tripartitis divisis. *Casalp.* 482.

Bidens folio non dissecto. *Casalp.* 483.

Blattaria lutea folio longo laciniato. *Pin.* 140.

Blitum sylvestre spicatum. *Tourn.*

Boletus esculentus. *Tourn.*

Boletus phalloides. *Tourn.*

Brunella major folio non dissecto. *Pin.* 240.

Brunella major folio non dissecto flore albo. *Pin.* 261.

Brunella folio laciniato flore albo. *H. r. paris.*

Brunella caerulea magno flore. *Pin.* 161.

Brunella folio laciniato flore purpureo. *Pin.* 161.

Bryonia aspera sive alba baccis rubris. *Pin.* 397.

- Buglossum sylvestre minus. Pin. 256.*
Buglossum angustifolium majus. Pin. 256.
Buglossum arvense annuum lithospermum folio. Tourn.
Buglossum angustifolium semine ciliato. Tourn.
Bugula sylvestris villosa flore caeruleo. Tourn.
Bugula sylvestris villosa flore suave rubente. Tourn.
Bugula sylvestris villosa flore albo. Tourn.
Bugula. Dod. pempt. 135.
Bulbocastanum majus folio apii. Pin. 162.
Bupleurum folio subrotundo, sive vulgarissimum. Pin. 278.
Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum. Tourn.
Bursa pastoris major folio sinuato. Pin. 108.
Butomus. Clus. 533.
Butomus flore albo. Tourn.
Calamintha humilior flore rotundiore. Tourn.
Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ. Pin. 118.
Caltha arvensis. Pin. 276.
Campanula radice esculenta flore caeruleo. h. r. p.
Campanula angustifolia caerulea. J. B. 2. 803.
Campanula angustifolia alba. J. B. 2. 802.
Campanula arvensis cresta. h. r. p.
Campanula arvensis procumbens. Tourn.
Campanula hortensis rapunculi radice. Pin. 94.
Campanula minor rotundifolia vulgaris. Pin. 95.
Eadem flore albo. Pin. 93.
Campanula pratensis flore conglomerato. Pin. 94.
Campanula vulgarior foliis urticæ, vel major & asperior. Pin. 94.
Caprifolium germanicum. Dod. pempt. 411.
Cardamine pratensis magno flore purpurascens. Tourn.
Eadem flore albo.
Cardiaca. J. B. 3. 320.
Cardus stellatus sive calcitrapa. J. B. 3. 39.
Cardus stellatus luteus foliis cyani. Pin. 387.
Cardus stellatus foliis integris serratis. Bot. Monsp.
Cardus nutans. J. B. 3. 56.
Eadem flore albo.
Cardus lanceolatus latifolius. Pin. 385.
Cardus caule crispo. J. B. 3. 59.
Cardus acanthoides. J. B. 3. 56.
Cardus tomentosus acanthi folio vulgaris. Tourn.
Cardus lanceolatus latifolius flore albo. h. r. p.
Cardus albis maculis notatus vulgaris. Pin. 381.
Cardus capite rotundo tomentoso. Pin. 382.
Carlina sylvestris vulgaris. Clus. hist. 156.
Carpinus. Dod. pempt. 341.

Cervi. Cas. 291.

Caryophyllata vulgaris. Pin. 321.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. Pin. 209.

Caryophyllus sylvestris barbatus. Pin. 209.

Caryophyllus sylvestris prolifer. Pin. 209.

Caryophyllus simplex lupinus latifolius. Pin. 208.

Cassida palustris vulgarior flore caruleo. Tourn.

Cassida palustris minima purpurascente flore. Tourn.

Castanea sylvestris quæ peculiariter castanea. Pin. 419.

Cataria major vulgaris. Tourn.

Caucalis arvensis echinata magno flore. Pin. 150.

Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu. Pin. 152.

Caucalis arvensis echinata latifolia. Pin. 158.

Centaurium minus. Pin. 278.

Centaurium purpureum minimum. Moris.

Centaurium palustre luteum minimum. Rai. Hist.

Centaurium luteum perfoliatum. Pin. 278.

Cepa sylvestris tenuifolia prolifera. Tourn.

Cepa montana bicornis flore obsoletiore. Tourn.

Cerasus sylvestris amara mâhaléb putata. J. B. 1. 227.

Chrozophyllum sylvestre perenne cicutæ folio. Tourn.

Chrozophyllum sylvestre feminibus brevibus hirsutis. Tourn.

Chamædis minor repens. Pin. 248.

Chamædis laciniatis foliis. Lob. Icon. 395.

Chamædis fruticosa sylvestris melissæ folio. Tourn.

Chamædis palustris canescens seu scordiun officinarum. Tourn.

Chamæmelum nobile seu leucanthemum odoratius. Pin. 135.

Chamæmelum lusitanicum latifolium sive coronopi folio. Brein.

Chamæmelum vulgare leucanthemum Dioscoridis. Pin. 135.

Chamæmelum foetidum. Pin. 135.

Chamæmelum inodorum. Pin. 135.

Chamæmelum majus folio tenuissimo caule rubente. L. r. Monsp.

Chamæmelum majus folio tenuissimo caule rubente flore pleno. Tourn.

Chamænerion latifolium vulgare. Tourn.

Chamænerion villosum magno flore purpureo. Tourn.

Chamænerion majus villosum parvo flore. Tourn.

Chamænerion glabrum majus. Tourn.

Chamænerion glabrum minus. Tourn.

Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro. Pin. 451.

Chamæpytis lutea vulgaris sive folio trifido. Pin. 249.

Chelidonium majus vulgare. Pin. 144.

Chelidonium majus foliis quernis. Pin. 144.

Chenopodium folio sinuato candicante. Tourn.

Chenopodium foetidum, Tourn.

Chenopodium pes anserinus primus, Tabern. Icon 427.

Chenopodium pes anserinus secundus, Tabern. Icon. 428.

Chenopodium betæ folio Tourn.

Chenopodium angustifolium laciniatum minus. Tourn.

Chenopodium stramonii folio.

Chenopodium annuum humifusum folio breviori & capillaceo, Tourn.

Chenopodium folio triangulo Tourn.

Chondrilla juncea viscosa arvensis quæ prima Dios. Pin. 170.

Chondrilla sonchi folio, flore luteo pallescente. Tourn.

Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa, Hist. oxon.

Chrysanthemum segetum. Lob. Icon. 552.

Cichorium sylvestre sive officinarum. Pin. 125.

Cichorium sylvestre flore roseo. Pin. 126.

Cichorium sylvestre platycaulon.

Cicuta major, Pin. 160.

Cicuta minor petroselino similis. Pin. 160.

Circæa luteriana. Lob. Icon. 266.

Cirsium arvense sonchi folio, radice repente, flore purpurascente. Tourn.

Cirsium arvense, sonchi folio, radice repente, flore albo. Tourn.

Cirsium acaulos, flore purpureo. Tourn.

Cirsium palustre polycephalon vulgare. Tourn.

Cirsium majus singulari capitulo magno vel incanum varie dissectum. Pin. 377.

Clematidis sylvestris latifolia. Pin. 300.

Clematidis sylvestris latifolia foliis non incis. Tourn.

Clinopodium origano simile elatius majore flore. Tourn. 225.

Clinopodium arvense ocymi facie. Pin. 225.

Idem floribus albis.

Clymenum parisiense flore cæruleo. Tourn.

Cnicus atrastilis lutea dictus. h. Lugd. Bat.

Cnicus pratensis acanthi folio, flore flavescente. Tourn.

Cnicus pratensis acanthi folio flore purpureo. Tourn.

Cnicus pratensis foliis inferioribus integris, superioribus laciniatis.

Cæruleus humilis & minor, Tourn.

Colchicum commune. Pin. 67.

Convolutulus major albus. Pin. 294.

Convolutulus minor arvensis flore roseo, Pin. 295.

Convolutulus minor arvensis flore candido. Pin. 284.

Convolutulus minor arvensis flore cum purpureo umbilico. Pin

- Conferva Plinii. Lob. Icon. 257.*
Conyza major vulgaris. Pin. 265.
Conyza linaria folio. Tourn.
Coralloides albida. Tourn.
Coralloides flava. Tourn.
Coralloides dilute purpurascens. Tourn.
Coralloides cornua cervi referens corniculis brevioribus. Tourn.
Coralloides cornua cervi referens corniculis longioribus. Tourn.
Coralloides glabra corniculis tenuioribus bifurcatis. Tourn.
Coralloides cornua damæ referens. Tourn.
Coralloides corniculis candidissimis. Tourn.
Cornus hortensis mas. Pin. 447.
Cornus foemina. Pin. 447.
Coronilla minima. Tourn.
Coronilla herbacea flore vario. Tourn.
Coronopus hortensis. Pin. 190.
Corylus sylvestris. Pin. 418.
Cratægus folio laciniato. Pin.
Cratægus folio subrotundo serrato. Tourn.
Cruciata hirsuta. Pin. 335.
Cruciata palustris alba. Tourn.
Cruciata minima. Tourn.
Cucubalus plinii. Lugd. 1429.
Cuscuta minor. Tourn.
Cyanus segetum flore cæruleo. Pin.
Cynoglossum vulgare majus. Pin. 257.
Cynoglossum vulgare majus flore albo. Pin. 257.
Cyperoides latifolium spicâ rufa sive caule triangulo. Tourn.
Cyperoides spicâ pendula brevior. Tourn.
Cypetoides vesicarium humile locustis ratoribus. Tourn.
Cyperoides palustre aculeatum capitulo brevior. Tourn.
Cyperoides polystachion lanuginosum. Tourn.
Cyperoides vesicarium glabrum spica pendula longior. Tourn.
Cyperoides spicis parvis longe distantibus. Pin.
Cyperoides polystachion spicis teretibus erectis. Tourn.
Cyperoides nigro-luteum vernum majus. Tourn.
Cyperoides minus spicis densioribus. Tourn.
Cyperus vulgarior panicula sparsa. Tourn.
Cyperus odoratus radice longâ sive cyperus officinarum. Pin.
 14.
Cyperus minimus paniculâ sparsâ nigricante. Tourn.
Cyperus gramineus. J. B. 3. 504.
Cytiso-genista scoparia vulgaris flore luteo. Tourn.
Cytiso-genista scoparia vulgaris flore albo. Tourn.
Damasonium stellatum. Lugd. 1058.
Daucus vulgaris. Clus. hist. 198.

- Daucus annuus minor flosculis rubentibus. Tourn.*
Daucus annuus minor flosculis albis. Tourn.
Daucus annuus ad nodos floridus. Tourn.
Delphinium segetum flore caeruleo. Tourn.
Dens leonis latiore folio. Pin. 126.
Dens leonis angustiore folio. Pin. 126.
Dens leonis tenuissimo folio. Pin. 126.
Digitalis purpurea J. B. 2. 812.
Digitalis flore magno candido. J. B. 3. 813.
Digitalis major lutea vel pallida parvo flore. Pin. 244.
Digitalis minima gratiola dicta. Moris.
Dentaria heptaphyllos baccifera. Pin. 322.
Dipsacus sylvestris aut virga pastoris major. Pin. 385.
Dipsacus sylvestris capitulo minore vel virga pastoris minor. Pin. 385.
Doronicum plantaginis folio. Pin. 284.
Echium vulgare. Pin. 154.
Elychrysum ramosum aquaticum minus capitulis foliatis. Tourn.
Elychrysum sylvestre latifolium capitulis conglobatis. Pin. 264.
Elychrysum spicatum. Tourn.
Elychrysum montanum flore rotundiore subpurpureo. Tourn.
Elychrysum montanum flore candido. Tourn.
Elychrysum montanum longiore & folio, & flore purpureo. Tourn.
Elychrysum montanum longiore & folio & flore albo. Tourn.
Equisetum palustre majus. Tabern. Icon. 257.
Equisetum majus aquaticum. J. B. 3. 729.
Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermon. Pin. 15.
Equisetum foetidum sub aqua repens. Pin. 16.
Equisetum foliis nudum non ramosum sive junceum. Pin. 26.
Erica vulgaris glabra. Pin. 485.
Erica vulgaris glabra flore albo. Pin. 485.
Erica myricæ folio hirsuta. Pin. 485.
Erica humilis cortice cinereo arbuti flore. Pin. 486.
Erica humilis cortice cinereo arbuti flore albo. v. r. p.
Erica Brabantica folio caris hirsuto quaterno. J. B. 1. 358.
Erica major scaparia foliis deciduis. Pin. 485.
Eruca sylvestris minor lutea Barfæ pastoris folio. Pin. prodv. 39.
Eruca tenuifolia perennis flore luteo. J. B. 2. 861.
Eruca procumbens alba siliquis singularibus in foliorum alis.
Eryngium vulgare. Pin. 386.
Erysimum vulgare. Pin. 100.
Erysimum latifolium majus glabrum. Pin. 101.
Evonymus granis rubentibus. Pin. 428.

- Eupatorium cannabinum.* *Pin.* 320.
Euphrasia officinarum. *Pin.* 233.
Euphrasia ramosa pratensis flore albo. *Pin.*
Fagopyrum vulgare scandens. *Tourn.*
Fagopyrum vulgare erectum. *Tourn.*
Fagus. *Dod. pempt.* 832.
Ferrum equinum germanicum siliquis in summitate. *Pin.* 349.
Filago seu impia. *Dod. pempt.* 6.
Filago altera. *Dod. pempt.* 67.
Filago vulgaris tenuissimo folio erecto. *Tourn.*
Filicula quæ adiantum nigrum officinarum pinnulis obtusioribus. *Tourn.*
Filicula fontana major sive adiantum album filicis folio *Pin.* 358.
Filicula regia fumariz pinnulis.
Filicula fontana adianti facie latifolia dentata. *Schol. bot.*
Filipendula vulgaris an melon. *Pin.* 163.
Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis. *Pin.* 357.
Filix non ramosa dentata. *Pin.* 358.
Filix non ramosa latifolia dentata. *Tourn.*
Filix mollis sive glabra vulgari mari non ramosæ accedens. *J. B.* 3. 739.
Filix non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissime dentatis. *Pin.* 358.
Filix minor non ramosa *J. B.*
Filix querna. *Pin.* 358.
Filix ramosa montana minor argute denticulata. *Rai. synopsis.* 49.
Fluvialis piscanz foliis denticulatis. *J. B.* 3. 779.
Fœniculum sylvestre perenne ferulæ folio breviori. *Tourn.*
Fœniculum sylvestre elatius ferulæ folio longiori. *Tourn.*
Fœniculum minimum patulum. *Tourn.*
Fœnum græcum sylvestre alterum polyceration. *Pin.* 348.
Fragaria sterilis. *Pin.* 327.
Fragaria sterilis incana. *h. r. p.*
Fragaria vulgaris. *Pin.* 326.
Frangula. *Dod. pempt.* 784.
Fraxinus excellior. *Pin.* 416.
Fucus tubulosus intestinorum formâ. *Tourn.*
Fumaria officinarum & Dioscoridis. *Pin.* 143.
Fumaria major scandens foliorum pediculis flore majore ac pallidior. *Morif. hist.* 261.
Fumaria minor tenuifolia cauliculis surrectis flore hilari purpurâ rubente. *Pin.* 143.
Fumaria segmentis foliorum longis, angustis & rarius dispositis.

- Fumaria* foliis tenuissimis floribus albis circa Monspelium nascens. *Pin.* 143.
- Fungus* piperatus albus, lacteo succo turgens *J. B.* 3. 825.
- Fungus* planus orbicularis aureus. *Pin.* 371.
- Fungus* angulosus & velut in lacinias sectus. *Pin.* 371.
- Fungus* porosus magnus crassus. *J. B.* 3. 833.
- Fungi albi lucentes ex uno principio plures, ex radicibus arborum. *J. B.* 3. 835.
- Fungi lutei perniciosi sub pino habitantes. *J. B.* 3. 832.
- Fungus* clypeiformis minor. *Pin.* 373.
- Fungi albi pileolo inverso. *J. B.* 3. 847.
- Fungus* pileo lato orbiculari candicante. *Pin.* 370.
- Fungus* pileolo lato & rotundo livido. *Pin.* 370.
- Fungus* aurantii coloris capitulo in conum abeunte. *Tourn.*
- Fungus* porosus magnus crassus ex fusco albicans. *J. B.* 3. 833.
- Fungus* porosus magnus crassus purpurascens. *Tourn.*
- Fungi verni mousserons dicti odorati & esculenti. *J. B.* 3. 823.
- Fungi multi ex uno pedo perniciosi. *J. B.* 3. 835.
- Fungi multi ex uno pede Clypeiformes rubri. *J. B.* 3. 835.
- Fungoides infundibuli formâ semine foetum. *Tourn.*
- Galeopsis* procerior cauliculis aculeatis, flore purpurascens. *Tourn.*
- Galeopsis* sive urtica iners flore luteo. *J. B.* 3. 323.
- Galeopsis* palustris betonicæ folio flore variegato. *Tourn.*
- Galeopsis* procerior foetida spicata. *Tourn.*
- Galeopsis* patula segetum flore purpurascens. *Tourn.*
- Galium* luteum. *Pin.* 335.
- Galium* album vulgare. *Tourn.*
- Genista* tinctoria germanica. *Pin.* 395.
- Genista* ramosa foliis hyperici. *Pin.* 395.
- Genista* spartium majus brevioribus & longioribus aculeis. *Tourn.*
- Genista* minus anglicum. *Tourn.*
- Genista* minus Germanicum. *Tourn.*
- Genistella* herbacea sive chamæspartium. *J. B.* 3. 393.
- Gentiana* cruciata. *Pin.* 188.
- Gentiana* angustifolia autumnalis major. *Pin.* 188.
- Gentiana* foliis centaurei minoris. *Tourn.*
- Geranium* folio malvæ rotundo. *Pin.* 318.
- Geranium* columbinum tenuius laciniatum. *Pin.* 318.
- Geranium* columbinum minus majore flore & foliis florum bifidis *Bot. monsp.*
- Geranium* columbinum majus foliis tenuiter dissectis foliis florum bifidis. *Bot. monsp.*
- Geranium* cicutæ folio minus & supinum. *Pin.* 319.
- Idem flore albo. *Pin.* 319.

- Geranium sanguineum maximo flore. *Pin.* 318.
 Geranium lucidum saxatile. *Pin.* 318.
 Geranium robertianum 1. rubens. *Pin.* 319.
 Glaucium flore luteo. *Tourn.*
 Glaux palustris flore striato clauso, foliis portulacæ. *Tourn.*
 Globularia vulgaris. *Tourn.*
 Gramen pratense paniculatum majus latiore folio poa Theophrasti *Pin.* 2.
 Gramen pratense vulgare spicâ fere arundinacea magnâ. *J. B.* 2. 461.
 Gramen pratense paniculatum majus angustiore folio. *Prodr.* 5.
 Gramen pratense paniculatum medium. *Pin.* 2.
 Gramen pratense paniculatum minus album. *Pin.* 3.
 Gramen pratense paniculâ duriore laxa unam partem spectante *Rai. hist.*
 Gramen in uxoribus dalechampii. *Lugd.* 428.
 Gramen spicâ hirsuta ad gramen duyros accedens. *J. B.* 3. 438.
 Gramen avenaceum locustis villosis angustis candicantibus & aristatis. *Tourn.*
 Gramen avenaceum paniculâ sparsâ locustis majoribus & aristatis. *Tourn.*
 Gramen avenaceum panniculâ sparsâ locustis minoribus & aristatis. *Tourn.*
 Gramen pratense paniculatum altissimum locustis parvis splendentibus non aristatis. *Tourn.*
 Gramen avenaceum pratense elatius panicula flavescente, locustis parvis. *Rai. hist.*
 Gramen avenaceum panicula flavescente densiori, locustis minimis tenuiter aristatis & quasi villosis. *Tourn.*
 Gramen spicatum folio aspero. *Pin.* 3.
 Gramen arundinaceum acerosâ glumâ nostras. *Park.*
 Gramen nodosam avenacea panicula. *Pin.* 2.
 Gramen aquaticum fluitans multiplici spicâ. *Pin.* 3.
 Gramen angustifolium spicâ tritici muticæ simili. *B. prod.* 17.
 Gramen avenaceum elatius jubâ longâ. *Rai. synops.* 266.
 Gramen hordaceum minus & vulgare. *Pin.*
 Gramen loliaceum angustiore folio & spica. *Pin.* 9.
 Gramen arvense paniculâ crispâ. *Prod.* 3.
 Gramen xerampelinum milicâ prætenui, ramosâque sparsâ paniculâ sive xerampulin congener-arvense æstivum gramen minutissimo semine. *Lob.*
 Gramen minimum paniculis elegantissimis. *Pin.* 2.
 Gramen nemorosum paniculis albis capillaceo folio. *Pin.* 7.
 Gramen typhoides maximum spicâ longissimâ. *Pin.* 4.
 Gramen typhoides asperum primum. *Pin.* 4.
 Gramen phalaroides majus sive italicum. *Pin.* 4.

- Gramen avenaceum pratense elatius paniculâ flavescente locustis rubris. *Rai.* 1284.
- Gramen pratense cristatum sive gramen spica crustaceâ, laxe. *Pin.* 3.
- Gramen murorum spicis pendulis angustioribus. *Tourn.*
- Gramen festucae sterile elatius. *Tourn.*
- Gramen festucae sterile humilius. *Tourn.*
- Gramen festucae effusâ jubâ. *Tourn.*
- Gramen arundinaceum spicâ multiplici, xalanacosis dioscoridis. *Pin.* 6.
- Gramen tremulum majus. *Pin.* 2.
- Gramen loliaceum corniculatum. *Tourn.*
- Gramen aquaticum particulatum latifolium. *Pin.* 3.
- Gramen pratense caninum sive primum, sive gramen Dioscoridis & officinarum. *B. Theat.* 7.
- Gramen pratense paniculatum molle. *Pin.* 2.
- Gramen nodosum spicâ parvâ sive nodosum tertium. *Pin.* 2.
- Gramen phalaroides spicâ molli sive germanicum. *Pin.* 4.
- Gramen montanum paniculâ spadiceâ dellicatior. *Pin.* 2.
- Gramen arundinaceum spicatum. *Pin.* 6.
- Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *Pin.* 3.
- Gramen pratense spicâ purpureâ ex utriculo prodeunte, vel gramen folio spicam amplexante. *Pin.* 3.
- Gramen capillatum paniculis viridentibus. *J. B.* 2. 462.
- Gramen tremulum minus paniculâ parvâ. *Pin.* 2.
- Gramen spicâ secalinâ. *Pin.* 9.
- Gramen pratense spicâ flavescente. *Pin.* 3.
- Gramen spicâ brisæ minus. *Pin.* 9.
- Gramen dactylon folio latiore. *Pin.* 8.
- Gramen amoris dictum. *J. B.* 2. 470.
- Gramen segetum paniculâ arundinaceâ. *Pin.* 3.
- Gramen paniculatum aquaticum minus. *Rai. hist.* 1289.
- Gramen avenaceum dumetorum paniculâ sparsâ. *Rai. hist.* 1289.
- Gramen caninum longius radiculatum majus. *Pin.* 1.
- Gramen avenaceum minus procumbens paniculis non aristatis. *Rai. hist.* 1288.
- Gramen sylvaticum paniculâ meliaceâ sparsâ. *Pin.* 8.
- Gramen arundinaceum enode majus montanum. *Pin.* 7.
- Gramen pratense serotinum panicula longâ purpurascente. *Rai. hist.* 1288.
- Gramen paniculâ multiplici majus. *Pin.* 3.
- Gramen paniculâ multiplici minus. *Pin.* 3.
- Gramen legitimum. *Cusf. hist.* 2012.
- Gramen typhoides culmo echinato. *Pin.* 4.
- Gramen spicâ cristatâ subhirsutum. *Pin.* 3.

- Gramen nemorosum spica molli rufescente. *Pin.*
 Gramen spicatum angustifolium montanum. *Pin.* 4.
 Gramen loliaceum spica longiore. *Pin.* 9.
 Gramen loliaceum latifolium spica angustiore. *Pin.* 9.
 Gramen spartzum juncifolium. *Pin.* 5.
 Gramen spartzum. *Pin.* 5.
 Gramen spicatum junci facie, lythospermi facie. *Tourn.*
 Gramen cyperoides palustre majus spica compacta. *Pin.* 6.
 Grossularia simplicis acino vel spinosa sylvestris. *Pin.* 433.
 Grossularia non spinosa fructu nigro majore. *Pin.* 433.
 Hedera arborea. *Pin.* 305.
 Helianthemum vulgare flore luteo. *J. B.* 2. 15.
 Helianthemum foliis majoribus flore albo. *J. B.* 2. 16.
 Helianthemum flore maculoso. *Col. par.* 2. 77.
 Helianthemum foliis thymi floribus umbellatis. *Tourn.*
 Helianthemum tenuifolium glabrum humiliter luteo flore. *J. B.* 2. 18.
 Helianthemum vulgare flore sulphureo. *Tourn.*
 Heliotropium majus dioscoridis. *Pin.* 253.
 Heliotropium majus autumnale jasmini odore. *Tourn.*
 Helleborine latifolia montana. *C.* 67. 186.
 Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Pin.* 187.
 Helleborine palustris nostras. *Rai.* 1231.
 Helleborine flore albo, vel damasonium montanum latifolium. *Pin.* 187.
 Helleborus niger foetidus. *Pin.* 145.
 Herba Paris. *Dod. pempt.* 444.
 Herniaria glabra. *J. B.* 3. 378.
 Herniaria hirsuta. *J. B.* 3. 379.
 Hesperis allium redolens. *Morif. Hist.*
 Hieracium echinoides capitulis cardui benedicti. *Pin.* 128.
 Hieracium murorum folio pilosissimo. *Pin.* 129.
 Hieracium murorum laciniatum minus pilosum. *Pin.* 129.
 Hieracium dentis leonis folio obtuso majus. *Pin.* 127.
 Hieracium dentis leonis folio bulbosum. *Pin.* 127.
 Hieracium minus dentis leonis folio subaspero. *Pin.* 127.
 Hieracium amygdalas amaras olens, seu odore apuli suave rubentis. *Tourn.*
 Hieracium asperum majori flore in limitibus agrorum. *J. B.* 2. 1029.
 Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. *Pin.* 129.
 Hieracium fruticosum angustifolium majus. *Pin.* 129.
 Hieracium chondrillæ folio radice succisa majus. *Pin.* 127.
 Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro. *Pin.* 127.

- Hieracium alpinum latifolium maculatum hirsutie incanum* flore magno. *Pin.* 128.
Hieracium alpinum latifolium non maculatum hirsutie incanum flore majus. *Pin.* 128.
Hieracium crucæ folium hirsutum. *J. B.* 2. 1023.
Hieracium maximum crucæ folio. *Tourn.*
Hieracium minus folio subrotundo. *Pin.* 127.
Hieracium nigrum. *Tab. Icon.* 181.
Hieracium luteum hirsutum. *J. B.* 2. 1024.
Hieracium minus dioec. *Tabern.*
Hyacinthus oblongo flore ceruleus major. *Pin.* 43.
Hyacinthus anglicus cinericius. *Ajst.*
Hydrocotyle vulgaris. *Tourn.*
Hyosciamus vulgaris vel niger. *Pin.* 129.
Hydroceratophyllum folio aspero quatuor cornibus armato. *Ad. Acad. Scient.*
Hypericum vulgare. *Pin.* 279.
Hypericum minus erectum. *Pin.* 279.
Hypericum minus supinum vel supinum glabrum. *Pin.* 179.
Hypericum palustre supinum tomentosum. *Tourn.*
Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato. *J. B.* 3. 383.
Hypericum ascyrum dictum caule quadrangulo. *J. B.* 3. 382.
Hypericum villosum erectum caule rotundo. *Tourn.*
Hypoxylon excrementum ligni putridi fungosum digitatum. *Matth. Brund. Mentz.*
Hyssopus officinarum cærulea, seu spicata. *Pin.* 213.
Jacea nigra pratensis latifolia. *Pin.* 271.
Jacea nemorensis quæ ferratula vulgo. *Tourn.*
Jacea cum squammis pennatis sive capite villosa. *Tourn.*
Jacea cum squammis ciliis instar pilosis. *J. B.* 3. 29.
Jacea vulgaris laciniata flore purpureo. *Tourn.*
Jacea vulgaris laciniata flore albo. *Tourn.*
Jacobæa vulgaris laciniata. *Pin.* 131.
Jacobæa vulgaris foliis instar crucæ laciniatis. *Pin.* 131.
Jacobæa latifolia palustris seu aquatica. *Rai. hist.*
Jacobæa senecionis folio. *Morif.*
Jacobæa pannonica prima. *Clus.*
Jacobæa montana lanuginosa angustifolia non laciniata. *Pin.* 131.
Jacobæa foliis ferulaceis flore minore. *Tourn.*
Jacobæa palustris altissima foliis serratis. *Tourn.*
Jacobæa senecionis folio perennis. *Rai. hist.*
Imperatoria pratensis major. *Tourn.*
Iris palustris lutea sive acorus adulterinus. *J. B.* 2. 732.

- Iris fatidissima seu xytis. Tourn.*
Iris vulgaris germanica sive sylvestris. Pin. 30.
Isatis sylvestris vel angustifolia. Pin. 113.
Juncago palustris & vulgaris. Tourn.
Juncus lævis paniculâ sparsâ major. Pin. 12.
Juncus lævis paniculâ non sparsâ. Pin. 12.
Juncus villosus capitulis pŷlli. Tourn.
Juncus nemorosus latifolius major. Tourn.
Juncus angustifolius villosus floribus albis panniculatis. Tourn.
Juncus foliis articulatis floribus umbellatis cum utriculis. Tourn.
Juncus foliis articulatis floribus umbellatim & paniculatim dispositis. Tourn.
Juncus palustris humilior erectus. Tourn.
Juncus palustris humilior repens. Tourn.
Juncus cum pericarpis rotundis. J. B. 2. 522.
Juncus acumine reflexo major. Pin. 12.
Juniperus vulgaris fruticosa. Pin. 488.
Lactuca sylvestris costâ spinosâ. Pin. 123.
Lactuca sylvestris angustâ laciniato folio. Bot. monsp.
Lactuca perennis humilior flore cæruleo. Tourn.
Lactuca perennis humilior flore albo. Tourn.
Lamium vulgare album sive archangelica flore albo. Park.
Lamium purpureum foetidum folio subrotundo sive galeopsis. Diosc.
Lamium folio caulem ambiente minus. Pin. 231.
Lamplana. Dod. pempt. 675.
Lapathum folio acuto crispo. Pin. 115.
Lapathum folio minus acuto. Pin. 115.
Lapathum aquaticum folio cubitali. Pin. 116.
Lapathum minimum. Pin. 115.
Lappa major arctium Diosc. Pin. 198.
Lasercpitium foliis latioribus lobatis. Moris.
Lathyrus sylvestris major. Pin. 344.
Lathyrus arvensis repens tuberosus. Pin. 344.
Lathyrus sylvestris luteus foliis vicix. Pin. 344.
Lentibularia vulgaris. Tourn.
Lentibularia minor, sive millefolium palustre galericulatum minus flore minori. Pluk.
Lenticula palustris vulgaris. Pin. 362.
Lenticula aquatica trifolca. Pin. 392.
Lepidium latifolium. Pin. 97.
Leucanthemum vulgare. Tourn.
Leucocium luteum vulgare. Pin. 202.
Leucocium luteum montanum serrato folio. Pin. 201.

- Lichen Dioscorid. & Plin. secundus cinereo colore, *Col. part.*
1. 331.
Idem colore viridescente, *Col. part.* 1. 331.
Idem colore flavescente, *Col. part.* 1. 331.
Lichen crustæ modo arboribus adnascens pullus, *Tourn.*
Lichen crustæ modo arboribus adnascens tenuiter divisus,
Tourn.
Lichen cinereus latifolius aculeatus, umbilicis nigricantibus,
Tourn.
Lichen crustæ modo saxi adnascens verrucosus cinereus &
veluti densus, *Tourn.*
Lichen crustæ modo saxi adnascens cinereus, eleganter &
tenuiter laciniatus, *Tourn.*
Lichen nigricans omphalodes, *Tourn.*
Lichen arboreus sive pulmonaria arborea, *J. B.* 3. 759.
Lichen pulmonarius saxatilis maximus cinereus, *Tourn.*
Lichen pulmonarius saxatilis digitatus major cinereus, *Tourn.*
Idem minor, *Tourn.*
Lichen pulmonarius saxatilis cinereus minor umbilicis nigrican-
tibus, *Tourn.*
Lichen pulmonarius saxatilis è cinereo fuscus minimus, *Tourn.*
Lichen pulmonarius saxatilis rufescens superne planus, inferne
reticulatus, *Tourn.*
Lichen pulmonarius cinereus mollior in amplas lacinias divisus,
Tourn.
Lichen cinereus vulgaris capillaceo folio minor, *Tourn.*
Lichen cinereus cornua damæ referens, *Tourn.*
Lichen tubulatus cinereus, *Tourn.*
Lichen pixidatus corniculis aduncis, *Tourn.*
Lichen pixidatus teres acetabulis minoribus repandis, *Tourn.*
Lichen pixidatus ramosus acetabulis fimbriatis, *Tourn.*
Lichen pixidatus non ramosus acetabulis fimbriatis, *Tourn.*
Lichen pixidatus major, *Tourn.*
Lichen pixidatus minor, *Tourn.*
Lichen pixidatus acetabulorum oris coccineis & tumentibus,
Tourn.
Lichen pixidatus acetabulorum oris fuscis & tumentibus,
Tourn.
Lichen pixidatus prolifer, *Tourn.*
Lichen petras latifolius sive hepatica fontana, *Pin.* 362.
Ligustrum, *J. B.* 1. 523.
Lilium convallium album, *Pin.* 304.
Limodorum austriacum, *Clus.*
Linagrostis panniculâ ampliore, *Tourn.*
Linagrostis panniculâ minore, *Tourn.*

- Linagrostis spicâ singulari alopecuroides.*
Linaria vulgaris lutea flore majore. Pin. 212.
Linaria pumila supina lutea. Pin. 213.
Linaria pumila supina flore albido.
Linaria segetum nummulariæ folio villoso. Tourn.
Linaria segetum nummulariæ folio aurito & villoso flore ex-
ruleo. Tourn.
Idem flore luteo.
Linaria pumila vulgatioꝝ arvensis. Tourn.
Linaria minor repens & inodora. h. r. parif.
Linum sylvestre angustifolium floribus dilute purpurascens
vel cernuis. Pin. 214.
Linum pratense flosculis exiguis. Pin. 214.
Lithospermum majus erectum. Pin. 258.
Lithospermum arvense minus. Tourn.
Lithospermum palustre minus. Tourn.
Lithospermum arvense minus floribus luteis vel luteo exru-
leis. Tourn.
Lonchitis aculeata major. Tourn.
Lotus pentaphyllos flore majore luteo splendente. Pin. 332.
Lotus corniculata glabra minor. J. B. 2. 356.
Lotus corniculata hirsuta minor. J. B. 2. 356.
Lotus pratensis siliquosus luteus minor & mollior. Pin. 332.
Lotus pentaphyllos major hirsutie candicans. Pin. 332.
Lupulus mas. Pin. 298.
Lupulus femina. Pin. 298.
Luteola herba salicis folio. Pin. 100.
Lychnis sylvestris. Tabern. Icon. 293.
Lychnis sylvestris quæ beben album vulgo. Pin. 205.
Lychnis sylvestris quæ saponaria vulgo. Tourn.
Lychnis sylvestris angustifolia caliculis turgidis striatis. Pin.
205.
Lychnis viscosa flore muscoso minor. h. r. par.
Lychnis segetum rubra foliis perfoliatis. Pin. 204.
Lychnis pratensis flore laciniato simplici. Morif.
Lychnis pratensis flore laciniato pleno ampliore purpureo.
Tourn.
Lychnis segetum major. Pin. 204.
Lychnis annua minima flore carneo lincis purpureis distincto.
Tourn.
Lychnis sylvestris alba simplex. Pin. 204.
Lychnis sylvestris sive aquatica purpurea simplex. Pin. 204.
Lycoperdon vulgare. Tourn.
Lycoperdon minus & multiplex sphaericum. Tourn.
Lycoperdon minus & multiplex ovatum. Tourn.
Lycoperdon parisiense minimum pediculo donatum. Tourn.

Lycoperdon vesicarium stellatum. Tourn.

Lycopus palustris glaber. Tourn.

Lycopus palustris villosus. Tourn.

Lyfimachia lutea major, quæ dioscoridis. Pin. 245.

Lyfimachia humifusa folio subrotundo acuminato flore luteo. Tourn.

Lyfimachia humifusa folio rotundiore flore luteo. Tourn.

Eadem flore purpurascente. Tourn.

Malva vulgaris flore majore folio sinuato. J. B. 2. 949.

Malva vulgaris flore minore folio rotundo. J. B. 2. 949.

Marrubiastrum vulgare. Tourn.

Marrubiastrum cardiacæ folio. Boer.

Marrubium album vulgare. Pin. 230.

Marrubium album villosum. Pin. 230.

Medica sylvestris floribus croceis. J. B. 2. 383.

Medica sylvestris floribus luteo pallescentibus. Tourn.

Eadem floribus è cæruleo virescentibus. Tourn.

Eadem floribus partim luteis, partim violaceis. Tourn.

Medica echinata glabra cum maculis nigricantibus. J. B. 2. 384.

Medica echinata magna hirsuta. J. B. 2. 385.

Medica echinata minima. J. B. 2. 386.

Melampyrum luteum latifolium. Pin. 234.

Melampyrum cristatum flore albo & purpureo. J. B. 3. 440.

Melampyrum purpurascente comâ. Pin. 334.

Melampyrum latifolium flore albo labio inferiori duabus maculis distincto.

Melilotus capsulis renisimilibus in capitulum congestis. Tourn.

Melilotus officinarum germanicæ. Pin. 331.

Melilotus vulgaris altissimus frutescens flore albo. Tourn.

Idem flore luteo. Tourn.

Melilotus lutei coloris longioribus siliquis. Dod. pempt. 567.

Melissa humilis latifolia maximo flore purpurascente. Tourn.

Menyanthes palustre latifolium & triphyllum. Tourn.

Mentha rotundifolia palustris sive aquatica major. Pin. 227.

Mentha sylvestris rotundiore folio. Pin. 227.

Mentha sylvestris longiore folio. Pin. 227.

Mentha arvensis verticillata hirsuta. J. B. 3. p. 3. 217.

Mentha aquatica seu pulegium vulgare. Tourn.

Mercurialis testiculata sive mas Diosc. & Plin. Pin. 125.

Mercurialis spicata sive femina Diosc. & Plin. Pin. 121.

Mercurialis montana testiculata. Pin. 122.

Mercurialis montana spicata. Pin. 122.

Mespilus apii folio sylvestris spinosa sive oxyacantha. Pin. 434.

Mespilus germanica folio laurino non serrato, sive mespilus sylvestris. Pin. 433.

- Mespilus folio rotundiori fructu nigro subdulci. Tourn.*
Millefolium vulgare album Pin. 140.
Millefolium vulgare purpureum minus. Pin. 140.
Millefolium aquaticum cornutum. Pin. prod. 73.
Millefolium aquaticum seu viola aquatica caule nudo. Pin.
Millefolium aquaticum umbellatum coriandri folio. Pin. 141.
Moschatellina foliis fumariz bulbosæ. J. B. 3. 206
Muscari arvense latifolium purpurascens. Tourn.
Muscari arvense juncifolium cæruleum minus. Tourn.
Muscus capillaceus major pediculo & capitulo crassioribus. Tourn.
Muscus capillaceus major pediculo & capitulo tenuioribus. Tourn.
Muscus capillaceus minor capitulo longiori falcato. Tourn.
Muscus capillaceus minor folio breviori capitulo nutante. Tourn.
Muscus capillaceus ramosus major capitulo angustissimo. Tourn.
Muscus capillaceus ramosus minor capitulo angustissimo. Tourn.
Muscus capillaceus minor calyptrâ tomentosâ. Tourn.
Muscus capillaceus omnium minimus. Tourn.
Muscus capillaceus minimus plumosus elegans. Tourn.
Muscus capillaceus densissimus lanuginosus. Tourn.
Muscus capillaceus sericeus cordis facie. Tourn.
Muscus arboreus usnea officinarum. Pin. 361.
Muscus longissimus aquaticus capillaceo folio. Tourn.
Muscus squamosus non ramosus major capitulis incurvis. Tourn.
Muscus squamosus non ramosus minor capitulis incurvis. Tourn.
Muscus squamosus major foliis amplioribus acutissimis. Tourn.
Muscus squamosus major foliis angustioribus acutissimis. Tour.
Muscus squamosus ramosus crassior capitulis incurvis. Tourn.
Muscus squamosus ramosus tenuior capitulis erectis. Tourn.
Muscus squamosus ramosus tenuior capitulis incurvis. Tourn.
Muscus squamosus ramosus erectus alopecuroides. Tourn.
Muscus squamosus erectus minimus. Tourn.
Muscus nummulariæ folio major. Tourn.
Muscus palustris foliis subrotundis. Tourn.
Muscus nummulariæ folio fructu pediculo carente. Tourn.
Muscus saxatilis nummulariæ folio minor. Tourn.
Muscus squamosus ericæ foliis minimus capitulis nutantibus. Tourn.
Muscus polygoni folio. Tourn.
Muscus squamosus linariæ folio major crispus. Tourn.

- Muscus squamosus vulgaris pennatus major.* *Pin.* 360.
Muscus vulgaris pennatus minor. *Pin.* 360.
Muscus filicinus major. *Pin.* 360.
Muscus filicinus minor. *Bauh. prodr.* 151.
Muscus ramosus erectus major. *Bauh. prod.* 151.
Muscus terrestris latioribus foliis major seu vulgaris. *Rai. hist.* 122.
Muscus terrestris clavatus. *Pin.* 360.
Muscus terrestris arborum stipitibus adnascens major & erectior. *Rai. hist.* 3. 47.
Muscus pennatus omnium minimus. *Tourn.*
Muscus squamosus pennatus capitulis adianti. *Tourn.*
Muscus squamosus palustris candicans mollissimus. *Tourn.*
Muscus palustris absynthii folio insipidus. *Tourn.*
Muscus squamosus foliis latis subrotundis. *Tourn.*
Muscus squamosus foliis acutissimis in aquis nascens. *Tourn.*
Myosotis arvensis hirsuta flore majore. *Tourn.*
Myosotis arvensis hirsuta parvo flore. *Tourn.*
Myosotis hirsuta altera viscosa. *Tourn.*
Myosotis hirsuta minor. *Tourn.*
Myrrhis annua semine striato levi. *Marif.*
Nasturtium sylvestre capsulis cristatis. *Tourn.*
Nasturtium petraeum foliis burse pastoris. *Pin.* 194.
Nasturtium pumilum supinum vernum. *Bot. monsp.*
Nidus avis. *Lugd.* 1073.
Nigella arvensis cornuta. *Pin.* 145.
Nissolia vulgaris. *Tourn.*
Nostoch cinisium.
Nymphæa alba major. *Pin.* 193.
Nymphæa lutea major. *Pin.* 193.
Nymphæa alba minor. *Pin.* 193.
Nymphoides aquis innatans. *Tourn.*
Oenanthe aquatica. *Pin.* 162.
Oenanthe sive filipendula aquatica altera. *J. B. 3. part. 2. 192.*
Oenanth^e charophylli folio. *h. r. monsp.*
Onobrychis foliis vicæ fructu echinato major. *Pin.* 350.
Ophioglossum vulgatum. *Pin.* 454.
Ophiris bifolia. *Pin.* 87.
Opulus ruellii. *Pin.* 281.
Orchis fucum referens colore rubiginoso. *Pin.* 83.
Orchis alba bifolia minore calcare oblongo. *Pin.* 83.
Orchis barbata foetida. *J. B. 2. 755.*
Orchis morio foemina. *Pin.* 82.
Orchis palmata palustris tertia. *Pin.* 86.
Orchis palmata pratensis angustifolia major. *Pin.* 85.
Orchis morio foemina procerior majore flore. *Tourn.*

- Orchis militaris minor. Tourn.*
Orchis hirci minor. Pin. 82.
Orchis latifolia altera. Auf. hist.
Orchis spiralis alba odorata. J. B. 2. 769.
Orchis spiralis alba odorata longo angustoque folio.
Orchis palmata palustris tertia flore suave rubente cum lituris purpureis.
Orchis palmata batrachites. Pin. 86.
Orchis palmata palustris maculata. Pin. 86.
Orchis palmata palustris latifolia. Pin. 86.
Orchis palmata pratensis maculata. Pin. 85.
Orchis palmata maculata montana. Pin. 86.
Orchis palmata minor calcaribus oblongis Pin. 85.
Orchis flore nudi hominis effigiem representans mas. Pin. 82.
Oreoselinum apii folio minus. Tourn.
Oreoselinum apii folio majus. Tourn.
Origanum vulgare spontaneum. J. B. 3. 236.
Ornithogallum autumnale minus floribus caeruleis. Tourn.
*Ornithogallum angustifolium majus floribus ex albo virescen-
tibus. Pin. 70.*
Ornithogallum luteum. Pin. 71.
Ornithogallum umbellatum medium angustifolium. Pin. 70.
Ornithopodium radice tuberculis nodosa. Pin. 250.
Orobanche major caryophyllum olens. Pin. 87.
Orobanche major foetidissima. Tourn.
Orobanche ramosa. Pin. 88.
*Orobanchoides nostras flore oblongo flavescente. Ait. Acad.
Scienc.*
Orobis sylvaticus foliis oblongis glabris. Tourn.
Osmunda vulgaris & palustris. Tourn.
Osmunda foliis lunatis. Tourn.
Oxys flore albo. Tourn.
Panicum vulgare spicâ simplici & asperâ. Tourn.
Panicum vulgare spicâ simplici & molliore. Tourn.
Paniculum vulgare spicâ multiplici aspericulâ. Tourn.
Papaver erraticum rubrum campestre. J. B. 3. 395.
Papaver erraticum capite longitimo glabro. Tourn.
Papaver erraticum capite oblongo hispido. Tourn.
Papaver erraticum capite longiore hispido. Tourn.
Parietaria officinarum & Diosc. Pin. 171.
Parietaria minor ocymi folio. Pin. 111.
Parnassia palustris & vulgaris. Tourn.
Pastinaca sylvestris latifolia. Pin. 155.
Pedicularis serotina purpurascente flore. Tourn.
Pedicularis pratensis lutea vel crista galli. Pin. 173.
Pedicularis pratensis lutea erectior calyce floris hirsuto. Tourn.

- Pedicularis pratensis purpurea. Pin. 163.*
Pedicularis rubra elatior. Rai. hist. 770.
Pedicularis serotina lutea. Tourn.
Pentaphylloides argenteum elatum seu potentilla. Tourn.
Pentaphylloides supinum. J. B. 2. 398.
Pentaphylloides palustre rubrum. Tourn.
Perficaria mitis maculosa. Pin. 101.
Perficaria urens sive hydropiper. Pin. 101.
Perficaria angustifolia. Pin. prod.
Perficaria latifolia floris calyce candido. Tourn.
Perficaria falicis folio potamogeton angustifolium dicta. Rai. hist. 134.
Perficaria major lapathi foliis calyce floris purpureo. Tourn.
Pervinea vulgaris angustifolia flore cæruleo. Tourn.
Peucedanum gallicum rarioribus & brevioribus foliis. h. r. p.
Phalangium parvo flore non ramosum. Pin. 29.
Phalangium parvo flore ramosum. Pin. 29.
Phallendrium. Dod. pempt. 591.
Pilosella major repens hirsuta. Pin. 262.
Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. Pin. 160.
Pinguicula gessneri. J. B. 3. 546.
Plantago latifolia sinuata. Pin. 189.
Plantago latifolia incana. Pin. 189.
Plantago angustifolia major. Pin. 189.
Plantago palustris gramineo folio monanthos pariflorus. Tourn.
Polium lavendulæ folio. Pin. 220.
Polygala vulgaris. Pin. 215.
Polygala purpurea. Tabern Icon. 831.
Polygala alba. Tab. Icon. 831.
Polygala flore carneo. h. r. p.
Polygala acutioribus foliis monspeliaca. Pin. 215.
Polygonatum latifolium vulgare. Pin. 303.
Polygonatum latifolium maximum. Pin. 303.
Polygoni vel lini folia per terram sparsa flore scorpioides. J. B. 3. 379.
Polygonum muscosum minimum. Boerh. 56.
Polygonum oblongo angusto folio. Pin. 284.
Polygonum latifolium. Pin. 281.
Polygonum parvum flore albo verticillato. J. B.
Polypodium vulgare. Pin. 259.
Polypodium angustifolium folio vario. Tourn.
Populago flore majore. Tourn.
Populago flore minore. Tourn.
Populus tremula. Pin. 429.
Populus alba majoribus foliis. Pin. 429.

- Populus nigra*. *Pin.* 429.
Populus alba minoribus foliis. *Lab. Icon.* 193.
Potamogeton rotundifolium. *Pin.* 193.
Potamogeton foliis latis splendentibus. *Pin.* 193.
Potamogeton longo serrato folio. *Pin.* 193.
Potamogeton foliis pennatis. *Tourn.*
Potamogeton strobulis ad foliorum nodos. *Tourn.*
Potamogeton foliis crispis sive lactuca ranarum. *Pin.* 193.
Potamogeton foliis angustis & undulatis. *Tourn.*
Potamogeton ramosum angustifolium. *Pin.* 193.
Potamogeton caule compresso folio graminis canini. *Rai. hist.* 189.
Potamogeton millefolium sive foliis graminis ramosum. *Rai. synopsis.*
Primula veris odorata flore luteo simplici. *J. B.* 3. 495.
Primula pallido flore humilis. *Clus. hist.* 302.
Prunus sylvestris. *Pin.* 444.
Pteris vulgaris folio longo serrato flore albo. *J. B.* 3. 147.
Pulegium latifolium. *Pin.* 222.
Pulmonaria rubro flore foliis echii. *J. B.* 597.
Eadem flore albo. *Tourn.*
Pulmonaria angustifolia caeruleo flore. *J. B.* 3. 596.
Pulsatilla folio crassiore & majore flore. *Pin.* 177.
Pulsatilla folio crassiore & majore flore laciniato. *Tourn.*
Quercus latifolia mas quæ brevi pediculo est. *Pin.* 419.
Quercus cum longo pediculo. *Pin.* 420.
Quercus foliis molli lanugine pubescentibus. *Pin.* 420.
Quinquefolium majus repens. *Pin.* 325.
Quinquefolium argenteum. *Pin.* 325.
Quinquefolium minus repens luteum. *Pin.* 325.
Rapunculus pratensis erectus acris. *Pin.* 178.
Ranunculus pratensis repens hirsutus. *Pin.* 179.
Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotundâ. *Pin.* 179.
Ranunculus vernalis rotundifolius minor. *Tourn.*
Ranunculus palustris apti folio laevis. *Pin.* 180.
Ranunculus phragmites purpureus vernalis. *J. B.* 3. 412.
Idem albus.
Ranunculus longifolius palustris minor. *Pin.* 180.
Ranunculus nemorosus vel sylvaticus folio rotundo. *Pin.* 178.
Ranunculus apti folio lanuginosus. *Pin.* 180.
Ranunculus palustris plantaginis folio angustiore. *Tourn.*
Idem folio ampliore. *Tourn.*
Ranunculus palustris plantaginis folio humilis & supinus. *Tourn.*
Ranunculus aquaticus capillaceus. *Pin.* 180.
Ranunculus nemorosus luteus. *Pin.* 178.

- Ranunculus arvensis echinatus. Pin. 179.*
Ranunculus arvensis foliis chamæmeli flore phæniceo. Tourn.
Ranunculus arvensis foliis chamæmeli flore citrino. Tourn.
Idem flore minore atro rubente. Tourn.
Ranunculus oleraceus major. Tab. Icon. 52.
Ranunculus montanus folio gramineo. Pin. 180.
Ranunculus aquatilis altus fluitans foliis peucedani. h. l. Bat.
Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo. Pin. 180.
Ranunculus palustris folio sagittato minori. Tourn.
Ranunculus longifolius palustris major. Pin. 180.
Ranunculus aquaticus plantaginis folio angustissimo. Tourn.
Ranunculus hederaceus rivulorum se extendens atrâ maculâ notatus. J. B. 3. 782.
Ranunculus gramineo folio flore caudato seminibus in capitulum spicatum congestis. Tourn.
Raphanistrum siliquâ articulatâ glabrâ majore & minore. Morif. hijl.
Raphanistrum arvense flore albo. Tourn.
Idem flore luteo. Tourn.
Rapistrum arvense folio auriculato acuto. Tourn.
Rapunculus scabiosæ capitulo capuleo. Pin. 92.
Idem capitulo albo. Pin. 92.
Rapunculus spicatus flore flavescente. Tourn.
Rapunculus folio oblongo spicâ orbiculari. Pin. 92.
Rapuntium urens solonientic. h. r. Blas.
Reseda vulgaris. Pin. 100.
Rhamnus catharticus. Pin. 478.
Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. Pin. 483.
Rosa sylvestris foliis odoratis. Pin. 483.
Rosfolis folio rotundo. Pin. 357.
Idem folio oblongo. Pin. 357.
Rubecola vulgaris quadrifolia laxis floribus purpurascens. Tourn.
Rubia sylvestris monspessulana major. J. B. 3. 715.
Rubus sylvestris sive rubus fructu nigro. Pin. 479.
Rubus repens fructu cæcio. Pin. 479.
Rubus idæus spinosus. Pin. 479.
Ruscus myrsifolius aculeatus. Tourn.
Ruta muraria. Pin. 356.
Ruta quæ silicula saxatilis corniculata. Tourn.
Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis. Tourn.
Salicaria hyssopi folio latiore. Tourn.
Eadem folio angustiore. Tourn.
Salix latifolia inferne hirsuta. J. B. 2. 215.
Salix vulgaris alba arborefcens. Pin. 473.
Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. Pin. 473.

- Salix sativa lutea folio crenato. *Pin.* 473.
 Salix folio longissimo angustissimo utrinque albedo. *Pin.* 474.
 Salix platyphyllos leucophyllos. *Lugd.* 276.
 Sambucus fructu in umbellâ nigro. *Pin.* 456.
 Sambucus humilis seu ebulus. *Pin.* 456.
 Samolus valerandi. *J. B.* 3. 792.
 Sanicula officinarum. *Pin.* 319.
 Saxifraga rotundifolia alba. *Pin.* 309.
 Saxifraga verna annua humilior. *Tourn.*
 Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum. *Pin.* 269.
 Scabiosa capitulo globoso minor. *Pin.*
 Scabiosa folio integro hirsuto. *Tourn.*
 Scandix semine rostrato vulgaris. *Pin.* 152.
 Scirpus altissimus. *Tourn.*
 Scirpus equiseti capitulo majori. *Tourn.*
 Scirpus equiseti capitulis minor & fluitans. *Tourn.*
 Scirpus altissimus foliis & cæcinâ serratis. *Tourn.*
 Sclarea pratensis foliis serratis flore cæruleo. *Tourn.*
 Sclarea pratensis foliis serratis flore albo. *Tourn.*
 Eadem flore suave rubente. *Tourn.*
 Scorfonera angustifolia prima *Pin.* 275.
 Scorfonera palustris pulveri flore. *h. r. p.*
 Scorfonera laciniatis foliis. *Tourn.*
 Scorfonera foliis nervosis. *Pin.* 275.
 Scrophularia nodosa foetida. *Pin.* 235.
 Scrophularia aquatica major. *Pin.* 235.
 Sedum minus luteum folio acuto. *Pin.* 283.
 Sedum minus teretifolium album. *Pin.* 283.
 Sedum minus teretifolium alterum. *Pin.* 283.
 Sedum parvum acre flore luteo. *J. B.* 3. 694.
 Sedum minimum luteum non acre. *J. B.* 3. 693.
 Sedum crepea dictum. *h. Lugd. Bat.*
 Sedum majus vulgare. *Pin.* 283.
 Sedum minus lato & crasso caule portlandicum vulgare.
h. r. p.
 Sedum minimum flore tetrapetalo rubente.
 Sedum minus luteum ramulis inflexis. *Pin.* 283.
 Senecio minor vulgaris. *Pin.* 131.
 Serpillum latifolium hirsutum. *Pin.* 120.
 Serpillum vulgare majus flore purpureo. *Pin.* 120.
 Idem flore albo. *Pin.* 120.
 Serpillum vulgare minus. *Pin.* 120.
 Idem capitulis lanuginosis. *Pin.* 120.
 Serpillum foliis citri odore. *Pin.* 120.
 Sideritis hirsuta procumbens. *Pin.* 233.
 Sinapi arvensis præcox semine nigro. *Morif.*

Idem foliis integris. *Tourn.*

Sinapi album filiquâ hirsutâ semine albo & rufo. *J. B. 2; 856.*

Sinapi rapi folio. *Pin. 99.*

Sisymbrium palustre repens nasturtii folio. *Tourn.*

Sisymbrium aquaticum raphani folio filiquâ breviori. *Tourn.*

Sisymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias divisis filiquâ breviori. *Tourn.*

Sisymbrium aquaticum. *Matth. 487.*

Sisymbrium annuum absynthii minoris folio. *Tourn.*

Sisymbrium erucæ folio glabro flore luteo. *Tourn.*

Sium five apium palustre foliis oblongis. *Pin. 154.*

Sium palustre alterum foliis serratis. *Tourn.*

Sium arvense five segetum. *Tourn.*

Sium latifolium. *Pin. 154.*

Sium aromaticum, fison officinarum. *Tourn.*

Sium minimum. *Rai. hist.*

Smilax unifolia humillima. *Tourn.*

Smyrnium. *Matth. Icon. 773.*

Solanum officinarum acinis nigricantibus & fuscis. *Pin. 166.*

Idem acinis puniceis. *Pin. 166.*

Idem acinis luteis. *Pin. 166.*

Solanum scandens seu dulca mara. *Pin. 167.*

Sonchus lævis minor paucioribus laciniiis. *Pin. 124.*

Sonchus lævis laciniatus. *Pin. 124.*

Sonchus asper arborefcens. *Pin. 124.*

Sonchus repens, multis hieracium majus. *J. B. 2. 1017.*

Sonchus asper non laciniatus. *Pin. 125.*

Idem laciniatus. *Pin. 124.*

Sorbus aucuparia. *J. B. 1. 62.*

Sparganium ramosum. *Pin. 15.*

Idem non ramosum. *Pin. 15.*

Sphondylium vulgare hirsutum. *Pin. 157.*

Sphondylium crispum. *J. B. 3. part. 2. 163.*

Sphondylium hirsutum foliis angustioribus. *Bauh. prod. 32.*

Idem pediculo & costâ violaceis. *Tourn.*

Stachis major germanica. *Pin. 236.*

Stachis folio obscure virente flore ferrugineo. *Hist. oxon.*

Statice. *Lugd. 1190.*

Symphitum consolida major flore purpureo cæruleo. *Pin. 259.*

Symphitum consolida major flore pallide luteo, quæ femina. *Pin. 259.*

Tamnus racemosa flore minore luteo pallescente. *Tourn.*

Tanacetum vulgare luteum. *Pin. 132.*

Thalictrum minus. *Pin. 337.*

Thalictrum majus filiqua angulosa vel striata. *Pin. 336.*

- Thalistrum minus alterum pariscensium foliis crassioribus & lucidis. r. Ray. parif.*
Thlaspi vulgatus. J. B. 2. 211.
Thlaspi arvense perfoliatum majus. Pin. 106.
Thlaspi arvense filiquis latis. Pin. 105.
Thymelæa linearis folio vulgaris. Tourn.
Tyffelinum palustre. Tourn.
Tithymalus helioscopius. Pin. 292.
Tithymalus sive esula exigua. Pin. 291.
Tithymalus cyparissias. Pin. 291.
Tithymalus amygdaloides angustifolius. Tab. Icon. 591.
Tithymalus sylvaticus lunato flore. Pin. 293.
Tithymalus rotundis foliis non crenatis. h. Lugd. Bat.
Tithymalus exiguus saxatilis. Pin. 291.
Tithymalus sive esula exigua foliis obtusis. Pin. 291.
Tithymalus palustris fruticosus. Pin. 292.
Tithymalus montanus non acris. Pin. 292.
Tordylium maximum. Tourn.
Formicilla sylvestris. Pin. 326.
Tragopogon pratense luteum majus. Pin. 274.
Tragopogon majus umbellâ candidâ. Tourn.
Tragopogon alterum majus. Tourn.
Trichomanes sive polytrichum officinarum. Pin. 356.
Trichomanes foliis eleganter incis. Tourn.
Trifolium pratense flore monopetalo. Tourn.
Trifolium pratense flore albo & fœmina glabrum. J. B. 2. 320.
Trifolium fragiferum nostras purpureum folio oblongo. Morif.
Trifolium arvense humile spicatum sive lagopus. Pin. 328.
Trifolium pratense luteum capitulo lupuli vel agrarium. Pin. 328.
Trifolium luteum nodosum seu nodiflorum capitulis thymi. Morif.
Trifolium spicâ oblongâ rubrâ Pin. 328.
Trifolium montanum spicâ longissimâ rubente. Pin. 328.
Trifolium montanum album. Pin. 328.
Trifolium parvum hirsutum flore parvo dilute purpureo in glomerulis oblongis semine magno. Rai. hist.
Trifolium pratense flore monopetalo brevior.
Trifolium orientale altissimum caule fistuloso flore albo. Cor. inf.
Trifolium semen sub terram condens. h. r. parif.
Turritis. Lob. Icon. 220.
Turritis foliis inferioribus cichoraceis ceteris perfoliatum. Tourn.
Turritis vulgaris ramosa. Tourn.

- Turritis minor. Bot. monsp.*
Turritis leucoii folio. Tourn.
Tussilago vulgaris. Pin. 197.
Typha palustris major. Pin. 20.
Typha palustris clava duplici.
Typha palustris clava gracili. Pin. 20.
Valeriana sylvestris major. Pin. 164.
Valeriana sylvestris major altera folio lucido. h. f. par.
Valeriana palustris minor. Pin. 164.
Valeriana aquatica minor flore minore. Rai. hist. 389.
Valeriana rubra. Pin. 165.
Valerianella arvensis præcox humilis semine compresso. Morisf.
Valerianella arvensis serotina foliis ferratis. Tourn.
Valerianella semine umbilicato nudo oblongo. Morisf.
Valerianella semine umbilicato nudo rotundo. Morisf.
Verbascum mas latifolium luteum. Pin. 239.
Verbascum fœmina flore luteo magno. Pin. 239.
Verbascum fœmina flore albo. Pin. 239.
Verbascum pulverulentum flore parvo luteo. J. B. 3. app. 872.
Verbascum flore albo parvo. J. B. 3. app. 872.
Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascute. Pin. 240.
Veronica mas supina & vulgarissima. Pin. 246.
Veronica spicata angustifolia. Pin. 246.
Veronica spicata minor. Pin. 247.
Veronica cymbalarix folio verna. Tourn.
Veronica flosculis pediculis oblongis insidentibus chamædrys folio. Morisf.
Veronica flosculis canticulis adhzrentibus. Morisf.
Veronica pratensis serpillifolia. Pin. 247.
Veronica verna trifido vel quinquefido folio. Tourn.
Veronica minor foliis imis rotundioribus. Morisf.
Veronica supina facie teucrii pratensis. Lob. Icon. 473.
Veronica aquatica minor folio subrotundo. Morisf.
Veronica aquatica minor folio oblongo. Tourn.
Veronica aquatica angustiore folio. Tourn.
Veronica aquatica major folio subrotundo. Morisf. hist. 323.
Veronica minima clinopodii minoris folio glabra romana. Boc. mus. part. 2. 19. Tab. 102.
Veronica minor angustifolia ramosior & procumbens. Morisf. hist.
Veronica supina teucrii folio. Tourn.
Viburnum. Matth. 217.
Vicia multiflora. Pin. 345.
Vicia perennis incana multiflora. Bot. monsp.
Vicia sativa vulgaris semine nigro. Pin. 344.

- Vicia vulgaris* acutiore folio semine parvo nigro. *Pin.* 343.
Vicia minima cum siliquis glabris. *Tourn.*
Vicia angustifolia purpureo violacea siliquâ latâ glabra. *Bot. monsp.*
Vicia segetum cum plurimis siliquis hirsutis. *Pin.* 345.
Viola maritima purpurea flore simplici odore. *Pin.* 199.
Viola maritima inodora sylvestris foliis majoribus & rotundioribus. *Pin.* 199.
Viola maritima sylvestris minor foliis mucronatis oblongis ac strictioribus. *Pin.* 199.
Viola bicolor arvensis. *Pin.* 200
Viola maritima arborescens purpurea. *Pin.* 199.
Viola palustris rotundifolia glabra. *Hist. or.*
Virga aurea vulgaris latifolia. *J. B.* 1. 1062.
Virga aurea virginiana annua. *Zanon.* 205.
Virga aurea minor foliis glutinosis & graveolentibus. *Tourn.*
Viscum baccis albis. *Pin.* 423.
Vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricantes. *Pin.* 470.
Ulmaria. *Ans. Hist.* 198.
Urtica urens maxima. *Pin.* 231.
Urtica urens minor. *Pin.* 232.
Vulneraria rustica *J. B.* 2. 362.
Ulmus campestris & *theophrasti.* *Pin.* 426.
Xanthium. *Dod. pempt.* 39.



LISTE DES PLANTES

DE LA BOURGOGNE,

*Rangée par ordre alphabétique , & communiquée par
M. Leclerc , Médecin à Semur.*

- A** *Acetosa arvensis lanceolata. Pin.*
Acetosa pratensis. Pin.
Acetosa rotundifolia , hortensis. Pin.
Aconitum azureum , seu Napellus primus. Pin.
Aconitum lycoctonum luteum. Pin.
Agaricus lichenis facie. Tourn.
Agaricus pedis equini facie. Tourn.
Alcea folio rotundo laciniato. Pin.
Alcea major & procerior. Rai. Hist.
Alchimilla linariz facie , calice florum albo. Tourn.
Alchimilla supina , gramineo folio , minore flore. Tourn.
Alchimilla linariz folio , calice florum luteo. Tourn.
Alchimilla vulgaris. Tourn.
Alisma , seu plantago aquatica , latifolia. Pin.
Alkekengi officinarum. Tourn.
Alliaria. Dodon.
Allium sylvestre latifolium. Pin.
Allium sylvestre tenuifolium , proliferum. Pin.
Alfene altissima nemorum. Pin.
Alfene hyperici folio. D. Vaill. Tourn.
Alfene minima flore fugaci. Tourn.
Alfene minor multicaulis. Pin.
Alfene palustris exigua , flosculis-albis , lanceolatis foliis plantaginellæ aquaticæ jussat. Mentz.
Alfene pratensis , gramineo folio , ampliore. Tourn.
Alfene pratensis , gramineo folio , angustiore. Tourn.
Alfene saxatilis. Pin.
Alfene saxatilis & multiflora , capillaceo folio. Tourn.
Alfene spergula dicta major. Pin.
Alfene spergula facie minor. Pin.
Alfene tenuifolia. J. B.
Althæa Dioscoridis & Plinei. Pin.
Alyssoides fruticosum Leucoii folio , viridi. Tourn.

- Alysson fruticosum incanum.* *Tourn.*
Alysson incanum luteum serpilli folio majus & minus. *Tourn.*
Alysson perenne montanum incanum *Tourn.*
Alysson segetum foliis auriculatis acutis. *Tourn.*
Alysson vulgare polygoni folio caule nudo. *Tourn.*
Amatanthus sylvestris & vulgaris. *Tourn.*
Anacampteros purpurea. *J. B.* 3. 682.
Anagallis cœruleo flore. *Pin.* 252.
Anagallis phœniceo flore *Pin.* 250.
Angelica pratensis apii folio flore luteo. *Tourn.*
Angelica sylvestris minor sive erratica. *Pin.* 155.
Anonis spinosa flore purpureo. *Pin.* 389.
Anonis viscosa spinis carens lutea major. *Pin.* 389.
Anthriscinum vulgare. *J. B.*
Aparine latifolia humilior montana. *Tourn.*
Aparine supina pumila flore cœruleo. *Tourn.*
Aparine vulgaris. *Pin.* 334.
Aparine palustris minor, Parisiensis, flore albo. *Tourn.*
Aparine vulgaris, semine laxi. *Tourn.*
Aphaca. *Lob. Icon.* 70.
Apium petraeum, sive montanum, album. *J. B.*
Aquilegia sylvestris. *Pin.* 112.
Aristolochia clematitis recta. *Pin.* 307.
Artemisia vulgaris major. *Pin.* 137.
Arum maculatum maculis nigris. *Pin.* 195.
Arum vulgare, non maculatum *Pin.*
Arundo vulgaris, palustris. *J. B.*
Afarum *Dod. pempt.* 358.
Asclepias albo flore. *Pin.* 303.
Asparagus sylvestris tenuissimo folio. *Pin.*
Asperugo vulgaris. *Tourn.*
Asplenium sive ceterach. *J. B.* 3. 740.
Aster atticus, cœruleus vulgaris. *Pin.*
Aster atticus, luteus, montanus, villosus, magno flore *Pin.*
Aster luteus, radice odorâ. *Pin.*
Aster montanus, salicis folio, glabro. *Pin.* 266.
Aster omnium maximus helenium dictus. *Tourn.*
Aster palustris, luteus, flore lanuginoso. *Tourn.*
Aster palustris parvo flore globoso. *Tourn.*
Aster pratensis autumnalis conyzæ folio. *Tourn.*
Aster serotinus, ramosus alter, flore purpurascente. *Tourn.*
Astragalus sylvestris, procumbens, latifolius sive vulgaris.
Pin.
Attractylis lutea *Pin.*
Avena vulgaris, seu alba. *Pin.*
Ballota. *Mattâ.* 825.

- Barbarea muralis. *J. B.*
 Belladonna. *Chuf. hist.*
 Bellis sylvestris minor. *Pin.* 261.
 Betonica alba. *Pin.* 235.
 Betonica purpurea. *Pin.* 325.
 Bidens foliis tripartito divisis. *Cesalp.* 488.
 Bistorta major, radice magis inronâ. *Pin.*
 Blattaria lutea folio longo laciniato. *Pin.* 247.
 Blitum album, minus. *Pin.*
 Borrago floribus caeruleis. *J. B.*
 Borrago floribus albis. *J. B.*
 Brassica alba vel viridis. *Pin.*
 Brassica campestris, perfoliata, flore albo. *Pin.*
 Brunella flore albo. *Pin.*
 Brunella folio laciniato, major. *Pin.*
 Brunella major folio non dissecto. *Pin.* 240.
 Bryonia alba sive aspera, baccis rubris. *Pin.* 297.
 Buglossum angustifolium majus flore caeruleo. *Pin.* 236.
 Buglossum arvense annuum litholpermi folio. *Tourn.*
 Buglossum sylvestre minus. *Pin.* 256.
 Buglossum sylvestre minus, fructu echinato. *Pin.*
 Bugula. *Dod. pempt.* 135.
 Bugula Genevensis, flore carneo.
 Bulbocastanum majus folio apii. *Pin.* 162.
 Buplevrum angustifolium, annuum. *Bot. Monsp.*
 Buplevrum folio subrotundo, sive vulgatissimum. *Pin.* 78.
 Bursa pastoris major, folio non sinuato. *Pin.*
 Bursa pastoris major folio sinuato. *Pin.* 108.
 Butomus. *Ces.* 553.
 Calamintha humilior rotundiori folio. *Tourn.*
 Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ. *Pin.* 218.
 Caltha arvensis. *Pin.* 276.
 Caltha vulgaris. *Lin.*
 Campanula arvensis erecta. *Hort. Lugd. Bat.*
 Campanula arvensis, minor, uliquâ ampliori. *Tourn.*
 Campanula cymbalariz foliis, vel folio bederaceo. *Pin.*
 Campanula maxima, foliis latissimis, flore caeruleo aut albo.
Pin.
 Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Pin.* 93.
 Campanula pratensis flore conglomerato. *Pin.* 94.
 Campanula radice esculenta. *Pin.*
 Campanula vulgarior foliis urticæ, vel major & asperior. *Pin.*
 94.
 Canusabis fativa. *Pin.*
 Cardamine pratensis magno flore purpurascente. *Tourn.*
 Cardiaca. *J. B.* 3. 320.

- Carduus albis maculis notatus vulgaris. Pin. 381.*
Carduus capite rotundo tomentosus. Pin. 382.
Carduus vinearum repens, sonchi folio. Pin.
Carduus lanceolatus larifolius. Pin.
Carduus nutans J. B. 3. 36.
Carduus nutans, flore albo. J. B.
Carduus stellatus sive calcitrapa. J. B. 3. 79.
Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris. Tourn.
Carlina caulescens, magno flore albicante. Pin.
Carlina sylvestris vulgaris. Clus. hist. 136.
Caryophyllata vulgata. Pin.
Caryophyllus barbatus, flore multiplici. Pin.
Caryophyllus minimus. Pin.
Caryophyllus sylvestris barbatus. Pin. 209.
Caryophyllus sylvestris prolifer. Pin. 209.
Cassida palustris vulgarior flore exaruleo. Tourn.
Cataria major vulgaris. Tourn.
Caucalis arvensis echinata latifolia. Pin. 153.
Caucalis arvensis echinata magno flore. Pin. 150.
Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu. Pin. 152.
Centaureum luteum perfoliatum. Pin. 278.
Centaureum minus. Pin. 278.
Centaureum minus, ramosissimum, flore purpureo.
Cepa juncifolia, minor, purpurascens. Tourn.
Chamaedrys frutescens, tenerulum vulgò. Tourn.
Chamaedrys fruticosa sylvestris melilix folio. Tourn.
Chamaedrys laciniatis foliis. Lob. Icon. 395.
Chamaedrys major repens. Pin. 248.
Chamaedrys palustris canescens seu Scordium officinarum.
Tourn.
Chamaemelum foetidum. Pin. 135.
Chamaemelum vulgare leucanthemum Dioscoridis. Pin. 135.
Chamaenerion glabrum majus. Tourn.
Chamaenerium vulgare, flore purpureo. Tourn.
Chamaepyris lutea vulgaris sive folio trifido. Pin. 249.
Chara vulgaris, foetida. Ad. Acad. Reg. Paris.
Chelidonium majus vulgare. Pin. 144.
Chenopodium angustifolium laciniatum minus. Tourn.
Chenopodium betæ folio Tourn.
Chenopodium brevi & graminæo folio.
Chenopodium foetidum. Tourn.
Chenopodium folio sinuato candicante. Tourn.
Chenopodium folio triangulo. Tourn.
Cherophyllum sativum. Pin.
Cherophyllum sylvestre. Pin.
Cherophyllum sylvestre alterum, geniculis tumentibus. B. r. p.

- Chondrilla arvensis*, viminea, an prima Dioscoridis. *Pin.*
Chondrilla juncea viscosa arvensis quæ prima Dios. *Pin.* 170.
Chondrilla sonchi folio, flore luteo pallescente. *Tourn.*
Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa. *Hist. oxon.*
Chrysosplenium foliis minoribus, subrotundis. *Tourn.*
Cichorium sylvestre vel officinarum. *Pin.* 125.
Cicuta major. *Pin.* 160.
Cicuta minor petroselino similis. *Pin.* 160.
Circea lutetiana. *Lob. Icon.* 266.
Cirsium acaulos, flore purpureo. *Tourn.*
Cirsium anglicum. *Lobel. Icon.*
Cirsium pratense polycephalon vulgare. *Tourn.*
Cirsium quod carduus pratensis latifolius. *Pin.*
Clematitis carulea, erecta. *Pin.*
Clematitis carulea, repens. *Pin.*
Clematitis sylvestris latifolia. *Pin.* 300.
Clinopodium arvense ocymi facie. *Pin.* 225.
Clinopodium origano simile. *Tourn.* 125.
Cnicus attraxillis lutea dictus. *h. Lugd. Bat.*
Cnicus pratensis acanthi folio, flore flavescente. *Tourn.*
Colechicum commune. *Pin.* 67.
Conserva Plinii. *Lob. Icon.* 257.
Convolvulus major albus. *Pin.* 294.
Convolvulus minor arvensis. *Pin.* 295.
Conyza major vulgaris. *Pin.* 265.
Coralloides corniculis rufescentibus. *Tourn.*
Coronilla herbacea flore vario. *Tourn.*
Coronopus hortenſis. *Pin.* 190.
Coryledon major. *Pin.*
Cruciata hirsuta. *Pin.* 335.
Cruciata minima. *Tourn.*
Cucumis sylvestris, asininus dictus. *Pin.*
Cuscuta minor. *Tourn.*
Cyanus segetum. *Pin.*
Cynoglossum vulgare majus. *Pin.* 257.
Cyperoides angustifolium; spicis scissilibus in foliorum alis. *Tourn.*
Cyperoides latifolius spicâ spadiceo-viridi, majus. *Tourn.*
Cyperoides latifolium spicâ rufâ sive caule triangulo. *Tourn.*
Cyperoides minus, paniculâ flavescente. *Tourn.*
Cyperoides minus spicis densioribus. *Tourn.*
Cyperoides nigro-luteum vernum majus. *Tourn.*
Cyperoides polystachion spicis teretibus erectis. *Tourn.*
Cyperoides spicis parvis longe distantibus. *Pin.*
Cyperoides sylvarum, tenuius, spicarum. *Tourn.*

- Cyperus gramineus.* *J. B.* 3. 504.
Cyperus minimus paniculâ sparsâ nigricante. *Tourn.*
Damaconium stellatum. *Lugd.* 1058.
Daucus vulgaris. *Clus. hist.* 198.
Daucus minor, annuus, umbellâ candidâ. *Tourn.*
Daucus sylvestris, vulgaris. *Clus. hist.*
Delphinium segetum flore caeruleo. *Tourn.*
Dens leonis latiore folio. *Pin.* 126.
Dens leonis tenuissimo folio. *Pin.* 126.
Dentaria heptaphyllos. *Pin.*
Digitalis major lutea vel pallida parvo flore. *Pin.* 244.
Digitalis minima gratiola dicta. *Morif.*
Digitalis purpurea. *J. B.* 2. 812.
Dipsacus lativus. *Pin.*
Dipsacus folio laciniato. *Pin.*
Dipsacus sylvestris aut virga pastoris major. *Pin.* 386.
Doronicum plantaginis folio. *Pin.* 284.
Echium vulgare. *Pin.* 154.
Echium vulgare, flore albo. *Pin.*
Elatine folio subrotundo. *Pin.*
Elychrysum montanum flore rotundiorè subpurpureo. *Tourn.*
Elychrysum sive impia. *Dodon.*
Elychrysum spicatum. *Tourn.*
Equisetum palustre, longioribus setis. *Pin.*
Equisetum arvense, longioribus setis. *Pin.*
Equisetum nudum non ramosum sive junceum. *Pin.* 25.
Eruca tenuifolia perennis flore luteo. *J. B.* 2. 361.
Eruca sylvestris major, caule aspero. *Pin.*
Ervum verum Camerat. *Hort. mos.*
Eryngium vulgare. *Pin.* 386.
Erysimum vulgare. *Pin.* 100.
Esula linaria folio, lunato flore. *Mor. h. R. B.*
Eupatorium cannabinum. *Pin.* 310.
Euphrasia officinarum. *Pin.* 233.
Faba major recentiorum. *Lobel.*
Fagopyrum vulgare erectum. *Tourn.*
Fagopyrum minus scandens. *Tourn.*
Ferrum equinum germanicum siliquis in summitatē. *Pin.* 348.
Filago altera. *Dod. pempt.* 67.
Filago vulgaris tenuissimo folio erecto. *Tourn.*
Filicula fontana major sive adiantum album filicis folio. *Pin.*
Filicula quæ adiantum nigrum officinarum pinnulis obtusioribus. *Tourn.*
Filicula saxatilis, corniculata. *Tourn.*
Filipendula. *J. B.*
Filix non ramosa dentata. *Pin.* 358.

- Filix mollis* five *glabra* vulgari mari non ramosa accedens. *J. B.*
Filix ramosa, minor, pinnulis dentatis. *Pin.*
Filix minor, palustris. *Rai. hist.*
Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis. *Pin.* 357.
Foeniculum vulgare, Germanicum. *Pin.*
Foeniculum sylvestre perenne ferulæ folio breviori. *Tourn.*
Fragaria vulgaris. *Pin.* 326.
Fragaria sterilis incana. *h. r. p.*
Fumaria officinarum & *Dioscoridis*. *Pin.* 143.
Fumaria bulbosa, radice non cavâ, major. *Pin.*
Fungi minimi, incarnati coloris.
Galeopsis altera, caliculis aculeatis, flore flavescente. *Tourn.*
Galeopsis procerior, caliculis aculeatis, flore albo. *Tourn.*
Galeopsis procerior cauliculis aculeatis, flore purpurascente. *Tourn.*
Galeopsis patula segetum flore purpurascente. *Tourn.*
Galeopsis palustris betonicæ folio flore variegato. *Tourn.*
Galeopsis procerior foetida spicata. *Tourn.*
Galeopsis live *urtica* iners flore luteo. *J. B.* 3. 323.
Gallium arvense, flore caeruleo. *Tourn.*
Gallium luteum. *Pin.* 335.
Gallium palustre album. *Tourn.*
Genistella herbacea five *chamæspartium*. *J. B.* 3. 393.
Gentiana angustifolia autumnalis major. *Pin.* 188.
Gentiana cruciata. *Pin.* 182.
Gentiana major latea. *Pin.*
Gentiana pratensis, flore laguginoso. *Pin.*
Geranium cicutæ folio, acu longissimâ. *Pin.*
Geranium cicutæ folio minus & *supinum*. *Pin.* 319.
Geranium columbinum minus majori flore & foliis florum bifidis *Bot. monsp.*
Geranium columbinum maximum, foliis dissectis. *D. Plot.*
Geranium sanguineum maximo flore. *Pin.* 318.
Geranium robertianum. *Pin.* 319.
Glancium flore luteo. *Tourn.*
Glaux palustris flore striato clauso, foliis portulacæ. *Tourn.*
Globularia vulgaris. *Tourn.*
Gramen avenaceum locustis villosis crassioribus *Tourn.*
Gramen aquaticum particulatum latifolium. *Pin.* 3.
Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *Pin.* 3.
Gramen antoxanthum, spicatum. *Pin.*
Gramen avenaceum, montanum, lanuginosum. *Pin.*
Gramen avenaceum elatius jubâ longâ, splendente. *Rai. hist.*
Gramen avenaceum montanum spicâ simplici, aristis & recurvis. *Rai. hist.*
Gramen avenaceum panniculâ sparsâ locustis minoribus & aristatis. *Pin.* Gramén

- Gramen avenaceum*, locustis rarioribus. *Pin.*
- Gramen avenaceum*, locustis amplioribus, candicantibus, glabris & aristatis. *Tourn.*
- Gramen bromoides segetum*: latiore paniculâ. *Park.*
- Gramen caninum*, supinum minus. *Pin.*
- Gramen capillatum*, paniculis rubentibus. *J. B.*
- Gramen capillatum* paniculis viridentibus. *J. B.*
- Gramen cum caudâ muris purpurascente.* *J. B.*
- Gramen dactylon*, angusto folio spicis villosis. *Pin.*
- Gramen dactylon* folio latiore. *Pin.* 8.
- Gramen junceum* *Dalechamp.*
- Gramen loliaceum majus* spicis longius distantibus. *Tourn.*
- Gramen loliaceum* radice repente, sive *gramen officin.* *Tourn.*
- Gramen loliaceum corniculatum*, spicis glabris. *Tourn.*
- Gramen loliaceum* spica longiore, aristas habens. *Pin.*
- Gramen loliaceum* angustiore folio & spica. *Pin.* 9.
- Gramen loliaceum* fibrosa radice, aristis donatum. *Tourn.*
- Gramen montanum*, paniculâ spadiceâ, delicatiore, angustiore folio. *Pin.*
- Gramen murorum* spica longissima. *Gerard*
- Gramen nemorosum* panicula rufescente, molli. *Tourn.*
- Gramen nodosum* avenacea panicula. *Pin.* 2.
- Gramen phalaroides*, folio angustiore. *Mentz.*
- Gramen paniculatum aquaticum* phalaridis semine. *Tourn.*
- Gramen paniculatum autumnale*, paniculâ angustiore ex viridi nigricante. *Tourn.*
- Gramen paniculatum* radice repente, culmo compresso. *Pin.*
- Gramen pratense paniculatum* molle *Pin.* 2.
- Gramen pratense* paniculâ duriore laxa unam præcipue partem spectante *Rai.*
- Gramen pratense* panicularum altissimum locustis parvis splendentibus non aristatis. *Tourn.*
- Gramen pratense paniculatum* majus angustiore folio. *Prodr.* 3.
- Gramen pratense* spicâ flavescente. *Pin.* 3.
- Gramen* folio spicam amplexante. *Pin.* 3.
- Graminea festuca*, glumis vacuis. *Bot. Par.*
- Gramen* quod *festuca pratensis*, lanuginosa. *Pin.*
- Gramen* quod *festuca avenacea*, sterilis elatior. *Pin.*
- Gramen* quod *festuca avenacea*, sterilis humilior. *Pin.*
- Gramen* spicatum folio aspero. *Pin.* 3.
- Gramen* spicatum, folio aspero, spicâ albâ. *Pin.*
- Gramen* spicatum, glumis cristatis. *Tourn.*
- Gramen* spicatum, localinum minus. *Tourn.*
- Gramen* spicatum, glumis variis. *Tourn.*
- Gramen* spicatum, instar limæ dentatum. *Fr. Cupan.*
- Gramen* spicâ lavendulæ. *Rai. Hist.*

- Gramen subhirsutà spicà purpureo-argenteà, molli. *Rai hist.*
Gramen sylvaticum paniculà meliacea sparsà. *Pin.* 8.
Gramen typhoides maximum spicà longissimà. *Pin.* 4.
Gramen tremulum majus. *Pin.* 2.
Gramen tremulum maximum. *Pin.*
Helianthemum flore maculoso. *Col. parc.* 2. 77.
Helianthemum foliis majoribus flore albo. *J. B.* 2. 16.
Helianthemum vulgare flore luteo. *J. B.* 2. 15.
Heliotropium majus dioscoridis. *Pin.* 253.
Helleborine flore albo, vel damasonium montanum latifolium. *Pin.* 187.
Helleborine montana latifolia. *C.* 67. 186.
Helleborine palustris nostras. *Rai.* 1231.
Helleborus niger foetidus. *Pin.* 145.
Hepaticoides foliis subrotundis squammatis-incumbentibus major & minor. *Bot. Paris.*
Hepaticoides polytrichi facie. *Bot. Paris.*
Herba Paris. *Dod. pempt.* 444.
Herniaria glabra. *J. B.* 3. 378.
Herniaria hirsuta. *J. B.* 3. 379.
Hesperis allium redolens. *Morif hist.*
Hesperis leucoi folio serrato, siliquà quadrangulà. *Tourn.*
Hieracium asperum, magno flore in limitibus agrorum. *J. B.*
Hieracium murorum folio pilosissimo. *Pin.* 129.
Hieracium fruticosum, latifolium foliis dentatis, glabris. *Bot. Paris.*
Hieracium dentis leonis folio obtuso majus. *Pin.* 127.
Hieracium minus dentis leonis folio subaspero. *Pin.* 127.
Hieracium folio cichorii sylvestris, odore castorei. *Bot. Monsp.*
Hieracium latifolium fruticosum hirsutum. *Pin.* 129.
Hieracium fruticosum angustifolium majus. *Pin.* 129.
Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro. *Pin.*
Hieracium luteum, glabrum, seu minus hirsutum. *J. B.*
Hieracium minus. *Pin.*
Hieracium murorum folio pilosissimo. *Pin.*
Hieracium fruticosum latifolium hirsutum, dentatum. *Pin.*
Hordeum distichum. *J. B.*
Hordeum murinum. *J. B.*
Hordeum polystichum vernum. *Pin.*
Hordeum minimum. *J. B.*
Horminum sylvestre, latifolium verticillatum. *Pin.*
Hydrocotyle palustris & vulgaris. *Tourn.*
Hyoisclamus vulgaris vel niger. *Pin.* 129.
Hypericum ascyrum dictum caule quadrangulo. *J. B.* 3. 382.
Hypericum minus supinum vel supinum glabrum. *Pin.* 179.
Hypericum palustre supinum tomentosum. *Tourn.*

- Hypericum pulchrum. Trag.*
Hypericum villosum erectum caule rotundo. Tourn.
Hypericum vulgare. Pin. 279.
Jacea annua, foliis laciniatis. Tourn.
Jacea foliis cichoraceis, villosis, altissima, flore purpurascente. Tourn.
Jacea nemorensis quæ serratula vulgo. Tourn.
Jacea nigra pratensis latifolia Pin. 271.
Jacea vulgaris laciniata flore purpureo. Tourn.
Jacobæa foliis ferulaceis, flore majore. Tourn.
Jacobæa foliis ferulaceis flore minore. Tourn.
Jacobæa nemorum altissima, foliis serratis. Tourn.
Jacobæa palustris altissima foliis serratis. Tourn.
Jacobæa pratensis, altissima, limonii folio. Tourn.
Jacobæa palustris, sive aquatica. Rai. hist.
Jacobæa senecionis folio, incano, perennis. Rai. hist.
Jacobæa senecionis folio perennis. Rai. hist.
Jacobæa vulgaris laciniata. Pin. 121.
Imperatoria major Pin.
Imperatoria pratensis major Tourn.
Iris frigidissima sive xyris. Tourn.
Iris palustris, flore luteo. Tab. Mont.
Iris vulgaris germanica sive sylvestris. Pin. 30.
Isatis sylvestris vel angustifolia. Pin. 113.
Juncago palustris & vulgaris. Tourn.
Juncus foliis articulosis floribus umbellatis. Tourn.
Juncus foliis articulosis, cum utriculis. Tourn.
Juncus nemorosus, folio articuloso. Tourn.
Juncus nemorosus latifolius major. Tourn.
Juncus villosus capitulis psylli. Tourn.
Lactuca montana latifolia laciniata, flore caeruleo. Tourn.
Lactuca perennis humidior flore caeruleo. Tourn.
Lactuca sylvestris angusto laciniato folio. Bot. monsp.
Lactuca sylvestris costâ spinosâ. Pin. 123.
Lactuca sylvestris, odore viroso Pin.
Lactuca viscosa, caule foliis obducto. Tourn.
Lamium album, vulgare. Robin.
Lamium folio oblongo, luteum. Pin.
Lamium folio caulem ambiante, minus. Pin.
Lamium purpureum, foetidum, folio subrotundo. Pin.
Lampfana. Dod. pempt. 675.
Lampfana aphyllorcaulos. Ad. Acad. Reg. Paris. 1721.
Lapathum aquaticum folio cubitali. Pin. 116.
Lapathum aquaticum, minus. Pin.
Lapathum folio acuto plano. Pin. 115.
Lapathum folio acuto, flore aureo. Pin.

Lapathum minimum. *Pin.* 115.

Lappa major, five action *Dioscoridis.* *Pin.*

Lasercpitium foliis latioribus lobatis. *Morif.*

Lathyrus angustifolius, filiquâ hirsutâ. *Pin.*

Lathyrus arvensis repens tuberosus. *Pin.* 344.

Lathyrus latifolius. *Pin.*

Lathyrus sylvestris, angustifolius, flore rubro. *Pin.*

Lathyrus sylvestris luteus foliis vicix. *Pin.* 344.

Lathyrus sylvestris, luteus, foliis angustissimis. *Pin.*

Lathyrus sylvestris major. *Pin.* 344.

Lens major. *Pin.*

Lenticula aquatica trifolca. *Pin.* 392.

Lenticula palustris, bifolia, fructu tetragono. *Pin.*

Lepidium latifolium. *Pin.* 97.

Leucanthemum vulgare. *Tourn.*

Leucolum luteum vulgare. *Pin.* 202.

Leucolum hesperidis folio. *Tourn.*

Lichen arboreus, seu *pulmonaria arborea.* *J. B.* 3. 719.

Lichen arboreus, subrus nigricans. *Hist. oxon.*

Lichen cinereus, arboreus, marginibus pilosis, minor.

Lichen cinereus lactuæ folio. *Tourn.*

Lichen cinereus latifolius tamosus. *Bot. Parisf.*

Lichen cinereus vulgaris capillaceo folio minor. *Tourn.*

Lichen cinereus vulgarissimus, cornua damæ referens.

Lichen crustæ modo saxis adnascens verrucosus cinereus & veluti densus. *Tourn.*

Lichen pulmonarius saxatilis maximus. *Bot. Parisf.*

Lichen Dioscorid. & *Plin.* colore flavescente. *Col.*

Lichen pulmonarius saxatilis digitatus. *Bot. Parisf.*

Lichen pixidatus major. *Tourn.*

Lichen pixidatus non ramosus acetabulis simbricatis. *Tourn.*

Lichen pixidatus verticillatus, prolifer. *Tourn.*

Hepatica secunda, five *Lichen officinarum.*

Lichen terrestris, cinereus *Rai. hist.*

Lichen rufescens, cornua damæ referens. *Tourn.*

Lilium convallium album. *Pin.* 304.

Limnapeuce. *Cord. hist.*

Linagrostis panniculâ ampliore. *Tourn.*

Linagrostis panniculâ minore. *Tourn.*

Linaria arvensis, cærulea. *Pin.*

Linaria hederaceo folio, seu *cymbalaria vulgaris.* *Tourn.*

Linaria lutea, vulgaris. *J. B.*

Linaria pumila supina lutea. *Pin.* 213.

Linaria quæ antirrhinum arvense minus. *Pin.*

Linaria segetum nummulariæ folio villosa. *Tourn.*

Linaria segetum nummulariæ folio aurito & villosa flore cæruleo. *Tourn.*

- Linaria vulgaris* lutea flore majore. *Pin.* 212.
Lingua cervina officin. *Pin.*
Linifolia per humum sparsa, flore scorpioides. *J. B.*
Linum arvense. *Pin.*
Linum pratense flosculis exiguis. *Pin.* 214.
Linum sativum. *Pin.*
Linum sylvestre angustifolium floribus dilute purpurascens
 vel cernuis. *Pin.* 214.
Lithospermum arvense minus. *Tourn.*
Lithospermum majus erectum. *Pin.* 238.
Lithospermum minus, repens, latifolium. *Pin.*
Lithospermum palustre minus. *Tourn.*
Lotus seu *melilotus* pentaphyllos, minor, glabra. *Pin.*
Lotus pentaphyllos flore majore luteo splendens. *Pin.* 332.
Lunaria major, siliquâ longiore. *J. B.*
Lunaria major, siliquâ rotundiore. *J. B.*
Lunaria major, siliquâ angustiore. *J. B.*
Lupulus mas vel *framina.* *Pin.*
Luteola herba *salicis* folio. *Pin.* 100.
Lychnis annua minima flore carneo lineis purpureis distincto.
Tourn.
Lychnis aquatica, purpurea, simplex. *Pin.*
Lychnis montana, viscosa, alba latifolia. *Pin.*
Lychnis pratensis flore lacinioso simplici. *Morif.*
Lychnis segetum major. *Pin.* 204.
Lychnis segetum rubra foliis perfoliatis. *Pin.* 204.
Lychnis sylvestris angustifolia caliculis turgidis striatis. *Pin.*
Lychnis sylvestris quæ *behen album* vulgo. *Pin.* 205.
Lychnis sylvestris quæ *saponaria* vulgo. *Tourn.*
Lychnis viscosa, alba, latifolia lævis. *Pin.*
Lycopodium. *Dod. pempt.*
Lycopus palustris glaber. *Tourn.*
Lycopus palustris villosus. *Tourn.*
Lyfimachia lutea major, quæ *Dioscoridis* foliis binis. *Pin.*
Lyfimachia lutea major, quæ *Dioscoridis* foliis ternis. *Pin.*
Lyfimachia lutea major, foliis quaternis. *Pin.*
Lyfimachi humifusa quæ *nummularia lutea major.* *Pin.*
Lyfimachia humifusa, folio rotundiore, flore purpurascens.
Tourn.
Malva vulgaris flore majore folio sinuato. *J. B.* 2. 949.
Malva vulgaris flore minore folio rotundo. *J. B.* 2. 949.
Malva foliis crispis. *Pin.*
Marrubium album vulgare. *Pin.*
Matricaria tanacetii folio, flore majore semine umbilicato.
Tourn.
Matricaria vulgaris, seu *sativa.* *Pin.*

- Medica major*, erectior, floribus violaceis. *Tourn.*
Medica polycarpus, foliis obruso crenato. *Tourn.*
Medicago quæ medica sylvestris. *J. B.*
Melampyrum cristatum flore albo & purpureo. *J. B.* 3. 440.
Melampyrum purpurascens comâ. *Pin.* 334.
Melilotus capitulis tenuissimis in capitulum congestis. *Tourn.*
Melilotus officinarum germanicæ. *Pin.* 331.
Melissa hortensis. *Pin.*
Melissophyllum verum. *Fusch. hist.*
Mentha angustifolia, spicata. *Pin.*
Mentha aquatica sive *pulegium vulgare*. *Tourn.*
Mentha arvensis verticillata, folio rotundiore. *Pin.*
Mentha rotundifolia palustris sive *aquatica major*. *Pin.*
Mentha rotundifolia, spicata. *Pin.*
Mentha sylvestris longiore folio. *Pin.* 227.
Mentha sylvestris rotundiore folio. *Pin.* 227.
Menyanthes palustre latifolium & angustifolium triphyllum.
Tourn.
Mercurialis montana testiculata seu spicata. *Pin.*
Mercurialis spicata sive *fœmina*. *Pin.*
Millefolium vulgare album. *Pin.* 140.
Millefolium vulgare purpureum minus. *Pin.* 140.
Muscari arvense-juncifolium caeruleum minus. *Tourn.*
Muscari arvense latifolium purpurascens. *Tourn.*
Muscus apocarpus, hirsutus, saxi adnascens, capitulis obscure
 rubris. *Rai. hist.*
Muscus capillaceus folio rotundiore, capsulâ oblongâ incurvâ.
Tourn.
Muscus capillaceus major, capitulis crassioribus cylindraceis.
Tourn.
Muscus capillaris minor, capitulis erectis, vulgarissimus. *Rai.*
hist.
Muscus capillaceus minor capitulo longiori falcato. *Tourn.*
Muscus capillaceus major pediculo & capitulo tenuioribus.
Tourn.
Muscus capillaceus major pediculo & capitulo tenuioribus.
Tourn.
Muscus capillaceus sericeus, cordis facie. *Tourn.*
Muscus capillaris, surculis erectis, foliis oblongis, tenuissimis.
Rai. synopsis.
Muscus dendroides, squamosus repens. *Tourn.*
Muscus denticulatus major. *Pin.*
Muscus filicinatus major. *Pin.*
Muscus pennatus major. *Pin.*
Muscus polygoni folio. *Tourn.*
Muscus qui polytricum aureum majus. *Pin.*

- Muscus squamosus foliis acutissimis in aquis nascens. Tourn.*
Muscus squamosus ramosus crassior capitulis incurvis. Tourn.
Muscus squamosus ramosus minor & crispus. Tourn.
Muscus squamosus saxatilis tortuosus ac nodosus. Tourn.
Muscus trichoides, montanus albidus, fragilis. Rai syn.
Myagrum monospermum, minus. Pin.
Myosotis hirsuta arvensis flore majore. Tourn.
Myosotis arvensis hirsuta parvo flore. Tourn.
Myosotis arvensis, polygoni folio. Tourn.
Myriophyllum aquaticum, majus. Ad. Acad.
Napus sylvestris. Pin.
Narcisso-leucoium pratense multiflorum. Tourn.
Nasturtium latifolium. Pin.
Nasturtium petraeum foliis bursæ pastoris. Pin. 104.
Nasturtium sylvestre capsulis cristatis. Tourn.
Nicotiana minor. Pin.
Nigella arvensis cornuta. Pin. 145.
Nymphaea alba minor. Pin. 193.
Nymphaea lutea major. Pin. 193.
Oenanthe aquatica. Pin. 162.
Oenanthe aquatica, trifolia, caulibus fistulosis. Pin.
Oenanthe sive filipendula aquatica altera. J. B.
Onagra latifolia. Tourn.
Onobrychis foliis vicie fructu echinato major. Pin. 350.
Ophiris bifolia. Pin. 2.
Ophioglossum vulgatum. Pin. 454.
Orchis barbata foetida J. B. 2. 755.
Orchis bifolia flore albo calcaribus longis. Pin.
Orchis flore nudi hominis effigiem representans fœmina. Pin.
Orchis fucum referens major foliolis superioribus candidis & purpurascens. Pin.
Orchis militaris major. Tourn.
Orchis palmata minor, calcaribus longis. Pin.
Orchis palmata montana, maculata. Pin.
Orchis palmata montana maculata, floribus albis. Pin.
Orchis palmata montana maculata floribus albis purpurascens. Pin.
Orchis palmata pratensis latifolius longis calcaribus. Pin.
Orchis spiralis alba odorata. Tourn.
Orchis pratensis palmata maculata. Pin.
Orchis palustris, palmata flore albo. Pin.
Oreoselinum apii folio majus. Tourn.
Oreoselinum apii folio minus. Tourn.
Origanum sylvestre album. Pin.
Origanum vulgare spontaneum. J. B.
Ornithogalum sylvestre Germanicum caeruleum. Tourn.

- Ornithopodium majus* *Pin.*
Ornithopodium minus. *Pin.*
Ornithopodium radice tuberculis nodosâ. *Pin.*
Orobanche major, caryophyllum olens. *Pin.*
Orobanche ramosa, floribus purpurascens. *Pin.*
Orobis sylvaticus, foliis oblongis glabris. *Tourn.*
Orobis sylvaticus, purpureus vernus, *Pin.*
Osmunda foliis lunatis. *Tourn.*
Osmunda vulgaris palustris. *Tourn.*
Oxys flore albo. *Tourn.*
Panicum vulgare, spicâ multiplici asperiusculâ. *Tourn.*
Panicum vulgare spicâ simplici & asperâ. *Tourn.*
Papaver erraticum, rubrum campestre.
Parietaria officinarum & Dioscoridis. *Pin.*
Patreaia palustris & vulgaris. *Tourn.*
Paronichia serpilli-folia palustris. *Bot. parif.*
Pastinaca sylvestris altissima. *Tourn.*
Pastinaca sylvestris latifolia. *Pin.*
Pedicularis pratensis lutea sive crista Galli. *Pin.*
Pedicularis pratensis purpurea. *Pin.*
Pedicularis serotina flore purpurascens. *Tourn.*
Pedicularis serotina lutea. *Tourn.*
Pentaphylloides argenteum alatum. *Tourn.*
Pentaphylloides palustre rubrum. *Tourn.*
Perfoliata vulgarissima sive arvensis. *Pin.*
Perficaria mitis, cum maculis ferrum equinum referentibus,
Tourn.
Perficaria mitis folio subtus incano. *Tourn.*
Perficaria minor floribus albis. *Pin.*
Perficaria mitis maculosa. *Pin.*
Perficaria talicis foliis potamogeton angustifolia dicta. *Rai.*
hiff.
Perficaria urens seu hydropiper. *Pin.*
Pervinca vulgaris angustifolia flore caruleo. *Tourn.*
Pervinca vulgaris latifolia flore caruleo. *Tourn.*
Petalites major & vulgaris. *Pin.*
Phalangium parvo flore ramosum. *Pin.*
Phellandrium. *Dod. pempt.*
Pilosella major repens hirsuta. *Pin.*
Pimpinella sanguisorba major. *Pin.*
Pimpinella sanguisorba minor lævis. *Pin.*
Pisum sylvestre perenne. *Pin.*
Plantaginella palustris. *Pin.*
Plantago angustifolia major. *Pin.*
Plantago angustifolia minor. *Pin.*
Plantago latifolia sinuata. *Pin.*

- Polium lavendulæ folio. Pin.*
Polygala alba. Tabern. mont.
Polygala purpurea. Tabern. mont.
Polygala vulgaris floribus cartuleis. Pin.
Polygonatum angustifolium non ramosum. Pin.
Polygonatum latifolium vulgare. Pin.
Polygonifolia vulgaris. Bat. Paris.
Polygonum brevi angustoque folio. Pin.
Polygonum latifolium. Pin.
Polypodium vulgare. Pin.
Populago flore majore. Toura.
Potamogeton foliis angustis & undulatis. Pin.
Potamogeton pusillum gramineo folio caule] rotundo. Rai.
dist
Potamogeton ramosum angustifolium. Pin.
Potamogeton rotundifolium. Pin.
Primula veris odorata flore luteo simplici. Pin.
Pranica vulgaris folio oblongo serrato flore albo. J. B.
Pulmonaria foliis echii. Lobel. Icon.
Pulmonaria foliis non maculosis. J. B.
Pulsatilla folio crassiore & majore flore. Pin.
Pyrola rotundifolia major. Pin.
Quinquefolium folio argenteo. Pin.
Quinquefolium majus repens. Pin.
Ranunculus aconiti folio flore albo simplici Toura
Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo. Pin.
Ranunculus aquaticus albus fluitans peucedani folio. Pin.
Ranunculus arvensis echinatus. Pin.
Ranunculus arvensis folio chamæmeli flore phæniceo. Toura.
Ranunculus gramineo folio flore caudato seminibus in capi-
tulum congestis. Toura.
Ranunculus holeraceus. Tab. Mont. Icon.
Ranunculus nemorosus luteus. Pin.
Ranunculus nemorosus vel sylvaticus folio rotundo. Pin.
Ranunculus palustris apii folio laxus. Pin.
Ranunculus palustris longifolius major. Pin.
Ranunculus palustris longifolius minor. Pin.
Ranunculus palustris serratus. Pin.
Ranunculus pratensis erectus acris. Pin.
Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotundâ. Pin.
Ranunculus pratensis repens hirsutus. Pin.
Ranunculus tridentatus vernus flore simplici. Toura.
Ranunculus vernus rotundifolia minor. Toura.
Raphanistrum arvense flore albo. Toura.
Rapunculus folio oblongo spicâ orbiculari. Pin.
Rapunculus scabiofæ capitulo cartuleo. Pin.

- Rapunculus spicatus. Pin.*
Razeda vulgaris. Pin.
Ros solis foliis subrotundis. Pin.
Rubcola vulgaris, quadrifolia lavis. Tourn.
Rubia cynanchica. Pin.
Rubia sylvestris Montepessulana major. J. B.
Rubia tinctorum sativa. Pin.
Ruta hortensis latifolia. Pin.
Ruta muraria. Pin.
Sagittaria aquatica major. Pin.
Salicaria hyssopi folio angustiore. Tourn.
Salicaria trifolia caule exagono. Tourn.
Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis. Pin.
Salvia angustifolia. Pin.
Salvia latifolia. J. B.
Sambucus humilis sive ebulus. Pin.
Samolus valerandi. J. B.
Sanicula officin. Pin.
Satureria sativa. J. B.
Saxifraga rotundifolia alba. Pin.
Saxifraga verna annua humilior. Tourn.
Scabiosa capitulo gibboso minor. Pin.
Scabiosa folio integro hirsuto. Tourn.
Scabiosa quæ diptacus sylvestris folio minore. Pin.
Scabiosa pratensis hirsuta officin. Pin.
Scandix semine rostrato vulgaris. Pin.
Scirpus omnium minimus capitulo breviori. Tourn.
Scirpus omnium minimus capitulo longiori. Tourn.
Scirpoides quod gramen cyperoides palustre majus, spicâ compactâ. Pin.
Scirpoides quod gramen cyperoides spicâ è pluribus spicis brevibus & mollibus compositâ Rai. hist.
Scirpus equiseti capitulo majori. Tourn.
Sclarea vulgaris lanuginosa. Tourn.
Scorfonera angustifolia subcaerulea. Pin.
Scorfonera latifolia sinuata. Pin.
Scrophularia aquatica major. Pin.
Scrophularia major foetida. Pin.
Scrophularia melissæ folio. Tourn.
Scrophularia ruta canina dicta vulgaris. Pin.
Sedum luteum folio acuto. Pin.
Sedum majus vulgare. Pin.
Sedum minimum acre. J. B.
Sedum teretifolium album. Pin.
Senecio vulgaris. J. B.
Serpilum vulgare minus. Pin.

- Sideritis hirsuta procumbens. Pin.*
Sinapi arvense præcox semine nigro. Hist. Oxonn.
Sinapi rapi folio. Pin.
Sisymbrium annuum absinth. min. folio. Tourn.
Sisymbrium aquaticum. Mathiol.
Sisymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias divisis, filiquâ brevior. Tourn.
Sisymbrium erucæ folio glabro flore luteo. Tourn.
Sisymbrium geniculis umbellatis. Pin.
Sisymbrium palustre raphani folio filiqua brevior. Pin.
Sisymbrium palustre repens nasturtii folio Tourn.
Sium sive apium palustre foliis oblongis. Pin.
Smyrnium. Mathiol.
Solanum officinarum acinis nigricantibus. Pin.
Solanum scandens seu dulcamara. Pin.
Solanum tuberosum esculentum. Pin.
Sonchus lavis laciniatus latifolius. Pin.
Sonchus subrotundo folio nostras levissimis spinulis circa foliorum oras exasperatus. Plukenet.
Sparganium ramosum. Pin.
Sphondylium vulgare hirsutum. Pin.
Stachys folio obscure virente flore ferruginoso. Moris.
Stachys major Germanica. Pin.
Stellaria quæ lenticula palustris bifolia fructu tetragono. Pin.
Stramonium fructu spinoso oblongo flore albo. Tourn.
Stratiotes fluviatilis. Gesner.
Succisa glabra. Pin.
Symphytum consolida major flore purpureo quæ mas. Pin.
Tamnus racemosus flore minore luteo pallidente. Tourn.
Tamnus vulgaris fœmina vel fructifera. Pin.
Taraxacum vulgare luteum. Pin.
Thalictrum major filiquâ angulosâ aut striatâ. Pin.
Thalictrum minus. Pin.
Thalictrum pratense minus. Pin.
Thlaspi arvense perfoliatum majus. Pin.
Thlaspi arvense umbellatum amarum. Pin.
Thlaspi arvense, filiquis latis. Pin.
Thlaspi vulgatus. J. B.
Thymelea linariæ folio vulgaris. Tourn.
Thyselinum palustre. Tourn.
Tithimalus cyparissias. Pin.
Tithimalus exiguus glaber nummulariæ folio. Tourn.
Tithimalus folius pini forte Dioscoridis Pityusa. Pin.
Tithimalus latifolius cataputia dictus. Hort. Lugd. Bât.
Tithimalus lini folio acuto. Bor. Monsp.
Tithimalus myrsinites fructu verrucæ simili. Pin.

- Tithimalus sylvaticus* lunato flore *Pin.*
Tithimalus vulgaris. *Pin.*
Tordylium maximum. *Tourn.*
Tordylium Narbonense minus. *Tourn.*
Tormentilla sylvestris. *Pin.*
Tragofelinum majus umbellâ candidâ. *Tourn.*
Tragofelinum alterum majus, *Tourn.*
Tragofelinum annuum, quod apiam peregrinum foliis subrotundis. *Pin.*
Tragofelinum minus. *Tourn.*
Tribulus des vulgare aquis innascens. *Tourn. app.*
Tribulus terrestris. *J. B.*
Trichomanes seu polytricum officin. *Pin.*
Trifolium arvense humile spicatum sive lagopus. *Pin.*
Trifolium fragiferum nostras. *Morif.*
Trifolium lupulinum montanum. *Pin.*
Trifolium montanum spicâ longissimâ rubente. *Pin.*
Trifolium pratense flore albo minus & fœmina glabrum. *J. B.*
Trifolium pratense luteum capitulo lupuli vel agrarium. *Pin.*
Trifolium pratense purpureum. *Pin.*
Trifolium semen sub terram condens. *A. r. par.*
Trifolium spicâ oblongâ rubrâ. *Pin.*
Triticum hybernium aristis carent. *Pin.*
Turtis. *Lob. Icon.*
Turtis minor. *Bot. monsp. & Tourn.*
Turtis vulgaris ramosa. *Tourn.*
Tussilago vulgaris. *Pin.*
Typha. *Lob. Icon.*
Valeriana palustris minor. *Pin.*
Valeriana rubra angustifolia. *Pin.*
Valeriana sylvestris major. *Pin.*
Valerianella arvensis præcox humilis semine compresso. *Morif. hist.*
Verbascum fœmina flore luteo magno. *Pin.*
Verbascum mas latifolium luteum. *Pin.*
Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente. *Pin.*
Verbena communis caeruleo flore. *Pin.*
Veronica aquatica angustiore folio. *Tourn.*
Veronica aquatica major folio subrotundo. *Hist. oxon.*
Veronica aquatica major folio oblongo. *Morif.*
Veronica aquatica minor folio subrotundo. *Tourn.*
Veronica cymbalarix folio verna. *Tourn.*
Veronica flosculis pediculis longis insidentibus chamædrys folio. *Mor. hist.*
Veronica mas supina & vulgarissima. *Pin.*
Veronica minima clinopodii minoris folio romana. *Boet. Mus.*

- Veronica minor* foliis imis rotundioribus. *Hist. Oxon.*
Veronica pratensis serpilli folia. *Pin.*
Veronica palustris quæ beccabunga. *Tourn.*
Vicia angustifolia purpureo-violacea, siliquâ latâ glabrâ. *Bot. Mon/p.*
Vicia angustifolia siliquâ pisi.
Vicia cum siliquis plurimis hirsutis. *Tourn.*
Vicia minima cum siliquis singularibus glabris. *Tourn.*
Vicia multiflora. *Pin.*
Vicia sativa. *Pin.*
Viola bicolor arvensis flore candido & luteo. *Pin.*
Viola maritima alba. *Pin.*
Viola maritima inodora sylvestris. *Pin.*
Viola maritima purpurea flore simplici odore. *Pin.*
Virga aurea vulgaris latifolia. *J. B.*
Vitis idæa foliis crenatis oblongis fructu nigricante. *Pin.*
Ulmaria. *Clus. hist.*
Urtica urens maxima. *Pin.*
Urtica urens minor. *Pin.*
Vulneraria rustica *J. B.*
Xanthium. *Dod.*
Xeranthemum flore simplici purpureo minore. *Tourn.*
-

LISTE DES ARBRES ET ARBUSTES

*de La Bourgogne, communiquée par M. d'Aubenton,
 Maire & subdélégué à Monbord.*

- V**ITIS idæa foliis oblongis albicantibus. *Pin.*
Cratægeus folio laciniato. *Tourn.*
Cratægeus folio subrotundo serrato & laciniato. *Bot. Par.*
Cratægeus folio subrotundo minus laciniato. *Bot. Par.*
Cratægeus folio subrotundo serrato subtus incano. *Tourn.*
Mespilus folio rotundiori, fructu n'gro subdulci. *Tourn.*
Mespilus folio subrotundo fructu rubro. *Tourn.*
Mespilus apii folio, sylvestris spinosa, sive oxioacantha. *Tourn.*
Mespilus germanica, folio laurino, non serrato, sive mespilus sylvestris. *Pin.*
Alnus rotundifolia, glutinosa viridis. *Pin.*
Buxus arborescens. *Pin.*
Betula. *Dod. pempt. J. B.*
Betula julifera, fructu conoide, viminibus lentis gr. flor.
Virg.

- Cerasus sylvestris amara mahaleb putata. J. B.*
Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro. Pin.
Carpinus foliis variegatis.
Castanea sylvestris quæ peculiariter castanea Pin.
Quercus burgundiaca, calice hispido. Pin.
Quercus cum longo pediculo Pin.
Quercus parva sive phagus græcorum & esculus Plinii.
Caprifolium germanicum. Dod. pempt.
Clematidis sylvestris latifolia. Pin.
Cydonia angustifolia vulgaris. Tourn.
Sorbus fativa. Pin.
Sorbus aucuparia. J. B.
Cornus sylvestris mas. Pin.
Cytisus hirsutus flore luteo purpurascente. Pin.
Berberis dumetorum. Pin.
Acer platanoides. Muhl. hist.
Acer majus foliis eleganter variegatis. Hord. Edimb.
Acer campestre & minus. Pin.
Pinus sylvestris foliis brevibus glaucis, conis parvis albican-
tibus Rat. hist.
Fraxinus excelsior. Pin.
Erica vulgaris glabra. Pin.
Evonymus vulgaris granis rubentibus. Pin.
Evonymus granis luteis.
Genista ramosa foliis hyperici. Pin.
Genista humilior pannonica. Tourn.
Genista spartium spinosum minus. Pin.
Juniperus vulgaris fruticosa. Pin.
Frangula. Dod. pempt.
Grossularia symplici acino, vel spinosa sylvestris. Pin.
Ribes alpinum sterile.
Fagus. Dod. pempt.
Idem folio subtus incano.
Aquifolium baccis rubris. H. Lugd. Bat.
Thymelæa lauri folio, semper virens. Tourn.
Thymelæa lauri folio deciduo. Tourn.
Eadem foliis ex albo variegatis. M. C.
Thymelæa alpina linifolia, humilior, flore purpureo odora-
tissimo Tourn.
Ruscus myrtifolius aculeatus. Tourn.
Hedera arborea. Pin.
Cerasus major ac sylvestris fructu subdulci nigro colore in-
ciente.
Rhæmnus catharticus. Pin.
Staphylodendron. Matth.
Opulus ruellii.

- Ulmus major ampliore folio , ramos extra se spargens.
 Ulmus campestris & Theophrasti. *Pin.*
 Ulmus folio latissimo scabro. *Ger. amur.*
 Pervinca vulgaris angustifolia. *Tourn.*
 Populus nigra. *Pin.*
 Populus tremula. *Pin.*
 Eadem ampliori folio.
 Populus nigra foliis acuminatis , dentatis , ad marginem undulatis.
 Pinus maritima major. *Dod.*
 Pyrus sylvestris *Pin.*
 Malus sylvestris fructu valde acerbo.
 Prunus sylvestris major. *J. B.*
 Prunus sylvestris fructu parvo serotino. *M. C.*
 Rubus vulgaris fructu nigro. *Pin.*
 Idem fructu caſſio.
 Rubus idæus spinosus fructu rubro *J. B.*
 Rosa rubra simplex. *Pin.*
 Rosa rubra multiplex. *Pin.*
 Rosa alba vulgaris major. *Pin.*
 Rosa sylvestris vulgaris , flore odorato incarnato *Pin.*
 Rosa lutea symplex. *Pin.*
 Rosa campestris repens alba. *Pin.*
 Rosa alba pimpinellæ folio.
 Rosa Burgundica.
 Cornus faxmina. *Pin.*
 Salix vulgaris alba , arboreſcens. *Pin.*
 Salix fragilis. *Pin.*
 Salix montana major foliis laurinis. *Pin.*
 Salix folio ex rotunditate acuminato. *Pin.*
 Salix humilis foliis anguſtis , ſubcæruleis , ex adverſo binis ſinopſis. *Rai.*
 Salix vulgaris rubens. *Pin.*
 Salix ſativa lutea , folio crenato. *Pin.*
 Salix folio amygdalino , utrinque virente , aurito. *Pin.*
 Salix pumila linifolia incana. *Pin.*
 Salix humilis anguſtifolia. *Pin.*
 Solanum ſcandens ſeu dulca mara. *Pin.*
 Corylus ſylveſtris. *Pin.*
 Corylus nucibus in racemum congeſtis. *Pin.*
 Sambucus fructu in umbella nigro. *Pin.*
 Sambucus racemosa rubra. *Pin.*
 Tilia faxmina folio minore. *Pin.*
 Eadem folio majore. *Pin.*
 Liguſtrum. *J. B.*
 Vitis vinifera. *Pin.*

Vitis virginiana sylvestris. Park.

Viburnum. Matth.

Idem folio ampliore.

Abies taxifolio, fructu sursum spectante. *Tourn.*

Abies tenuiori folio, fructu deorsum inflexo. *Tourn.*

Cytiso genista scoparia vulgaris flore luteo. *Tourn.*

Rubus flore albo. L. r. p.

Idem alpinus humilis.

Caprifolium flore rubello.

Idem serotinum.

M. d'Aubenton dit qu'il y a en Bourgogne un Orme très-singulier, dont la feuille ressemble au coquillage que l'on nomme Etoile de mer.

EXTRAIT DE L'OUVRAGE

DE M. COLLET,

sur les plantes qui viennent aux environs de Dijon.

ATRIPLEX foetida, *Arroche puante* : on en trouve sur les remparts de Dijon.

Bonus Henricus, *l'Épinars sauvage* : on en voit à l'entrée du clos des Chartreux.

Betonica, *Beroiné* : elle n'est pas commune dans ce pays ; on n'en voit que dans les bois.

Willent : il vient naturellement dans Lavau, auprès de Gettey.

Réponce femelle : elle se trouve dans les montagnes de Vernot, & dans le valon qui est derrière Marcenay.

Asclepias, *Dompte-venin* : il y en a à l'entrée des Perrières, au-dessus des Chartreux.

Azarum, *Cabaret* : il s'en trouve en quantité dans les bois de Saulx-le-Duc & de Courtivron, de Geurey, de Brochon, de Couchey, auprès de l'Hermitage de S. Joseph.

Aristolochia longa, *Aristoloché* : il y en a au fauxbourg S. Nicolas, en allant à S. Apollinaire.

Camœcerasus, *Cerisier bâtard* : il est très-commun.

Cynoglossum, *Langue de Chien* : commun.

Mentha cataria, *l'Herbe aux Chats* : il y en a sur les bords du Bras de Suzon & au coin de la Belle Croix.

Melissa fuschii, la *Mélisse sans odeur* : il s'en trouve dans les bois de Notre-Dame de l'Étang, & autres.

Tribulus

Tribulus aquaticus, la *Châtaigne d'eau* : il s'en trouve dans les étangs de Cîteaux & du côté d'Arney-le-Duc.

Lunaria minor, *petite Lunaire* : on en voit dans la Combe au Serpent.

Reseda, le long des chemins.

Eruca sylvestris, la *Roquette sauvage* : il y en a sur le rempart derrière S. Bénigne.

La grande Jacée : elle est commune dans les bleds.

Acer montanum, le *grand Erable* : il se trouve presque dans tous les bois des montagnes du pays.

Althæa, *Gaimarve* : il s'en trouve dans des prés au bas de la côte, dans ceux d'Arceau & d'Arcelot.

Torminalis : il y en a sur le mont d'Afrique.

Aquilegia, *Anchoise* : il y en a quantité sur la montagne au-dessus de Chenone.

Coridalis, la *grande Fumeterre* : on en trouve auprès de Larrey.

Caryophyllata, la *Benoîte* : on en voit dans toutes les hayes.

Papaver corniculatum, le *Pavot cornu* : il y en a auprès du bastion près le Pont-aux-Chèvres.

Ranunculus bulbosus, la *Rave de S. Antoine* : il y en a dans les prés du moulin d'Ahuy.

Geranium malvæ folio : il vient sur la montagne au-dessus de Baune.

Adonis : il y en a dans les bleds à côté de S. Martin & de S. Arside.

Melanthium, la *Violette romaine* : il y en a dans la plaine au bas de Mont Musard.

Consolida regia, le *Pied d'Alouette* : il s'en trouve dans les mêmes endroits que la précédente.

Pulsatilla, la *Coquelourde* : toutes les montagnes en sont couvertes.

Valeriana angustifolia rubra. *Pia*. On en voit en quantité aux environs de Dijon, dans les Perrières autour de S. Bernard.

Cannabina, *cupatorium cannabinum* : il s'en voit dans les prés de Bruant en-deça.

Sanicula dentaria : il y en a sur les deux côtés du mont d'Afrique.

Aconitum lycoctonum, l'*Aconit*, *Tue-toup*.

Aconitum exruleum, le *Chaperon de moines* : l'Auteur n'a pas voulu indiquer l'endroit où l'on trouve ces deux plantes.

L'*Alliaire* : il y en a dans le jeu d'arquebuse & aux pieds de Charmes

Le *Marrube blanc* : il y en a partout le long des chemins.

Scrophularia fistida odore hirci, la *Scrophulaire puante* : il y en a dans la Combe dessous l'Hermitage de S. Joseph.

Rapunculus spicatus, la *Réponse* : elle vient en abondance dans

les bois en allant à Vernol , en montant de Courtivron à Saulx-le-Duc , & derrière les montagnes de Couchey.

Perficaria mâle : plante commune.

Tréfle mâle : plante commune.

L'Orobanche croît dans les terres stériles.

Les Mousserons croissent dans les taillis & les pelouses de la montagne , où ils font élever la mousse qui leur donne son nom.

L'Epithyme : on en voit beaucoup sur les montagnes par où l'on passe pour aller à l'Hermitage S. Joseph.

La véritable pulmonaire : il y en a beaucoup dans le bois qui est à côté du chemin de Saulx-le-Duc , à Isfutile par le bas.

Hieracium : il y en a sur les murailles des clos.

Semper vivum ou le *Petit Arçon* , ses feuilles sont toujours rouges en Bourgogne.

Le Thora. Il se trouve dans les bois de Notre-Dame du Tan.

L'Ophris : il s'en trouve en quantité dans les bois au-dessous de Brochon & au Mont Afrique.

Lilium convallium : il y en a partout , principalement dans les bois du Mont d'Afrique & de la Vau derrière Geurcy.

Trifolium fragiferum : il y en a dans le clos des Chartreux.

Trifolium bituminosum : il y en a sur le chemin de Dijon à Plombières.

Trifolium acetosum , *Pain de Concou* ou *Alléluia* : il y en a dans la plupart des bois.

Trifolium hepaticum : il s'en trouve une très-grande quantité dans les bois au-dessus de Courtivron.

Menyanthes : il y en a au-dessous de la route de Saneton.

Sanicula officinarum , le *Sanielle* : il y en a en quantité dans les bois de Périgny & aux environs du mont Afrique.

Sagittaria , la *Flèche* ou *Sagitte* : il y en a au-dessus du pont aux Chèvres.

Arbor trifolia : il y en a sur la montagne au-dessus d'Ivry.

Herba Paris : il y en a au dessous de Couchey & au Mont d'Afrique.

Coronopus , *Corne de Cerf* : il y en a sur le chemin couvert du bastion de la porte d'Ouche.

Nymphaea , *Lys d'étang* : il y en a de trois espèces dans les étangs de Cîteaux & de Geurcy ; du blanc , du jaune & du petit blanc.

Potamogeton , *Épis d'eau* : il y en a dans les fossés entre les portes d'Auche & de S. Pierre.

Rubia tinctorum , la *Garance* : il y en a d'une petite espèce dans les terres au-dessous de Notre-Dame de l'Étang.

Martagon : il y en a dans les bois au-dessus de la montagne

de Lanténet, & en ceux qui sont auprès de Fleigneret : Ellebore blanc à fleurs blanches : on en trouve auprès du grand étang de Geucy.

Ellebore blanc à fleurs rouges : il y en a à Mont Musart.

Sigillum Salomonis, *Signet* : il s'en voit du petit & du grand en la Combe derrière Geucy sur la gauche.

Ornithogallum : il y en a au-dessous de l'hermitage de S. Joseph, & dans les pelouses au-dessous d'Ormoï.

Perfoliata, *Percefeuille* : il s'en trouve dans les hayes.

Le Satyrion à fleurs en cône : il vient dans les prés de la Colombière.

Le Satyrion *Barbatum* : il croît dans un pré au-delà de l'Hermitage de S. Joseph.

Le Satyrion à fleurs d'abeilles.

Stachys : on en trouve en allant au moulin au-dessous de la ville.

Scrophularia : il y en a beaucoup le long du ruisseau du clos des Chartreux.

Solanum halicacabum ou Vesicaria : on en trouve en allant à Lichey.

Tilia, le *Tilleul* : il en vient naturellement dans Lavan auprès de Geucy.

Rapunculus spicatus, la *Réponse* : il s'en trouve sur les rives du faux Suzon.

Le Sorbier : on en trouve dans tous les bois.

Sisymbrium sive nasturtium aquaticum, *Cresson d'eau* : il s'en trouve dans les ruisseaux du clos des Chartreux : & presque en toutes les fontaines.

Sium, la *Berle* : il s'en voit aux mêmes lieux.

Ulmaria regina pratorum : *Barbe de Bouc* : il y en a auprès du moulin de S. Étienne aux bords de la rivière.

Nummularia : on ne voit autre chose dans les lieux humides & auprès des marais.

Potentilla, *Argentine* : cette plante se voit aux mêmes endroits.

Eupatorium : il s'en voit le long des chemins dans les lieux secs.

Angelica sativa, *Angélique de Bohême* : on en voit auprès de Vontoux.

Glycyrrhiza, *Ré-lisse sauvage* : il y en a dans les hayes auprès d'Eraule & de Larrey.

Apios : elle est commune dans les terres cultivées de la Bourgogne.

Trichomanes, *Capillaire du pays* : il s'en trouve contre les rochers & murailles en plusieurs pays.

Onobrychis, *Foin de Bourgogne*.

Colutea vesicaria, *Baguenaudier* : il s'en trouve dans les bois du Mont d'Afrique.

Anthemis folio tanacetii : il se trouve dans les bois Cautenet.

Scandix pecten veneris : il s'en trouve dans les champs.

Polypodium, *Polypode* : il s'en voit aux pieds des arbres, sous les roches humides.

Filipendula : il y en a dans les prés au-dessous de Couchey à l'entrée du bois.

Lunaria minor.

Dipsacus, *Chardon à foulon* dont les piquans sont à crochet : on en trouve à Mont Musard.

Phaseolus agrestis, *Phaseol sauvage* : il y en a dans les bois des montagnes.

Beccabunga, *Pourpier d'eau* : il y en a dans tous les ruisseaux.

La grande *Gentiane* : elle se trouve sur presque toutes les montagnes en montant à Notre-Dame du Tan, en allant à Chanceaux auprès d'Etaule, & ailleurs.

Gentiana minor, sive *cruciata*, *Gentiane bleue* : elle est assez commune auprès de Larrey.

Gentiana minima, *petite Gentiane* : il y en a auprès de l'étang de Gourcy, de la rivière de Nuis & de celle de Banne.

Gentianelle : *Mariette des prés* : il y en a dans les prés sous la route de Sully.

Saponaria, *Saponaire* : il y en a entre la Colombière & le Moulin S. Etienne.

Bugula, *consolida minor*, *Bugle* : il y en a dans les prés des Chartreux.

Scordium : il y en a dans les marais au-dessous des petites roches, & sous la route de Sully.

Gratiola : il s'en voit aux mêmes lieux.

Centaureum minus, *petite Centaurée* : il y en a peu dans ce pays ; sinon auprès de Liehey & dans les pays bas.

Ornithogallum à fleurs jaunes : dans le parc de la Colombière, & à fleurs blanches auprès de Dormey.

Les *Asphodèles* blancs se trouvent dans les bois de Somberton.

Hyacinthus botryoides vulgaris : il se trouve dans les vignes & les bleds.

Le petit se voit au-dessus de la fontaine Sainte Anne.

Caryophyllus montanus, *Guillet sauvage* : il se trouve presque par tout dans le pays.

Chamaecistus, *Hyssope de montagnes* : toutes les pelouses de ce pays en sont couvertes.

Chamaelytis, *petit Pin* : il y en a entre S. Apollinaire & la route de Sully, de même que dans les champs auprès de la grande justice.

Cameline, linum campestre : j'en ai vu dans les champs entre Massigny & Savigny.

Aster conyzoides : il y en a dans les prés des pays bas.

La Lyfimachie jaune : il y en a au-dessous de Bruant, & au-dessus du moulin Bernard.

Lyfimachia spicata : il y en a beaucoup le long de la rivière d'Ouche.

Luteola, *Herbe jaune* : il y en a dans le grand chemin par où l'on va à Lafrey.

Draba ou Arabis : il y en a sur les bords de la rivière d'Ouche, entre Pile & le moulin en descendant.

Bistorte : il y en a auprès du moulin d'Afrique.

Digitale à fleurs blanches : il y en a entre Bruant & Plombières, & auprès de Chaignay dans un petit vallon.

Digitale à fleurs rouges : il y en a auprès de Saulieu.

PLANTES DES ENVIRONS DE RHEIMS,

Communiquées par M. Rauffin, docteur-régent de la faculté de cette ville.

ADIANTUM acrostichon vel filix corniculata saxatilis. *Pin.*
On en trouve à Hautviller sur les pierriers qui sont au-dessus des côtes aux renards, & à S. Basle, bois le Sourd, aux environs de Rheims.

Polypodium angustifolium folio vario : au bois le Sourd.

Pulsatilla flore dilutiore : Garenne d'Ecueil.

Pyrola rotundifolia major : au bois Fournier.

Anemonoides scabiosa capitulo caeruleo : à la garenne d'Ecueil.

Rhamnus catharticus : au bois de Nuiseman à Taisy.

Sanicula officinarum : au bois Fournier.

Sisymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias divisis, siliqua breviori : sur la Chaussée des Jésuites.

Thymelea linaria folio vulgaris : entre Joui & Pergny dans les terres.

Thymelea lauri folio deciduo, sive laureola fraxina : au bois le Sourd, à S. Basle, au bois Fournier.

Xanthium : à Courtagnon.

Veronica aquatica major folio oblongo : à Carmont autour des jardins murés.

Androsace vulgaris, latifolia annua. *J. B.* 123. on en trouve proche Muire dans les terres, au pied du mont S. Pierre, proche Tinquaux.

- Brassica campestris perfoliata* flore albo. *Pia.* On en trouve aux environs de Rheims , sur la montagne de Ville demange.
- Caucalis arvensis echinara magno flore.* *Pia.* 152. Hérifsonnée
- Cerasus racemosa sylvestris*, fructu non eduli. *Pia.* Dans les bois d'Yancourt & dans ceux de Trigny.
- Christophoriana vulgaris nostras*, racemosa & ramosa. *Hist. oxon.* 2. 8. à la fontaine de la Peureuse.
- Circæa lutetiana.* *Lob. Icon.* 160. Dans les fossés de la ferme aux Sons , & dans les fosses de S. Nicolas & de S. Eloi.
- Cytisus supinus*, foliis inferne & siliquis molli hirsutie pubescentibus : à Voisy au-dessus proche le Calvaire , & sur toutes les petites montagnes sèches.
- Digitalis* flore magno candido : au champ de la Reine , proche Luvrigny , au mont Flambert , dans le bois à droite en descendant à Avenay.
- Globularia vulgaris* : sur la montagne de Pargny , chemin de S. Euphrasie , à droite proche les vignes.
- Vitis idæa foliis oblongis*, fructu nigriconte : à S. Basle en descendant à la Peureuse , & à Rilly , au bois des Roses.
- Thlaspi allium redolens* : à Sacy dans la rue d'Ecueil , & à la montagne de Pargny , où on tire la pierre.
- Sorbus fativa* : à S. Basle.
- Samolus valerandi* : à S. Thierri , à Outchi , au trou Romarin.
- Pedicularis ferotina lutea* : sur la pelouffe depuis Courtagnon jusqu'à Mary.
- Tithymalus myrsinites* : à Ville-Demange.
- Osmunda vulgaris & palustris* : sur la pelouffe du Champ d'Arène , paroisse de Luvrigny , proche S. Martin d'Abloy.
- Lycopodium vulgare* : à S. Basle , au bois d'Enveau , au-dessus de la Pierre Detelée.
- Alchimilla linariæ folio*, calice florum albo : entre le bois d'Ecueil & Chemery sur la pelouffe.
- Alchimilla erecta*, gramineo folio , minore flore : entre le chemin & la garenne d'Ecueil.
- Berberis dumetorum* : au Fossé S. Nicaise vis-à-vis l'Ame blanche.
- Bidens folio non dissecto* : sur la Chaussée des Jésuites.
- Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro* : à la garenne d'Ecueil , à S. Basle , au bois de Soury.
- Chamædis fructicosa melissæ folio* : entre la maison Blanche & S. Brice.
- Cratægus folio subrotundo serrato* : à S. Basle.
- Elychrisum montanum flore rotundiore subpurpureo* : Plaine de Verfy.

- Eruca procumbens alba*, filiquis singularibus in foliorum alis : en allant à Carmontreuil, prairie de la ville.
- Evonymus vulgaris granis rubentibus* : au bois de Nuiffeman, à Laiffy.
- Frangula* : au bois de Nuiffeman à Laiffy.
- Filix mas ramosa*, pinnulis dentatis : à la garenne d'Ecueil.
- Galeopsis sive urtica iners flore luteo* : à la ferme Housseuse.
- Genistella herbacea sive chamæspartium* : à la garenne d'Ecueil, bois d'Onresy.
- Cruciata gentiana* : dans les fossés S. Nicaise.
- Herba Paris* : au bois Fournier & à la Peureuse.
- Herniaria glabra* : entre le chemin & la garenne d'Ecueil, & au Terrier de Bezanè, lieu-dit en Creander.
- Hieracium murorum*, laciniatum minus, pilosum folio angustiore : garenne d'Ecueil.
- Senecio hirsutus* : garenne d'Ecueil.
- Hypericum pulchrum tragi* : Bois le Sourd.
- Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato* : à Saint-Basle.
- Jacobæa alpina*, foliis longioribus serratis : à S. Basle, à Hautviller.
- Linopense* : à Carmontreuil.
- Linagrostis panicula ampliore* : Bois Fournier.
- Lenchitis aculeata major* : Garenne de Remy.
- Lychais montana viscosa alba latifolia* : à Sablonnière, sur l'ancien chemin de Châtillon à Rheims.
- Ros solis* : au-dessus du bois d'Anveau, à la Pierre Detelée, au haut du bois le Sourd.
- Mentha montana testiculata* : au bois Fournier, au-dessus de la Fontaine du Roradre.
- Muscus terrestris clavatus* : à S. Basle au-dessus de la Pierre Detelée.
- Myrophyllum aquaticum minus* : sur la Chaussée des Jésuites.
- Nidus avis* : Garenne de Courtagnon.
- Onagra* : à Courtagnon.
- Orchis fucum referens colore rubiginoso* : à Verfy au-dessus du Calvaire.
- Ophioglossum vulgatum* : dans les près de la Cense Courlandon, à côté du marais Buffy, vis-à-vis la rivière du Mouhebrulé, au coin du jardin de S. Maurice, lieu dit les près de madame de S. Pierre, dans la pièce du milieu du moulin d'Hurn.
- Orchis spiralis alba*, odorata : Bois le Sourd, à S. Basle.
- Orchis morio famina parva* : dans le petit Bois auprès de la ferme d'Housseuse.

Ornithopodium radice tuberculis nodosa : la garenne de Courtagnon.

Oxys flore albo : Bois Fournier.

Polygala vulgaris floribus caeruleis : Bois S. Liez.

LISTE DE QUELQUES PLANTES

d'Alsace, qui n'ont pas été rapportées dans le catalogue botanique de cette province, découvertes par M. Gagnebin, Suisse.

A*donis vernalis*. *Linn. Sp. plant.* *Ranunculus foeniculaceis foliis, hellebori nigri radice. h. monsp.* l'*Hellebore noir d'Hyppocrate*. Il croît en quantité à une lieue de Neuf-Brillac, dans un petit bois entre Dessenheim & Herder, où le sieur Chevreuse, jardinier de Pont-à-Mousson l'a découvert.

Hieracium aurantiacum. Linn. Sp. *Hieracium hortense, floribus atro purpurascens. Pin.* *Hieracium latifolium-pilosum, coccineum umbellatum indicum hermann. h. l. Bat. p. 315.* Le sieur Chevreuse l'a trouvée sur le Belisca ou Belchau; M. Gagnebin sur le petit Ballon.

Hieracium incanum. Linn. Sp. *Dens leonis montanus angustifolius, Raii synopsis. edit. 3. p. 171.* *Hieracium halleri, Helvet stirp. p. 749.* *Hieracium tragopogonis folio. Pin. 129.* *Tabernaemontanus* dit que cette plante fleurit sur la fin de Mai sur les montagnes d'Alsace, pas loin de la montagne où est situé le Château de Klenisstein, tirant à Feldberg.

Crepis foetida. Linn. Sp. plant. *Hieracium amygdalas amarus olens, seu odore apuli suave rubentis. Vaillants, h. r. paris.* M. Gagnebin en a vu quantité sur la Chaussée près d'Ottmarsheim, tirant à Brillac, sur la fin de Septembre 1743. *Fuselle* en François.

Lappa capitulis glabris minimis. Haller *Lappa vulgaris capitulo minore. Vaillant.* *Lappa major, arctium Dioscoridis. Rai. synopsis.* M. Gagnebin l'a observé en 1747, sur-tout dans les fossés de la Chaussée sur la route de Schelestat à Strasbourg. *Bardane* ou *Glouteron*.

Tussilago alba. Linn. Sp. *Petasites minor. Pin.* Le sieur Chevreuse l'a remarqué en descendant du Rotabac pour aller dans la vallée de S. Tamarin, au-dessus des Verrières.

Myosotis lappula. Linn. Sp. Buglossum angustifolium semine echinato. *Tourn.* M. Gagnebin l'a rencontré sur la Chaussée près Colmar, en Octobre 1747.

Uvularia amplexifolia. Linn. Sp. Polygonatum latifolium ramosum. *Pin.* Il ne s'en trouve pas dans Tournefort; le fleur Chevreuse dit l'avoir vu au pied du Ballon; elle est fréquente dans les Combes de Vallenvron, où M. Gagnebin l'a découvert.

Corrusa matr. Linn. Sp. Auricula urfi laciniata seu cortusa *Matth.* A. flore rubro. B. flore violaceo. C. flore albo. *Tourn.* sont trois variétés. Tabernæmontanus assure que cette plante croît sur les hautes montagnes situées entre Besançon, Vesoul & Montbéliard, de même que sur celles des Vosges, & sur celles de Lorraine entre Epinal & Fontenauce, où elle fleurit sur la fin de Mai & en Juin.

Arctia foliis ciliatis linearibus, floribus umbellatis. Haller. Androsace angusto nervoso folio multiflora ejusd. *Hall.* Androsace foliis ciliatis. *Linn. Sp.* M. Willi, médecin de Mulhouse, l'a découvert au sommet du Ballon, nommé dans les auteurs *Mons Vogesus* ou Montagne de Voge, & en Allemand *Der Belisen*, & M. Gagnebin, en 1757, sur le petit Balon.

Saxifraga stellaris. Linn. Sp. Geum palustre minus, foliis oblongis crenatis. *Tourn.* en Alsace sur le petit Balon, au dessus de Sultz inudis, en quantité.

LISTE DES PRINCIPALES PLANTES

qui se trouvent dans les montagnes de Pila, communiquée par M. Dulac, avocat, à S. Etienne en Forez.

GRATIOLA officinalis. Digitalis minima gratiola dicta. *Tour.* Gratiola centaureoides. *bot. monsp.*

Valériana officinalis. *Linn.* Valeriana sylvestris major. *Pin.*

Globularia vulgaris. *Linn.* Globularia vulgaris. *Tourn.* Bellis exerulea caule folioso. *bot. Monsp.*

Agrimonia eupatoria. *Linn.* Agrimonia officinalis. *Tourn.* Eupatorium veterum seu agrimonia. *bot. Monsp.*

Asarum europeum. *Linn.* Asarum. *Dod.*

Symphitum tuberosum. *Lin.* Symphitum majus & minus. *Tour.*

Rubia tinctorum. *Linn.* Rubia sylvestris monspessulana major. *Tourn.* Rubia tinctorum sativa. *bot. monsp.*

Rumex sanguineus. *Linn.* Lapathum folio acuto rubente. *Pin.*

- Colchicum autumnale. *Linn.* Colchicum commune. *Pin.*
 Dictamnus albus. *Linn.* Fraxinella. *Pin.* Dictamnus albus fraxinella. *Bar. Icon.*
 Pyrola rotundi folia. *Linn.* Pyrola rotundi folia major. *Pin.*
 Cerastrum aquaticum. *Linn.* Alfine major. *Pin.* Alfine maxima solani folia. *Tab.*
 Cotyledon umbilicus. *Linn.* Cotyledon majus. *Pin.*
 Circea luteriana. *Linn.* Circea luteriana. *Tourn.* Circea foliis longioribus obiter crenatis. *Savage.*
 Veronica officinalis. *Linn.* Veronica mas & vulgarissima. *Tour.*
 Arbutus quæ urssi. *Linn.* Uva urssi. *Tourn.* Vitis idæa fructibus carnosis & veluti punctatis. *Pin.*
 Aëta spicata. *Linn.* Christophoriana vulgaris nostras. *Tourn.*
 Aconitum racemosum an aëta Plinii. *Pin.*
 Papaver cambricum. *Linn.* Papaver erraticum, pyrenaicum flore flavo. *Pin.*
 Ranunculus aconiti folius. *Linn.* Ranunculus montanus aconiti folio, flore majore. *Pin.*
 Geum rivale. *Linn.* Cariophyllata aquatica, nutante flore. *Pin.* Cariophyllata septentrionalium. *Lob. Icon.*
 Geum montanum. *Linn.* Cariophyllata montana flore luteo nutante. *Tourn.*
 Helleborus hiemalis. *Linn.* Helleborus niger tuberosus, ranunculi folio, flore luteo. *Tourn.*
 Chrysosplenium oppositi folium. *Linn.* Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis. *Tourn.* Saxifraga rotundi folia annua. *Pin.* Saxifraga romanorum. *Daleck.*
 Scleranthus annuus. *Linn.* Alchimilla supina gramineo folio, flore minore. *Tourn.* Polygonum gramineo folio, majus erectum. *Pin.* Polygonum acuto, angusto & gramineo folio minus repens. *Bot. monsp.*
 Viola calearata. *Linn.* Viola montana grandi flora. *Tourn.*
 Viola alpina exiguis foliis. *Pin.* Melanium alpinum. *Daleck.*
 Pedicularis tuberosa. *Linn.* Pedicularis alpina, asphodeli tadice, flore purpurascente. *Tourn.* Filipendula montana flore pediculariz. *Pin.*
 Digitalis lutea. *Linn.* Digitalis minor lutea, sive pallida parvo flore. *Tourn.* Digitalis flore minore, subluteo parvo flore. *Pin.*
 Erinus alpinus. *Linn.* Ageratum ferratum alpinum. *Tourn.*
 Ageratum purpureum. *Daleck.*
 Melissa grandi flora. *Linn.* Calamintha magno flore. *Tourn.*
 Calamintha montana præstantior. *Pin.*
 Lactuca perennis. *Linn.* Lactuca perennis humilior flore cæruleo. *Tourn.* Chondrilla cærulea altera, cichorii sylvestris folio. *Pin.*

- Paris quadrifolia.* *Linn.* Herba *Paris*. *Dod.* Solanum quadrifolium. *Pin.*
- Adoxa moschatellina.* *Linn.* Moschatellina foliis fumaris bulbosæ. *J. B.* Ranunculus nemorosus moschatellina-dictus. *Pin.*
- Polygonum bistorta.* *Linn.* Bistorta major radice minus intorta. *Tourn.* Bistorta media foliis minus rugosis. *J. B.*
- Lonicera nigra.* *Linn.* Chamæ cerasus alpina, fructu gemino nigro. *Pin.* Periclymenum rectum. *Clus. hist.*
- Lonicera cærulea.* *Linn.* Chamæ cerasus montana, fructu singulari cæruleo. *Pin.* Periclymenum rectum fructu cæruleo. *Clus. hist.*
- Lonicera alpigena.* *Linn.* Chamæ cerasus alpina fructu rubro duobus punctatis notato. *Pin.* *Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis, acutis, integris* *Sauv. Bot. Monsp.*
- Cetropa bella dona.* *Linn.* Bella dona majoribus foliis & floribus. *Tourn.* Solanum lethale. *Bot. Monsp.*
- Rhamnus alpinus.* *Linn.* Frangula rugosior & amplior folio. *Tourn.* *Alnus nigra polycarpus.* *Pin.*
- Spiræa aruncus.* *Linn.* Barba capræ floribus oblongis. *Pin.* Barba capræ. *Cam. Hort.*
- Potentilla hirta.* *Linn.* Quinque folium montanum hirsutum lateum. *Pin.*
- Veratrum nigrum.* *Linn.* Veratrum flore atro rubente. *Tourn.* Helleborus albus flore atro rubente. *Pin.*
- Veratrum album.* *Linn.* Veratrum flore subviridi. *Tourn.* Helleborus albus, ex albido flore. *Pin.*
- Campanula pyramidalis.* *Linn.* Campanula altissima pyramidata. *Tourn.* Campanula lactescens fortidior. *Clus. hist.*
- Campanula trachelium.* *Linn.* Campanula vulgatiores foliis urticæ, vel major & asperior. *Tourn.*
- Campanula latifolia.* *Linn.* Campanula maxima foliis latissimis. *Pin.*
- Campanula rotundifolia.* *Linn.* Campanula minor rotundifolia & alpina. *Tourn.* Campanula alpina minor, rotundioribus imis foliis. *Clus. hist.*
- Phyteuma orbicularis.* *Linn.* Phyteuma foliis oblongis, spica orbicularis. *Dal. Flor. Paris.* Rapunculus folio oblongo, spica orbicularis. *Pin.*
- Phyteuma spicata.* *Linn.* Rapunculus spicatus. *Pin.* Phyteuma foliis cordato lanceolatis, spica oblonga. *Dal. Flor. Par.*
- Daphne mezereum.* *Linn.* Thymelæa folio deciduo sive laureola femina. *Tourn.* Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis laureola femina. *Pin.*
- Daphne laureola.* *Linn.* Laureola semper virens, flore viridi, quibusdam laureola mas. *Pin.*

Vaccinium Myrtillus. Linn. Vitis idæa foliis oblongis crenatis ; fructu nigricante. *Tourn.* Vitis idæa sive Myrtillus. *Tabern. Icon.*

Vaccinium uliginosum. Linn. Vitis idæa foliis subrotundis ex albidis. *Pin.* Vitis idæa. *Clus. hist.*

Vaccinium vitis idæa. Linn. Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris. *Pin.* Vitis idæa semper fructu rubro. *J. B.* *Vaccinia rubra. Lob. Icon.*

Convallaria multiflora. Linn. Polygonatum latifolium maximum. *Pin.* Polygonatum majus vulgari simile. *J. B.*

Convallaria racemosa. Linn. Polygonatum latifolium hellebori albi foliis. *Pin.* Polygonatum ramosum & racemosum spicatum. *Morif.* Polygonatum racemosum americanum, hellebori albi foliis amplissimis. *Pluk. alm.* Liliū floribus reflexis latifolium. *Tourn.* Liliū flore nutante ferrugineo. *Bot. Monsp.*

Anthericum caliculatum. Linn. Phalangium alpinum palustre iridis folio. *Tourn.* Pseudo asphodelus alpinus. *Pin.*

Parnassia palustris. Linn. Parnassia palustris & vulgaris. *Tourn.* Gramen parnassi albo flore simplici. *Pin.*

Sambucus racemosa. Linn. Sambucus racemosa rubra. *Pin.* Sambucus caule arboreo ramoso ; floribus racemosis. *Sauv. Bot. Monsp.*

Crythronium dens canis. Linn. Dens canis latiore, rotundiore que folio. *Pin.*

Genista tinctoria. Linn. Genista tinctoria germanica. *Tourn.* Tinctorius flos. *J. B.*

Genista germanica. Linn. Genista spartium minus germanicum. *Tourn.* Genista spinosa minor germanica. *Pin.*

Fumaria bulbosa. Linn. Fumaria bulbosa radice cava major. *Pin.*

Drosera rotundifolia. Linn. Ros solis folio subrotundo. *Pin.* *Gentiana lutea. Linn.* Gentiana major lutea. *Pin.* Gentiana vulgaris major, hellebori albi folio. *J. B.*

Gentiana verna. Linn. Gentiana alpina verna major. *Pin.* Gentiana verna minor. *Clus. hist.*

Gentiana amarella. Linn. Gentiana pratensis flore lanuginoso. *Tourn.* Gentiana autumnalis ramosa. *Pin.*

Aconitum anthora. Linn. Aconitum salutarium sive anthora. *Tourn.*

Aconitum lycoctonum. Linn. Aconitum lycoctonum luteum. *Tourn.*

Sorbus domestica. Linn. Sorbus sativa. *Pin.*

Sorbus aucuparia. Linn. Sorbus aucuparia. *Tourn.*

Aconitum napellus. Linn. Aconitum coeruleum sive napellus. *Tourn.*

- Athamanta meum. Linn. Meum foliis anethi. Pin. Clus. Tourn. Meum. Dod. pempt.*
- Pimpinella saxifraga. Linn. Tragoselinum umbella candida, Tourn.*
- Sanicula officinalis. Linn. Sanicula officinarum. Pin.*
- Chærophylum hirsutum. Linn. Myrrhis palustris latifolia alba. Tourn. Cicutaria palustris latifolia alba. Pin. Chærophylum latifolium hirsutum album & rubrum. Moris.*
- Saxifraga granulata. Linn. Saxifraga rotundifolia alba. Tourn.*
- Saxifraga rotundifolia. Linn. Geum rotundifolium. Tourn. Sanicula montana rotundifolia major. Pin.*
- Saxifraga cotyledon. Linn. Saxifraga sedifolio, angustiore serrato. Tourn. Cotyledon media, foliis oblongis serratis. Pin.*
- Saxifraga tridactyles alpina. Linn. Saxifraga tridactyles alpina lutea. Tourn. Sedum tridactyles alpinum luteum majus. Pin.*
- Serapias helleborine B. palustris. Linn. Helleborine angustifolia palustris. Pin. Helleborine palustris pratensis nostras. Moris.*
- Ophris ovata. Linn. Ophris bifolia. Pin.*
- Senecio doronicum incanum. Linn. Jacobza integro & crasso hieracii folio. Tourn.*
- Senecio abrotani folius. Linn. Jacobza foliis ferrulaceis flore minore. Tourn. Chrysanthemum alpinum. Clus. hist.*
- Doronicum pardalianches Linn. Doronicum maximum, folio caulem amplexante. Tourn. Doronicum radice scorpii. Pin.*
- Doronicum plantagineum. Linn. Doronicum plantaginis folio. Tourn. Doronicum minus officinarum. Dalech.*
- Hypericum androsæmum. Linn. Hypericum plurimum frutescens. Pin. Androsæmum. Dalechamp.*
- Hypericum hirsutum. Linn. Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato. Tourn. Androsæmum non ramosum. Bot. Monsp.*
- Pinguicula vulgaris. Linn. Pinguicula gesneri. J. B. Sanicula montana flore calcari donato. Pin.*
- Alchemilla alpina. Linn. Alchemilla alpina, quinque foliis, folio subtus argenteo. Tourn. Tormentilla alpina, foliis cæniceo. Pin.*



LISTE DES PLANTES

D'Auvergne,

*Par Dom François - Emmanuel Fournault , religieux
Bénédictin à l'Abbaye de S. Jean d'Angely.*

- L**ILIIUM convallium album : au bois de Roya près Clermont ,
au Puy de Domme.
Polygonatum latifolium vulgate : au sommet du Puy de
Domme.
Polygonatum latifolium hellebori albi foliis : au bois de Roya.
Polygonatum angustifolium , non ramosum : au bois de
Come , à une demi-lieue du Puy de Domme.
Gentiana major lutea : sur toutes les autres montagnes.
Gentiana alpina magna flore : à une lieue des Monts d'Or.
Gentiana caerulea , olis pilosis.
Gentiana pratensis flore lanuginoso : ces deux plantes se trou-
vent dans les prés des Bains du Mont d'Or & dans les prai-
ries de Côme.
Gentiana cruciata : dans les fables le long du chemin aux
environs du Mont d'Or , à Dormant dans les parcs du Châ-
teau.
Soldanella alpina rotundifolia : au Mont d'Or & au Cantal.
Convolvulus linaria folio , humilior : au Clos de S. Allire à
Clermont.
Tithymalus montanus non acris.
Tithymalus myrsinites , fructu vertueux simili : ces deux plantes
se trouvent au Puy de Domme & aux Monts d'Or.
Glaux maritima : autour des fontaines de Jande & de Saint-
Allire. Le pré dit Salins à Clermont en est tout garni.
Cotyledon major : aux rochers élevés de Royat , & plus abon-
damment à la voute près de S. Flour , entre les pierres des
petits murs qui soutiennent les terres.
Althiza Dioscoridis : aux endroits marécageux de la Limagne.
Alcea vulgaris major , flore ex rubro roseo : le long des vi-
gnes , sur les côteaux de S. Allire.
Tamnus ramosa , flore minore luteo pallescenté : au bois de
Royat.
Campanula maxima foliis latissimis , flore caeruleo : au bord
des bois qui sont au-dessous du rocher du Capucin , à côté
des prairies des Monts d'Or.

- Campanula vulgarior* foliis urticæ , vel major & asperior. *Pin.*
Campanula persicæ folio. *Quif.* au bois de Royat.
- Campanula minor* rotundifolia , vulgaris : dans nos provinces
 autour de Paris ; mais elle est sur les montagnes d'Auver-
 gne beaucoup plus grande.
- Campanula pratensis* flore conglomerato : dans les prairies des
 montagnes.
- Campanula alpina* linifolia , cærulea : dans les prairies entre
 la Dordogne & la côte où est le rocher du Capucin.
- Rapunculus spicatus* : au sommet des montagnes. Il y en a
 à fleurs blanches , jaunes & bleues.
- Rapunculus folio* oblongo , spicâ orbiculari : dans nos prai-
 ries de Côme.
- Rapunculus folio* gramineo : dans les fentes des rochers au-
 tour du Puy de Domme & des Monts d'Or.
- Rapunculus scabiosæ* capitulo cæruleo. *Pin.* dans la plainé &
 même dans nos campagnes des environs de Paris ; elle est
 beaucoup plus belle & plus forte sur les montagnes.
- Aparine latifolia* , humilior , montana : dans tous les bois hu-
 mides des montagnes.
- Gallium rubrum* : autour des sources de la Dordogne , & à
 la cime du Mont d'Or.
- Menyanthes palustre* , angustifolium & triphyllum : dans les
 prairies humides aux environs de la Croix Morant , & dans
 toutes les prairies hautes & humides des montagnes.
- Stramonium fructu* spinoso , oblongo , flore albo : autour
 de Clermont.
- Androsace vulgaris* , latifolia , annua : dans les champs cultivés
 de la Limagne , & à Reims en Champagne ; sur les roches
 du Mont d'Or.
- Androsace alpina* , perennis , angustifolia , glabra & multi-
 flora : sur tous les rochers à la cime du Mont d'Or.
- Plantago gramineo folio* major : dans les prés salins de Cler-
 mont.
- Psyllium majus* erectum : dans les champs auprès de S. Pour-
 cain , dans les terres sablonneuses.
- Valeriana alpina* prima. *Pin.* sur toutes les roches du Puy de
 Domme & du Mont d'Or.
- Buglossum angustifolium* majus , flore cæruleo : on en trouve
 un peu dans la Limagne ; elle est commune dans l'Angoumois
 & la Saintonge.
- Buglossum angustifolium* semine echinato : commune dans
 les plaines de Limagne.
- Lysimachia humifusa* folio subrotundo , acuminato , flore luteo :
 au bois de Côme , & dans tous les bois du Mont d'Or.

Veronica pratensis serpilli folia : dans les bois sur le rocher du Capucin.

Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis. *Chrysosplenium foliis minoribus subrotundis* : on en trouve sur les ruisseaux du Mont d'Or & de Royat.

Blattaria lutea folio longo, laciniato : commune dans la Limagne.

Moschatellina foliis fumarix bulbosæ : le long du ruisseau au jardin de S. Allire ; on en trouve dans le Parc de l'Abbaye de Rubais ; dans le Laonnois & près d'Amiens.

Pimpinella sanguiforba major : dans les prairies des bords du Mont d'Or, & aux sources de la Dordogne.

Aristolochia clematidis recta : dans le clos de S. Allire, & le long des fossés, des prés & des vignes.

Digitalis verbasci folio, purpurea, minor, perennis, hispanica. *Bar. Icon.* Montagnes d'Auvergne,

Digitalis minor lutea vel pallida, parvo flore. *Pin.* sur un coteau près de Cervières, & beaucoup à S. Pourcain.

Scrophularia ruta canina dicta, vulgaris : le long des rivières de l'Allier & de la Dordogne.

Pinguicula gesneri : sur les rochers humides des Monts d'Or, dans la plaine de la Croix Morant, & dans les prairies humides de Rheims.

Linaria Bellidis folio : sur les collines pierreuses en montant de Clermont au Puy de Domme.

Asarina lobelii : elle est très-commune le long d'un ruisseau qui traverse la ville d'Arras, & le long de la rivière qui passe à Coulommiers ; on en trouve aussi sur un escalier du parc du Château abbatial des Bénédictins de Pontoise.

Pedicularis alpina, filicis folio major. *Pin.* au Puy de Domme.

Pedicularis alpina asphodeli radice, purpurascens flore.

Pedicularis alpina tencrili facie, atra rubente comâ : prairies du Mont d'Or ; la seconde prairie humide de Rheims.

Euphrasia alpina, parva floribus luteis : au Puy de Domme & au Mont d'Or.

Polygala vulgaris : au Puy de Domme & aux Monts d'Or.

Schizaea vulgaris, lanuginosa, amplissimo folio : la Limagne.

Melissa humilis latifolio maximo flore purpurascens : au bois de Royat.

Calamintha magno flore : sur les montagnes du côté d'Ambert.

Clinopodium origano simile elatius, majore flore. *Pin.* Coteaux de S. Allire.

Satureia sativa : champs de la Limagne.

Cataria major vulgaris : le long des haies & des fossés sortant de Clermont sur le chemin d'Issoire.

- Betonica rubicundissima* flore , montis aurei
Chamædrys palustris , canescens , seu *scordium officinarum* : le long des fossés pleins d'eau & dans les ruisseaux de la Limagne.
Rapistrum monospermum : au clos de S. Allire.
Lepidium latifolium : le long des ruisseaux de S. Allire
Bursa pastoris montana , *globularia folio* : au Puy de Donime , au-dessus du rocher du Capucin & au sommet du Mont d'Or.
Lunaria major filiquâ rotundiore : dans les bois du vallon de Lapardie , au Mont d'Or , & en grande quantité au bois de Royat.
Brassica campestris perfoliata , flore albo. *Pin.* Terres ensemencées de la Limagne.
Cardamine alpina 1. *trifolia*.
Cardamine alpina minor , *reseda foliis* : ces deux plantes se trouvent dans les bois du Cantal.
Dentaria heptaphyllos : dans les bois de la Cascade du vallon de la Pardie au Mont d'Or , & dans ceux de Liourran au Cantal.
Dentaria pentaphyllos , *foliis asperis* : au bois de Côme.
Sisymbrium annuum , *absynthii minoris folio* : autour de Clermont.
Papaver erraticum , *pyrenaicum* , flore flavo : au Mont d'Or & au Cantal , dans les bois de Royat & de Côme.
Alfina altissima nemorum.
Alfina montana latifolia , flore laciniato : ces deux plantes se trouvent aux Monts d'Or & au bois de Côme.
Alfina saxatilis & *multiflora capillaceo folio* : sur les rochers du Mont d'Or.
Alfina saxatilis laricis folio , major , & majori flore : le long des torrens près Clermont.
Alfina palustris exigua , *flosculis albis foliis lanceolatis*. *Mentzelii*. au Vallon de la Pardie.
Ros solis folio subrotundo. *Pin.* 357. Prés humides de la Croix Morant , & prés humides des montagnes ; à S. Basle près de Rheims.
Parnassia palustris & *vulgaris* : prairies de Rheims.
Kali minus album semine splendente : terres ensemencées de la Limagne.
Helianthemum vulgare , flore albo : au clos de S. Allire.
Helianthemum tenuifolium , *glabrum* , luteo flore per humum sparsum : côteaux de S. Allire.
Geum rotundifolium majus : au Mont d'Or ; à Rebais en Brie
Geum palustre minus , *foliis oblongis crenatis* : aux pieds

des rochers humides des Monts d'Or , & le long des eaux qui coulent dans la plaine de la Croix Morant.

Saxifraga rotundifolia alba : très-commune entre les rochers en allant de Clermont à Royat , dans la prairie de Côme , à Brereuil en Picardie , à Nogent-sous-Couais dans le Soissonnois.

Saxifraga muscosa , *trifido folio* : aux rochers des Monts d'Or & de Royat.

Saxifraga tridactylites alpina , *pallide lutea*.

Saxifraga tridactylites alpina , *minor* & *villosa* : ces deux plantes se trouvent sur le sommet des rochers des Monts d'Or & du Cantal.

Saxifraga fedi folio angustiore , *serrato* : sur les rochers du Mont d'Or & du Cantal.

Pyrola rotundifolia major : dans les bois de S. Basle & de S. Thierry près de Rheims , & dans un bois près de S. Fuscien en Picardie.

Pyrola folio mucronato , *serrato* : au Mont d'Or , sur le rocher du Capucin , bordant la prairie.

Sedum minus , *folio circinato* : dans les rochers & les murs en allant à S. Marc.

Anacampteros purpurea : sur les rochers à Royat & au Puy de Domme.

Geranium batrachioides foliis aconiti : au clos de S. Allire , bois de Royat , prairies humides des Monts d'Or & du Cantal.

Geranium phaeum , *fuscum* , *petalis rectis seu planis* : au bas du rocher du Capucin.

Geranium sanguineum maximo flore : prés humides de Côme , du Puy de Domme & du Mont d'Or.

Geranium romanum verticillor , *sive striatum* : en montant au Puy de Domme , dans les prés de la Fon-de-l'Arbre & au Mont d'Or.

Thalictrum alpinum majus aquilegiae folio , *florum staminibus albis* , *caule viridi* : à S. Marc près Clermont , & à Beauregard près du pont du Château.

Thalictrum minus alphodeli radice , *parvo flore* : au bois de Côme.

Helleborus niger , *foetidus* : autour de Clermont.

Helleborus niger ranunculi folio , *flore globoso* , *major* & *minor* : montagnes d'Auvergne , prairies hautes & humides.

Veratrum flore subviridi : Bains du Mont d'Or.

Pulsatilla apii folio vernalis , *flore minor*.

Pulsatilla alpinahispidior , *lutea* : ces deux plantes se trouvent au Mont d'Or au-dessus du rocher du Capucin.

- Ranunculus phragmites* albus vernus : commun en Auvergne , en Picardie & en Champagne.
- Ranunculus montanus aconiti folio* albus , flore majeure & minore : le long de tous les ruisseaux aux Monts d'Or , au Puy de Domme. Il y en a à grandes fleurs aux sources de la Dordogne.
- Ranunculus apii folio* , lævis : dans les ruisseaux qui coulent dans la plaine de la Croix Morant.
- Quinquefolium minus* repens , alpinum aureum. *Pis.* Au sommet du Mont d'Or & du Puy de Domme.
- Quinquefolium folio* argenteo : auprès de S. Pourçain & de Clermont.
- Pentaphylloides palustre* , rubrum : dans toutes les prairies des montagnes.
- Christophoriana vulgaris nostras* racemosa & ramosa : au bois de Royat.
- Onagra latifolia* : le long de la Fibule , près S. Pourçain.
- Chamaenerion latifolium* vulgare : sur les bords de la Dordogne , dans la prairie des Bains du Mont d'Or ; dans la forêt de S. Nicolas - aux-Bois près de Laon.
- Ammi* perenne , Clos de S. Allire , & les vignes autour de Clermont.
- Apium pyrenaicum* , thapsiz facie : au sommet du Mont d'Or & au Puy de Domme.
- Carvi foliis tenuissimis asphodeli radice* : prés humides du Mont d'Or & de la Croix Morant.
- Buibocastanum majus* , folio apii : aux environs des sources de la Dordogne.
- Meum foliis anethi* : au Puy de Domme , dans les prairies de la Croix Morant & de la Chaise-Dieu.
- Astrantia major* , coronâ floris candidâ : prés élevés du Mont d'Or , du Puy de Domme , du Cantal , & de toutes les montagnes d'Auvergne.
- Myrrhis annua* , semine striato , villosa , incano : au bois de Royat.
- Imperatoria major* , au Mont d'Or , au Puy de Domme & au Cantal.
- Imperatoria pratensis major* : dans tous les endroits humides des Monts d'Or & de Royat.
- Oreoselinum apii folio* majus & minus : sur les côtes de S. Allire.
- Laserpitium foliis latioribus lobatis* : au bois de Royat , au Puy de Domme , & aux Monts d'Or.
- Hydrocotyle vulgaris* : dans les prés humides de la Limagne.
- Caryophyllus flore tenuissime dissecto* : au Puy de Domme , aux Monts d'Or.

Caryophyllus sylvestris, humilis, flore unico : sur les rochers du Mont d'Or & du Cantal.

Lychnis sylvestris sive *aquatica*, *purpurea simplex* : le long des torrens près Clermont.

Lychnis viscosa floribus foris purpurascens intus albis : dans un petit bois près Clermont, montant au Puy de Domme.

Lychnis viscosa, flore muscose minor : au clos de S. Allire.

Lychnis sylvestris quæ *saponaria* vulgo : par toute la Limagne.

Lychnis saxatilis, *viscosa*, *rubra*, *angustifolia* : on trouve cette plante en montant des Bains au Mont d'Or, & sur-tout au sommet de cette montagne.

Cucubalus Plinii : au clos de S. Allire, & dans les hayes qui séparent les vignes sur les côteaux de S. Allire.

Statice : dans plusieurs endroits des montagnes autour de Clermont.

Statice montana minor : au clos de S. Allire.

Muscari arvense, *latifolium purpurascens* : dans les champs cultivés.

Narcissus albus, *circulo purpureo* : dans les prairies du Mont d'Or, autour des sources de la Dordogne, & dans celles de la Chaise-Dieu.

Narcissus major, *luteus*, *calyce prælongo* : au Puy de Domme, & aux bois des Monts d'Or.

Iris vulgaris germanica, sive *sylvestris* : au clos de S. Allire.

Phalangium parvo flore, non *ramosum*.

Phalangium parvo flore ramosum : ces deux plantes se trouvent à deux lieues de la Chaise-Dieu.

Lilium floribus reflexis, *montanum*, flore *maculis rubris inordinatis asperso* : au bois de Royat & au Puy de Domme.

Lilio-hyacinthus vulgaris flore exeruleo : au bois de Côme.

Ornithogallum umbellatum, *medium*, *angustifolium* : champs cultivés de la Limagne.

Ornithogallum luteum : on en trouve dans les campagnes de Rheims.

Ornithogallum æstivum, *flosculis alternatim positis*.

Ornithogallum pumilum, *vernum* : ces deux plantes se trouvent au clos de S. Allire.

Allium sylvestre latifolium : au bois de Côme.

Allium montanum, *latifolium maculatum* : dans les bois & sur les roches des plus hautes montagnes.

Narcisso leucolum trifolium minus : aux Monts d'Or aux environs des sources de la Dordogne.

Vulneraria rustica : prairies des montagnes.

- Orobis sylvaticus* nostras : au sommet du Puy de Domme , dans le pré de Bayle , au Mont d'Or.
- Orobis sylvaticus* vicix foliis : sur les côteaux de S. Allire.
- Lathyrus sylvestris* , luteus , foliis vicix : bois de Royat.
- Galega vulgaris* , floribus cœruleis.
- Ornithopodium majus* : ces deux plantes se trouvent sur les côreaux de S. Allire.
- Ornithopodium minus* : sur le bord des champs de la Limagne.
- Trifolium montanum* spicâ longissimâ rubente : au Puy de Domme & aux Monts d'Or.
- Anonis alpina* , humilior , radice ampla & dulci , *Régliſſe de montagne* , fort commune sur les rochers , & parmi les bruyères des montagnes. Les paysans en arrachent les racines qui sont très-grosses , & les vendent pour de la régliſſe , dont elles ont effectivement le goût.
- Balsamina lutea* sive noli me tangere : aux lieux humides & à l'ombre ; on en trouve beaucoup en allant de Clermont à S. Marc , aux chutes d'eaux des moulins , il y en a en quantité aux Monts d'Or.
- Viola montana* , cœrulea grandiflora : prairie de Côme , & sur toutes les montagnes d'Auvergne.
- Fumaria bulbosa* , radice non cavâ : au bois de Côme ; sur les côteaux auprès de S. Pourcain.
- Aconitum lycoſtionum* luteum.
- Aconitum cœruleum* seu napellus primus : ces deux plantes se trouvent au Puy de Domme & aux Monts d'Or , sur les côtes exposées au nord.
- Orchis barbata* odore hirci , brevior , latioreque folio.
- Orchis spiralis* odorata : ces deux plantes se trouvent dans l'enclos des Minimes de Beauregard , dans la Limagne.
- Limodorum montanum* flore ex albo dilute vireſcente : au Mont d'Or suivant M. Monnier , & au Cantal suivant M. Chomel.
- Xanthium* : dans les endroits marécageux de la Limagne.
- Carduus albis maculis notatus* , vulgaris : autour de Clermont , sur le chemin d'Issoire.
- Carduus cespice rotundo tomentoso* : ce Chardon croit sur le chemin de Clermont aux Monts d'Or , & suivant les endroits plus ou moins favorables où il se trouve , il diffère de beaucoup en grandeur ; l'auteur en a vu qui s'élevoient à la hauteur de cinq à six pieds à Beaulieu en Bas-Limousin , dans une île formée par la Dordogne.
- Carduus stellatus* luteus foliis cyani : autour de Clermont le long des chemins.
- Cyanus montanus latifolius* , vel verbaſculum cyanoïdes : au Puy de Domme , au Puy de Côme.

Cirsium acanthoides montanum flore flavescente : au bois de Royat.

Cacalia foliis crassis hirsutis : au Puy de Domme , & aux Monts d'Or , côtes exposées au nord.

Elychrysum montanum folio rotundiore subpurpureo.

Elychrysum flore rotundiore candido.

Elychrysum flore rotundiore suave rubente.

Elychrysum flore rotundiore variegato.

Elychrysum flore longiore & folio & flore purpureo.

Elychrysum flore longiore & folio & flore albo.

Ces six plantes se trouvent au Puy de Domme & aux Monts d'Or.

Elychrysum spicatum : aux Monts d'Or.

Elychrysum alpinum minimum capillaceo folio : sur les rochers aux Monts d'Or près des sources de la Dordogne.

Gonyza linearis folio : à S. Pourcain sur un côteau couvert d'un bois fort clair , & sur les côteaux de S. Allire.

Abfynthium ponticum , seu *romanum officinarum* , seu *Dioscoridis* : dans les masures des châteaux ruinés.

Abrotanum campestre , cauliculis rubentibus : à S. Pourcain le long de la Sicule , & à S. Thierry dans la Champagne.

Tanacetum vulgare luteum : côteaux de S. Allire.

Bidens foliis tripartito divisis : le long des fossés pleins d'eau de la Limagne.

Dipsacus sativus.

Dipsacus sylvestris , aut *virga pastoris major* : ces deux plantes se trouvent dans la Limagne.

Lactuca alpina , glabra , acanthi folio , flore magno , caeruleo. *Vaill.*

Lactuca alpina , altissima villosa , sonchi folio . flore purpureo ; ces deux plantes se trouvent le long du bois au-dessous du rocher du Capucin.

Chondrilla sonchi folio , flore luteo pallescente : aux côteaux de S. Allire.

Chondrilla sonchi folio , flore purpurascente major : bois du Mont d'Or , & au bois de Côme.

Aster montanus caeruleus , magno flore , foliis oblongis : côteaux de S. Allire.

Aster montanus caeruleus , omnium minimus : sur les roches les plus élevées du Mont d'Or.

Aster senecionis folio , villosa & graveolente : sur les roches allant de Clermont au Puy de Domme.

Aster omnium maximus , *helenium dictus* : auprès de S. Pourcain , sur les bords de la Sioule & dans la Limagne.

Virga aurea , alpina , laurinis rigidioribus foliis : au bois de Royat & aux Monts d'Or.

Jacobaea alpina foliis longioribus serratis : aux Monts d'Or.

Jacobaea foliis ferulaceis flore minore : au pied du Puy de Domme , aux environs de la Chaise-Dieu.

Jacobaea integro & crasso hieracii folio : au bois de Royat , au Puy de Domme.

Doronicum radice scorpi : auprès de Breteuil & de S. Fuscien , en Picardie.

Doronicum plantaginis folio : prairies de Côme & Puy de Domme.

Doronicum maximum , foliis caulem amplexantibus : au bois de Côme , sur les penchans rapides du Puy de Domme & du Mont d'Or , vers le nord.

Xeranthemum flore simplici ex albo & rubro absolute mixto : côteaux de S. Allire.

Carlina acaulos flore magno , radice perenni montis augei : auprès de Clermont , sur le mont vulgairement appelé Grave-ner , sur le chemin du Mont d'Or. Les paysans portent les têtes épineuses de cette plante au marché , & les vendent comme artichauts sauvages.

Acetosella montana maxima : aux Monts d'Or vers le nord.

Acetosella rotundifolia alpina : sur les rochers aux Monts d'Or.

Lapathum folio rotundo , alpinum : les paysans se servent de la racine à la place de la rhubarbe ; elle purge assez bien.

Herniaria glabra & hirsuta : Croix Morant & au Puy de Domme.

Empetrum montanum , fructu nigro : Mont d'Or.

Abies taxi folio fructu sursum spectante : Monts d'Or & Chaise-Dieu.

Pinus sativa : Chaise-Dieu.

Salix montana major , foliis laurinis : au Mont d'Or le long de la Dordogne , & dans les prés aux environs de Lafond-de-l'Arbre

Salix alpina pumila , rotundifolia , repens inferne subcinerea : Croix Morant.

Salix pumila foliis utrique candicantibus & lanuginosis : source de la Dordogne , & aux environs de la Croix Morant.

Salix pumila , linifolia , incana : au Mont d'Or & au Cantal.

Rhamnus catharticus : dans les hayes auprès de S. Just , en Picardie.

Thymelea laurifolia semper virens seu laureola mas : au bois de Côme , au Puy de Domme.

Thymelea laurifolia deciduo seu laureola femina : autour de S. Fuscien en Picardie , de Rebais dans la Brie , & de S. Basle en Champagne.

Uva ursi : sur les montagnes de Rouergue.

Sambucus racemosa rubra : Mont d'Or.

- Vitis idæa* foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante : au Puy de Domme & aux Monts d'Or.
- Vitis idæa* foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris. *Pin.* Rocher du Capucin, à la cime du Mont d'Or.
- Vitis idæa* foliis subrotundis, ex albidis : rochers les plus arides.
- Chamæcerasus dumetorum* fructu gemino rubro : bois de Royat, & dans les hayes autour de Clermont.
- Frangula montana*, pumila, saxatilis folio subrotundo : au sommet du Puy de Domme.
- Berberis dumetorum* : côteaux de S. Allire.
- Rubus idæus* levis : dans tous les bois du Mont d'Or.
- Rubus alpinus* humilis : au sommet du Puy de Domme vers le nord, & sur le rocher du Capucin.
- Cratægus* folio subrotundo, serrato, intus incano : au bois de Royat, sur le chemin du pont du Château à Ambert.
- Cratægus* folio laciniato : au bois de Royat & de Côme.
- Sorbus aucuparia* : sur le chemin du pont du Château à Ambert.
- Rosa sylvestris* foliis odoratis : aux bois du Mont d'Or & du Puy de Domme.
- Grossularia vulgaris*, fructu dulci : Royat, Puy de Domme, Monts d'Or.
- Grossularia multiplici* acino sive non spinosa : on en trouve aux bois du Mont d'Or, sur la côte où est le rocher du Capucin, & autour de la Cascade.
- Mespilus germanica* folio laurino non serrato, sive *mespilus sylvestris*.
- Mespilus* folio rotundiore, fructu nigro, subdulci : *Amelan-chier*, dans les bois de Royat & du Mont d'Or.
- Coronilla minima* : côteaux S. Allire sur le haut.
- Ageratum serratum* alpinum, glabrum flore purpurascense : sur les rochers de la côte orientale au-dessus du village des Bains, & autour de la Cascade.
- Cuscuta major* : au clos de S. Allire, & à Beauregard sur les orties.
- Clandestina* flore subæruleo : à S. Pourcain & dans la Limagne.
- Smilax unifolia* humillima : à Côme & aux Monts d'Or dans les bois du rocher du Capucin.
- Tribuloides* vulgare aquis innasces : dans les étangs à Orleat, près de Thiers, dans la Limagne.
- Oxycoccus* sive *vaccinia palustris* : dans la plaine de la Croix Morant.
- Thesium* *Linn.* au Puy de Domme, & à Beauregard près Clermont.

PLANTES DES ENVIRONS

de Souillac en Quercy, & de Beaulieu en Bas-Limousin, par Dom Emmanuel Fournault.

Ruscus myrthifolius aculeatus : sur les côteaux regardant le nord, dans la Forêt de Compiègne.

Cotyledon major : le long de la Dordogne.

Althæa Dioseoridis & Plinii, sur la côte de S. Etienne.

Tamnus racemosa, flore minore luteo palléscente : autour de Souillac.

Campanula minor, annua, foliis incisís : en Quercy & en Saintonge ; c'est le *Rostla* de Linnæus.

Rubia tinctorum sativa : autour de Souillac.

Stramonium fructu spinoso, oblongo, flore albo simplici : autour de Souillac, à Castelnau de Bertenous, près de Beaulieu en Bas-Limousin.

Pervinca latifolia, florè caruleo : à Ebene & à Martel près Souillac.

Centaurium luteum perfoliatum : le long de la Dordogne.

Psyllium majus supinum : sur les côteaux arides allant de Souillac à Pinfat.

Valeriana foliis calcetrapæ : à Souillac sur les murailles.

Euglossum angustifolium majus flore caruleo : en allant de Souillac à Pinfat.

Symphitum minus, tuberosa radice : entre Souillac & la Dordogne.

Lyfimachia humifusa folio rotundiore, flore purpurascence : à Beaulieu auprès des sources, sur les côteaux.

Samolus valerandi : dans les prairies humides entre Souillac & la Forge.

Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis : aux sources des côteaux de Beaulieu.

Blattaria lutea, folio longo, laciniato : sur le chemin de Souillac à la Motte.

Alkekengi officinarum : dans les hayes & les vignes

Arum venis albis.

Aristolochia clematitis recta : dans les vignes.

Digitalis major lutea vel pallida, parvo flore : sur les côteaux arides.

Digitalis minor lutea parvo flore : sur les côteaux arides de Beaulieu.

Scrophularia ruta canina dicta vulgaris : sur les bords de la Dordogne.

Linaria bellidis folio : sur les côteaux de Beaulieu.

Pedicularis ferotina lutea.

Pedicularis ferotina purpurascens flore : ces deux plantes se trouvent autour de Souillac.

Schlarœa : le long de la côte entre Prédignat & la Mote.

Salvia minor non aurita : sur un coteau en montant de Souillac au chemin de Paris.

Stachis major Germanica : à la Plâne, près Souillac.

Cardiaca : à Maironne, en quantité.

Sideritis hispanica, erecta, folio angustiore : sur un coteau près Souillac, & à Roquemadoure. dans le Périgord & l'Angoumois.

Marrubium album vulgare.

Melissa hortensis : elle croît ici d'elle-même le long des hayes.

Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascens : le long de la Dordogne.

Satureia fativa : commune dans les terres cultivées, dans les vallées.

Hyssopus officinarum, caerulea seu spicata : dans le chemin de Souillac à Pinfat, & sur les roches le long de la Dordogne.

Chamaedrys palustris canescens, seu *scordium officinarum* : au bas de la côte de S. Etienne.

Polium montanum repens : sur les côteaux de Lamar, à une lieue de Rheims.

Jonchlaspi luteo flore, incanum, montanum discoides. *Col. Park.* 1180. sur les roches le long de la côte S. Etienne, & au port de Lanzac.

Thlaspi umbellatum arvense, amarum : sur les rochers.

Nasturtium sylvestre, tenuissime incisum : entre Souillac & la Dordogne.

Thlaspidium Monspeliense, hieracii folio hirsute : à Roquemadour sur les rochers, en Angoumois & en Saintonge.

Alysson perenne, montanum incanum : sur tous les rochers le long de la Dordogne.

Lunaria major, siliqua rotundiore : dans une île formée par la Dordogne à Beaulieu.

Hesperis hortensis flore purpureo : le long du ruisseau qui passe à Souillac du côté de la Mote.

Cardamine annua exigua flore : dans quelques bois humides & auprès des moulins.

Sisymbrium aquaticum, foliis in profundas lacinias divisis, siliqua breviori : sur les bords de la Dordogne.

- Hypecoön latifolium* folio : dans une île formée par la Dordogne à l'abbaye de Beaulieu.
- Erucago segetum* : entre Souillac & la Dordogne.
- Kali minus album*, semine splendens : au haut des côtes qui environnent Souillac.
- Helianthemum vulgare*, flore luteo.
- Helianthemum vulgare*, flore albo.
- Helianthemum tenuifolium*, glabrum luteo flore per humum sparsum : ces trois plantes se trouvent sur les côtes autour de Souillac.
- Androsamum maximum frutescens* : le long des torrens qui tombent des côtes autour de Beaulieu.
- Saxifraga rotundifolia alba* : le long d'une côte exposée au nord auprès de Souillac.
- Ranunculus phragmites albus vernus* : dans les bois de Salagnac, dans la prairie entre Souillac & la Dordogne.
- Onagra latifolia* : la prairie entre Souillac & la Dordogne.
- Amni perenne* : dans les vignes.
- Bulbocastanum majus folio apii* : dans les bois sur les côtes humides regardant le nord.
- Carvi foliis tenuissimis asphodelli radice* : dans les prairies de Beaulieu.
- Bupleurum montanum*, gramineo folio : sur le sommet des côtes allant de Souillac à Sainte Sophie.
- Oenanthe apii folio* : le long du ruisseau qui passe à Souillac.
- Oenanthe five filipendula aquatica altera* : dans les prairies sous la côte de S. Etienne.
- Angelica sylvestris*, minor five etratia : le long des hayes dans la prairie entre Souillac & la Dordogne.
- Charophyllum sylvestre*, perenne cicutz folio : dans la cour de l'abbaye de Souillac.
- Oreoselinum apii folio minus* : à Roquemadour sur les rochers.
- Laserpitium humiliss paludapii folio flore albo* : sur le haut des rochers de Roquemadour.
- Hydrocotyle vulgaris* : dans les prairies humides entre Souillac & la Forge.
- Cucubalus Plinii* : dans les osiers le long de la Dordogne.
- Linum sylvestre*, caruletum, folio acuto : sur les rochers le long de la Dordogne.
- Narcissus niveus*, odoratus, circulo rubello : dans les prairies des endroits élevés du Quercy.
- Phalangium ampliore folio*, non ramosum : le long de la Dordogne.
- Phalangium parvo flore ramosum* : entre Souillac & la Forge.

- Lilium* floribus reflexis montanum , flore maculis rubris inordinatis asperso : entre Souillac & la Forge.
- Allium* sylvestre latifolium , dans les mêmes endroits.
- Narcisso* leucolum trifolium , minus : à Souillac.
- Vulneraria* flore purpurascente : dans les pâturages élevés autour de Souillac.
- Lathyrus sativus* flore purpureo : on en sème à Souillac
- Lathyrus* major latifolia , flore majeure purpureo speciosus : entre Souillac & la Forge.
- Ornithopodium* minus : le long de la Dordogne.
- Ornithopodium* portulacæ folio : dans l'Angoumois & la Saintonge.
- Trifolium* spicâ oblongâ rubrâ : dans les prairies de Souillac.
- Trifolium* hispanicum ; angustifolium spicâ dilute rubente : sur le haut des côteaux qui bordent la Dordogne.
- Anonis* viscosa , spinis carens : le long de la Dordogne , au-delà du port de Lanzaç.
- Balsamina* latea seu noli me tangere : dans l'île formée par la Dordogne à l'abbaye de Beaulieu.
- Fumaria* bulbosa , non cavâ radice : sur les côteaux au nord de Souillac , à la Forge.
- Orchis* barbata , odore hirci , brevior latioreque folio : sur le chemin de Souillac à la Motte.
- Orchis* alba bifolia minor calcari oblongo : dans les bois de la Planc.
- Helleborine* latifolia montana : entre Souillac & la Forge.
- Limodorum* austriacum : sur plusieurs côteaux autour de Souillac.
- Nidus* avis : dans les bois près d'Amiens , de Rheims , & dans la forêt de S. Nicolas aux bois près de Laon.
- Xanthium* : autour de Souillac.
- Cyanus* humilis hieracii folio , flore à caeruleo obsolete purpurascente : sur le chemin de Mié à Roquemadour.
- Elychrysum* , seu stæchas citrina , angustifolia : dans le Périgord , l'Angoumois & la Saintonge.
- Elychrysum* sylvestre latifolium capitulis conglobatis : sur les rochers le long de la Dordogne.
- Absinthium* ponticum , seu romanum officinarum seu Dioscoridis : dans les osiers le long de la Dordogne.
- Globularia* vulgaris : autour de Souillac.
- Aster* montanus luteus salicis glabro folio : au-dessus des vignes qui bordent le grand chemin allant de Souillac au port de Lanzaç.
- Virga aurea* major foliis glutinosis & graveolentibus : autour de Beaulieu.
- Doronicum* radice scorpii : sur les côteaux au nord de Souillac à la Forge.

- Matricaria tanacetifolia* , flore majore , semine umbilicato : le long de la Dordogne.
- Chamæmelum nobile* , sive *leucanthemum odoratum* : le long de la Dordogne.
- Chenopodium annuum* , humifusum folio breviori & capillaceo : à Souillac sur les côteaux entre le chemin de Martal & de S. Sotier.
- Herniaria glabra* & *hirsuta* : sur les bords de la Dordogne.
- Parietaria officinarum* & *Dioscoridis* : sur les murailles & les rochers le long de la Dordogne.
- Gramen spicatum* perenne , semine miliaceo , tuberosâ radice : le long de la Dordogne ; sur les remparts de Rheims.
- Asplenium* sive *ceterach* : en abondance dans ce pays.
- Lingua cervina officinarum* : aux environs de Souillac.
- Lichen pixidatus* , major : sur les bords escarpés de la Dordogne , à l'aspect de l'orient.
- Tubera* : c'est des environs de Souillac qu'on porte à Paris les meilleures truffes qu'on y mange.
- Buxus arborescens*.
- Therebinthus vulgaris* : il y en a beaucoup sur les côteaux les plus secs & les mieux exposés au soleil. Pourquoi néglige-t-on la culture de cet arbruste , qui y vient très-bien de lui-même ? il y est inconnu à tous les habitans du pays.
- Ilex aculeata cocci glandifera* : le long de la Dordogne.
- Castanea sativa* : il vient ici de très-bons marons.
- Rhamnus catharticus* : dans les hayes sur la hauteur.
- Alaternus*. 1. *Clus.* Il est commun ici & toujours verd.
- Opulus ruellii* : sur les bords des ruisseaux.
- Tinus prior* : il vient ici en pleine terre.
- Chamaecrasus dumetorum fructu gemino rubro* : dans les bois.
- Celtis fructu nigricante* : dans les bois & les haies sur les hauteurs.
- Berberis dumetorum* : sur les hanturs du côté d'Ebene , à une lieue de Souillac.
- Spiræa hyperici folio crenato & non crenato* : petit arbruste très-commun sur les hauteurs.
- Cratægus folio subrotundo , serrato , subtus incano*.
- Cratægus folio oblongo , serrato , utrinque virente* : ces deux plantes se trouvent sur les côtes devant Pinlat , exposition du nord , sur les bords de la Dordogne.
- Cuscuta major* : sur les côteaux autour de Souillac.
- Clandestina flore subæruleo* : dans les osiers sur les bords de la Dordogne.
- Ficus sylvestris Dioscoridis* : sur les rochers le long de la Dordogne.

Thesium. Linn. en abondance sur les côteaux arides entre les rochers.

PLANTES OBSERVÉES SUR

la route de Souillac à S. Jean d'Angely , par Dom François-Emmanuel Fournault.

CORONOPUS laciniatus : dans les sentiers du côté de S. Même , près Bassac en Angoumois.

Horminum sylvestre latifolium , verticillatum : à Bassac , à S. Jean d'Angely , dans les prés & dans les chemins.

Dorycnium majus : sur des hauteurs du côté de S. Même , & dans la carrière , & aux environs de Coignac le long du chemin.

Catananthe quorundam , du côté de Salle , à une lieue de Coignac.

Sorbus sativa : à Bassac.

Erica maxima purpurascens , longioribus foliis : auprès de Périgneux.

Genista spartium minus , germanicum : aux mêmes endroits.

LISTE DE QUELQUES PLANTES

*très-communes aux environs de Nantes ,
par M. Bonamy , professeur en Botanique.*

ARTEMISIA maxima. *Linn.*

Artemisia caeruleascens. Linn.

Abfynthium maritimum foliis superioribus in aliquot laciniis divisis. Pin.

Scleranthus calycibus fructus patulis. Linn.

Alchimilla gramineo folio , majori flore. Tourn.

Thesium linophilum. Linn.

Alchimilla minima montana. Park. 1. 146.

Alchimilla supina gramineo folio minore flore. Tourn.

Alfinastrum gallii folio. Tourn.

Alfina littoralis foliis portulacæ. Pin.

Alfina minima flore fugaci. Tourn. sur les vieilles murailles de Nantes.

- Spergula arvensis. Linn.*
Arenaria marina. Linn.
Arenaria rubra. Linn.
Mortia. Linn.
Ammi perenne. Morif.
Andryola integrifolia. Linn.
Arenaria montana. Linn.
Asclepias flore albo & flavescente. Pin.
Alphodelus albus minimus Pin.
Alphodelus albus ramosus mas. Pin.
Alphodelus albus ramosus minor seu ramosus alter. Pin.
Aster arvensis cæruleus acris. Tourn.
Aster maritimus folio tereti, crasso tridentato Tourn.
Aster maritimus palustris. cæruleus, salicis folio. Tourn.
Atriplex latifolia sive halimus fruticosus. Morif.
Atriplex maritima angustissimo folio. Morif.
Atriplex maritima laciniata. Pin.
Brunella folio laciniato, flore albo. & r. p.
Buglossum radice rubra, sive anchusa vulgarior floribus cæruleis. Tourn. Orcanette, à la Rochelle.
Bugula flore cinereo vel albo. Tourn.
Bupleurum angustissimo folio. Pin.
Castile maritima. Burias species. Linn.
Campanula foliis cymbalarum vel folio hederaceo. Pia.
Centaurium palustre minimum flore in aperto. Vail.
Chamaepytis lutea sive folio trifido. Pin. à Muchecoul à six lieues de Nantes.
Chenopodium ambrosioides folio sinuato. Tourn.
Chenopodium maritimum. Linn.
Chenopodium fruticosum. Linn.
Cistus fæmina, folio salviae elatior & rectis virgis. Pin. dans l'île de Noirmoutier
Clandestina flore cæruleo. Tourn.
Boletus coralloides foetidus. Ad. Acad.
Cochlearia folio subrotundo. Pin.
Colchicum commune.
Convolvulus maritimus nostras rotundifolius. Morif. Soldanelle.
Corallo-fungus candidissimus. Vail.
Isuardia. Pin.
Digitalis purpurea. Pin.
Eruca sylvestris major. lutea, caule aspero. Pin. 98.
Eryngium maritimum. Pin.
Fragaria sterilis, sericea seu incana. Morif.
Frankenia. Linn. Gen.
Fritillaria præcox purpurea, variegata. Pia.

- Gale frutex odoratus septem trionalium. *J. B.* mas & femina, en Breton *Sanferents*.
- Galeopsis five urtica iners flore luteo. *J. B.*
- Gallium atvense flore cæruleo. *Tourn.*
- Gallium flore pallido. *J. B.* sur les sables de la mer.
- Lycoperdon vesicarium stellatum. *Tourn.*
- Genista spartium majus brevioribus aculeis. *Tourn.*
- Gentiana angustifolia autumnalis major. *Pin.*
- Glaux palustris flore striato clauso foliis portulacæ. *Tourn.*
- Glaux maritima. *Pin.*
- Gnaphalium maritimum. *Pin.*
- Helianthemum, five cistus humilis folio sambuci, capitulis valde hirsutis. *J. B.* aux environs de Mans.
- Helianthemum vulgare flore luteo. *J. B.*
- Helleborine angustifolia pratensis seu palustris. *Pin.*
- Heliotropium majus Dioscoridis. *Pin.*
- Herniaria alfine folio. *Tourn.*
- Leucoium maritimum angustifolium. *Pin.*
- Hieracium echioides capitulis cardui benedicti. *Pin.*
- Hypericum palustre supinum tomentosum. *Tourn.*
- Ilex oblongo serrato folio. *Pin.*
- Ilex aculeata cocci-glandiflora. *Pin.* dans l'île de Noirmoutier.
- Iris angustifolia maritima major. *Pin.*
- Kali majus coeleato semine. *Pin.* salsola. *Linn.*
- Kali spinosum longioribus & angustioribus foliis & foliis crassioribus & brevioribus.
- Lactuca perennis humilior flore cæruleo. *Tourn.* Plante commune dans le Perche.
- Lentibularia major. *Vaill.* sur la rivière d'Ardre.
- Leucoium maritimum candidum. *Pin.*
- Limonium maritimum majus. *Pin.*
- Limonium parvum bellidis minoris folio. *Pin.*
- Polygonum minimum five millegrana minima. *Lob. Icon.* 432.
- Linum sylvestre luteum annuum, folio angustiore. *Morif.*
- Lonchitis maritima. *Tourn.* à Porric.
- Lychnis annua minima flore carneo, lineis purpureis distincto. *Tourn.*
- Silene pratensis. *Linn.*
- Lycoperdastrum rotundum majus, leucopheum, pulpâ fordidè cærulea. *Mich. Gen.*
- Lythymachia humifusa folio rotundiore, flore purpurascente *Tourn.*
- Medica marina. *Lobel. Icon.* 32.
- Marrubiastrum cardiacæ folio. *Borron.*
- Melissophyllon verum Fuchsii. *hist.* 492.

- Menianthes palustre latifolium & triphyllum. *Tourn.*
 Mercurialis montana testiculata. *Pin.*
 Mercurialis montana spicata. *Pin.*
 Moschatellina foliis fumariz bulbosæ. *J. B.*
 Muscus squamosus major foliis angustioribus acutissimis.
Tourn.
 Nasturtium minimum vernum, foliis tantum circa radium.
Lin. Sp.
 Oenanthe charophilli foliis. *Pin.* Les paysans appellent cette
 plante *Pars âcre* : ils s'en servent efficacement pour détruire
 les taupes, en faisant manger à ces animaux des noix
 qu'ils ont fait bouillir avec cette plante.
 Onagra latifolia. *Tourn.*
 Ophioglossum vulgatum. *Pin.*
 Ophris bifolia. *Pin.* 87.
 Bartsia viscosa. *Lin. Sp.* Aux environs de Macheoul & de
 Valet.
 Pentaphylloides palustre rubrum. *Tourn.*
 Plantago maritima gramineo folio rigido. *Tourn.* A l'entrée
 du port de Primbræuf.
 Polygonifolia vulgaris. *Bot. Paris.* 161.
 Lonchitis aspera. *Dod pempt.*
 Populago flore majore. *Tourn.*
 Quercus calyce echinato glande majore. *Pin.*
 Quercus pedem vix superans. *Pin.*
 Ranunculus parvi florus. *Lin.*
 Ranunculus phragmites purpureus vel albus vernus. *J. B.*
 Ranunculus arvensis echinatus. *Pin.*
 Rapuntium urens solonientse. *Morif. La Cardinale.*
 Ros solis folio subrotundo. *Pin.*
 Rubia maritima. *Pin.*
 Scherardia. *Lin.*
 Asperula cynanchica. *Lin.*
 Samolus valerandi. *J. B.*
 Scirpus minimus, capitulo longiore. *Tourn.*
 Scolymus chrysanthemus. *Pin.*
 Sedum cepæa dictum. *h. l. bat.*
 Sesamoides fructu stellato. *Tourn.* Entre le bourg d'Ourdon
 & la petite ville d'Arcenis, & entre le Quesselar, la ville
 de Mans & celle de Boleme en Perche.
 Sideritis hirsuta procumbens. *Pin.*
 Stachys major Germanica. *Pin.*
 Stramonium fructu spinoso rotundo flore albo simplici. *Tourn.*
 Stramonium fructu spinoso oblongo. *Tourn.*
 Thimalea foliis lini : dans les bois des Bernardins de la Blan-
 che, en l'île de Noirmoutier.

- Tithymalus maritimus*. *Pin.*
Peplis maritima folio obtuso. *Pin.*
Tribulus terrestris ciceris folio integumento aculeato. *Tourn.*
à S. Jean de Mont , & dans l'île de Noirmoutier.
Turtitis leucos folio. *Tourn.*
Conyza vera minor. *Lob.*
Cotyledon major. *Pin.* 285. Vulgairement *Goblet* : pilée ou
amortie dans du saindoux bouillant & appliquée sur les tu-
meurs phlegmoneuses , elle les résout ou les fait venir à
suppuration.
Urtica urens pilulas ferens , *prima Dioscoridis semine lini*.
Pin. Cette plante est commune aux environs du Croisic ,
petite ville du diocèse de Nantes , sur le bord de la mer.
Xanthium. *Dod. pempt.*
Rosa pumila spinosissima foliis pimpinellæ glabris flore albo.
J. B. à l'abbaye de Melleray , & en l'île de Noirmoutier.
-

LISTE DES PLANTES

qui croissent aux environs d'Angers , communiquées
par M. Dupaty.

- S**AMOLUS valerandi. *Linn.*
Oenanthe fistulosa. *Linn.*
Asphodelus fistulosus. *Linn.*
Reseda canescens. *Linn.*
Lathræa clandestina. *Linn.*
Orchis bifolia. *Linn.*
Orchis pyramidalis. *Linn.*
Orchis coriophora. *Linn.*
Orchis morio. *Linn.*
Orchis mascula. *Linn.*
Orchis ustulata. *Linn.*
Orchis latifolia. *Linn.*
Orchis sambucina. *Linn.*
Orchis incarnata. *Linn.*
Orchis maculata. *Linn.*
Orchis odoratissima. *Linn.*
Orchis conopsea. *Linn.*
Orchis abortiva. *Linn.*
Cotyledon umbilicus. *Linn.*

LISTE DES PRINCIPALES PLANTES

*des environs de Rouen , communiquées par
Messieurs Pinard & d'Angerville.*

PLANTAGO major. *Linn.* On en trouve auprès de la Chartreuse de Belbœuf.

Plantago spicâ multiplici.

Osinunda lunaria. *Linn.* Près de la Chartreuse de Belbœuf.

Crisosplenium oppositi folium. *Linn.* On en voit à Blais , à Deville , à S. Martin du Vivier, à Roncerolle, endroits situés aux environs de Rouen.

Alchimilla vulgaris. *Linn.* A Bourg Denys , près de Rouen.

Arenaria tenuifolia. *Linn.* A Corville , près de Rouen.

Melica nutans. *Linn.* à Orival , près de Rouen.

Cistus incanus. *Linn.*

Thlaspi montanum. *Linn.* Ces deux plantes viennent sur la côte S. Adrien , près de Rouen.

Viola tricolor. *Linn.* sur la côte S. Adrien , &c sur celle de S. Crépin près de Rouen.

Polygonum bistorta. *Linn.* On en voit à Darnetal , aux environs de Rouen.

Quercus suber. *Linn.* On en trouve dans l'île de Dan , en Normandie.

Andromeda polifolia. *Linn.* Dans le marais de Jumiège , près de Rouen.

Ulex europæus. *Linn.* Par toute la Normandie.

Cardamine hirsuta. *Linn.* Elle croît sur les rives d'une rivière qu'on nomme Robec en Normandie.

Scirpus supinus. *Linn.* On en voit aux environs de Rouen.

Verbascum lychnitis. *Linn.* Aux environs de Rouen.

Antirrhinum bellidifolium. *Linn.* A S. George près de Rouen.

Ophris monorchis. *Linn.* Aux environs de Rouen.

Borrago officinalis. *Linn.* En Normandie près de Colbeck.



LISTE DES PLANTES

qui croissent aux environs de Caen & sur les côtes de Normandie, communiquées par M. Desmoueux, professeur en Botanique à Caen.

SALSOLA fruticosa. *Linn.*
 Ornithogallum pyrenaicum. *Linn.*
 Polygonum bistorta. *Linn.*
 Chrysosplenium oppositifolium. *Linn.*
 Sedum rubens. *Linn.*
 Fumaria bulbosa. *Linn.*
 Acrostichum septentrionale. *Linn.*

Ces sept plantes se trouvent aux environs de Caen.

Climus arenarius. *Linn.*
 Plantago maritima. *Linn.*
 Glaux maritima. *Linn.*
 Salsola tragi. *Linn.*
 Alfine media. *Linn.*
 Statice limonium. *Linn.*
 Bunias cakile. *Linn.*
 Artemisia caulescens. *Linn.*
 Aster tripolium. *Linn.*

Atriplex portulacoides. *Linn.* Ces dix plantes se trouvent sur les côtes de Normandie.

Cotyledon umbilicus. *Linn.*
 Fumaria claviculata. *Linn.*

Hellorus fumarix foliis. *Aruan.* Ces trois plantes se trouvent près de Caen.

Triglochin maritimum. *Linn.* Sur les côtes maritimes de Normandie.

LISTE DES PLANTES

de Picardie, communiquées par le sieur Jourdain.

ILLEX aquifolium. *Linn.* aux environs d'Amiens.
 Atropa belladonna. *Linn.* à Hailly.

- Drosera rotundifolia*, Linn. dans les fontaines de Forges & aux environs de Beauvais.
- Gentiana cruciata*, Linn. à Framohal près de Poix, & aux environs de Baume, à deux lieues d'Amiens.
- Campanula media foliis inferius candida lanugine vestitis*.
Tourn. sur les vieux murs de la Citadelle d'Amiens.
- Aparine semine coriandri saccharati*, Theat. Park. dans les terres où on cultive le chanvre, aux environs d'Amiens.
- Menyanthes nymphoides*, Linn. auprès de Corby.
- Coronilla securiata*, Linn. à Gar, abbaye de Picardie.
- Artemisia campestris*, Linn. aux environs de Beauvais.
- Betula alnus*, Linn.
- Ilex aquifolium*, Linn. Ces deux plantes se trouvent en Picardie.
- Aquifolium echinata folii superficie*, Carn. 130. à Grandvillers.
- Genista anglica*, Linn. à Forges.
- Althæa officinalis*, Linn. aux environs d'Amiens.
- Carlina vulgaris*, Linn. aux environs d'Albret.
- Euphrasia officinalis*, Linn. aux environs d'Amiens & de Cambrai.
- Fagus castanea*, Linn. aux environs d'Amiens, & en plusieurs endroits de la Picardie.
- Fucus communis*, Linn.
- Caltha palustris*, Linn.
- Cicuta villosa*, Linn.
- Sanicula europæa*, Linn.
- Orobis sylvaticus*, Linn.
- Gentiana pneumonanthe*, Linn.
- Herniaria glabra*, Linn.
- Doronicum plantagineum*, Linn.
- Sparganium natans*, Linn.
- Osmunda lunaria*, Linn. Ces dix plantes se trouvent aux environs d'Amiens.
- Ruscus aculeatus*, Linn. dans les bois d'Aumale.
- Polygala vulgaris*, Linn.
- Polygala amara*, Linn. ces deux plantes se trouvent à Baume, en Picardie.
- Lithospermum purpureo caruleum*, Linn.
- Verbascum thapsus*, Linn. ces deux plantes se trouvent aux environs de Cambrai.
- Menyanthes trifoliata*, Linn.
- Spiræa ulmaria*, Linn.
- Hydrocotyle vulgaris*, Linn. ces trois plantes se trouvent à Camon.
- Hippuris vulgaris*, Linn. à Camon, & sur la rivière de Somme.

Euphorbia palustris. Linn.

Gratiola officinalis Linn. ces deux plantes se trouvent à Dour près de Corby.

Paris quadrifolia. Linn.

Rupeta cataria. Linn.

Bunium bulbocastanum. Linn.

Spartium scorpius. Linn.

Juniperus communis. Linn.

Lycoperdon tuber. Linn. ces six plantes se trouvent à Dury près d'Amiens.

Plantago maritima. Linn.

Vinca major. Linn.

Allium ursinum. Linn. ces trois plantes se trouvent à Notre-Dame de Vertus.

Saxifraga granulata. Linn.

Prunella vulgaris. Linn.

Gnaphallum sylvaticum. Linn. ces trois plantes se trouvent à Notre-Dame de Grace.

Veronica officinalis. Linn. à Montreuil sur mer.

Vaccinium oxycoccus. Linn.

Erica cinerea. Linn.

Ornithopus perpusillus. Linn.

Pteris aquilina. Linn. ces quatre plantes se trouvent à Forges.

Orchis abortiva. Linn. à l'abbaye de Gar.

Samolus valerandi. Linn. à Hailly.

Asclepias nigra. Linn. à Hailly & au bois de Piquigny, à deux lieux d'Amiens.

Spiræa filipendula. Linn.

Digitalis lutea. Linn. ces deux plantes se trouvent à Hailly.

Nepeta cataria. Linn.

Spartium scorpius. Linn.

Carduus marianus.

Chrysanthemum montpelienae. Linn. Ces quatre plantes se trouvent à Fitzames.

Allium moly. Linn. au bois de Piquigny, à deux lieux d'Amiens.

Ruscus aculeatus. Linn. à Poix.

Elymus arenarius. Linn.

Glaux maritima. Linn. ces deux plantes se trouvent à saint Vallory.

Adoxa moschatellina. Linn. à Savause.

Pyrola rotundifolia. Linn. à Vailly à quatre lieux d'Amiens.

Acer pseudo-platanus. Linn. à Grandvillers.

Lycoperdon tuber. Linn. à Osmont & à Hetcourt.

Ophioglossum vulgatum. Linn. au pont de Mest.

Parietaria officinalis. Linn. au pont S. Michel.
Senecio paludosus. Linn. à Brailly.
Alchimilla vulgaris. Linn.
Rhamnus catharticus. Linn.
Daphne mezereum. Linn.
Scieranthus perennis. Linn.
Tilia europæa. Linn.
Salix caprea. Linn. ces six plantes croissent en Picardie.

PLANTES OBSERVÉES AUX ENVIRONS

de Beauvais en Picardie, par M. Desmars,
docteur en médecine.

CARYOPHYLLATA aquatica nutante flore. *Tourn.*
Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis *Tourn.* dans le
 parc de l'abbaye de S. Paul.
Oxys flore albo.
Gentiana cruciata ; à deux lieues & demi de Clermont en
 Beauvoisis.
Millefolium aquaticum umbellatum coriandri folio.

LISTE DE DIFFÉRENTES PLANTES

découvertes dans le Royaume, & communiquées
à l'Auteur.

ILLEX aquifolium. Linn. à Elame près de Château-Thierry,
 & aux environs de Villers-Corétet.
Physalis alkekengi. Linn. aux environs de Dormans.
Atropa belladonna. Linn. dans la forêt de Villers-Cotteret,
 & à Jully près de Daumartin.
Marrubium vulgare. Linn. aux environs de Daumartin, de
 Valenciennes & de Chanrilly.
Scandix pestis venetis. Linn. aux environs de Bapaume en
 Flandres.
Euphrasia officinalis. Linn. en quantité aux environs de
 Bouchain.
Calendula arvensis. Linn. en quantité aux environs de Châ-
 teau-Thierry.

Chrysanthemum segetum. *Linn.* à Esfaune près de Château-Thierry.

Tropa. *Linn.* en Franche-Comté.

Herniaria glabra. *Linn.* à Hay , à la Veuve & à Givry dans le Vallage , en Champagne.

Antirrhinum repens. *Linn.* à Hissé & à la Veuve en Champagne.

Ononis viscosa. *Linn.* à Hay , à Hissé & à la Veuve en Champagne.

Anthyllis vulneraria. *Linn.* à Vitri-le-François , à Hissé & à la Veuve en Champagne.

Ophioglossum vulgatum. *Linn.* à Juilly près de Daumartin.

Digitalis lutea. *Linn.*

Conysa squarrosa. *Linn.* ces deux plantes se trouvent à la Cave près d'Épernay.

Verbascum thapsus. *Linn.* à la Ferté près de Meaux.

Heliotropium supinum. *Linn.*

Parietaria officinalis. *Linn.* ces deux plantes se trouvent à Meaux en Brie.

Xanthium spinosum. *Linn.* aux environs de Mons.

Asperula pyrenaica. *Linn.* à Valence.

Lathyrus scitifolius. *Linn.* à Semur.

Juniperus communis. *Linn.*

Sedum anacampseros. *Linn.* ces deux plantes se trouvent aux environs de Villers Cotteret.

Erica vulgaris. *Linn.* aux environs de Villers Cotteret & d'Arlon en Ardennes.

Convallaria polygonatum. *Linn.*

Verbascum lychnitis. *Linn.*

Verbascum nigrum. *Linn.* ces trois plantes se trouvent aux environs de Villers Cotteret.

Tormentilla erecta. *Linn.*

Digitalis purpurea. *Linn.*

Viola tricolor. *Linn.*

Betula alba. *Linn.* ces quatre plantes se trouvent à Ramon près d'Arlon , en Ardennes.

Isoetes. *Linn.* On en trouve dans le lac de Retourmer , dans les Vosges.

Vallisneria. *Linn.* On trouve cette plante singulière dans le Rhône ; nous la ferons connoître plus particulièrement dans nos lettres périodiques.

Acorus vernus seu *calamus aromaticus*. *Pin.* On en trouve en Flandre.

Angelica sativa. *Pin.* cette plante croît dans les montagnes des Pyrénées , des Alpes & d'Auvergne.

Aconitum salutiferum seu *anthora* *Pin.* Elle vient en abondance dans les montagnes du Dauphiné.

- Imperatoria major.* *Pin.* cette plante se plaît dans les Alpes & les Pyrénées.
- Meum foliis anethi.* *Pin.* on en trouve dans les montagnes des Vosges.
- Crocus sativus.* *Pin.* on le cultive dans la Guyenne, le Languedoc, aux environs d'Orange, le Gatinois & la Normandie.
- Abrotanum mas, angustifolium majus.* *Pin.* cette plante croît communément sur les montagnes de quelques provinces du royaume.
- Abrotanum femina foliis teretibus.* *Pin.* Garidel l'a observé en Provence.
- Adiantum rubrum lonicer.* Cette plante vient dans les fentes des rochers aux environs de Paris.
- Ptarmica lutea suaveolens.* *Tourn.* Cette plante croît dans le Languedoc auprès de Montpellier.
- Alchimilla vulgaris.* *Pin.* Cette plante croît parmi les herbes dans les Alpes & les Pyrénées, & sur les montagnes de la Provence.
- Amygdalus sativa fructu major.* *Pin.* On cultive cet arbre dans le Languedoc.
- Apium anisum dictum.* *Tourn.* On sème beaucoup d'anis dans la Touraine.
- Camphorata hirsuta.* *Pin.* 486. Cette plante vient dans le Languedoc & la Provence.
- Capparis spinosa.* *J. B.* 2. 63. On cultive le Caprier dans la Provence, aux environs de Toulon.
- Cuminum pratense, carvi officinarum.* *Pin.* Cette plante vient dans les prés aux environs de Paris, dans les Alpes & les Pyrénées.
- Castanea sativa.* *Pin.* On cultive cet arbre dans les provinces méridionales de la France.
- Centaureum majus, juglandis folio.* *J. B.* 3. 33. Cette plante vient communément dans les Alpes.
- Cicer sativum flore candido.* *Pin.*
- Cicer floribus ex purpura rubescentibus.* *Pin.* On cultive ces deux espèces dans les champs de plusieurs provinces de la France.
- Daucus foliis foeniculi tenuissimis.* *Pin.* Cette plante vient communément dans les Alpes.
- Eryngium maritimum.* *J. B.* 3. 36. Il croît sur les côtes septentrionales & méridionales.
- Grossularia non spinosa fructu nigro majore.* *Pin.* 455. Cette plante vient communément dans le Poitou & la Touraine.
- Lavendula latifolia.* *Pin.*
- Eadem angustifolia.* *Pin.* Ces deux plantes croissent spontanément dans le Languedoc.

Thymelea lauri folio semper virens seu laureola mas. Tourn.

Cette plante vient à l'ombre dans les forêts & montagnes de la Provence & du Languedoc.

Laureola folio deciduo sive mezereum germanicum. J.B. Cette plante vient dans les bois froids des Alpes & des Pyrénées.

Lepidium latifolium. Pin. Il croît en abondance dans les îles de la Marne.

Lepidium gramineo folio sive iberis. Tourn. On en voit dans les décombres & le long des chemins des pays méridionaux de la France.

Ligusticum quod fesceli officinarum. Pin. Cette plante croît spontanément dans les pays méridionaux de la France.

Majorana vulgaris. Pin. Cette plante croît dans les pays chauds de la France.

Malus punica sativa. Pin. Il croît naturellement dans le Languedoc & la Provence.

Marum cortusi. J. B. 3. 242. Il vient fréquemment dans une des îles d'Yères qu'on appelle *Porte-Croix*.

Oxyacantha Dioscoridis sive ipina acuto pyriformio. Pin. Cet arbrisseau croît naturellement dans les hayes en Provence.

Tremella plicata undulata. Linn. Cette plante se trouve presque par-tout aux environs de Paris.

Myrrhus minor vulgaris. Pin. Il vient naturellement sans culture en Provence.

Myrrhus communis italica. Pin. Il croît dans les hayes en Provence.

Aconitum caeruleum seu napellus. Pin. Il croît naturellement sur les Alpes dans la forêt noire.

Chamelæa tricocco. Pin. Cette plante croît en Provence, en Languedoc, aux lieux déserts, rudes & incultes.

Oxycoccus sive vacinia palustris. J. B. On en trouve auprès de Forges, en Normandie.

Papaver corniculatum luteum. J. B. On en voit dans le bois de Boulogne, auprès du château de Madrid.

Periploca Monspeliaca foliis rotundioribus. Tourn. Cette plante croît le long de la mer près de Montpellier : dans les sables de la Gaule Narbonnoise, sur les bords du Rhône.

Folium montanum luteum. Pin. Il croît en Languedoc, en Provence & en Dauphiné.

Fyllium majus supinum. Pin. Aux environs de Montpellier.

Pyrola nostras vulgaris. Park. On le trouve dans plusieurs provinces du Royaume, & en particulier dans la haute Champagne.

Rhus folio ulmi. Tourn. Il croît aux lieux secs & pierreux, sur les collines, & dans les garrigues aux environs de Montpellier.

- Rosmarinus hortensis angustiore folio.* *Pia.* Il croît en Languedoc & en Provence.
- Saturea fativa.* *Tourn.* Cette plante croît aux environs de Montpellier.
- Brassica marina sive soldanella.* *J. B.* Cette plante croît fréquemment sur les rivages sablonneux de la mer.
- Staphisagria.* *Pm.* Cette plante croît en Provence & en Languedoc.
- Suber latifolium perpetuo virens.* *Pin.* Cet arbre croît en Provence, en Gascogne, vers les Pyrénées : il en vient aussi beaucoup en Roussillon.
- Tamarix germanica sive minor fruticosa* *J. B.* Cet arbre croît aux environs de Strasbourg & de Landau.
- Thymelæa foliis lini.* *Pin.* Il croît en Provence & en Languedoc.
- Luteola herba salicis folio.* *Pin.* On le cultive dans le Languedoc, la Normandie, la Picardie, & en plusieurs autres lieux.
- Tithymalus amygdaloides angustifolius* *Tourn.* Il croît abondamment en Champagne dans les plaines sablonneuses, surtout entre Rheims & Chalons.
- Tribulus terrestris, ciceris folio, fructu aculeato.* *Pin.* Cette plante croît abondamment en Provence & en Languedoc.
- Trifolium asphaltites, sive bituminosum odoratum & non odoratum.* *J. B.* Cette plante croît abondamment en Languedoc, aux environs de Montpellier & de Narbonne.
- Lotus pentaphyllos filiquosus villosus.* *Pin.* Cette plante croît en Languedoc aux environs de Montpellier.
- Gingidium umbella oblonga.* *Pin.* Cette plante croît en Languedoc.
- Arbutus folio serrato.* *Pin.* Cet arbrisseau croît en Languedoc & en Provence.

LISTE DES PLANTES

DES ALPES.

- C**ERINTHE alpina perennis flore striato. *Tourn.* 80.
- Gentiana alpina inagno flore. *J. B.* 3. 523.
- Gentiana alpina, pumila, verna major. *Tourn.* 80.
- Gentiana alpina, pumila, verna minor. *Tourn.* 81.
- Gentiana alpina, pumila, brevi folio. *Tourn.* 81.
- Soldanella alpina rotundifolia. *Pin.* 295.

- Soldanella alpina rotundifolia* flore niveo. *Pin.* 296.
Soldanella alpina, folio minus rotundo. *Pin.* 296.
Campanula alpina echinoides pyramidata. *Tourn.* 109.
Campanula alpina glabra flore dilutissime caeruleo. *J. B.* 1.
Campanula alpina folio longiori lucido. *Tourn.* 110.
Campanula alpina sphærocephalos. *Pin.* 94.
Campanula alpina sphærocephalos folio rotundiori hirsuto
Tourn. 110.
Campanula alpina, teucrii folio angulato. *Tourn.* 110.
Campanula alpina pubescens, spicâ florum pyramidatâ *Tourn.*
110.
Campanula alpina altissima hirsuta parvo flore. *Tourn.* 110.
Campanula alpina tragopogî folio. *Pin.* 94.
Campanula alpina sphærocephalos, purpureo flore. *Tourn.*
110.
Campanula alpina minor florum spicâ pyramidatâ. *Tourn.*
111.
Campanula alpina pumila repens, maximo flore. *Tourn.*
111.
Campanula alpina rotundifolia minor. *Prod.* 34.
Campanula alpina latifolia flore pullo. *Pin.* 93.
Rapunculus alpinus corniculatus. *Pin.* 93.
Cruciata alpina latifolia lævis. *Tourn.* 115.
Cruciata alpina tenuifolia lævis. *Tourn.* 115.
Auricula ursi alpina angustifolia. *Tourn.* 123.
Auricula ursi alpina gramineo folio, jasmini luteo flore.
Tourn. 122.
Androsace alpina perennis angustifolia glabra & multiflora.
Tourn. 123.
Androsace alpina perennis angustifolia, villosa & multiflora.
Tourn. 123.
Androsace alpina perennis angustifolia glabra, flore singulari.
Tourn. 123.
Plantago alpina, folio angusto, longo & nigricante. *Bocc.*
musc. part. 2. 22.
Valeriana alpina, foliis integris, radice repente inodora. *Rai.*
hist. 389.
Valeriana alpina prima. *Pin.* 164.
Valeriana alpina scrophulariæ folio. *Pin.* 164.
Valeriana alpina altera. *Pin.* 164.
Valeriana alpina, nardo celtico similis. *Pin.* 165.
Valeriana alpina minor. *Pin.*
Pulmonaria alpina, foliis mollibus, subrotundis, flore car-
uleo. *Tourn.* 136.
Pulmonaria alpina angusto folio italica. *Bocc. musc. part.* 2.
110.

Lithospermum alpinum, tomentosum, minimum. *Tourn.*

137.

Veronica mas alpina, glabra, crecta foliis parum crenatis.

Boec. mus. part. 2. 17. Tab. 19.

Veronica alpina bellidis folio hirsuta. Pin. 247.

Veronica alpina frutescens. Pin. 247.

Veronica alpina fruticans, serpilli minoris folio circinato.

Pluk. phytog. Tab. 232.

Verbascum alpinum perenne nigrum flore albo, staminibus purpureis. h. r. p.

Verbascum humile alpinum villosum borraginis flore & folio. Tourn. 147.

Verbascum humile alpinum, villosum borraginis flore albicante. Tourn. 147.

Pedicularis alpina, floribus spicatis, pallidis. Tourn. 172.

Pedicularis annua alpina lutea angustifolia. Tourn. 172.

Pedicularis alpina, tenerii folio, atro rubente comâ. Tourn. 172.

Pedicularis alpina lutea. Pin. 193.

Pedicularis alpina filicis folio major. Pin. 163.

Pedicularis alpina folio ceterac. Pin. 163.

Pedicularis alpina asphodeli radice purpurascente flore. Tourn. 173.

Pedicularis alpina altera asphodeli radice. Tourn. 173.

Euphrasia alpina parva luteis floribus. Pin. 233.

Callida alpina supina magno flore. Tourn. 182.

Eadem flore albido. Tourn. 183.

Galeopsis alpina, betonicæ folio, flore variegato. Tourn. 185.

Sideritis alpina hyssopifolia. Pin. 233.

Sideritis alpina hyssopifolia in summitate crenata. Pin. 233.

Clinopodium alpinum, hyssopi folio. Tourn. 195.

Cataria minor alpina. Tourn. 202.

Betonica minima, alpina, helvetica. Park. theat. 614.

Betonica alpina, latifolia, major, villosa flore lucco. h. r. par.

Chamædrys alpina villosa. Tourn. 205.

Chamædrys alpina frutescens, folio splendente. Tourn. 205.

Bugula alpina maxima. Tourn. 209.

Thlaspi alpinum, folio rotundiore, carnoso, flore purpurascente. Tourn. 212.

Thlaspi alpinum, minimum foliis crassis & angustis. Tourn. 213.

Nasturtium alpinum tenuissime divisum. Pin. 105.

Thlaspidium alpinum, pumilum asperum. Tourn. 215.

Alysson alpinum hirsutum luteum. Tourn. 217.

Alysson alpinum, polygoni folio incano. Tourn. 217.

- Brassica alpina* perennis. *Tourn.* 220.
Turritis alpina, foliis incis. *Tourn.* 224.
Cardamine alpina, minor, refecta foliis. *Tourn.* 225.
Cardamine alpina prima trifolia. *Clus. hist.* 127.
Potamogeton alpinum plantaginis folio. *Tourn.* 233.
Papaver alpinum saxatile coriandri folio. *Tourn.* 239.
Alline alpina, serpilli folio, multicaulis & multiflora. *Tourn.* 243.
Alline alpina junceo folio. *Pin.* 251.
Alline alpina, subhirsuta, linaria folio. *Tourn.* 243.
Alline alpina, subhirsuta, linaria folio glabro. *Tourn.* 243.
Myosotis alpina, latifolia. *Tourn.* 244.
Myosotis alpina, angustifolia, villosa & viscosa. *Tourn.* 245.
Myosotis alpina, pumila, mirtifolia. *Tourn.* 245.
Helianthemum alpinum, folio pilosellæ minoris fuchsi. *J. B.* 2. 18.
Helianthemum alpinum, oleæ folio subtus incano. *Tourn.* 250.
Saxifraga tridactyles alpina, pallide lutea. *Tourn.* 252.
Saxifraga tridactyles alpina, minor & villosa. *Tourn.* 252.
Saxifraga alpina, sedi foliis crenatis, asperis. *Tourn.* 252.
Saxifraga alpina, ericoides, flore purpurascente. *Tourn.* 253.
Saxifraga alpina, ericoides, flore caeruleo. *Tourn.* 253.
Saxifraga alpina, minima, foliis cælis, deorsum incurvis. *Tourn.* 253.
Saxifraga alpina, lutea, sedi folio. *Tourn.* 253.
Hypericum alpinum, humiliss, magno flore punctato. *Tourn.* 256.
Sedum alpinum, roseum, acuto folio, hematodes majus. *h. r. p.*
Sedum alpinum roseum, medium aculeo rubente. *h. r. p.*
Sedum alpinum roseum, minus, viride & subhirsutum. *h. r. p.*
Sedum alpinum, subhirsutum, folio longiore. *h. r. p.*
Sedum alpinum subhirsutum, corona floris purpurascente, disco viridi. *h. r. p.*
Sedum alpinum flore pallido. *Pin.* 184.
Sedum alpinum rubro, magno flore. *Pin.* 284.
Sedum alpinum cordis folio. *Tourn.* 263.
Geranium argenteum alpinum. *Pin.* 318.
Thalictrum alpinum, aquilegiæ foliis, florum staminibus purpurascen-
 tib. *Tourn.* 270.
Thalictrum alpinum, aquilegiæ foliis, florum staminibus albis
 caule viridi. *Tourn.* 270.
Thalictrum alpinum, minus, aquilegiæ foliis, florum stami-
 nibus albis, caule viridi. *Tourn.* 271.
Pulsatilla lutea, alpina, hispidior. *Pin.* 177.

- Ranunculus alpinus*, tribuli aquatici foliis. *Tourn.* 286.
Ranunculus alpinus, fumarix folio. *h. r. parif.*
Ranunculus alpinus, humilis, rotundifolius flore minore;
Pin. 181.
 Idem flore majore. *Pin.* 181.
Ranunculus alpinus, pumilus, gramineo folio, flore albo.
Tourn. 292.
Clematitis alpina geranifolia. *Pin.* 300.
Caryophyllata alpina lutea. *Pin.* 312.
Caryophyllata alpina, flore purpureo. *Pin.* 322.
Caryophyllata alpina flore albo. *Pin.* 322.
Caryophyllata alpina minor. *Pin.* 322.
Caryophyllata alpina apii folio. *Pin.* 322.
Caryophyllata alpina chamædryos folio. *Morif. hist.*
Fragaria sterilis alpina, caulescens. *h. r. par.*
Fragaria sterilis alpina angustifolia. *Tourn.* 296.
Fragaria alpina, major, foliis argenteis, acutis, flore roseo.
Tourn. 296.
Fragaria alpina, major, foliis argenteis obtusis, flore roseo.
Tourn. 296.
Quinquefolium alpinum, argenteum, erectum, foliis in apice
 erectis. *Tourn.* 297.
Quinquefolium minus repens, alpinum, aureum. *Pin.* 325.
Quinquefolium alpinum, minus, serotinum. *Morif.*
Tormentilla alpina vulgaris major. *Pin.* 326.
Chamænerion latifolium alpinum. *Tourn.* 302.
Chamænerion angustifolium alpinum, flore albo. *Tourn.* 303.
 Idem flore variegato. *Tourn.* 303.
Chamænerion alpinum, foliis ad nodos ternis. *Tourn.* 303.
Chamænerion alpinum, foliis splendentibus, denticulatis.
Tourn. 303.
Chamænerion alpinum minus brunellæ foliis. *Tourn.* 303.
Phallandrium alpinum umbellâ purpurascente. *Tourn.* 307.
Bulbocastanum majus alpinum, pastinacæ folio. *Tourn.* 307.
Bupleurum alpinum latifolium minus. *Tourn.* 310.
Bupleurum alpinum angustifolium medium. *Tourn.* 310.
Bupleurum alpinum angustifolium minus. *Tourn.* 310.
Angelica alpina, ad nodos florida. *Tourn.* 313.
Imperatoria alpina maxima. *Tourn.* 317.
Sphondylium alpinum parvum. *Pin.* 157.
Sphondylium alpinum glabrum. *Pin.* 157.
Thapsia alpina lucida, thalictri aut carotæ folio, flore albo.
Tourn. 322.
Ligusticum alpinum, multifido longoque folio. *Tourn.* 324.
Laterpitium alpinum majus foliis rotundioribus. *Tourn.* 324.
Aryngium alpinum caeruleum, capitulis diffaci. *Pin.* 326.

Eryngium alpinum spicis horridum, displaci capitulo longiore. *Tourn.* 317.

Eryngium alpinum, amethystinum capitulo majore pallescente. *Tourn.* 317.

Caryophyllus alpinus, flore roseo, umbilico virescente. *Tourn.* 333.

Lychnis alpina, pumila, folio gramineo, sive muscus alpinus lychnidis flore. *Pin.* 206.

Lychnis alpina, pumila, folio gramineo, sive muscus alpinus lychnidis flore niveo. *Pin.* 206.

Lychnis saxatilis alpina glabra, pumila. *Tourn.* 338.

Lychnis alpina, linifolia, multiflora per amplâ radice. *Tourn.* 338.

Linum alpinum laricis folio. *Tourn.* 340.

Statice alpina major, flore albo. *Tourn.* 341.

Crocus alpinus autumnalis. *Pin.* 65.

Phalangium alpinum, palustre iridis folio. *Tourn.* 368.

Liliastrum alpinum majus. *Tourn.* 369.

Idem minus. *Tourn.* 369.

Cepa alpina palustris tenuifolia. *Tourn.* 382.

Allium alpinum. *J. B.* 2. 566. *Victorialis* longa. *Cusf.*

Hedysarum alpinum siliquâ lævi flore purpureo cæruleo. *Tourn.* 401.

Hedysarum alpinum siliquâ lævi flore albido. *Tourn.* 401.

Anonis alpina, pumila glabra, non spinosa, purpurea. *Tourn.* 408.

Astragalus alpinus procerior, alopecuroides. *Tourn.* 416.

Astragalus alpinus foliis vicix ramosus & procumbens, flore glomerato, oblongo cæruleo. *Tourn.* 417.

Astragalus alpinus tragacanthæ folio, vesicarius. *Tourn.* 417.

Astragalus alpinus tragacanthæ folio, ramosus, flore cæruleo glomerato. *Tourn.* 417.

Astragalus alpinus foliis vicix angustioribus, flore ochroleuco. *Tourn.* 417.

Tragacantha alpina, semper virens, floribus purpurascens. *Tourn.* 417.

Viola alpina, flore in plures partes dissecto. *Pin.* 199.

Viola alpina, purpurea exiguis foliis. *Pin.* 199.

Viola alpina, rotundifolia lutea. *Pin.* 199.

Viola alpina, minima, nummularix folio. *Tourn.* 421.

Orchis humilis alpina, folio gramineo. *Tourn.* 432.

Orchis palmata angustifolia alpina nigro flore. *Pin.* 36.

Jacea alpina, calcitrappeæ folio, flore cæruleo. *Tourn.* 444.

Eadem flore albo. *Tourn.* 444.

Jacea alpina succisæ folio. *Tourn.* 445.

Cyanus alpinus, capite pennato. *Tourn.* 445.

- Cirsium alpinum* Boni Henrici folio. *Tourn.* 448.
Cirsium alpinum foliis minus profunde laciniatis, creberrimis spinis oblongis. *Rai. hist.* 317.
Cirsium acanthoides alpinum flore purpureo. *Tourn.* 448.
Cirsium pratense alpinum polycephalon, asphodeli radice. *Tourn.* 448.
Cirsium alpinum, polycephalon, flore minore purpurascente, caule aculeis obfito. *Tourn.* 448.
Centaureum alpinum luteum. *Pin.* 117.
Centaureum majus alpinum, acaulos ferme, foliis verbasci lanuginosis. *Tourn.* 449.
Cacalia alpina, foliis utrinque denso & candidissimo tomento obfitis. *Tourn.* 452.
Filago alpina capite folioso. *Tourn.* 454.
Abisynthium alpinum incanum. *Pin.* 139.
Abisynthium alpinum candidum humile. *Pin.* 139.
Scabiosa alpina foliis centaurei majoris. *Pin.* 270.
Scabiosa hirsuta, multifida alpina, repens. *Tourn.* 463.
Dens leonis alpinus, minimus, pilosellæ folio. *Tourn.* 469.
Dens leonis alpinus, minimus, glaber. 469.
Hieracium alpinum asperum, conyzæ facie. *Pin.* 128.
Hieracium alpinum latifolium, hirsutæ incanum : flore magno. *Pin.* 128.
Hieracium alpinum latifolium maculatum, hirsutæ incanum, flore magno. *Pin.* 128.
Hieracium alpinum latifolium villosum, flore magno. *Pin.* 128.
Hieracium alpinum pumilum, chondrillæ folio. *Pin.* 129.
Hieracium alpinum humile, doronici folio. *Tourn.* 472.
Hieracium alpinum, scorfoneræ folio. *Tourn.* 472.
Aster alpinus flore purpurascente. *Tourn.* 481.
Aster alpinus pilosissimus. *Tourn.* 482.
Aster alpinus luteus, conyzæ vulgaris folio. *Tourn.* 483.
Virga aurea alpina, laurinis rigidioribus foliis. *Tourn.* 484.
Jacobæa alpina, foliis subrotundis serratis. *Pin.* 131.
Eadem foliis longioribus. *Tourn.* 485.
Jacobæa alpina, absynthii folio, humilior. *Tourn.* 486.
Leucanthemum alpinum majus rigido folio. *Tourn.* 492.
Leucanthemum alpinum foliis coronopi. *Tourn.* 493.
Leucanthemum alpinum foliis profunde incis. *Tourn.* 493.
Chamæmelum alpinum abrotani folio. *Tourn.* 494.
Chamæmelum alpinum, magno flore tenuissimo folio, inodorum. *Tourn.* 494.
Millefolium alpinum incanum carneo flore. *Pin.* 140.
Millefolium alpinum incanum flore specioso. *J. B.* 3. 138.

Ptarmica alpina, foliis angustis, partim ferratis, partim integris. *Tourn.* 196.

Ptarmica alpina, tanacetii foliis flore purpureo. *Tourn.* 497.

Ptarmica alpina foliis profunde incis. *Tourn.* 497.

Ptarmica alpina, matricariae foliis. *Tourn.* 497.

Ptarmica alpina, altissima, corymbis è luteo albicantibus. *Tourn.* 497.

Ptarmica alpina, altera, floribus minus compactis. *Tourn.* 497.

Alchimilla alpina minor. *Tourn.* 508.

Alchimilla alpina pubescens, minor. *h. r. p.*

Alchimilla alpina, quinquefolii folio subtus argenteo. *Tourn.* 508.

Perficaria alpina, folio nigricante, floribus albis. *Tourn.* 510.

Bistorta alpina, maxima. *Pin.* 192.

Bistorta alpina, media. *Pin.* 161.

Bistorta alpina, minor. *Pin.* 192.

Ruta muraria alpina latifolia. *Tourn.* 541.

Lycoperdon alpinum, maximum, cortice lacteo. *Tourn.* 563.

Coralloides alpina, purpurea. *Tourn.* 564.

Alnus alpina minor. *Pin.* 428.

Salix alpina, pumila rotundifolia, repens, inferne subcinerea. *Pin.* 474.

Salix alpina, alni rotundo folio, repens. *Tourn.* 591.

Salix alpina, pyrenaica. *Pin.* 474.

Salix alpina angustifolia, repens, non incana. *Pin.* 474.

Salix alpina serpilli folio lucido. *Pin.* 591.

Thymelæa alpina, linifolia, humilior flore purpureo, odoratissimo. *Tourn.* 594.

Thymelæa alpina, linifolia, humilior, flore albo odoratissimo. *Tourn.* 594.

Chamaerhodendros alpina, glabra. *Tourn.* 604.

Chamaerhodendros alpina, villosa. *Tourn.* 604.

Chamaerhodendros alpina, serpillifolia. *Tourn.* 604.

Chamaecerasus alpina, fructu gemino, rubro duobus punctis notato. *Pin.* 451.

Chamaecerasus alpina fructu nigro gemino. *Pin.* 451.

Rubus alpinus humilis. *J. B.* 2. 61.

Rubus minor, alpinus, aethnicus, rectus, canescens, candido flore. *h. Catà.*

Rosa alpina, pumila, montis rosarum, pimpinellæ foliis minoribus ac rotundioribus flore minimo, livide rubente. *h. Catà.*

Cytisus alpinus, latifolius, flore racemoso pendulo. *Tourn.* 643.

- Cytisus alpinus latifolius*, flore racemoso, pendulo, foliis variegatis. *Tourn.* 648.
Cytisus alpinus angustifolius, flore racemoso, pendulo longiori. *Tourn.* 648.
Cytisus alpinus flore racemoso, pendulo, breviori. *Tourn.* 648.
Ageratum serratum, alpinum, glabrum flore purpurascente. *Tourn.* 651.
Ageratum serratum, alpinum, glabrum flore albo. *Tourn.* 657.
-

LISTE DES PLANTES DES PYRÉNÉES.

- C**RUCIATA pyrenaica villosa rotundifolia. *Tourn.* 115.
Veronica mas, repens, pyrenaica, folio longiori, glabro. *Tourn.* 143.
Veronica maxima pyrenaica, non ramosa. *Tourn.* 144.
Pedicularis pyrenaica, veronicæ folio. *Tourn.* 172.
Scleara pyrenaica glutinosa foliis sinuatis. *Tourn.* 179.
Brunella pyrenaica, maxima, flore majore. *Tourn.* 182.
Sideritis pyrenaica, hyssopi folia, minima procumbens. *Tourn.* 192.
Polygonum pyrenaicum, supinum, hederæ terrestres folio. *Tourn.* 206.
Alysson pyrenaicum, perenne, minimum, foliis trifidis. *Tourn.* 217.
Sisymbrium pyrenaicum, latifolium, purpurascente flore. *Tourn.* 226.
Papaver erraticum pyrenaicum, flore flavo. *Pin.* 171.
Saxifraga sedi folio, pyrenaica, serrata. *Tourn.* 252.
Saxifraga pyrenaica, lutea, minima, sedi foliis densissime congestis. *Tourn.* 253.
Saxifraga pyrenaica alba, minima, foliis densissime congestis. *Tourn.* 253.
Saxifraga pyrenaica, tridactylites, latifolia. *Tourn.* 253.
Saxifraga tridactylites pyrenaica, pallide lutea, minima. *Tourn.* 253.
Saxifraga pyrenaica foliis partim integris, partim trifidis. *Tourn.* 253.
Saxifraga pyrenaica, minima, lutea, musco similis. *Tourn.* 253.

- Geranium pyrenaicum , foliis cineraceis , radice crassa , magna flore variegato. *Tourn.* 207.
- Pulsatilla pyrenaica flore albo duplici. *l. r. parif.*
- Ranunculus pyrenæus albo flore. *Clus.*
- Caryophyllata pyrenaica amplissimo & rotundiori folio , nante flore. *Tourn.* 295.
- Quinquefolium pyrenaicum folio subtus argenteo. *Tourn.* 297.
- Apium pyrenaicum , thapsix facie. *Tourn.* 305.
- Imperatoria pyrenaica tenuifolia. *Tourn.* 317.
- Ligusticum pyrenaicum amplissimo tenuique folio. *Tourn.* 323.
- Ligusticum pyrenaicum fœniculi folio lucidum *Tourn.* 324.
- Lychnis pyrenaica , umbellifera , minima. *Tourn.* 328.
- Iris humilis , pyrenaica , foliis repandis , è luteo virescentibus. *Tourn.* 361.
- Iris humilis , pyrenaica , foliis repandis , virescentibus , cum lineis cæruleis. *Tourn.* 361.
- Allium pyrenaicum. *Pin.* 75.
- Orobis pyrenaicus , foliis nervosis. *Tourn.* 395
- Astragalus pyrenaicus , foliis vicix subrotundis , flore ochroleuco , glomerato *Tourn.* 417.
- Astragalus pyrenaicus , barbæ jovis folio , non ramosus , folio ochroleuco , glomerato. *Tourn.* 417.
- Viola pyrenaica , longius caudata teucii folio. *Tourn.* 421.
- Luteola pumila pyrenaica , linariæ folio. *Tourn.* 424.
- aconitum pyrenaicum ampliore folio tenuius laciniato. *Tourn.* 424.
- Aconitum salutiferum elatius , pyrenaicum , foliis atro virentibus , flore majore. *Tourn.* 425.
- Carduus tomentosus pyrenaicus , floribus purpureis , glomeratis *Tourn.* 441.
- Cacalia pyrenaica , alliaræ folio *Tourn.* 452.
- Scabiosa pyrenaica , cineræ , villosa , magno flore. *Tourn.* 465.
- Globularia pyrenaica , folio oblongo , caule nudo. *Tourn.* 467.
- Hieracium pyrenaicum verbasçi folio tomentosum. *Tourn.* 472.
- Hieracium pyrenaicum altissimum , foliis & facie doronici terræ austriaci. *Clus.*
- Hieracium pyrenaicum , lampsanæ dodonzi foliis. *Tourn.* 472.
- Hieracium pyrenaicum , blattariæ folio , hirsutius. *Tourn.* 472.
- Idem minus hirsutum. *Tourn.* 472.
- Hieracium pyrenaicum , folio cerinthes latifolium. *Tourn.* 472..
- Idem angustifolium. *Tourn.* 472.

- Hieracium pyrenaicum rotundifolium amplexicaule. Tourn.*
472.
Idem longifolium. Tourn. 472.
Hieracium pyrenaicum, dentis leonis folio latissimo. Tourn.
472.
Jacobæa incana pyrenaica, saxatilis & latifolia. Tourn. 486.
Jacobæa pyrenaica, persicæ folio. Tourn. 486.
Leucanthemum pyrenaicum, minimum, multifido incano folio. Tourn. 493.
Matricaria pyrenaica, buphtalmi folio. Tourn. 493.
Acetola pyrenaica, angustissimo & longissimo folio. Tourn.
502.
Cyperus pyrenaicus, humilior, tenui paniculâ. Tourn. 528.
Thymalea pyrenaica, juniperifolia, ramulis surrectis. Tourn.
595.
Ageratum serratum, pyrenaicum, villosum, flore purpurascen-
cente. Tourn. 652.
Ageratum serratum pyrenaicum, villosum, flore albo. Tourn.
652.

LISTE DES PLANTES

observées dans le Roussillon & dans les montagnes du
Diocèse de Narbonne, par M. le Monnier, de
l'Académie Royale des Sciences.

- A**CHILLEA foliis lanceolatis, dentato serratis, denticulis
tenuissime serratis. *Hort. Cliff.* 413. *Ptarmica alpina, foliis*
profunde incis. Tourn.
Aconitum foliis peltatis multifidis petalo supremo cylindraceo.
h. Cliff. 213. *Aconitum lycoctonum luteum. Pin.* 183. On
en trouve sur les montagnes, principalement au Canigou.
Adiantum foliis coriandri. Pin. 355. On en trouve sur les ro-
chers le long des eaux, sur-tout autour des sources chaudes
des bains du Vernet, proche Villefranche.
Ageratum alpinum serratum, flore purpurascen-
te. Tourn. 651. *Erius. h. Cliff.* 320. Il croît abondamment sur les
montagnes de Tauch & de Bugarach.
Alaternus prima. Clus. Rhamnus inermis floribus dioïcis, stig-
mate simplici mas. virid. h. Cliff. 19. Dans les hayes & par
toutes les garigues.
Alchemilla foliis palmatis. h. Cliff. 38. *Alchimilla vulgaris,*
Pin. 319.

- Alchemilla foliis digitatis.* *h. Cliff.* 39. *Alchemilla alpina* quinquefolii folio subtus argentea. *Tourn.* 508. Ces deux espèces de Pied de lion sont communes dans les montagnes de Tauch, de Bugarach & de Canigou.
- Aloë folio in longum aculeum abeunte.* *Tourn.* 286. Cette plante s'est beaucoup multipliée dans le Roussillon.
- Alyssum ramis senilibus spiciformibus nudis.* *h. Cliff.* 332. *Alysson fruticosum aculeatum.* *Tourn.* 217. Dans la montagne de Tauch.
- Andryala foliis inferioribus dentatis summis integris.* *h. Cliff.* 387. *Hieracium villosum* sonchus lanatus, dalecampii dictum. *Tourn.* 470. On en trouve sur les bords de la Tet, proche Perpignan.
- Anthirinum foliis, oppositis cordatis, crenatis.* *h. Cliff.* 323. *Azarina.* *Lob.* Il croît dans les rochers du Boulou.
- Arbutus caule erecto; foliis glabris serratis.* *h. Cliff.* 163. *Arbutus folio serrato.* *Pin.* 460. On en voit un bois de plus d'une lieue d'étendue, en allant de Perpignan à Tuchan.
- Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis.* *Flor. Lapp.* 162. *Uva ursi.* *Clus. hist.* Cette plante croît au sommet du Canigou.
- Arundo sativa quæ donax dioscoridis.* *Pin. theat. pag.* 271. Ce roseau est très-commun sur les bords de la rivière d'Agly.
- Asparagus foliis acutis.* *Pin.* 490.
- Aster tripolii flore.* *Pin.* 269. Cette plante est très-commune dans la plaine du Roussillon, sur-tout autour du moulin de Lasguilles.
- Aster flore terminatrici, foliis linearibus, tricuspидatis.* *h. Cliff.* 409. *Aster maritimus folio tereti crasso tridentato.* *Tourn.* 483. Dans les montagnes qui sont au bord de la mer, autour de Canet.
- Astrantia minor.* *Morif.* Dans le Canigou.
- Auricula ursi flore luteo.* *J. B.* 3. 499. au sommet du Canigou.
- Azalæa maculis ferrugineis subtus aspersa, floribus decandris, chamærhodendros alpina glabra.* *Tourn.* 604. Cette plante croît au Canigou, en allant au clos par Fillol.
- Azalæa ramis diffusis procumbentibus.* *Flor. Lapp.* 90. *Chamærhodendros alpina serpillifolia.* *Tourn.* On en trouve au dos du Canigou.
- Betonica maritima flore à luteo pallescente.* *Tourn.* 203.
- Buglossum radice rubra sive anchusa vulgarior.* *Tourn.* 134. Cette plante & la précédente sont communes sur les bords de la mer, proche le village de Canet.
- Bupleurum foliis obverse ovatis in petiolum attenuatis.* *h. Cliff.* 104. *Bupleurum arboreseens salicis folio.* *Tourn.* 330. Cette

- plante croit dans les rochers proche Narbonne & dans les Corbières.
- Buxus arboreoens*, *Pin.* 471. C'est le plus commun des arbres qui croissent sur les montagnes des Corbières.
- Camphorata Monspeliensis*; autour des fossés de Perpignan
- Capparis aculeata*, *h. Cliff.* 203. *Capparis spinosa fructu minore folio rotundo*, *Pin.* 480. On en cultive dans les vignes du côté du Boulou.
- Carlina flore purpureo rubente patulo*, *Tourn.* 500. *Carlina annua purpurea monspeliensium*, *Bot. monsp.*
- Catananche squamis calycinis inferioribus ovatis*, *h. Cliff.* 390. *Catananche quorundam*, *Tourn.* 478. On en trouve au pied du Canigou, proche Villefranche.
- Centaurea calycibus squamosis, foliis tomentosis, radicalibus lanceolatis, caulinis pinnatifidis, caule simplici*, *Royen. Flor.* 142. *Centaureum majus incanum humile capite pini*, *Tourn.* 449. Cette plante croit autour de l'hermitage du Forceval.
- Chenopodium foliis oblongis, dentato sinuatis, racemis nudis multifidis*, *h. Cliff.* 34. *Chenopodium ambrosioides folio sinuato*, *Tourn.* 506. Rien n'est si commun autour des murailles de Perpignan.
- Cistus foliis lanceolatis sessilibus, utrinque villosis, trinerviis alis nudis*, *h. Cliff.* 215. *Cistus ladanifera monspeliensium*, *Pin.* 465. Cette plante croit abondamment dans toutes les Garigues.
- Cistus ledon foliis laurinis*, *Pin.* 267. On en trouve auprès de l'abbaye de S. Martin du Canigou.
- Cistus foliis oblongo linearibus margine revolutis, helianthemum foliis rosmarini splendentibus, subtus incanis*, *Tourn.* 250. Cette plante croit sur des rochers de l'hermitage de Forceval; on en trouve aussi dans les fentes du pont de Gard, en Languedoc.
- Cneorum*, *h. Cliff.* 18. *Chamaelea tricoccus*, *Pin.* 462. Rien n'est si commun que cette plante le long des chemins & autour de Narbonne.
- Convolvulus foliis reniformibus*, *h. Cliff.* 67. *Convolvulus maritimus rotundifolius nostras*, *Morif. hist.* Cette espèce croit abondamment sur les bords de la mer.
- Convolvulus foliis cordato digitatis sericeis, foliolis linearibus intermediis duplo longioribus*, *h. Cliff.* 67. *Convolvulus argenteus folio althææ*, *Pin.* 296. Cette plante croit le long des chemins, & autour du moulin de Las guilles.
- Crithmum foliolis lanceolatis carnosis*, *h. Cliff.* 94. *Crithmum seu foeniculum maritimum minus*, *Pin.* 228. Cette plante se trouve au bord de la mer.

Cucubalus caule ramoso, floribus trigynis, fructu colorato globoso. *h. Cliff.* 170. *Cucubalus* *plinii*. *Tourn.* 339. On en trouve dans les hayes.

Dorycnium foliis digitatis sessilibus. *h. Cliff.* 271. *Dorycnium monspeliensium* *Lob. Icon.* 51.

Emerus *caesp.* *Coronilla* corollarum unguibus calice duplo longioribus. *Royen. Flor. Lugd.* 387. Cet arbrisseau croît sur la montagne de Tauch & dans les autres montagnes des Corbières.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, floribus pedunculatis. *h. Cliff.* 87. *Eryngium mantimum*. *Pin.* 386.

Filicula montana folio vario. *Tourn.* 542. *Filicula saxatilis*, omnium minima, elegantissima. *Tourn.* 542. Ces deux espèces croissent au Canigou.

Gallium narbonense tenuifolium flore albo. *Tourn.* 115. dans les montagnes de Narbonne.

Gentiana caule unifloro, flore campanulato, caulem longitudine excedente. *h. Cliff.* 81. *Gentiana alpina* magno flore. *Pin.* 188. Cette plante croît au Canigou, sur les montagnes de Tauch & de Bugarach.

Gramen spicatum secalinum maritimum, spica longiore. *Tourn.* 518. *Arundo* foliorum lateralibus convolutis acumine pungentibus. *Flor. Lapp.* 43.

Globularia caule folioso, foliis ovatis, integerrimis. *h. Cliff.* 490. *Globularia vulgaris*. *Tourn.* 466.

Globularia foliis radicalibus, cuneiformibus retusis dentatis, denticulo intermedio minimo. *h. Cliff.* 491. *Globularia montana* humillima, repens. *Tourn.* 467.

Globularia pyrenaica, folio oblongo, caule nudo. *Tourn.* 467.

Globularia caule fruticoso foliis lanceolatis, aliis tridentatis, aliis integerrimis, *Royen. Fl. Lugd.* *Globularia* fruticosa myrti folio tridentato. *Tourn.* 467. *Alypum* monspeliensium sive frutex terribilis. *J. B.* 598. Les trois premières espèces de Globulaire sont très-communes dans les montagnes; M. le Monnier a trouvé la dernière à Forceval, dans les rochers autour de Narbonne, & aux îles d'Hières.

Herniaria squamis nitidis flores superantibus. *h. Cliff.* 41. *Paronichia hispanica* *clusii*. *Tourn.* 507.

Jacobæa incana pyrenaica saxatilis & latifolia. *Tourn.* 486.

Jacobæa pyrenaica perfixa folio. *Tourn.* 486. au clos du Canigou.

Iris humilis saxatilis gallica. *Tourn.* 362. Dans la montagne de Tauch.

Juniperus foliis quaternis patentibus, subulatis pungentibus.

- Royen. Fl. Leyd.* 90. *Juniperus major* bacca rufescente. *Pin.* 439 Dans toutes les Gariques.
- Kali majus* cochleato semine. *Pin.* 289.
- Kali spinosum* foliis longioribus & angustioribus. *Tourn.* 247.
- Kali spinosum* foliis crassioribus & brevioribus. *Ibid.* Ces trois espèces de soude croissent abondamment sur les bords de la mer, en descendant vers Narbonne.
- Lamium alba* lineâ notatum. *Pin.* 231. Au pic de Bugarach.
- Lasercpitium* foliis cordatis incis. *h. Cliff.* 96 *Lasercpitium* foliis latioribus lobatis. *Morif.* Au même endroit.
- Lavendula* foliis lanceolatis integris, spicis nudis. *h. Cliff.* 303. *Lavendula angustifolia.* *Pin.* 216.
- Lavendula* foliis lanceolato-linearibus spica comosâ. *h. Cliff.* 303. *Stachas purpurea.* *Pin.* 216. La Lavande & le Stachas sont très-communes dans les lieux incultes autour de Perpignan.
- Laurus* foliis lanceolatis venosis, perennantibus corollis quadrifidis, mas & femina. *h. Cliff.* 133. *Laurus vulgaris.* *Pin.* 460. Le Laurier croît dans tous les jardins.
- Lentiscus vulgaris.* *Pin.* 399. *Pistacia* foliis obrupte pinnatis. *h. Cliff.* 436.
- Leucanthemum pyrenaicum* minimum, multifido incano folio. *Tourn.* 493. M. le Monnier a trouvé cette plante au clos du Canigou parmi les pierres.
- Leucoium maritimum* folio sinuato. *Pin.* 201.
- Leucoium vernum* perenne album majus. *Tourn.* 221. La première de ces deux espèces croît sur le bord de la mer; on trouve l'autre au pic de Bugarach.
- Ligusticum* foliis multiplicato pinnatis, foliis pinnatim incis. *h. Cliff.* 97. *Cicutaria latifolia* fatida *Pin.* 161.
- Limonium parvum* bellidis minoris folio. *Pin.* 191.
- Limonium maritimum* majus alterum serotinum narbonense. *Tourn.* 342. Ces deux espèces sont communes sur le bord de la mer.
- Mercurialis* caule fruticoso, foliis tomentosis, mas & femina. *h. Cliff.* 461. *Mercurialis fruticosa* incana spicata & testiculata. *Tourn.* 334. Cette plante est très-commune le long des chemins.
- Olea* foliis lanceolatis ramis teretiusculis. *h. Cliff.* 4. *Olea sylvestris* folio duro subtus incano. L'Olivier sauvage croît dans toutes les côtes.
- Pinus* foliis geminis, primordialibus solitariis, glabris. *h. Cliff.* 430 *Pinus sylvestris* vulgaris genevensis. *Tourn.* 252. Cette espèce de pin croît par toutes les montagnes, & sur-tout au Canigou.

- Plumbago foliis amplexicaulibus. h. Cliff. 53. Plumbago quorundam. Cliff. 2. On en trouve aux environs de Narbonne, & à l'hermitage de Forceval.*
- Punica quæ malum granatum fert. Cæf. Le Grenadier est très-commun dans les hayes & dans les jardins.*
- Paliurus. Dod. pempt. 756. Rhamnus floribus trigynis aculeis geminatis, altero inferiore reflexo. h. Cliff. 69. On en fait des hayes.*
- Quercus foliis ovato oblongis], indivisis, serratis, cortice integro h. Cliff. 448. Ilex oblongo serrato folio Pin. 424. Cet arbre est commun dans le Roussillon.*
- Quercus foliis ovatis dentato spinosis. Royen. Fl. Lugd. 81. Ilex aculeata cocciglandifera. Pin. 425. Cet arbre est très-commun dans toutes les garigues du Roussillon & du Languedoc.*
- Quercus foliis ovato oblongis indivisis serratis, cortice rimoso. h. Cliff. 448. Suber latifolium perpetuo virens Pin. 424. Il réussit très-bien dans la province de Roussillon; on en voit des pieds fort élevés aux environs de Ceret.*
- Ros marinus spontaneus latiore folio. Pin. 217. Il croît dans toutes les Friches.*
- Ruta sylvestris minor. Pin. 336. Cette espèce de Rhue croît sur les bords de la mer.*
- Santolina tomentosa foliis oblongis integerrimis obtusis corymbo terminatrici ramoso. h. Cliff. 398. Gnaphalium maritimum. Pin. 263.*
- Saxifraga alba petraea. Pon. M. Bald.*
- Saxifraga pyrenaica lutea minima sedi foliis dentissime congestis. Tourn. 253. Ces deux espèces de Saxifrage croissent au Canigou.*
- Scolymus chrysanthemus annuus. Ad. Acad. r. p.*
- Sempervivum foliis radicalibus in globum congestis, villis reticulatim connexis. h. Cliff. 180. Sedum montanum tomentosum. Pin. 284. Cette espèce de Sedum croît au Canigou.*
- Thymalea foliis lini. Pin. 463. Cette plante est très-commune dans le Roussillon & dans le Languedoc.*
- Thymalea foliis candicantibus, serici instar mollibus. Pin. 465. On trouve cette plante aux environs de Narbonne, & dans une des îles d'Hières, savoir dans celle du levant.*
- Thymus erectus foliis margine reflexis ovatis, floribus verticillato spicatis. h. Cliff. 305. Thymus vulgaris folio tenuiore. Pin. 219.*
- Tithymalus maritimus. Pin. 291.*
- Tragopogon calycibus corollâ brevioribus inermibus. h. Cliff. 382. Hieracium magnum. Dalech.*
- Trifolium spicâ oblongâ rubente. Pin. 328. On en cultive autour de Perpignan.*

- Trifolium capitulis subrotundis , calycibus ventricosus , caule arborescente. h. Cliff. 373. Trifolium bitumen redolens. Pin. 327. Cette espèce croît partout a la campagne.*
Valeriana foliis cordatis serratis petiolatis. h. Cliff. 15. 3. Valeriana maxima pyrenaica calicis folio. Fagon. Cette plante est assez commune dans les Pyrénées.
Veronica alpina frutescens. Pin. 247.
Veronica mas repens pyrenaica folio longiori glabro. Tourn. 143. Ces deux espèces viennent au clos du Canigou.
Vitex foliis angustis cannabis modo dispositis. Pin. 475. Cet arbrisseau est commun dans le Roussillon autour des torrens.
Zea. Linn. h. Cliff 437. Mays granis aureis. Tourn. 531. Cette plante est étrangère au Roussillon , mais on l'y cultive avec grand soin.
-

LISTE DES PLANTES

qui croissent dans le Berry , & qui ne sont pas si communes aux environs de Paris , par M. le Monnier , de l'Académie Royale des Sciences.

- A**LSINE foliis linearibus , acuminatis , petalis floram integris , calyce duplo longioribus. *Alsine caryophylloides subhirsuta , capillaceo folio pulchro flore abo Tourn. Cette espèce de Morsegeline croît abondamment le long des chemins d'Orléans à Bourges , & surtout dans la forêt d'Aloigné.*
Asphodelus caule nudo , foliis laxis. h. Cliff. 127. Asphodelus albus ramosus mas. Pin. 23. On en trouve dans la lande de Meryès bois.
Belladonna majoribus foliis & floribus. Tourn. 77. Atropa. Linn. h. Cliff. 57. Elle n'est pas rare dans le Randonnay.
Campanula caule angulato , calycibus pedunculatis simplicibus , laciniis ciliatis. Linn. virid. Cliff. 16. Campanula vulgatio foliis urticæ , vel major & asperior Pin. 24. Cette plante vient dans le Randonnay d'une hauteur extraordinaire.
Centaureum luteum perfoliatum. Pin. 278. Gentiana caule dichotomo , foliis connatis , corollis octofidis. h. Cliff. 81.
Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro. Pin. 451. Autour de la carrière de Bourges.

- Cratægus* foliis ovalibus inæqualiter serratis , subtus tomentosis. *virid. Cliff.* 43. *Cratægus* folio subrotundo , serrato , subtus incano. *Tourn.* 633.
- Cratægus* folio laciniato. *Tourn.* 631. *Cratægus* foliis cordatis acutis , lacinulis acutis serratis. *h. Cliff.* 187. Ces deux espèces d'alisiers se trouvent dans les bois d'Yvoy.
- Cytisus supinus* , foliis inferne & siliquis molli hirsutie pubescentibus. *Pin.* 190. Cette même espèce se trouve tant dans le Berry qu'aux environs d'Etampes.
- Epilobium* foliis lanceolatis integerrimis. *Flor. Lapp.* 146. *Chamænerion latifolium* vulgare. *Tourn.* Cette plante vient abondamment dans le Randonnay.
- Fragaria sterilis* , amplissimo folio & flore , petalis florum cordatis. *Vaillant.* Cette espèce de Fraisier avec le *Cytise* précédent se trouve dans les bois de Bruères , à une demi lieue de Bourges.
- Gentiana floribus confertis terminatricibus* , corollis quadrididis , imberbibus , interjecto denticulo. *h. Cliff.* 31. *Gentiana cruciata.* *Pin.* 188. On trouve cette espèce de *Gentiane* dans les bois aux environs de Plain pied.
- Gentiana floribus terminatricibus raris* , corollis erectis plicatis , foliis linearibus. *h. Cliff.* 80. *Gentiana angustifolia autumnalis major.* *Pin.* 188. Cette *Gentiane* vient dans tous les prés.
- Geranium lucidum saxatile.* *Pin.* 318. aux environs de la carrière de Bourges.
- Scrapias caule multifolio multifloro.* *h. Cliff.* 429. Elle se trouve assez souvent dans le Randonnay.
- Hypericum floribus trigynis* , foliis ovatis hirsutis , caule repente. *Hypericum palustre supinum tomentosum.* *Tourn.* 255. Cette espèce vient abondamment dans la forêt de Vierzons.
- Linnapeuce.* *Vaill.*
- Linum* , caule dichotomo floribus tetrandris tetragynis. *hort. Cliff.* 115 *Chamælinum* vulgare. *Vaill. Bot.*
- Opulus.* *Ruell.* 181 Cet arbre est très-commun dans toutes les forêts du Berry.
- Orobanche* caule simplicissimo. *virid. Cliff.* 60. *Orobanche major caryophyllum olens.* *Pin.* 87.
- Ornithogallum angustifolium majus floribus ex albo virecentibus.* *Pin.* 70. Aux environs des carrières dans les brossailles.
- Osmunda* foliis caulinis , simpliciter pinnatis , pinnis lanceolatis. *h. Cliff.* 472. *Osmunda vulgaris* & *palustris.* *Tourn.* 547. Elle croît abondamment dans les forêts humides de la forêt d'Alloigni.

Polygala foliis lineari lanceolatis , caulibus diffusis herbaceis. virid. Cliff. *Polygala vulgaris. Pin.* 215. Cette plante vient en grande quantité dans les bois des Bruyères , avec toutes les variétés de couleur dont la fleur est susceptible.

Rapunculus foliis cordatis , spica florum oblonga. Lemonnier. *Rapunculus spicatus. Pin.* 92. *Rapunculus spicatus flore saturate violaceo foliis maculis nigris notatis. Pin.* 92. *Rapunculus spicatus albus. Ibid.* *Rapunculus spicatus flore flavescente. Tourn.* 43. *Rapunculus folio oblongo , spica orbiculari.* Toutes ces différentes phrases annoncent autant de variétés ; les deux dernières sont communes dans le Randonnay & dans la forêt d'Alloigny.

Rapuntium soloniense urens. Moris. Cette plante est assez commune dans le Betry ; elle se plaît mieux dans le Randonnay que dans les prés humides de la Sologne.

Sambucus racemosa rubra. Pin. 456. Ce sureau est fort commun dans les bois d'Yvoy.

Spiræa foliis integerrimis , pedunculis simplicibus. h. Cliff. 190. *Spiræa hyperici folio non crenato. Tourn.* 618.

Spiræa foliis apice crenatis pedunculis simplicibus. Lemonnier. *Spiræa hyperici folio crenato. Tourn.* Ces deux especes croissent ensemble dans le bois des Bruyères . à une demie lieue de Bourges.

Thymalus myrtilites fructu verrucæ simili. Pin. 291.

LISTE DES PLANTES

observées au Mont d'Or , au Puy de Domme , & au Cantal , par M. le Monnier.

Notæ. Nous avons déjà rapportées quelques plantes de celles qui croissent dans le Mont d'Or , parmi celles d'Auvergne , qui ont été communiquées par Dom Emmanuel Fournault , religieux Bénédictin , mais comme elles ne se trouvent pas en aussi grande quantité que dans le catalogue de M. le Monnier , nous avons cru devoir l'insérer ici pour ne rien laisser à désirer sur la Botanique de la France.

ABIES foliis solitariis , apice emarginatis. *Hort. Cliff.* 449. *Abies taxii folio , fructu sursum spectante. Tourn.* Cet arbre

est le plus grand & le plus commun des forêts du Mont d'Or.

Acer foliis tripartito palmatis, laciniis, utrinque emarginatis obtusis, cortice sulcato. h. Cliff. 143. Acer campêtre & minus. Pin. Erable.

Achillæa foliis integris minutissime serratis. Vahl. Parmica vulgaris, folio longo serrato flore albo. Tourn. 496.

Aconitum foliis peltatis multifidis, petalo supremo cylindraceo. h. Cliff. 213. Aconitum lycoctonum luteum. Pin. 423. Aconit, Tœ-loup.

Aconitum foliorum laciniis linearibus, lineâ excavatis. h. Cl. 214. Aconitum caeruleum seu napellus primus. Pin. 423. Napel. Il croît au Mont d'Or & sur les bords de la Dordogne; on le trouve encore avec l'espèce précédente au Puy de Domme & au Cantal.

Ageratum serratum alpinum glabrum, flore purpurascens. Tourn. Erinus. h. Cliff. 300. Cette plante se trouve sur les rochers de la côte orientale, au-dessus du village des Bains, & autour de la Cascade.

Agrimonia foliis pinnatis, fructibus hispidis. h. Cliff. 179. Agrimonia officinarum. Ibid. Agrimonia odorata procerior. Tourn. 301. Aigremoine.

Agrostema. h. Cliff. 175. Lychnis segetum major. Pin. 204. Cette plante vient parmi les seigles.

Alchimilla foliis palmatis. h. Cliff. 38. Alchimilla vulgaris. Pin. Pied de lion. Cette espèce varie beaucoup dans ses feuilles.

Alchimilla foliis digitatis. h. Cliff. 29. Alchimilla alpina quinquefoliis folio subtus argenteo. Tourn. Cette dernière espèce est la plus commune, tant au Mont d'Or qu'au Puy de Domme.

Allium montanum capite rotundo. Pin. 75.

Allium umbellâ florum globosâ radice longa. Allium montanum latifolium maculatum. Pin. Allium montanum latifolium minus montis aurei. Hort. reg. parisi. Victoralis longa. Clus. Cette espèce d'Ail croît par toutes les montagnes d'Auvergne; il est encore plus commun au sommet du Puy de Domme qu'au Mont d'Or.

Alfina foliis cordatis, petiolatis. Lemonnier. Alfina montana latifolia flore laciniato. Pin. 251. Alfina hederacea montana maxima. Colum. 1. 290. Cette espèce croît dans les forêts du Mont d'Or, sur-tout aux environs des ruisseaux, & au rocher du Capucin.

Alfina foliis linearibus. Flor. Lapp. 187. Alfina pratensis gramineo folio angustiore Tourn. 243. Eadem flore ampliore. Ibid.

Alfina foliis oblongis, nitidis. Lemonnier. Alfina hyperici

folio. *D. Vaill. Tourn.* 242. *Aline longifolia uliginosis* proveniens locis. *J. B.* 3. 19.

Aline saxatilis & multiflora capillaceo folio. *Tourn.* 243. Cette plante se trouve abondamment sur les rochers du Mont d'Or.

Aline foliis linearibus, caule ramoso, florum pediculis longissimis. *Lemon.* *Aline tenuifolia.* *J. B.* 3. 364.

Aline minor multicaulis. *Pin.* 250. *Arenaria foliis subovatis acutis sessilibus.* *h. Cliff.* 173.

Aline plantaginis folio. *J. B.* 3. 363. *Arenaria foliis ovatis acutis, petiolatis, nervosis.* *h. Cliff.* 173.

Aline palustris exigua flosculis albis foliis lanceolatis. *Mentz.* M. Chomela a trouvé cette plante dans les prés humides du vallon de la Pardie.

Androsace calycibus fructuum maximis. *h. Cliff.* 50. *Androsace vulgaris latifolia annua.* *Tourn.* 123.

Androsace foliis linearibus confertis glabris. *Lemonnier.* *Androsace alpina perennis angustifolia glabra & multiflora.* *Tourn.* 124. Cette plante croît sur tous les rochers qui sont à la cime du Mont d'Or.

Anagallis foliis ovatis. *h. Cliff.* 52. *Anagallis phæniceo flore.* *Pin.* 252.

Angelica foliolis æqualibus ovato lanceolatis serratis. *h. Cliff.* 97. *Imperatoria pratensis major.* *Tourn.* 317. *Angelica sylvestris major.* *Pin.* 155. Cette plante est commune dans tous les endroits humides du Mont d'Or, surtout au bas de la Cascade.

Angelica pratensis apii folio. *Tourn.* 313. *Seseli pratense filius forte plinio.* *Pin.* 162.

Anthemis foliis pinnato decompositis laciniis seraceis. *h. Cliff.* 415. *Chamaemelum nobile seu leucanthemum odoratum.* *Pin.* *Camomille.*

Anthemis foliis pinnato decompositis laciniis linearibus; caulibus diffusis radice annua. *Flor. Lugd. prodr.* 172. 5. *Chamaemelum foetidum.* *Pin.* 135. Ces deux espèces de Camomille croissent le long des seigles aux environs des Bains.

Antirrhinum foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis spicatis nudis. *Flor. Leyd. prodr.* 297. 13. *Linaria capillaceo folio, odora.* *Pin.* 213.

Antirrhinum foliis ovatis serratis corollis patulis. *h. Cliff.* 489. *Linaria bellidis folio.* *Pin.* Cette plante se trouve par toute l'Auvergne sur les collines pierreuses, sur-tout en montant de Clermont à Lafon-de-l'arbre pour aller au Puy de Dôme.

Aparine foliis lanceolatis, acuminatis scaberrimis, corollis fructu minoribus. *Flor. Leyd. prodr.* 155.

- Aparine vulgaris*. *Pin.* 334.
Aphanes. *h. Cliff.* *Alchimilla minima montana*. *Columna*. Cette plante vient abondamment au pied du Puy de Domme dans les sables.
Aquilegia sylvestris. *Tourn.* 428.
Aristolochia caule erecto symplicissimo, foliis cordatis, petiolatis, floribus lateralibus, confertis. *h. Cliff.* 432. *Aristolochia clematidis recta*. *Pin.* 307. Parmi les seigles de Lafonde-l'Arbre.
Asperula foliis pluribus, floribus pedunculo elevatis. *h. Cliff.* 474. *Aparine latifolia humilior montana*. *Tourn.* 114.
Asplenium fronde pinnatifida, lacinii alternis adnatis. *h. Cliff.* 474. *Asplenium sive ceterach*. *J. B.* 3. 479.
Aster caule unifloro, foliis integerrimis, calyce villosa subrotundo. *Flor. Lapp.* 307. *Aster montano purpureo similis vel globularis*. *J. B.* 2. 1047. *Scheuchz. it. alp.* 1. 30. *Aster montanus caeruleus, omnium minimus*. *h. r. par.* 27. Elle est très-commune sur les rochers les plus élevés du Mont d'Or.
Astrantia major. *Mor. Umbell.* Rien n'est si commun dans les prés élevés du Mont d'Or, du Puy de Domme & du Cantal.
Athamanta foliis capillaribus, seminibus glabris striatis. *h. Cliff.* 93. *Meum foliis anethi*. *Tourn.* 312.
Athamanta foliis capillaribus seminibus hirsutis. *h. Cliff.* 93. *Myrrhis annua semine striato villosa, incana*. *Moriff. & Tourn.* 315.
Atropa. *h. Cliff.* 37. *Belladonna majoribus foliis & floribus*. *Tourn.* 77.
Balsamina lutea, seu noli me tangere. *Pin.* 306. *Impatiens pedunculis solitariis, multifloris*. *h. Cliff.*
Betonica rubicundissimo flore montis aurei. *h. r. p.* Cette plante croît communément sur le sommet du Mont d'Or & du Cantal.
Biscutella filiquis orbiculato didymis, à stylo deliscentibus. *h. Cliff.* 329. *Thlaspidium monspeliense hieracii folio hirsuto*. *Tourn.*
Bistorta foliis ovato oblongis, acuminatis. *h. Cliff.* 150. *Bistorta major radice, magis vel minus intorta*. *Tourn.* 511.
Bistorta foliis lanceolatis. *Flor. Lapp.* 152. *Bistorta alpina minor*. *Pin.* 142. Elle est très-commune au sommet du Mont d'Or parmi l'Empetrum.
Banum. *Dod. Belg.* *Bulbocastanum majus apii folio*. *Pin.* 152. Cette plante est très-commune aux environs des sources de la Dordogne.
Buplevrum foliis ovato cordatis, decurrentibus. *Lamonnier.*
Buplevrum montanum latifolium *Tourn.* 510.

- Cacalia foliis crassis hirsutis.* *Pin.* 198. Cette plante est très-commune par toutes les montagnes.
- Caltha.* *Flor. Lapp.* 227. *Populago flore minore.* *Tourn.* 273.
- Campanula foliis cordato lanceolatis, caule simplicissimo, floribus secundis sparsis.* *Virid. Cliff.* 27. *Campanula maxima foliis latissimis flore caeruleo.* *Pin.* 94. Cette espèce croît au bord des bois qui sont au-dessous du rocher du Capucin, à côté des prairies.
- Campanula foliis lineari lanceolatis crenatis, caule longissimo simplicissimo, floribus raris.* *h. Cliff.* 5. *Campanula perlicæ folio.* *Auf. hist.* 171.
- Campanula caule angulato, calyculis pedunculatis simplicibus, lacinulis ciliatis.* *Virid. Cliff.* 16. *Campanula vulgarior foliis urticæ, vel major & asperior.* *Pin.*
- Campanula foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus.* *Flor. Lapp.* 33. *Campanula minor rotundifolia vulgaris.* *Pin.* 93.
- Campanula caule angulato, floribus sessilibus, capitulis terminaticibus.* *Virid. Cliff.* 16. *Campanula pratensis flore conglomerato.* *Pin.* 94.
- Campanula foliis lineari lanceolatis, sessilibus: obsolete dentatis.* *Campanula alpina linifolia caerulea.* *Pin. prodr.* 3. 4. On en trouve au Mont d'Or, dans les prairies qui sont entre la Dordogne & la côte où est le rocher du Capucin.
- Campanula alpina minor, spicæ florum pyramidata.* *Tourn.* 111.
- Campanula drabæ minoris foliis.* *Pin.* 94 Cette plante croît sur le Mont d'Or.
- Cardamine foliis pinnatis caule erecto.* *Flor. Lapp.* 258.
- Cardamine pratensis magno flore purpurascente.* *Tourn.* 224.
- Cardamine foliis pinnatis floribus terrandris.* *h. Cliff.* 336. *Cardamine IV.* *Dal. Lugd.* 659.
- Cardamine foliis pinnatis, pinnis latiniatis.* *h. Cliff.* 336.
- Cardamine annua exiguo flore.* *Tourn.* 324.
- Cardamine foliis terreatis crenatis, caule simplici.* *Fl. Lapp.* 259. *Cardamine alpina 1. trifolia.* *Auf. hist.* 127.
- Cardamine alpina minor refectæ foliis.* *Tourn.* 224. M. Chomel a observé ces deux dernières espèces dans les bois du Cantal; les autres croissent au Mont d'Or, le long des ruisseaux, & aux environs de la Cascade.
- Carlina acanlos magno flore.* *Tourn.* 500. Cette plante est commune sur les rochers de la côte orientale du Mont d'Or.
- Carvi foliis tenuissimis asphodeli radice.* *Tourn.* 309. Tous les prés humides du Mont d'Or & de la Croix Morant sont remplis de cette plante.
- Centaurea calycibus serratis foliis lanceolatis integerrimis,*

- decurrentibus. *h. Cliff.* 422. *Cyanus montanus latifolius* vel *verbasculum cyanoides*. *Pin.* 273. Cette plante croît au Puy de Domme.
- Centaurea calycibus cyliatis setis setaceis reflexis*. *h. Cliff.* 422. *Jacca cum squamis pennatis*, sive capite villosa. *J. B.* 3. 29.
- Cerastium corolla calyce majori*. *Fl. Lapp.* 192. *Myosotis alpina latifolia*. *Tourn.* 244.
- Cerasus foliis ovatis*. *Virid. Cliff.* 43. *Cerasus sylvestris amara mahaleb* putata. *J. B.* 1. 227.
- Chrozophyllum foliolis dissectis*, petiolis universalibus ramiferis utrinque membranâ acutis. *h. Cliff.* 101. *Myrrhis palustris latifolia alba*. *Tourn.* 315.
- Chamaecerasus dumetorum fructu nigro gemino*. *Pin.* 609.
- Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa*. *Morif.* Cette plante est commune dans tous les bois du Mont d'Or, sur-tout aux environs de la Cascade.
- Chrysocoma calycibus laxis*. *h. Cliff.* 395. *Conyza linariæ folio*. *Tourn.* 455.
- Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis*. *Tourn.* 146.
- Chrysosplenium foliis minoribus subrotundis*. *Ibid.* Tous les ruisseaux du Mont d'Or & du Cantal sont bordés de ces deux espèces de *Chrysosplenium*, qui se trouvent aussi le long des sources de Royat près de Clermont.
- Cirsium acanthoides montanum flore flavescens*. *Tourn.* 443. *Erisithales*. *Lugd. hist.* 1064.
- Comarum*. *Fl. Lapp.* 214. *Pentaphylloides palustre rubrum*. *Tourn.* 298. Cette plante est commune proche la Croix Morant.
- Convallaria foliis alternis*, floribus ex alis, caule ramoso, polygonatum latifolium ramosum. *Pin.* 303. M. Choumel a vu cette plante dans les bois du vallon de la Pardie.
- Convallaria foliis alternis*, floribus ex alis. *h. Cliff.* 124. *Polygonatum latifolium vulgare*. *Pin.* 393. Au sommet du Puy de Domme.
- Convallaria foliis verticillatis*. *Fl. Lapp.* 114. *Polygonatum angustifolium non ramosum*. *Pin.* 303.
- Convallaria scapo nudo*. *Fl. Lapp.* 112. *Lilium convallium album*. *Pin.* 304.
- Convallaria foliis cordatis*. *Fl. Lapp.* *Smilax unifolia humilima*. *Tourn.* 654. *Unifolium*. *Dod.* On en trouve dans les bois du rocher du Capucin.
- Cratægus foliis ovalibus inæqualiter serratis*. *h. Cliff.* 137.
- Critheum foliis lateralibus bis trifidis*. *h. Cliff.* 94. Cette plante croît abondamment au sommet du Mont d'Or & au Puy de Domme.

- Cucubalus floribus dioïcis pentagynis. h. Cliff.* 771.
- Daphne floribus racemosis lateralibus, foliis lanceolatis integris. h. Cliff.* 147.
- Daphne floribus sessilibus, intra folia elliptico-lanceolata. Fl. Lapp.* 140. Ces deux espèces croissent dans tous les bois des montagnes d'Auvergne, & parmi les broussailles du Puy de Domme.
- Dentaria foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus. h. Cliff.* 335. Cette plante croît abondamment dans les bois de la Cascade, du vallon de la Pardie au Mont d'Or, & dans ceux de Liourran au Cantal.
- Dianthus caule symplici unifloro. Lemonnier.* Il y en a des gazons sur les rochers du Mont d'Or & du Cantal.
- Dianthus petalis multifidis. Fl. Lapp.* 170. On trouve communément cet œillet au Puy de Domme.
- Doronicum foliis cordatis denticulatis, caule ramoso. h. Cliff.* 411. Cette espèce de Doronic varie beaucoup; on en voit au Mont d'Or & au Puy de Domme.
- Doronicum foliis oblongo ovalibus. Fl. Lapp.* 305. Il n'y a point de plantes si communes sur le sommet des montagnes.
- Doronicum foliis oblongo lanceolatis, serratis. Lemonn.* Cette plante croît abondamment au sommet du Puy de Domme.
- Drosera scapis radicatis, foliis orbiculatis. Fl. Lapp.* 103. On trouve cette plante dans les prés humides de la Croix Morant.
- Dryas. Fl. Lapp.* 215. On trouve cette plante au Cantal, & quelquefois aussi au sommet du Mont d'Or.
- Empetrum procumbens. h. Cliff.* 470. On en trouve sur le bord du précipice par où on passe pour arriver à la cime du Mont d'Or.
- Epilobium foliis lanceolatis integerrimis Fl. Lapp.* 146. On trouve cette plante en quantité sur la rivière de Dordogne, & dans les bois qui sont au-dessous du rocher du Capucin.
- Erinus. h. Cliff.* 320. On en trouve quelques pieds sur les rochers de la côte orientale au-dessus du village des Bains, au mont d'Or.
- Euphrasia alpina parva luteis floribus. Pin.* 233.
- Filix non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissime dentatis. Pin.* 358.
- Galanthus. h. Cliff.* 134. Cette plante se trouve au Mont d'Or, aux environs des sources de la Dordogne.
- Galium floribus pluribus linearibus, pedunculis brevissimis. h. Cliff.* 134. Cette plante croît dans les mêmes endroits que la précédente.
- Genista foliis lanceolatis obtusis caule tuberculato. h. Cliff.* 355.

Gentiana floribus lateralibus , confertis , pedunculatis , corollis rotatis. h. Cliff. 80.

Gentiana floribus confertis terminatricibus , corollis quadrifidis imberbibus , interjecto denticulo. h. Cliff. 81. On trouve cette plante dans un bois en sortant de Pardon pour aller au mont d'Or ; elle y croît dans les sables le long du chemin.

Gentiana caule uniflora , flore campanulato , caulem longitudine excedente. h. Cliff. 81. On trouve cette plante sur les rochers d'une des côtes du Mont d'Or qui s'étend de l'est à l'ouest , en allant au lac de Paven,

Gentiana corollis hypocrateriformibus , tubo uillosis clauso , calycis foliis alternis majoribus. Fl. Lapp. 94. Cette plante & la précédente croissent abondamment dans les prés du Mont d'Or & du Cantal ; la dernière est sur-tout très-abondante dans le pré en allant des Bains aux vacheries de Suisse.

Gentiana corollarum laciniis nectario gemino notatis. Lemonn.

Geranium pedunculis bifloris foliis peltatis , multifidis caule erecto. Fl. Lapp. 94. On trouve cette plante dans le prat de Bayle , & dans tous les autres prés humides du Mont d'Or & du Cantal : elle croît aussi dans les bois de Royat.

Geranium pedunculis simplicibus multifloris. h. Cliff. 343. Les prés humides du Puy de Domme , du Mont d'Or , & le plomb de Cantal sont garnis de cette plante.

Geranium pedunculis bifloris , alternatis , caule erecto , superne nudiusculo insidentibus. h. Cliff. 343. Cette plante se trouve au Mont d'Or , sur le bord du bois qui est au bas du rocher du Capucin.

Geranium romanum verticillor seu striatum. Park. & Tourn. 264. Cette plante croît au Mont d'Or ; on en trouve aussi en montant au Puy de Domme , dans les prés au-dessus de Chamailières.

Geum floribus nutantibus , fructu oblongo , seminum candida molli ; plumosa. h. Cliff. 195.

Glaux. Linn. Gen. 67. Cette plante se trouve auprès de la Fontaine minérale de S. Nectaire , en allant au Mont d'Or ; on en trouve aussi quelques pieds autour des fontaines de Jaude & de Ste Allyre , à Clermont.

Gnaphalium floribus per caulem simplicissimum sparsis. Fl. Lapp. 298. Cette plante est très-commune au Mont d'Or.

Gnaphalium caule simplicissimo , corymbo simplici terminatrici , sarmentis procumbentibus. h. Cliff. 400. Pied de chat. Toutes ses variétés se trouvent au Mont d'Or en-deçà de la Croix Morant , le long du chemin en montant la côte , & parmi les bruyères au-dessus des vacheries du rocher du Capucin , en allant à la tour d'Auvergne.

- Gnaphalium alpinum* nanum seu pumilum. *Bocc. plant. rar.* 40. On en trouve en quantité sur le bord du chemin en montant au Mont d'Or, près des sources de la Dordogne.
- Helleborus caule inferne angustato*, multifolio, multifloro, foliis caule brevioribus. *h. Cliff.* 127 *Pied de grifphon.*
- Helleborus foliis angulatis multidis*, flore globoso. *h. Cliff.* 127. Il n'y a point de plantes plus communes au sommet des montagnes d'Auvergne; les deux variétés se trouvent ensemble au haut du Mont d'Or: elle y croît aussi dans les prairies.
- Heracleum foliis pinnatifidis.* *h. Cliff.* 103.
- Hieracium foliis lanceolato linearibus obsolete denticulatis sparsis.* *h. Cliff.* 387.
- Hieracium caule supra folia ramoso*, foliis amplexantibus dentatis glabris. *Pt. Lapp.* 285.
- Hieracium alpinum latifolium villosum magno flore.* *Pin.* 128.
- Hieracium foliis amplexicaulibus cordatis vix dentatis*, pedunculis unifloris hirsutis, caule ramoso. *h. Cliff.* 387.
- Hieracium piloselloïdes majus longifolium*, floribus lateis fere umbellatis. *Vaill. Mém. de l'Acad.*
- Hieracium glabrum succisæ folio prorsus integro.* *D. Charles, Vaill. Mém. de l'Acad.*
- Hieracium fruticosum latifolium foliis dentatis glabrum.* *Pin.* 129.
- Hypochaeris caule fere nudo*, ramo sæpius solitario, foliis ovato oblongis, integris, dentatis. *h. Cliff.* 385.
- Imperatoria.* *J. B.* 3. 137. Cette plante croît abondamment au Mont d'Or & au Cantal, dans les endroits qui sont exposés au nord.
- Juncus nemorosus latifolius major.* *Tourn.* 246. Cette espèce de jonc est la plus commune des montagnes d'Auvergne.
- Lactuca montana latifolia laciniata*, flore cæruleo. *Tourn.* 471.
- Lactuca alpina altissima*, villosa sonchi folio flore purpureo. *D. Charles, Vaill.* Ces deux espèces de laitue croissent ensemble dans le vallon de la Pardie, & le long du bois qui couvre la côte au-dessous du rocher du Capucin, sur-tout le long des ruisseaux.
- Laserpitium foliis cordatis incis.* *h. Cliff.* 99 Cette plante est commune au Mont d'Or, au Puy de Domme & au Cantal.
- Lathyrus pedunculis multifloris*, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis nudis. *h. Cliff.* 367.
- Lilium foliis verticillatis*, floribus reflexis, corollis revolutis. *h. Cliff.* 120. Le *Martagon*. Il se trouve au Mont d'Or & au Puy de Domme du côté du nord vers le sommet; M. Le

- Monnier en a vu quelques pieds à fleurs blanches , avec des
stries purpurines
- Limodorum montanum* flore ex albo dilute virefcente *Cho-*
mel. M. Lemonnier en a vu un pied au Mont d'Or , M. Cho-
mel au Cantal.
- Lonchitis aculeata* major. *Pin.* Cette plante est commune dans
les bois du Mont d'Or.
- Lotus caule herbaceo* florum capitulo depresso , leguminibus
decumbentibus teretibus. *h. Cliff.* 372.
- Linaria foliis cordatis*. *h. Cliff.* 333. Cette plante se trouve
dans les bois du vallon de la Pardie , au Mont d'Or , mais
en bien plus grande quantité dans les bois de Royat , proche
Clermont.
- Lycopodium caule repente* foliis patulis , pedunculis spicâ ge-
minâ terminatis. *Fl. Lapp.* 418. On trouve cette plante au
Mont d'Or parmi les bruyères ; en-deçà de la Croix Morant.
- Lycopodium caule erecto* dichotomo. *Fl. Lapp.* 420. On trouve
cette plante en allant du Capucin à la cime du Mont d'Or.
- Lysimachia foliis ovato acutis* floribus solitariis , caule repente.
h. Cliff. 52. Cette plante est commune dans les bois du
Mont d'Or.
- Melissa* floribus ex alis superioribus , pedunculo communi ,
confertis. *h. Cliff.* 307. On trouve ce calament le long du
chemin en montant de Clermont au Puy de Domme. M. Le
Monnier en a aussi vu dans le bois qui régné le long de la
Dordogne , en allant du Mont d'Or à Murat.
- Menyanthes palastre* foliis ternatis. *Fl. Lapp.* 80. Il est très-
commun dans les prés humides aux environs de la Croix
Morant.
- Mercurialis caule simplicissimo* , foliis scabris. *h. Cliff.* 461.
Au haut du Puy de Domme & du Mont d'Or.
- Mespilus foliis ovatis integerrimis*. *h. Cliff.* 189. On trouve
cet arbrisseau au sommet du Puy de Domme , du côté du
nord.
- Mespilus inermis* , foliis ovatis , serratis , acutis. *h. Cliff.* 189.
Amelanchier. M. Le Monnier a vu cet arbrisseau dans les
bois de Royat & du Mont d'Or.
- Mespilus foliis lanceolatis integerrimis* subtus tomentosis , ca-
lycibus fructus prominentibus. *Virid. Cliff.* 44.
- Myrrhis perennis alba minor* , foliis hirsutis , semine aureo.
Morif.
- Myrrhis palustris latifolia* , alba & rubra. *Tourn.* 315. Ces
deux espèces croissent ensemble le long des ruisseaux au
Mont d'Or , & dans les prés de la Fon-de-l'Arbre.
- Narcissus foliis ensiformibus* , florum nectario rotato brevissi-
mo. *h. Cliff.* 134. On trouve ce Narcisse en quantité dans

les prés humides qui sont autour des sources de la Dordogne, au haut du Mont d'Or.

Narcissus foliis ensiformibus, nectario longitudine petalorum. *h. Cliff.* 134. Il est commun dans les bois du Mont d'Or.

Orchis radicibus palmatis, bracteis longitud. floris, nectarii labio trifido: setâ germinibus longiore. *h. Cliff.* 429. On en voit au Mont d'Or & au Cantal.

Orobis sylvaticus nostras. *Rai. synopsis* 191. *Ad. Acad.* 1706.

Orobis sylvaticus viciz foliis. *Pin.* 352. La première de ces deux espèces d'Orobe croît au sommet du Cantal, du Puy de Domme & dans le Prat de Bugle au Mont d'Or: l'autre espèce est commune dans tous les bois.

Osmunda fronde pinnatifidâ caulina, pinnis lunulatis. *h. Cliff.* 472. Cette espèce est commune au sommet du Puy de Domme & du Cantal, on en rencontre aussi en allant au Mont d'Or par le rocher du Capucin.

Papaver foliis pinnatis, fructu acuminato. *h. Cliff.* 201. Il croît au Mont d'Or & au Cantal, le long des ruisseaux. M. Le Monnier en a aussi vu dans les bois de Royat.

Paris foliis quaternis, quinis, senis, &c. *Fl. Lapp.* 135. Elle est très-commune dans les bois du Mont d'Or.

Parnassia. *Fl. Lapp.* 108. Tout en est garni au pied du Puy de Domme.

Pedicularis alpina, filicis folio major. *Pin.* 363.

Pedicularis alpina asphodeli radice, purpurascente flore. *Tourn.* 173.

Pedicularis alpina teucrii, fol. atro-rubente comâ. *Tourn.* 172. La première de ces trois espèces est commune sur le sommet des montagnes, les deux autres croissent au Mont d'Or dans les prés humides.

Phyllandrium alpinum umbella purpurascente. *Tourn.* 307

Polygala foliis linearî lanceolatis, caulibus diffusis, herbaceis. *h. Cliff.* 252. Cette espèce de Polygale est assez commune au Mont d'Or & au Puy de Domme.

Polypodium angustifolium folio variolo. *Tourn.* 540.

Poterium inerme. *h. Cliff.* 446

Prenanthes flosculis quinis, foliis pinnatis hastatis. *h. Cliff.* 383.

Prenanthes flosculis quinis, foliis lanceolatis denticulatis. *h. Cliff.* 383. On trouve cette dernière espèce dans les bois du Mont d'Or, aux environs du vallon de la Pardie, où elle est fort commune.

Primula foliis denticulatis rugosis, limbo corollarum concavo. *h. Cliff.* 51.

Pulmonaria foliis radicalibus ovato cordatis. *h. Cliff.* 44.

Pulsatilla involucri piloso nitido. *Fl. Lapp.* 223.

Pulsatilla alpina, lutea hispida: *Pin.* 177. Ces deux espèces de Coquelourde croissent au Mont d'Or au-dessus du rocher du Capucin, parmi les bruyères.

Pyrola foliis integerrimis, *h. Cliff.* 162.

Pyrola floribus uno versu sparsis, *Fl. Lapp.* 168. La première de ces deux espèces de Pyrole est très-commune dans les bois du Cantal & du Mont d'Or, aux environs de la Cascade. M. Le Monnier a trouvé l'autre espèce en montant du village des Bains au rocher du Capucin dans le bois.

Potentilla foliis quinatis incis, caule assurgente, *Fl. Lapp.* 212. On trouve cette espèce de Quintefeuille presque au sommet du Mont d'Or, du côté du nord.

Ranunculus foliis quinatis, lanceolatis inciso serratis, *h. Cliff.* 229. Cette Renoncule se trouve le long de tous les ruisseaux aux Monts d'Or & au Cantal : M. Le Monnier l'a trouvée à grandes fleurs auprès des sources de la Dordogne.

Ranunculus fructu oblongo, foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis, *h. Cliff.* 230. Dans les ruisseaux qui sont aux environs de la Croix Morant.

Ranunculus foliis peltatis, quinque angularibus, multipartitis laciniis linearibus, *h. Cliff.* 231.

Ranunculus foliis cordatis, spicâ florum oblongâ, *Lemonnier*. Cette plante est fort commune sur le sommet de toutes les montagnes.

Ranunculus folio oblongo : spicâ orbiculari, *Pin.* 92. M. Le Monnier n'a trouvé cette espèce que sur le Puy de Domme.

Ranunculus foliis linearibus, spicâ orbiculari, *Lemonn.* Cette plante se trouve communément dans les fentes des rochers sur toutes les montagnes.

Ranunculus scabiose capitulo cæruleo, *Pin.* 92. Cette plante qui est très-commune dans nos campagnes, est méconnoissable au Mont d'Or ; elle n'y a qu'une seule tige, & ses feuilles sont larges & arrondies.

Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis erectis, *h. Cliff.* 82.

Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis, *h. Cliff.*

82. Ces deux espèces de Groseillier croissent abondamment au Mont d'Or, dans le bois qui couvre la côte où est le rocher du Capucin, & autour de la Cascade ; il y en a aussi quelques pieds de la première espèce parmi les brossailles du Puy de Domme.

Rosa sylvestris foliis odoratis, *Pin.* 483.

Rubus caule repente annuo, foliis ternatis, *Fl. Lapp.* 206.

On en trouve au sommet du Puy de Domme, vers le nord, & sur le rocher du Capucin.

Rubus caule erecto glabro, foliis ternatis & quinatis, *Lemonn.*

Cette espèce est commune dans tous les bois du Mont d'Or & du Cantal.

Rumex floribus dioicis, foliis oblongo sagittatis, mas & femina. h. Cliff. 39. Cette plante est très-commune au Mont d'Or, vers le nord.

Rumex foliis orbiculatis emarginatis. Fl. Lapp. 132. Il y a des rochers au Mont d'Or qui sont couverts de cette plante ; elle vient aussi à Murat sur les ruines du château.

Rumex folio pedali cordato, radice repente. Lemonn. Lapa-thum folio rotundo alpinum. J. B. 2. 987.

Salix foliis serratis glabris ovato-lanceolatis, acuminatis. Fl. Lapp. 349.

Salix foliis integris glabris ovatis alternis. Fl. Lapp. Cette espèce se trouve dans les prés humides qui sont aux environs de la Croix Morant.

Salix montana major foliis laurinis. hort. Lugd. Bat. ce Saule est commun au Mont d'Or, le long de la Dordogne. M. Lemonnier en a aussi vu dans les prés aux environs de la Foudel'Arbre.

Salix pumila foliis utrinque candicantibus & lanuginosis. Pin. 474. Cette espèce est commune au haut du Mont d'Or, près des sources de la Dordogne, & aux environs de la Croix Morant.

Salix pumila linifolia incana. Pin. 474. M. Charles a trouvé autrefois cette espèce dans la prairie des Bains du Mont d'Or, & au-dessus de Pradebourg au Cantal.

Sambucus racemosa rubra. Pin. 416. Ce Sureau est très-commun au Mont d'Or & dans les bois de Liourran au Cantal.

Sanguisorba spicis ovatis. h. Cliff. 37 Dans les prés des Bains du Mont d'Or, & aux sources de la Dordogne.

Saxifraga foliorum marginibus cartilagine crenatis. h. Cliff. 168. On en trouve sur tous les rochers du Mont d'Or, du Puy de Domme & du Cantal.

Saxifraga tridactylides alpina, minor & villosa. Tourn. 252.

Saxifraga tridactylites alpina, pallide lutea. Tourn. 252. ces deux espèces se trouvent sur le sommet des rochers du Mont d'Or & du Cantal.

Saxifraga procumbens foliolis linearibus & trifidis. h. Cliff. 168.

Saxifraga caule nudo simplici, foliis lanceolatis dentatis, petalis acutis. Fl. Lapp. 173.

Saxifraga foliis reniformibus, acute crenatis, caule ramoso, folioso h. Cliff. 167.

Saxifraga foliis cordato ovalibus crenatis, emarginatis, caule nudo. h. Cliff. 167.

Scabiosa corollulis quinquefidis , foliis radicalibus ovatis , crenatis , caulinis pinnatis . setaceis. h. cliff. 31. On en trouve dans les prés du Mont d'Or plusieurs variétés.

Scilla radice squamosa. h. cliff. 123. On trouve cette plante dans les bois du Mont d'Or , vis-à-vis la Cascade.

Sclærus , floribus fasciculatis. Linn. h. cliff. 22. On trouve cette espèce de Junc autour de la Cascade , & dans tous les bois humides du Mont d'Or.

Sedum foliis planiusculis patentibus , serratis , corymbo terminatrici. h. cliff. 176.

Sedum folio circinnato. Pin. 283. Cette plante se trouve sur les rochers , dans le chemin de Clermont au Puy de Domme.

Sedum palustre subhirsutum purpureum. Pin. 285.

Sedum alpinum coridis folio. Tourn. 283. M. Charles a vu ce dernier au Mont d'Or dans les rochers.

Scilinum foliis radicalibus , ovatis , inæqualiter serratis. h. cliff. 91.

Scilinum foliis ovato acutis , acute serratis , & incis. h. cliff. 92.

Sempervivum foliis radicalibus , in glabrum congestis , villis reticulatim connexis. h. cliff. 130. On trouve cette Joubarbe sur les rochers les plus élevés du Mont d'Or du côté de l'ouest , de même qu'au Puy de Domme.

Silene floribus erectis , laxè distanibus , caule dichotomo. Fl. Lapp. 183. On trouve cette plante le long du chemin , en montant des Bains au Mont d'Or , & sur-tout au sommet des montagnes.

Silene floribus pentagynis , capsulis quinque locularibus. h. cliff. 172.

Soldanella. h. cliff. 49. Cette plante est commune au Mont d'Or & au Cantal

Solidago canle angulato , foliis lanceolatis , serratis decurrentibus. Lemonnier. Dans les Bains du Mont d'Or.

Solidago longifolia tomentosa & incana , floribus fere umbellatis , subtus atro rubescensibus. Vaill.

Sorbus foliis pinnatis. h. cliff. 188.

Thlaspi alpinum bellidis cæruleæ folio. Pin. 106. Cette plante se trouve au-dessus du rocher du Capucin , & au sommet du Mont d'Or.

Tithymalus myrsinites fructu verrucæ simili. Pin. 291.

Tithymalus montanus non acris. Pin. 292. Ces deux espèces de Tithymale croissent au Puy de Domme & au Mont d'Or.

Tragoselinum majus umbella rubente & candida. Tourn. 309.

Tragoselinum minus. Ibid.

- Trifolium spicis ovalibus, vexillis deflexis persistentibus, caule erecto.* *h. cliff* 374.
- Trifolium spicis villosis, caule diffuso, foliolis integerrimis.* *virid. cliff.* 76.
- Trifolium spicis villosis, caule erecto, foliis serratis.* *h. cliff.* 375.
- Trifolium caule nudo simplicissimo, foliis lineari lanceolatis.* *h. cliff.* 499. *Réglisse de montagnes.* Toutes ces espèces de Trèfle croissent au Mont d'Or & au Cantal ; la dernière y est sur-tout très-commune sur les rochers & parmi les bruyères.
- Valeriana foliis radicalibus lanceolatis, crenatis : caulinis trifidis, parte media ampliori.* *Lemonnier.* Cette plante croît sur tous les rochers du Puy de Domme & du Mont d'Or.
- Veratrum flore subviridi.* *Torn.* 273. Cette plante se trouve sur tous les prés du Mont d'Or & des autres montagnes de l'Auvergne.
- Veronica foliis inferioribus oppositis ovatis, superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis.* *h. cliff.* 9. Cette plante est très-commune dans les bois du rocher du Capucin.
- Viola alpina rotundifolia, lutea.* *Pin.* 199. M. Chomel a trouvé cette plante au Mont d'Or ; dans les rochers au-dessus des Bains & au Cantal.
- Viola montana, caerulea. grandiflora.* *h. r. par.* Il n'y a pas de plante plus commune sur les montagnes que cette espèce de Pensée.
- Vaccinium caule angulato : foliis serratis annuis.* *h. cliff.* 148.
- Vaccinium foliis perennantibus obverse ovatis.* *Fl. Lapp.* 144. La première de ces deux espèces, aussi bien que la suivante, sont très-communes au Puy de Domme parmi les brossailles, & au Mont d'Or dans les bois ; M. Le Monnier a trouvé la seconde parmi les bruyères, en allant du rocher du Capucin à la cime du Mont d'Or, aux environs du précipice, sur le bord duquel on passe.
- Vaccinium foliis annuis integerrimis.* *Flor. Lapp.* 132. Cette espèce croît sur les rochers les plus arides.



LISTE DES PLANTES

qui sont indiquées dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, avec les endroits où on les trouve.

ANONIS non spinosa purpurea frutescens. *Ad. Acad. Sc. t. IV.*

Anonis montana præcox purpurea frutescens. *Moriss.* Cet arbrisseau croît dans la haute Provence & dans le Dauphiné, près d'Embrun.

Asier pyrenæus præcox flore cæruleo majore. *Ad. Acad. Sc. t. IV.* Cette plante vient des Pyrénées.

Limonium minus bellidis minoris folio. *Ad. Acad. Sc. t. IV.* Cette plante croît au bord de la mer en Languedoc & en Provence.

Millefolium odoratum minus album Monspeliensium. *Ad. Acad. Sc. t. IV.* Cette plante croît aux environs de Montpellier.

Trifolium blesense. *Ad. Acad. Sc. t. IV.* Peu son altesse royale M. Gaston de France, duc d'Orléans, est le premier qui l'a remarquée dans le parc du Château de Chambord.

Trifolium echinato capite. *Ad. Acad. Sc. t. IV.* Elle croît aux environs de Montpellier.

Nux juglans folio eleganter dissecto, vel acanthi folio. *Ad. Acad. reg. Sc. 1700.* M. Rencaulme a trouvé cet arbre en Berri.

Camphorata Monspeliensis. Cette plante vient le long des chemins dans le Languedoc, & sur-tout aux environs de Montpellier.

Orobæ sylvaticus nostras. *Rai. Ad. Acad. Sc. 1708.* Cette plante est commune aux Monts d'Or, au Cantal & au Puy de Dôme.

Coryspermum hyssopifolium. *Jussieu. Ad. Acad. Sc. 1712.* Cette plante croît en Languedoc; M. Fagon, premier médecin du Roi, l'a autrefois remarquée aux environs d'Agde.

Lichen petræus stellatus marchantia. *Ad. Acad. Sc. 1713.*

Boletus ramosus coralloides foetidus. *Ad. Acad. Sc. 1713.*

Cette plante croît en bas Poitou, dans un mur du parc de la maison seigneuriale de Beaumur.

Spongia fluvialis, ramosa, fragile & piscem olens. *Ad. Acad.*

Sc. 1714. M. Reneaulme a trouvé cette plante dans la Seine; elle étoit attachée aux pierres d'une des piles du Pont-neuf; elle a pareillement été observée dans la rivière de Loire, elle étoit adhérente aux pilotis des moulins du pont de Bris; on en a vu aussi dans la petite rivière des Gobelins.

Gallium saxatile minimum, supinum & pumilum. Tourn. 105. M. de Jussieu l'a trouvée sur le sommet du mont Ventou, sur-tout en descendant du haut de cette montagne vers Bedoin.

Gallium saxatile, supinum, molliore folio. Ad. Acad. Sc. 1714. Cette espèce est attachée en forme de gazon sur les plantes humides des rochers de la vallée de Barcelonnette.

Fluvialis angusto, longoque folio. Ad. Acad. Sc. 1719. Cette plante naît dans la rivière de Loing, auprès du village d'Episy.

Chara translucens, major, flexilis. Ad. Acad. Sc. 1719. M. d'Isnard en a trouvé dans les fossés d'une chaussée de la forêt de Montfort-l'Amaury, en-deça de S. Léger en Ivelines.

Chara translucens, minor, flexilis. Ad. Acad. Scient. 1719. Cette plante est abondante dans quelques-unes des mares de la forêt de Fontainebleau, ou plutôt des landes qui précèdent cette forêt, entre Chailly & la Buvette royale.

Stratiotes vulgaris, flore albo. Ad. Acad. Sc. 1719. On trouve cette plante dans les mares de la forêt de Montfort-l'Amaury.

Lentibularia minor. Petiv. herbar. brit. On en trouve à S. Léger en Ivelines, dans la prairie marécageuse.

Sagitta minor angustifolia. J. B. 3. Cette plante n'est pas rare dans la Marne.

Damaionium repens, potamogetonis rotundifolii folio. Ad. Acad. Sc. 1719. Cette plante se plaît dans les mares des landes, & dans celles de la forêt de Fontainebleau.

Anemonoides monanthos, latifolia, flore albo. Ad. Ac. Sc. 1719. Cette plante se trouve dans les bois de Chantilly.

Eruca supina, alba, siliquâ singulari è foliorum alis erumpente. Ad. Acad. Sc. 1724. M. Danty d'Isnard l'a trouvée presque vis-à-vis l'hôtel des Invalides, sur le terrain relevé autour des fossés qui séparent les terres labourables & cultivées du grand chemin, qui est proche du bord de la rivière de Seine.

Pillularia palustris juncifolia. Vail. M. de Jussieu a trouvé cette plante dans les mares de Franchard & de la Belle-Croix.

Lemna theophrasti. Lugd. hist. On en trouve dans les lacs

& étangs de la Bresse , aux environs de Strasbourg dans les fosses du grand chemin qui conduit au pont , dans les endroits marécageux de la principauté de Dombes , en Dauphiné sur les bords d'un grand étang , en allant au pont de Beauvoisin à Châteauneuf près d'Orléans , & aux environs de Nantes.

Plantago palustris gramineo folio monanthos parisiensis. Tour. On en trouve aux environs de Paris sur les bords de l'étang de S. Gratien & sur Lotier ; M. de Jussieu en a vu en allant à S. Léger en Iveline , dans un fossé humide & marécageux que l'on rencontre sur le chemin de Cognières aux Essarts. *Franca maritima , supina saxatilis , glauca , cricoides , semper virens , flore purpureo. Mich.* Cette plante aime les bords de la mer ; elle se trouve sur ceux de la Méditerranée & de l'Océan : M. Magnol l'indique autour de Montpellier , M. Guettard l'a vue sur les côtes du bas Poitou & de l'Annis , où elle est commune.

Martilza foliis oppositis simplicibus. Linn. Sp. plant. M. Gouan rapporte qu'elle se rencontre aussi à Manguio & au fond de Latte dans le Languedoc.

PLANTES OBSERVÉES

en France , par le P. Barrelier.

GENTIANA alpina major , flore aureo & purpureo obsoleta. *Barr. Icon. 69.* In montibus Delphinatus supra oppidum Bourdoylan & circa gratianopolim in monte Charouffe , atque in monte divi hugonis collegit. *Barr. D. Antonius* Jussieu in monte Grandlon supra canobium majoris Carthusiæ observavit , necnon in celsioribus pratis vallis Barfilionensis.

Gentiana asclepiadis folio. Pin. 187. Copiose in editionibus pratis supra vapincum & in valle Barfilionensi invenitur.

Gentiana caerulea , punctata , annua pennæ 12. clas. Barr. Icon. 91. In pratis humidioribus vallis Barfilionensis provenit necnon circa vapincum præsertim in pratis montis la Chapelanie dicti.

Gentiana autumnalis , minor , annua , flore cruciæto ad latera piloso , fugax. Barr. Icon. 121. Invenitur supra vapincum secus fluvium Drac dictum , necnon in valle Barfilionensi.

Gentiana alpina magno flore. J. B. 3. Frequens est in Alpibus supra gratianopolim & in valle Barfilionensi.

- Convolvulus Betonica* althææque foliis, repens, argenteus flore purpureo. *Barr. Icon.* 312. In gallia Narbonensi, monte cetio, sed frequentius in gallo provincia circa Tolonam & albam occurrit.
- Tithymalus amygdaloides*, minor, subglaber. *Bar. Icon.* 830. Frequens in sylvis Gallix.
- Tithymalus palustris*, villosus, mollior, erectus. *Bar. Icon.* 885. In locis paludosis, canosisque provenit præsertim in maritimis Gallix.
- Tithymalus dulcis* tuberosâ radice. *Bar. Icon.* 909. Per sylvas Gallix occurrit.
- Tithymalus marinus*, acuto linifolio. *Bar. Icon.* 831. Frequens per Galliam occurrit.
- Tithymalus epithymi* fructu. *col. part.* 2. 51. *Rai. hist.* 871. In valle Barfiliensi & præsertim circa oppidum san Stephaniense in diœcesi Niciensi invenitur.
- Campanula alpina*, teucris folio angulato. *Tourn.* 110. In valle Barfiliensi & in editioribus pontis supra vapincum nascitur.
- Rapunculus spicatus* albus. *Pin.* 92. In monte Pilato agri Lugdunensis aliisque Gallix montibus provenit.
- Gallium album* linifolium. Rubia lavis, linifolia, floribus albis. *Bar. Icon.* 354. In monte ventoso prope Avenionem invenitur.
- Cruciata major*, villosa, flore molluginis albo. *Bar. Icon.* 324. In monte Pilato agri Lugdunensis colligitur.
- Cruciata muralis*, minima, montana. *col. part.* 1. 297. Circa Marsiliam & Monspelium crescit.
- Hysciamus creticus*, sulfureo flore, medio atro purpureo. *Bar. Icon.* 248. Circa Monspelium crescit.
- Rubcola* angustiore folio. *Tourn.* 130. Circa Monspelium frequens occurrit.
- Buglossum luteum*, annuum, minimum. *Tourn.* 134. Monspellii circa cellam novam & in sterilibus, la Colombiere, provenit.
- Pedicularis lutea*, viscosa, serrata, pratensis. *Tourn.* 172. In Normaniâ circa urbem Saint-Lô, & in Britannia Armoricâ in pratis paludosis & humentibus invenitur.
- Melampyrum luteum*, comâ cæruleâ. *Bauh. Bar. Icon.* 769. Circa Gratianopolim provenit, in sylvâ, circa Eremum Sancti Augustini & eundo ad sapet, viâ quæ ducit ad majorem Carthusiam.
- Cataria Hispanica*, betonicæ folio angustiore, flore cæruleo. *Tourn.* 202. In monte seuise supra vapincum occurrit.
- Cataria minor alpina.* *Tourn.* 202. In monte ventoso prope Avenionem frequens.

Betonica alpina . incana purpurea. *Bar. Icon.* 340. In monte la Bouvine dicto, supra cœnobium majoris Carthusiæ observavit. *Barr.*

Betonica montana lutea. *Bar. Icon.* 339 Supra cœnobium majoris Carthusiæ.

Polium marinum, dasyphyllum, gnaphalodes, flore albo. *Bar. Icon.* 1047. In Galliâ Narbonensi, ad radicem montis Ceti observatur.

Polium montanum, album, serratum, latifolium supinum majus. *Bar. Icon.* 1079. In Galliâ Narbonensi frequens.

Thlaspi cordatum, minus, flore albo insipidum. *Bar. Icon.* 815. Frequens per Galliâ.

Thlaspi montanum pingui folio, carneo flore, planâ & cordatâ siliquâ gualdi. *Bar. Icon.* 845. In monte Capouladon circa Montspelim & circa Gratianopolim in deserto. *rr. pp.* Augustianorum provenit.

Thlaspi montanum, serrato cepeæ-folio : flore purpurascens, umbellata. *Bar. Icon.* 848. Occurrit in monte ventoso, & in montibus vallis Barsilionensis.

Leucoium montanum, angustifolium pallido flore. *Bar. Icon.* 884. Circa Gratianopolim reperitur in montibus.

Hesperis lavendulæ folio, obsoleto flore. *Bar.* In montibus supra orgon oppidum in gallo provinciâ occurrit

Cardamine aquatica, cotyledonoides flore albo. *Bar. Icon.* 1163. In Alpibus & in vallo Barsilionensi inspicitur.

Eruca viminea, iberidis folio, luteo flore. *Bar. Icon.* 1111: Supra muros circa Parisios invenitur.

Polygoni vel linifolia per terram sparsa, flore scorpioides. *J. B.* 3. 379. Circa Parisios frequens.

Papaver alpinum, saxatile, coriandri folio. *Tourn.* 239. In monte ventoso vulgo le mont Ventou, in ascensu ad Sacellum crescit.

Alfene verna glabra. *Bot. Monsp.* Occurrit Montspelli, Lugduni & circa Parisios provenit.

Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore per humum sparsum. *J. B.* 2. 18. Galliæ Narbonensis indigena.

Helianthemum tenuifolium, glabrum, erectum. flore luteo. *J. B.* 2. 18. Circa eremum. *rr. pp.* Angustinor. prope Gratianopolim crescit, necnon in Galliâ Narbonensi.

Helianthemum massiliense, coridis folio. *Tourn.* 250. Massiliæ ad radices montis Redon provenit.

Helianthemum thymi folio, flore ferrugineo. *Bar.* In comitatu Niciensi circa oppidulum vulgo la Tour.

Sedum montanum, roseum, minus, reticulatum. *Bar. Icon.* 391. In editioribus montibus supra Vapincum & vallis Barsilionensis copiosa reperitur.

- Tribulus terrestris*, minor, incanus, hispanus. *Bar. Icon.* 558. *Vulgaris Monspelli.*
- Juncus bulbosus*, maritimus, floridus, filiquosus. *Bar. Icon.* 271. In maritimis Galliz Narbonensis & Monspeliensis agris
- Geranium montanum*, rotundifolium, perenne, flore purpureo majore, in monte ventoso prope Avenionem reperitur.
- Ranunculus alpinus*, coriandri folio, flore albo purpurascente. *Bar. Icon.* 456. In Alpibus Delphinatûs ad radices cristæ editæ montis de Lens, oppido Bourgdoyfan imminuentis provenit.
- Ranunculus albus*, apenninus, saniculæ majoris folio. *Bar. Icon.* 88. Saepe obvius fuit in Alpibus, in valle Barfilionensi, in monte Pilati supra Lugdunum & apud Sebenes in monte Calceris, vulgo l'Esperou.
- Ranunculus montanus*, hirsutus, humilior, narcissi flore. *Pin.* 182. In editioribus pratis humidis vallis Barfilionensis præsertim circa oppidum Larche copiose reperitur.
- Ranunculus aquaticus albus* fœniculi folio. *Bar. Icon.* Frequens per Galliam.
- Ranunculus aquaticus albus*, lato & fœniculi folio, italicus. *Bar. Icon.* 565.
- Caryophyllata alpina*, minima, flore aureo. *Bar. Icon.* 399. In summis Alpium pratis, præsertim in deserto majoris Carthusiæ supra Gratiopolin in Delphinatu obvia est.
- Caryophyllata alpina* tenuifolia, incana, flore luteo, longius radicata. *Bar. Icon.* 400. In monte de Lens supra oppidum Bourgdoyfan, in Delphinatu inveniit Barr. D. Jusieu inter saxa montis Tournon in valle Barfilionensi collegit.
- Fragaria sterilis*, sylvestris, sericea seu incana. *Morif. Hist.* in montibus Gallo provinciæ reperitur, necnon prope Valentiam urbem Delphinatûs juxta vias.
- Smilax perfoliata*, ramosa, flore albo. *Bar.* In Delphinatus montibus reperitur.
- Smilax alpina perfoliata* & ramosa, flore luteo. In monte divi Hugonis, deserto majoris Carthusiæ necnon circa oppidum Bourgdoyfan in trache alvarienti collegisse asseritur.
- Caryophyllus laxatilis*, ericæ foliis, umbellatis corymbis. *Bauh. prod.* Aridis montibus Alcaras & Monspellû in monte Capouladon observatus fuit.
- Lychnis corniculata* minor seu angustifolia. *Bar. Icon.* 1018. Circa Monspellium in Gallo provincia occurrit.
- Lychnis ocymoides*, muscosa, strictiore folio. *Bar. Icon.* 379. Inter saxa jugorum editiorum vallis Barfilionensis, juxta oppidum vulgò l'Hache, reperitur.
- Limonium minimum*, cordatum seu folio retuso. *Bar. Icon.*

305. Ad radices altæ præruptæque rupis, quæ portum oppidi *La Cité* dicti, massiliam inter & Tolonam respicit, viget.

Lotus hæmorrhoidalis flore albo & subrubefcente. *Bar. Icon.* 1033. In Gallia Narbonensi frequens.

Trifolium montanum, lupulinum. *Pin.* 328. In monte Pilati supra Lugdunum.

Trifolium stellatum. *Pin.* 319. Frequens in agro Monspelienfi.

Trifolium semen sub terram condens. *h. r. par.* Circa Monspelium, in agro Lugdunensi, tum etiam in Parisiensi provenit.

Anonis lutea: viscosa, minor, marina, latifolia, Hispanica. *Bar. Icon.* 1105. In maritimis agri Monspelienfis & circa Massiliam sæpius fuit obvia.

Viola montana, lutea, subrotundo crenato folio. *Bar. Icon.* 691. In Alpium Delphinatus pratis passim est obvia.

Viola montana cærulea, tricolor, folio subrotundo crenato. *Bar. Icon.* 692. In Alpibus supra Gratianopolim & Vapincum, necnon in valle Barsilionensi, & in monte Pilati supra Lugdunum.

Aconitum saluciferum, sive anthora. *Pin.* 134. In montibus Carthusiæ majoris reperitur.

Fraxinella. *Clus. hist.* 99. In Gallia Narbonensi provenit.

Jacea capitata, rorismarini folio. *h. r. Monsp.* Circa Monspelium & supra Massiliam in monte dicto *Notre-Dame de la Garde*.

Jacea montana, incana, odora. *Pin.* 272. à fissuris rupium montis Redon prope Massiliam erumpit.

Cirsium acanthii illirici folio, purpureum. *Bar. Icon.* 1117. Reperitur hæc planta in vineis supra *La colombière*.

Cnicus cæruleus, humilis, montis lupi. *h. l. Bar.* In monte divi Lupi prope Monspelium reperitur.

Filago alpina, capite folioso. *Tourn.* 454. Hæc planta occurrit in montibus editioribus supra Vapincum & vallis Barsilionensis.

Echinopus major. *J. B.* 3. 69. In montibus prope Vapincum, secus fluvium Drac, & in valle Barsilionensi reperitur.

Aster palustris, luteus, folio longiori, lanuginoso. *Tourn.* 683. Frequens est Parisiis ad sequanzæ ripam in pratis non longe ab oppido Villanovæ divi Georgii.

Aster maritimus, tuberosus, luteus. *Tourn.* 483. In sylva valenâ Monspeii provenit.

Aster saxatilis foliis glutinosis, villosis & graveolentibus. *Tourn.* 483. In montibus Gallo provinciæ, vulgo dictæ *Magdalenæ* dictis & prope Massiliam in monte Redon.

- Jacobæa incana repens.* *Bar. Icon.* 153. Circa Parisios provenit.
- Jacobæa alpina*, *incana*, *minor.* *Bar. Icon.* 262. In editissimis jugis montium Delphinatûs & vallis Barfilionensis.
- Matricaria alpina*, *ranaceti folio*, flore majore. *Bar.* In montibus majoris Carthusiæ & in collibus circa oppidum Bourgdoyfan, in Delphinatu observata est.
- Ptarmica alpina*, *matricariæ foliis.* *Barrel.* In sylvis supra cœnobium majoris Carthusiæ nascitur.
- Astericus annuus foliis ad florem rigidis.* *Tourn.* 497. Frequens in Gallia Narbonensi.
- Astericus maritimus*, *perennis patulus.* *Tourn.* 498. Circa Massiliam ad littus maris eundo ad montem Redon provenit.
- Xeranthemum flore simplici*, *purpureo*, *minore.* *Tourn.* 499. Circa Monspelim.
- Alchimilla argentea*, *montana*, *pentaphyllea.* *Bar. Icon.* 756. In Alpibus & Pyrenæis obvia est
- Gramen alopecurum*, *spicâ asperâ.* *Bar. Icon.* 123. Monspeli & in agro Massiliensi frequens.
- Gramen phalaroides*, *majus*, *acerosum*, *nutante spicâ.* *Bar. Icon.* 24. Passim per Galliam.
- Gramen sparteum bromoides*, *paniculâ spicatâ*, *majoribus utriculis.* *Bar. Icon.* 18. Sparsim per Galliam & in agro Parisiensi provenit.
- Linagostis paniculâ minore.* *Tourn.* 664. In paludosis galliæ frequens est.

LISTE DES PRINCIPALES PLANTES

*de la France , selon M. l'abbé Rosier, dans ses
Démonstrations Élémentaires Botaniques.*

- A***TROPA belladonna.* *Linn.* On la trouve sur les montagnes des Alpes, du Bugey & des Cévennes.
- Gentiana lutea.* *Linn.* Sur les plus hautes montagnes de la France.
- Cynanchum Monspeliacum.* *Linn.* Auprès de la mer, à Montpellier & à Narbonne.
- Althæa officinalis.* *Linn.* Dans les endroits humides, en plusieurs provinces de la France, en Flandres, &c.
- Tamnus racemosa*, *flore minore*, *luteo-pallescente.* *Tourn.* Dans le Lyounois & les provinces méridionales de la France.

- Cucumis anguria. Linn.* On cultive cette plante en Provence.
- Rubia tinctorum. Linn.* On en voit aux environs de Montpel-
lier, au Bugey.
- Primula auricula. Linn.* Sur les Alpes.
- Primula farinosa. Linn.* Sur les Alpes.
- Plantago coronopus. Linn.* En Provençe.
- Plantago cynops. Linn.* Dans les provinces méridionales de
la France.
- Lithospermum tinctorum. Linn.* Dans les provinces méridio-
nales de la France.
- Asperugo procumbens. Linn.* On en trouve beaucoup en
Provence.
- Cynoglossum omphalodes. Linn.* M. l'abbé Rosier prétend
qu'elle n'est pérennelle dans nos provinces, qu'autant qu'on
la préserve des hivers
- Plumbago Europæa. Linn.* Cette plante se trouve dans les
provinces méridionales de la France.
- Chrysosplenium oppositifolium. Linn.* sur les Alpes.
- Solanum tuberosum. Linn.* On cultive cette plante principa-
lement dans le Lyonnais, le Dauphiné, &c.
- Solanum melongena. Linn.* On cultive cette plante en Pro-
vence.
- Arum dracunculus. Linn.* Dans les provinces méridionales de
la France.
- Aristolochia longa. Linn.* Dans le Languedoc.
- Digitalis purpurea. Linn.* Dans les montagnes du Lyonnais,
la Provence.
- Acanthus mollis. Linn.* En Provence.
- Phlomis fruticosa. Linn.* Dans les provinces méridionales de
la France.
- Salvia officinalis. Linn.* Dans la Provence, le Languedoc.
- Rosmarinus officinalis. Linn.* En Languedoc, en Provence.
- Thymus vulgaris. Linn.* En Languedoc.
- Satureia hortensis. Linn.* En Languedoc, en Provence.
- Origanum majorana. Linn.* En Languedoc, en Provence.
- Teucrium polium. Linn.* Dans les provinces méridionales.
- Isatis tinctoria. Linn.* Sur les bords de la mer.
- Crambe maritima. Linn.* Sur les bords de l'Océan septen-
trional.
- Cochlearia officinalis. Linn.* Sur les Pyrénées, près de Bare-
ges.
- Dentaria pentaphyllos. Linn.* Sur les Alpes & les montagnes
du Bugey.
- Hypecoon procumbens. Linn.* Dans les provinces méridio-
nales de la France.
- Epimedium alpinum. Linn.* Sur les terrains humides des Alpes.

- Bunias erucago*. *Linna.* Dans les champs un peu humides du Languedoc, dans le Lyonnais.
- Drosera rotundifolia*. *Linna.* Sur les Alpes
- Salsola soda*. *Linna.* Sur les bords de la mer, dans nos provinces méridionales.
- Cistus helianthemum*. *Linna.* Par toute la France.
- Saxifraga rotundifolia*. *Linna.* Sur les Alpes & les hautes montagnes.
- Ruta graveolens*. *Linna.* En Provence.
- Cistus Montpellierensis*. *Linna.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Capparis spinosa*. *Linna.* Dans les mêmes endroits que la plante précédente.
- Rhodiola rosea*. *Linna.* Sur les Alpes.
- Tribulus terrestris*. *Linna.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Pœonia officinalis*. *Linna.* Aux environs de Montpellier.
- Oenothera biennis*. *Linna.* Cette plante est commune à Lyon sur les bords du Rhône & dans les fossés.
- Amuni majus*. *Linna.* Dans nos provinces méridionales.
- Anethum fœniculum*. *Linna.* Dans les vignes pierreuses des provinces méridionales.
- Athamantia meum*. *Linna.* Sur les Alpes, au mont Pila.
- Ligusticum levisticum*. *Linna.* Sur les Alpes, l'Esperou, le mont Pila.
- Astrantia major*. *Linna.* Sur les Alpes, les Pyrénées.
- Scandix odorata*. *Linna.* Sur les Alpes.
- Smyrniurn elusatrum*. *Linna.* A Montpellier.
- Imperatoria astruthium*. *Linna.* Sur les Alpes.
- Angelica archangelica*. *Linna.* Sur les Alpes.
- Peucedanum officinale*. *Linna.* En Provence.
- Thapsia villosa*. *Linna.* Dans nos provinces méridionales, aux bords de la mer.
- Ligusticum austriacum*. *Linna.* Sur les Alpes.
- Laserpitium gallicum*. *Linna.* Dans les provinces méridionales.
- Cachrys libanotis*. *Linna.* A Montpellier, dans nos provinces méridionales.
- Agrostema coronaria*. *Linna.* Cette plante est indigène dans les montagnes du Lyonnais au-dessus de l'arbresle.
- Statice armeria*. *Linna.* Cette plante croît dans les pays montagneux & un peu humides, sur les montagnes du Forez.
- Crocus sativus*. *Linna.* On cultive le Safran dans nos provinces méridionales de la France.
- Iris foetidissima*. *Linna.* Cette plante est commune en Dauphiné.

- Gladiolus communis*. *Linna.* Le Glaycul est commun à Montpellier dans les bleds.
- Glycyrrhiza glabra*. *Linna.* Dans le Languedoc.
- Cicer arietinum*. *Linna.* Dans le Languedoc.
- Hedysarum onobrychis*. *Linna.* Sur les montagnes sèches du Dauphiné.
- Pisum ochrus*. *Linna.* En Languedoc.
- Hippocraxis uniflora*. *Linna.* En Languedoc.
- Scorpiurus sulcata*. *Linna.* Dans nos provinces méridionales.
- Lotus hirsuta*. *Linna.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Triganea foenum graecum*. *Linna.* Dans le Languedoc.
- Astragalus tragacantha*. *Linna.* Aux environs de Marseille.
- Aconitum anthora*. *Linna.* Sur les Alpes & les montagnes du Dauphiné.
- Delphinium staphisagria*. *Linna.* Dans la Provence & le Languedoc.
- Ambrosia maritima*. *Linna.* Sur les bords de la mer, dans les sables.
- Cinara scolymus*. *Linna.* Dans les provinces méridionales.
- Centaurea centaurium*. *Linna.* Dans les Alpes.
- Cnicus benedictus*. *Linna.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Tussilago petasites*. *Linna.* Sur les Alpes.
- Gnaphalium ulxhas*. *Linna.* Sur les provinces méridionales de la France.
- Gnaphalium dioicum*. *Linna.* Sur les Alpes.
- Artemisia abrotanum*. *Linna.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Santolina chamaecyparissus*. *Linna.* Cette plante se trouve dans les pays méridionaux.
- Tanacetum balsamita*. *Linna.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Globularia alypum*. *Linna.* Aux environs de Montpellier.
- Aster ancillus*. *Linna.* Dans les collines de l'Europe méridionale.
- Doronicum pardalianches*. *Linna.* Sur les Alpes.
- Anthemis tinctoria*. *Linna.* Dans les provinces méridionales de la France, auprès de la mer.
- Achillea ageratum*. *Linna.* Au bord de la mer, en Languedoc.
- Xeranthemum annuum*. *Linna.* Dans les provinces méridionales.
- Carlina acaulis*. *Linna.* Sur les montagnes du Languedoc.
- Asarum europaeum*. *Linna.* Sur les montagnes du Bugey, les Alpes.
- Beta vulgaris*. *Linna.* Sur les bords de la mer.

- Rumex scutatus.* *Linn.* Sur les montagnes du Dauphiné, du Bugey & des Alpes.
- Chenopodium botris.* *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Camphorosina monspeliaca.* *Linn.* En Languedoc.
- Illecebrum paronichia.* *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Polygonum bistorta.* *Linn.* Sur les montagnes du Bugey, du Dauphiné, du Pila & des Alpes.
- Panicum italicum.* *Linn.* Dans le Languedoc.
- Arundo donax.* *Linn.* Dans la Provence.
- Mercurialis perennis.* *Linn.* Dans les montagnes, les bois taillis, au pied des buis ; dans le Bugey, au mont Pila.
- Urtica pilulifera.* *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Adiantum capillus veneris.* *Linn.* Dans le Languedoc, l'intérieur des puits, la grotte de Fontanières auprès de Lyon.
- Ceratonia siliqua.* *Linn.* Dans la Provence & le Languedoc.
- Ephedra distachia.* *Linn.* Dans les collines maritimes du Languedoc.
- Pistacia terebinthus.* *Linn.* Aux environs de Montpellier.
- Pistacia lentiscus.* *Linn.* En Provence.
- Quercus ilex.* *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Quercus suber.* *Linn.* *ibid.*
- Pinus sylvestris.* *Linn.* Dans les montagnes du Lyonnais.
- Pinus larix.* *Linn.* Sur les Alpes & les montagnes du Dauphiné.
- Cupressus semper virens famina.* *Linn.* Dans le Languedoc.
- Rhamnus catharticus.* *Linn.* Dans les provinces méridionales
- Daphne laureola.* *Linn.* Dans les forêts du Lyonnais & du Bugey.
- Daphne mezereum.* *Linn.* Sur les Alpes & les Pyrénées.
- Rhamnus alaternus.* *Linn.* En Provence & en Languedoc.
- Phillyrea latifolia.* *Linn.* On en trouve aux lieux pierreux, incultes du Languedoc & des provinces méridionales de la France.
- Arbutus unedo.* *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Arbutus uva ursi.* *Linn.* Sur les Alpes.
- Olea Europæa.* *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Vitex agnus castus.* *Linn.* On en trouve dans les lieux marécageux des provinces méridionales de la France.
- Vaccinium myrtillus.* *Linn.* Dans les bois des montagnes du Lyonnais.

- Rhus cotinus*. *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Rhus coriaria*. *Linn.* Dans les provinces méridionales de l'Europe.
- Tilia Europæa*. *Linn.* Cette plante est spontanée dans les bois, en Bugey, en Europe.
- Celtis australis*. *Linn.* Dans la Provence & le Languedoc.
- Cnecorum tricocco*. *Linn.* Dans le Languedoc.
- Rubus idæus*. *Linn.* Dans les Alpes, dans les montagnes du Bugey, du Dauphiné, &c.
- Acer pseudo platanus*. *Linn.* Dans le Bugey.
- Rhamnus paliurus*. *Linn.* Dans les hayes de Provence, du Languedoc.
- Melia azedarach*. *Linn.* Dans le Languedoc.
- Tamarix gallica*. *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France, sur-tout aux environs de Narbonne.
- Citrus aurantium*. *Linn.* En Provence, en Languedoc.
- Citrus medica*. *Linn.* *ibid.*
- Rhamnus ziziphus*. *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Punica granatum*. *Linn.* En Provence & en Languedoc.
- Ribes rubrum*. *Linn.* Dans les Alpes.
- Ribes nigrum*. *Linn.* Dans le Languedoc.
- Crataegus azarolus*. *Linn.* Dans les hayes du Languedoc.
- Mespilus pyracantha*. *Linn.* Dans les hayes de la Provence.
- Spartium junceum*. *Linn.* Cet arbruste croît dans le Languedoc, & est devenu indigène dans une montagne du Forez.
- Ulex Europæus*. *Linn.* Dans la Provence, la Bretagne, le Forez.
- Cercis filiquastrum*. *Linn.* Dans les provinces méridionales de la France.
- Anagyris foetida*. *Linn.* Dans les montagnes du Languedoc & de la Provence.
- Cytisus laburnum*. *Linn.* Sur les Alpes, les montagnes du Dauphiné & du Bugey.
- Colutea arborefcens*. *Linn.* En Provence.



LISTE DES PRINCIPAUX ARBRES

*& arbuscules qui croissent dans la France,
selon M. Duhamel.*

- A**LATERNUS. 1. *classi*. Cet arbruste croit en Provence.
 Alnus folio incano. *Pin.* Cet Aulne se trouve aux environs de Lyon.
 Alnus foliis eleganter incis. *D. Breman.* Cet Aulne se rencontre auprès de Caen.
 Amygdalus sativa fructu majori. *Pin.* Les Amandiers qui produisent les meilleurs fruits, croissent en Provence, en Languedoc, en Touraine & à Avignon.
 Anona fructu lutescente laevi, serotum arietis referente *casteb. hist.* *Assiminier.* Cet arbrisseau subsiste depuis longtemps en pleine terre au château de la Galissonnière, près de Nantes.
 Arbutus folio ferrato. *Pin.* Cet arbruste se multiplie en Provence.
 Armeniaca mala minora. *J. B.* Les Provençaux nomment cet Abricot *Alexandrin*.
 Arundo vulgaris, phragmites Dioscoridis. *Pin.* Cette plante croît en Provence & en Languedoc.
 Azedarach. *Dod. pempt.* Il croît en Provence.
 Buxus foliis rotundioribus. *Pin.* Bois d'Artois.
 Buxus arborescens. *Pin.* En Franche-Comté, en Bourgogne, &c.
 Castanea sativa. *Pin.* Les bonnes espèces viennent du Dauphiné, du Languedoc & de la Provence; on cultive aussi des Châtaigniers dans le Limosin, le Périgord, à Bourdeaux.
 Celtis fructu nigricante. *Tourn.* Le Micocoulier est un arbre de Provence, de Languedoc.
 Cerasus racemosa, sylvestris, fructu non eduli *Pin.*
 Cerasus sylvestris amara, mahaleh putata. *J. B.*
 Cerasus sylvestris alpina, folio rotundiori. *Tourn.*
 Cistus mas folio oblongo incano *Pin.* Ce Ciste & toutes ses autres variétés croissent en Languedoc, en Provence.
 Clematitis alpina geranii folio. *Pin.* *Astragene.*
 Cornus hottensis mas. *Pin.* Les Provençaux l'appellent *Avernier*.
 Citifus alpinus, latifolius, flore racemoso pendulo. *Tourn.*

Gale frutex odoratus septentrionalium elagnus cordo chamgleagnus dodonei. J. B. Mas & famina, rhus myrtifolia Belgica. Pin.

Genista spartium spinosum majus secundum hirsutum. Pin.
On en voit beaucoup en Normandie, en Bretagne, & dans une partie du Poitou.

Gleditsia spinosa mas & famina. Linn. M. Aimen, médecin à Bourdeaux, & bon Botaniste, a assuré à M. Duhamel avoir vu des hayes de cet arbre auprès de Bourdeaux, où on l'a sans doute naturalisé.

Alypum Monspeliacum, sive frutex terribilis. J. B. La Globulaire en arbre croît aux environs de Montpellier.

Jasminoides sive rhamnus spinis oblongis, flore candicante. Pin. On trouve communément cette espèce dans les hayes de la Provence.

Ilex folio agrifolii. Bot. Monsp.

Ilex folio utrinque lanato Monspeliaca. h. 1. p.

Ilex aculeata cocciglandifera. Pin.

Ilex media cocciglandifera ilici plene suppar, folio aquifolii. Advers. Ces différens Chênes verts se trouvent dans le Languedoc & la Provence.

Larix folio deciduo conifera J. B. On trouve cet arbre dans le Dauphiné, & en général dans les Alpes de la France.

Leutiscus vulgaris. Pin. Mas & famina. Il croît naturellement en Languedoc & en Provence.

Myrtus latifolia romana. Pin. Ce Myrthe & plusieurs autres espèces viennent très-bien en pleine terre dans les provinces maritimes, dans la Provence, le Languedoc, la Normandie, l'Aunis, la Bretagne, &c.

Olea. Tourn. Cet arbre croît abondamment en Provence & en Languedoc.

Paliurus. Dod. pempt. On trouve cet arbruste dans la Provence & le Languedoc.

Siliqua edulis. Pin. Mas & famina. Le Caroubier croît en Provence.

Smilax aspera fructu rubente Pin. Aux environs de Montpellier on en fait des hayes.

Suber latifolium, perpetuo virens. Pin. On en trouve en grande quantité dans les pays de Condom, de Nerac, & dans les landes de Bazas, qui s'étendent jusqu'à Bayonne; on en voit en Provence & en Languedoc.

Therbinthus vulgaris Pin. Mas & famina. Cet arbruste croît dans le Languedoc, le Dauphiné & la Provence.

Ziziphus. Dod. pempt. Cet arbruste croît en Provence & en Languedoc.

LISTE DES PLANTES

qui croissent au Mont Pila , avec l'indication de plusieurs de celles qui se rencontrent dans les provinces circonvoisines , extraite d'un ouvrage intitulé : Voyage au Mont Pila.

- C**ALLITRICHE verna. *Linna.* Cette plante surpasse les eaux de plusieurs sources dans les bois du Pilat ; on en voit aussi dans plusieurs rivières du Lyonnais , à S. Bel , &c. L'espèce que Linnæus nomme *callitriche autumnalis* , se plaît dans des fossés marécageux , en Dauphiné près de Lyon.
- Ligustrum vulgare. *Linna.* dans les hayes & les taillis.
- Circæa lutetiana. *Linna.* dans tout le Lyonnais.
- Veronica officinalis. *Linna.* dans les bois du Mont Pila.
- Veronica serpillifolia. *Linna.* dans les bois de la Grange.
- Veronica anagallis. *Linna.* dans les eaux qu'on rassemble pour les scieries des Chartreux.
- Buonarota. *Michx.* dans le Bugey , & notamment dans le parc de Dorran , & dans les montagnes au-dessus de Grenoble.
- Verbena officinalis. *Linna.* le long des chemins.
- Lycopus europæus. *Linna.* dans tous les terrains aquatiques.
- Salvia pratensis. *Linna.* l'Ormin des prés.
- Anthoxanthum odoratum. *Linna.* dans tous les prés du Lyonnais.
- Valeriana officinalis. *Linna.* dans les bois du Pila & de toute la province.
- Valeriana tripteris. *Linna.* dans les fissures des rochers , à Pila & dans le Bugey à Meria , Isnave , Junimond , &c.
- Valeriana pyrenæica. *Linna.* aux bords des bois du Pila.
- Polycnemum arvense. *Linna.* dans les chaumes des terres sablonneuses du Dauphiné.
- Cyperus flavescens. *Linna.* dans les pâturages de Pila , & aux environs de la ville de Lyon.
- Scirpus sylvaticus. *Linna.* à l'ombre dans les bois humides , dans des fossés aquatiques.
- Eriophorum polystachion. *Linna.* dans les prés humides , près de la source du Gier.
- Nardus stricta. *Linna.* le Nardet , sur les hauteurs , dans les lieux arides & dans les prés.

- Panicum miliaceum*. *Linn.* Millet. il est cultivé près de Tarentaise , village de Pila.
- Phleum pratense*. *Linn.* dans les prés de toutes les montagnes.
- Phleum nodosum*. *Linn.* dans les gasons des lieux arides , à Pila & dans toutes nos montagnes.
- Milium lendigerum*. *Linn.* au bord des prés & dans les rochers de Pila.
- Agrostis capillaris*. *Linn.* dans les près de la Grange.
- Aira cespitosa*. *Linn.* dans les champs.
- Aira montana*. *Linn.* dans les bois , à l'ombre.
- Melica ciliata*. *Linn.* dans les hayes , au-dessous de Pila , à S. Paul en Jarrët ; sur d'autres montagnes du Lyonnais , dans les rochers de l'Arbreffe , &c.
- Poa trivialis*. *Linn.* dans les prés.
- Poa angustifolia*. *Linn.* dans les prairies de la Grange.
- Poa pratensis*. *Linn.* ibid.
- Poa pilosa*. *Linn.* cette plante croît sur le Mont Pila , & dans presque toutes les montagnes du Lyonnais.
- Poa nemoralis*. *Linn.* à Pila au bord des bois ; on en voit aussi en plusieurs endroits du Lyonnais dans les hayes , à la Tourrette , &c.
- Briza minor*. *Linn.* dans les prés.
- Briza eragrostis*. *Linn.* dans les pâturages.
- Cynosurus cristatus*. *Linn.* au Mont Pila.
- Festuca myuros*. *Linn.* dans les fentes des rochers.
- Bromus sterilis*. *Linn.* aux bords des champs.
- Stipa pennata*. *Linn.* dans les lieux incultes.
- Avena elatior*. *Linn.* dans les prés de Pila.
- Avena flavescens*. *Linn.* dans les prés & dans tout le Lyonnais.
- Avena fragilis*. *Linn.* au bas du Pila , & sur les rivages du Rhône.
- Montia fontana*. *Linn.* au Mont Pila.
- Isuardia*. *Linn.* près des marais des Aveinières en Dauphiné.
- Peplis portula*. *Linn.* dans les ruisseaux sablonneux , près de Regni en Lyonnais.
- Scabiosa gramuntia* , olim triandra. *Linn.* dans les bois taillis de Pila , & dans toute la province.
- Sherardia arvensis*. *Linn.* dans les gasons , les prés , &c.
- Gallium palustre*. *Linn.* à la source du Gier.
- Gallium luteum*. *Linn.* dans les prés & champs du Pila , & par toute la province.
- Gallium uliginosum*. *Linn.* dans plusieurs endroits du Lyonnais.
- Gallium glaucum*. *Linn.* dans les bois du Bugey.

- Gallium rotundifolium*. *Linn.* dans les forêts au-dessus de la Grange , du côté du sud.
- Rubia tinctorum*. *Linn.* à S. Julien , dans les rochers de Sainte Colombe en Lyonnais , dans les bois taillis de Terre Bassé en Dauphiné , à Dorian dans le Bugey , dans les taillis au-dessous d'Uffel.
- Rubia peregrina*. *Linn.* dans le Comté de Nice & au Mont Pila.
- Asperula odorata*. *Linn.* aux environs de Lyon , à la Duchère , à Calvire , &c.
- Asperula cynanchica*. *Linn.* au bas de Pila , du côté de Condrieux.
- Sanguisorba officinalis*. *Linn.* dans les prés de Pila , dans ceux de Brotteaux près de Lyon , &c.
- Trapa natans*. *Linn.* dans les fossés marécageux près de Tarentaise ; dans les étangs du haut Beaujolais , près de Saint Symphorien de Lay.
- Alchemilla vulgaris*. *Linn.* dans les prés , les pâturages , au bord des ruisseaux.
- Alchemilla alpina*. *Linn.* au bord des prés , le long des sentiers.
- Aphanes arvensis*. *Linn.* *Percepiér*, dans tout le Lyonnais.
- Cuscuta europæa*. *Linn.* dans les prés du Pila & dans ceux du Lyonnais.
- Ilex aquifolium*. *Linn.* dans les bois du Lyonnais.
- Sabina procumbens*. *Linn.* à Pilat , & dans plusieurs de nos montagnes.
- Heliotropium europæum*. *Linn.* sur les revers de Pila.
- Lithospermum officinale*. *Linn.* au bas de Pila , près de S. Paul en Jarrèt.
- Anchusa officinalis*. *Linn.* au bord des champs & des chemins.
- Anchusa undulata*. *Linn.* on la trouve vers le bas de Pila , & en d'autres parties du Lyonnais , à la Tourrette.
- Cynoglossum officinale*. *Linn.* au bord des chemins , près de S. Chammond.
- Pulmonaria officinalis*. *Linn.* dans les bois de Pila.
- Symphitum officinale*. *Linn.* dans les prés du Lyonnais & du Dauphiné.
- Onosma echinoides*. *Linn.* cette plante croît sur les bords du Rhône , la route de Montluel , les Brotteaux , &c. Elle est assez commune dans le Languedoc.
- Cyclamen europæum*. *Linn.* dans les bois de la Franche-Comté , à Pila , dans plusieurs montagnes du Bugey , dans le parc de Dorian , &c.
- Menyanthes nymphoides*. *Linn.* au bas de Pila , dans des

fossés du côté du Rhône, & dans ceux des Brotteaux. *Menyanthes trifoliata*. *Lin.* dans les prés inondés, près du Bassard & des seies des Chartreux; à Lyon dans les prés au-dessous de Champ verd.

Hottonia palustris. *Lin.* à Pila, près de Lyon, dans les fossés de Ville Urbaine en Dauphiné.

Lysimachia vulgaris. *Lin.* dans les bois humides.

Lysimachia nemorum. *Lin.* à Pila, au bord des forêts de sapins, sur les revers du côté du Rhône.

Lysimachia nummularia. *Lin.* dans les prés humides de Pila, commune dans le Lyonnais & dans la Dombes, aux bords des fossés & des sources, au confluent du Rhône & de la Saône, sur le rempart de la ville de Lyon.

Convolvulus cantabrica. *Lin.* dans les rochers près de Condrieux; il est commun de l'autre côté du Rhône, près de Vienne en Dauphiné, à S. Symphorien, Ternai, &c.

Campanula medium. *Lin.* au bas de Pila, du côté du Rhône, dans les taillis & en se rapprochant de Lyon, à Vernaison, &c.

Samolus valerandi. *Lin.* sur les côtés de Pila, dans les fossés & dans ceux des Brotteaux.

Lonicera alpigena. *Lin.* dans les taillis en suivant le cours du Gier.

Verbascum lychnitis. *Lin.*

Verbascum pulverulentum, flore albo parvo. *Pin.* Cette variété est sur le chemin de Pila à S. Chaumont; elle est commune sur la route de Calvire, Roye, Fontaine, auprès de Lyon.

Datura stramonium. *Lin.* au bas de Pila, & dans tout le Lyonnais, originaire d'Amérique.

Hyoscyamus niger. *Lin.* au bas de Pila, dans tout le Lyonnais.

Rhamnus catharticus. *Lin.* au bas de Pila, près du Rhône, dans les hayes.

Ribes alpinum. *Lin.* dans les bois en suivant le cours du Gier, & dans les montagnes du Bugey.

Hedera helix. *Lin.* on trouve à Pila la plupart des variétés distinguées par Bauhin.

Thesium alpinum. *Lin.* au bord des bois du Pila.

Thesium lynophyllum. *Lin.* il se trouve dans les lieux sablonneux, à Dortan au Bugey, en Dauphiné près de Ternai.

Vincetoxicum. *Lin.* cette Pervenche se trouve de l'autre côté du Rhône, dans les bois taillis des collines du Dauphiné.

Asclepias vincetoxicum. *Lin.* dans les terrains argilleux, au bas de Pila.

Gentiana lutea. *Lin.* sur les bords des bois de sapins qui

appartiennent aux Chartreux , & du côté de S. Etienne ; on la voit aussi à la montagne de la Magdelaine en Roannois , & à Pierre-sur-Haute au-dessus de Montbrison ; elle n'est pas rare dans les hautes montagnes du Bugey , de Nantua à Dortan.

Gentiana amarella. Linn. dans les prés-du-Pila & des montagnes du Lyonnais , à la-Fal , &c.

Gentiana centaurium. Linn. dans les lieux incultes , au revers de Pila : commune dans les bruyères de Beaujolois , dans la Dombes , en Dauphiné.

Gentiana perfoliata. Linn. au-dessous du Pila , en se rapprochant du Rhône , dans les îles , à l'île Mogniat , aux étroits près de Lyon.

Sanicula europæa. Linn. dans les bois de Pila , & dans tous ceux du Lyonnais.

Tordylium officinale. Linn. dans le Lyonnais , au-dessus de l'Arbrêre.

Tordylium nodosum. Linn. sur la route de S. Chaumont , contre les murs , près de la Magdelaine , au-dessus de Rive de Gier.

Bunium bulbocastanum. Linn. assez commune à Pila , à l'entrée des bois , près du Crêt de la Perdrix.

Conium maculatum. Linn. cette plante croît abondamment à la Verpillière en Dauphiné , dans les fossés qui séparent le grand chemin du marais.

Athamanta oreoselinum. Linn. au bord du Gier , dans les prés au-dessous de Pila près de S. Chaumont , de Rive de Gier , & du côté de Condrieux.

Athamanta meum. Linn. le Meum est commun dans les prés de la Grange , de Tarentaise & du Bassard ; on la trouve dans les Cévennes , & à Pierre-sur-Haute , au-dessus de Montbrison.

Hieracium sphondylium. Linn. la Berce se rencontre dans les prés de Pila près des bois , comme dans tout le Lyonnais.

Sison verticillatum. Linn. dans les prés humides du Bassard & de Tarentaise.

Chrozophyllum tumulosum. Linn. à côté de la Grange.

Seseli pyrenaicum. Linn. dans les prés du Bassard.

Apium graveolens. Linn. dans les eaux stagnantes.

Viburnum apulus. Linn. dans les bois taillis , sur le cours du Gier , avant le Saut , à S. Bel , à l'Arbrêre en Lyonnais.

Sambucus racemosa. Linn. dans les bois , sur le cours du Gier ; il est aussi dans les montagnes du Bugey.

Parnassia palustris. Linn. dans les prés humides du Bassard , à Verpillière en Beaujolois , à Dortan en Bugey.

- Statice armeria*. *Linn.* dans les bois , près de Bessard , à la côte Rouge en Forez , à Fléchères en Dombes.
- Orosera rotundifolia*. *Linn.* dans les bois au - dessus de la Grange , du côté de la partie méridionale , & dans les prés humides de Bessard.
- Lilium martagon*. *Linn.* dans les bois de Pila , dans ceux du haut Bugey , quelquefois à S. Denys de Brompt près de Lyon.
- Ornithogallum pyrenaicum*. *Linn.* au bord des prés , sous les hayes , au bas de Pila & dans tout le Lyonnais.
- Asparagus officinalis*. *Linn.* cette plante croît naturellement dans les îles sablonneuses du Rhône.
- Convallaria verticillata*. *Linn.* dans les lieux escarpés des bois , en suivant le cours du Gier & dans les montagnes du Bugey à Meria , Ihave , Innimond.
- Convallaria majalis*. *Linn.* dans les bois de Pila & de tout le Lyonnais.
- Convallaria bifolia*. *Linn.* dans les taillis des hêtres , en allant de la Grange au Bessard ; dans quelques bois du Lyonnais & du Dauphiné , à S. Denys de Brompt.
- Juncus articulatus*. *Linn.* dans les prés arrosés près de la Grange.
- Juncus pilosus*. *Linn.* dans les bois de Pila
- Juncus bufonius*. *Linn.* dans les gasons marécageux au bord des ruisseaux , à Pila , à S. Chaumond , & à Rive-de-Gier.
- Rumex acetosa*. *Linn.* dans les prés de la Grange , & dans les bois du Pila.
- Rumex pulcher*. *Linn.* cette plante est au bord du Rhône au dessous de Fontanières
- Alisma peltata*. *Linn.* cette plante est dans quelques marais de la plaine du Dauphiné , notamment dans un petit marais situé entre le Rhône & le Château des Aveinières.
- Oenothera biennis*. *Linn.* au bas de Pila , en se rapprochant du Rhône , à Ampuis & sur les rivages de ce fleuve , auprès de Lyon.
- Epilobium angustifolium*. *Linn.* dans les bois de Pila & des montagnes du Bugey ; la variété à feuilles étroites se voit le long du Rhône & de la rivière d'Ain , dans les sables des Saussaies , aux Brotteaux , dans l'île Mogniat près de Lyon ; elles deviennent encore plus étroites à Cerdon en Bugey , à la Magdelaine près de Rien du Gier.
- Vaccinium myrtillus*. *Linn.* à l'ombre , sous les rochers , dans les bois de sapin & au Crêt de la Perdrix ; l'airelle croît aussi dans les forêts d'Iseron.
- Vaccinium vitis idæa*. *Linn.* cette espèce se trouve aussi à Pila , de même que dans d'autres montagnes du Lyonnais , notamment à Bossibre au-dessus de Tarare.

Daphne mezereum. Linn. il n'est pas rare à Pila, du côté d'orient ; il est aussi à Pierre-sur-Haute, montagne au-dessus de Montbrison.

Daphne laureola. Linn. dans les bois de Pila, dans le Dauphiné, à Anjou sur Terre Basse, dans le Bugey.

Mazhringia muscosa. Linn. dans les fentes des rochers de la partie orientale de Pila, assez commune dans le haut Bugey, à Nantua, Dortan, &c.

Polygonum bistorta. Linn. dans les prés de Pila ; on trouve la Bistorte de la petite espèce à la grande Chartreuse.

Polygonum convolvulus. Linn. dans les hayes du Bessard à S. Paul, au bas de Pila, dans d'autres montagnes de la province, à la Tourrette.

Paris quadrifolia. Linn. dans les lieux humides près des bois de Pila, en plusieurs lieux de la province ; à Eyrieux en Dauphiné.

Arbutus alpina. Linn. cette plante se trouve dans les bois & sur le Crêt de la Perdrix sous les roches avec la myrtille.

Pyrola rotundifolia. Linn. dans plusieurs montagnes du Lyonnais, à Héron, à Lafai, &c.

Chrysosplenium oppositifolium. Linn. dans les fissures des rochers humides ; au bord des sources, à l'ombre.

Saxifraga granulata. Pin. dans les bois de Pila & de nos collines, en Dauphiné.

Gypsophila rigida. Linn. dans les chaumes de Pila & de plusieurs montagnes du Lyonnais, au-dessus de Lenthilly, &c.

Gypsophila muralis. Linn. dans les fentes humides des rochers, près de la scie des Châtreaux, & au bas de Pila du côté de Condrieux.

Gypsophila saxifraga. Linn. sur le chemin de Pila à Condrieux.

Saponaria vaccaria. Linn. dans les bleds du Dauphiné.

Saponaria ocymoides. Linn. dans les fentes de rocher, à Pila, & dans les collines du Dauphiné auprès de Vienne.

Saponaria officinalis. Linn. elle est au bas de Pila, & commune dans tous les lieux de la province.

Dianthus armeria. Linn. dans les pâturages arides.

Dianthus prolifer. Linn. dans les chaumes de presque toutes nos montagnes.

Cucubalus bacciferus. Linn. dans les hayes de plusieurs montagnes du Lyonnais, à la Tourrette, à la Duchère, &c.

Cucubalus otites. Linn. près de Condrieux & de Vienné.

Silene armeria. Linn. au bas de Pila, près de S. Chaumont, sur les rochers qui bordent le Gier, à la grande Croix.

Stellaria nemorum. Linn. dans les bois de sapins, du côté du Vivarais.

Stellaria graminea. Linn. On en voit à la source de Gier.

- Cotyledon umbilicus veneris*. *Linn.* dans les fentes de rochers, sur de vieux murs ; au bas de Pila , du côté de Condrieux & de Roisey , dans les rochers de Sainte Colombe , au-dessus de l'Arbrêle.
- Sedum telephium*. *Linn.* dans plusieurs montagnes du Lyonnais ; Givors , la Croix rousse , &c.
- Sedum cepæra*. *Linn.* au bas de Pila , entre S. Chauvond & Rive de Gier.
- Sedum dasyphyllum*. *Linn.* dans les fentes des rochers humides , le long du Gier , près du Saut ; à Givors , & dans les montagnes du Bugcy.
- Oxalis acetosella*. *Linn.* dans les bois du Dauphiné.
- L'Oxalis à fleur jaune, *Corniculata*. *Linn.* se trouve sur les rivages du Rhône ; il est spontané aux environs de Lyon dans les jardins.
- Cerastium latifolium*. *Linn.* près des sources de Pila.
- Spergula arvensis*. *Linn.* à Pila & dans les montagnes voisines du côté de S. Paul en Jarrêt ; dans les chaumes sur les bords de la Saone , en Dombes.
- Afarum europæum*. *Linn.* il n'est pas rare en Bugcy , sous les rochers , dans les buis , à Emondo près de Dortan , à Meria.
- Lythrum salicaria*. *Linn.* près de la scie des Chartreux.
- Agrimonia eupatoria*. *Linn.* contre les balmes des bois & dans toute la province.
- Reseda luteola*. *Linn.* sur les côtés de Pila , au bord des terres sabloneuses , & dans plusieurs montagnes du Forez & du Lyonnais , à l'Arbrêle , &c.
- Prunus mahaleb*. *Linn.* il se trouve dans quelques bois de Pila , il est commun dans plusieurs de ceux du Lyonnais , & dans les hayes d'Oulin & des Brotteaux , près de Lyon.
- Prunus avium*. *Linn.* à Pila & dans plusieurs montagnes du Lyonnais.
- Crataegus aria*. *Linn.* on trouve cet arbre dans plusieurs bois du Lyonnais , ainsi qu'à Pila.
- Sorbus aucuparia*. *Linn.* il se trouve dans les montagnes du Lyonnais.
- Spiræa aruncus*. *Linn.* dans les montagnes du Bugcy.
- Rosa alpina*. *Linn.* dans les bois taillis de Pila , à Innimond en Bugcy , &c.
- Rubus cæsius*. *Linn.* le long des bords du Gier.
- Fragaria vesca*. *Linn.* on en trouve dans plusieurs montagnes du Lyonnais , dans les bois taillis au-dessus du pont de Buvet.
- Potentilla rupestris*. *Linn.* dans les lieux découverts des bois taillis , du côté du Vivarais , & dans le Dauphiné , à S. Symphorien , Ternay , &c.

- Potentilla aurea.* *Lin.* dans toutes les montagnes du Lyonnais.
- Potentilla argentea.* *Lin.* dans les fossés secs de Pila, & dans tout le haut Lyonnais.
- Geum rivale.* *Lin.* dans les prés atrofés de la Grange, près des bois.
- Comarum palustre.* *Lin.* dans les prés aux bords des eaux de marais, dans le Bugey.
- Astragalus spicatus.* *Lin.* dans les bois à côté du lieu où le Gier se précipite dans les rochers.
- Cistus helianthemum.* *Lin.* contre les Balmes, au bas de Pila.
- Aconitum lycoctonum.* *Lin.* près des bois.
- Aconitum variegatum.* *Lin.* au Pila.
- Aquilegia vulgaris.* *Lin.* à Sourcieu en Lyonnais, à la Tourette.
- Anemone pulsatilla.* *Lin.* au revers de Pila, du côté du Vivarais, auprès de Lyon, dans les bois taillis, à Villieux, à la Pape, &c.
- Anemone nemorosa.* *Lin.* dans plusieurs bois du Lyonnais.
- Clematis vitalba.* *Lin.* dans les hayes au bas de Pila.
- Thalictrum aquilegifolium.* *Lin.* près de Lyon, le long du rivage du Rhône, dans les prairies.
- Ranunculus aconitifolius.* *Lin.* dans les prés & les bois de Pila, au bord du Gier.
- Ranunculus hederaceus.* *Lin.* dans quelques prés de Pila, où les eaux n'ont point d'écoulement, & aux bords d'un marais aux aveinères en Dauphiné.
- Ranunculus aquatilis.* *Lin.* dans les ruisseaux.
- Caltha palustris.* *Lin.* dans les prés de Vaise, au-dessous de Champvert, à la porte de Lyon.
- Teucrium montanum.* *Lin.* sur les hauteurs dans les lieux secs & dans le Bugey, près de Nantua.
- Teucrium chamaedrys.* *Lin.* au bord des bois, dans les rochers.
- Sideritis hirsuta, olim betonica hirta.* *Lin.* contre les Balmes, dans les lieux escarpés des bois.
- Mentha rotundifolia.* *Lin.* le long des ruisseaux, au bas de Pila:
- Mentha aquatica.* *Lin.* il y en a une variété à fleurs blanches dans les réservoirs de la scie des Chartreux.
- Betonica officinalis.* *Lin.* dans les prés de Pila, où se trouve aussi la variété à fleurs blanches.
- Stachys germanica.* *Lin.* au bas de Pilat, dans les terres remuées, & dans le Lyonnais à Sourcieu, à la Tourette, &c.

- Origanum vulgare*. *Lin.* sur le chemin de Vienne à Auberive.
- Melissa grandiflora*. *Lin.* cette plante est commune dans les bois de Pila.
- Melittis melissophyllum*. *Lin.* dans les bois de Pila & du haut Bugéy, quelquefois dans le Lyonnais, à Iseron, &c.
- Scutellaria galericulata*. *Lin.* auprès des eaux, au réservoir de la scie des Chartreux, & dans le haut Beaujolois, à la Verpillière, &c.
- Euphrasia officinalis*. *Lin.* il s'en trouve à Pila une variété à fleurs très-larges.
- Melampyrum cristatum*. *Lin.* dans les prés marécageux & dans ceux du haut Bugéy.
- Pedicularis flammœa*. *Lin.* dans les prés humides, près de la Grange.
- Antirrhinum pelisseranium*. *Lin.* elle varie dans son port suivant l'exposition.
- Antirrhinum bellidifolium*. *Lin.* cette belle Linairé ne se trouve pas seulement à Pila, mais dans les chemins de presque toutes les montagnes du Lyonnais avec la Jasioné.
- Scrophularia canina*. *Lin.* dans les montagnes voisines de Pila, à Lyon, le long des chemins, près de Pierre Scise, à la Guillotière.
- Digitalis purpurea*. *Lin.* sur les hauteurs & au bas du Pila, dans les montagnes voisines, ainsi qu'à Iseron, à Tarare, en Lyonnais.
- Digitalis lutea*. *Lin.* dans quelques bois du Lyonnais & du Bugéy, celle qui est à grande fleurs est la variété dominante.
- Orobanche major*. *Lin.* dans tout le Lyonnais.
- Myagrum saxatile*, olim *cochlearia*. *Lin.* il est à Pila, & dans les montagnes subalpines du Bugéy, dans les fentes des rochers.
- Draba verna*. *Lin.* dans tout le Lyonnais.
- Draba muralis*. *Lin.* dans les bois, auprès des rochers.
- Tepedium iberis*. *Lin.* dans les chemins, au bas du Pila.
- Thlaspi montanum*. *Lin.* dans les fentes des rochers.
- Thlaspi bursa pastoris*. *Lin.*
- Iberis pinnata*. *Lin.* cette plante est commune au-dessous de Pila, du côté du Rhône, ainsi que dans le Dauphiné & aux Brotteaux, elle y croît avec l'*iberis amara*. *Lin.*
- Alyssum campestre*. *Lin.* dans toute la province, au bord des chemins.
- Dentaria pentaphyllos*. *Lin.* à l'ombre, au bord des bois de Pila, on la trouve avec 5 ou 7 folioles, à Meria, à Lani-mond en Bugéy.
- Cardamine hirsuta*. *Lin.* cette plante est très-commune à Lyon.

Sisymbrium nasturtium. *Linn.* sur les côtes de Pila, aux lieux arrosés.

Sisymbrium sophia. *Linn.* sur les revers de Pila, du côté de Condrieux, aux Brotteaux, sur le chemin de Mirebel.

Abies alpina. *Linn.* contre les rochers, rare à Pila, commune dans les montagnes du Bugey.

Turritis hirsuta. *Linn.* dans les fentes humides des rochers, à Pila rarement, commune à la Crote en Savoye, à la Chartrouse, &c.

Geranium phæum. *Linn.* le long du Gier en descendant, au bord des bois.

Geranium pratense. *Linn.* à Pila &c dans les Brotteaux du Rhône.

Spartium scoparium. *Linn.* à Pila.

Genista sagittalis. *Linn.* dans les pâturages, où elle devient destructive des plantes qui l'environnent, le bétail ne la broute jamais.

Genista pilosa. *Linn.* dans les bois du Bugey, à Ste Colombe en Lyonnois.

Genista purgans. *Linn.* il croît abondamment à Pila, on le trouve depuis S^t Paul en Jarrêt jusqu'au sommet le plus élevé; on le voit encore entre S^t Chaumond & Rive de Gier, dans les bois taillis &c sur les rochers qui bordent le Gier, à la grande Croix: sa fleur sent la vanille.

Genista germanica. *Linn.* dans plusieurs bois du Lyonnois, &c sur la petite montagne de S. Romain, dans la plaine du Forez.

Ononis spinosa. *Linn.* dans les champs de nos provinces, aux Brotteaux près de Lyon. On trouve dans la plaine du Dauphiné la variété sans épines.

Ononis natrix. *Linn.* sur les rivages du Rhône, au-dessous de Pila &c près de Lyon.

Anthyllis vulneraria. *Linn.* dans le haut Dauphiné, en Savoye.

Cytisus laburnum. *Linn.* moins fréquent dans les bois de Pila que dans ceux du haut Bugey & des Alpes Delphinoises.

Ulex Europæus. *Linn.* sur les côtes de Pila, dans la plaine du Forez &c près de Tassin sur la route de Paris, à une lieue de Lyon.

Coronilla emerus. *Linn.* dans les taillis, aux bords des bois, sur les côtés de la montagne, &c dans tous les environs de Lyon, aux Etroits, &c.

Coronilla varia. *Linn.* au bas de Pila.

Hypocrepis multi-siliquosa. *Linn.* on trouve cette plante sur la montagne de Grange Blanche près de Lyon, & dans la plaine du Dauphiné.

- Astragalus glycyphyllos*. *Linn.* au-dessous de Pila , du côté du Rhône , dans les Saussaies , commune dans plusieurs prés du Lyonnais & de la Dombes : on en pourroit faire de très-bonnes prairies artificielles.
- Trifolium rubens*. *Linn.* dans les bois de tout le Lyonnais.
- Lotus filiquosus olim erecta*. *Linn.* dans les prés humides de Pila , dans l'île de Mogniat , dans plusieurs prés du Dauphiné , le long du Rhône.
- Medicago fulcata*. *Linn.* au bas de Pila , aux bords des champs.
- Hypericum androsaemum*. *Linn.* sur les bords du Gier & de Dorley , au bas de la montagne & à la grande Croix.
- Hypericum quadrangulum*. *Linn.* on en trouve à Pila une variété dont la tige & les feuilles sont panachées de jaune par maladie.
- Hypericum pulchrum*. *Linn.* dans les montagnes du Lyonnais , à la Tournette , à l'Arbrète , à Iseron & sur les côtes de Pila.
- Scorsonera laciniata*. *Linn.* au bord des champs , des prés , & dans ceux des Brotteaux près du Rhône.
- Picris echinoides*. *Linn.* dans les bois de la plaine du Dauphiné , à Eyrieux , &c.
- Sonchus alpinus* *Linn.* dans les bois taillis , le long de Cours de Gier , avant le Saut.
- Chondrilla juncea*. *Linn.* au bas de Pila du côté de Condrieux.
- Prenanthes purpurea* *Linn.* dans le Bugey.
- Leontodon hispidum*. *Linn.* près du Bestard.
- Hieracium umbellatum*. *Linn.* dans les bois du Lyonnais.
- Andryala integrifolia*. *Linn.* sur les côtes du Pila.
- Carduus acaulis*. *Linn.* dans les montagnes du Lyonnais , au dessus de Buvet , &c.
- Carduus nutans*. *Linn.* dans le Lyonnais.
- Carduus serratuloides*. *Linn.* dans les prés humides à la porte de S. Fond.
- Carlina vulgaris*. *Linn.* dans les champs de tout le Lyonnais.
- Cacalia alpina*. *Linn.* à Pila , dans les bois taillis remplis de sources.
- Arthemisia campestris*. *Linn.* au bas de Pila dans les lieux incultes.
- Arthemisia absinthium*. *Linn.* au revers de Pila , du côté de S. Julien-Molip-Molette.
- Gnaphalium stachas*. *Linn.* dans les fentes des rochers , près de Condrieux.
- Erigeron canadense*. *Linn.* plante commune dans nos provinces.
- Senecio jarracenicus*. *Linn.* à Innimond en Bugey.

- Senecio paludosus. Linn.* au confluent du Rhône & de la Saône, dans les marais de Verpillière en Dauphiné.
- Senecio abrotanifolius. Linn.* on en trouve en allant de la Grange au Bessard.
- Inula Britannica. Linn.* sur les rivages du Rhône.
- Arnica montana. Linn.* dans les prés de la Grange.
- Doronicum pardalianches. Linn.* *ibid.*
- Achillea ptarmica. Linn.* dans les prés bas, humides : & dans plusieurs montagnes du Lyonnais, à Lentille, &c.
- Centaurea montana. Linn.* rare à Pila, commun à la grande Chartreuse.
- Filago germanica. Linn.* au bas de Pila.
- Jasione montana. Linn.* dans les champs, au bord des chemins : les abeilles aiment ses fleurs.
- Viola tricolor. Linn.* dans les prés de la Grange ; on y en trouve à fleurs blanches.
- Impatiens noli tangere. Linn.* dans les bois humides de Pila & du haut Dauphiné.
- Satyrium hircinum. Linn.* sur le revers de Pila, en plusieurs lieux du Lyonnais, aux environs de Lyon.
- Satyrium albidum. Linn.* à Pila dans les pâturages, en allant au Bessard.
- Ophris nidus avis. Linn.* dans les bois de sapins, à Nantua, à la Chartreuse.
- Orchis insectifolia. Linn.* on en voit plusieurs variétés près de Lyon.
- Ophris anthropophora. Linn.* à Grange blanche.
- Aristolochia clematitis. Linn.* au-dessous de Pila, du côté du Rhône, dans les Saussayes ; en Dombes, sur les bords de la Saône.
- Typha latifolia. Linn.* dans les lieux marécageux, au-dessous du Bessard, sous les arches du pont de la Guillotière.
- Zea mays. Linn.* dans les montagnes du Bugey.
- Betula alba. Linn.* dans les bois taillis ; on l'appelle *Bière* dans le Lyonnais.
- Fagus castanea. Linn.* commun vers Condrieux ; c'est du village de Lange, ainsi que de Loire & des cantons voisins qu'on tire cette belle variété qu'on nomme *Marons de Lyon*, à Heron, dans plusieurs parties du Lyonnais, à Cerdon dans le Bugey, on voit des forêts de Châtaigniers & de beaux bois taillis de ces arbres dans le Dauphiné.
- Fagus sylvatica. Linn.* entre Ronno & S. Just d'Aurey en Beaujolais.
- Carpinus betulus. Linn.* *Charpenne*, en Dauphiné.
- Pinus sylvestris. Linn.* il est abondant dans quelques montagnes du Lyonnais ; il est commun à Montrollier, à la Rivière, &c.

- Pinus picea*. *Linn.* une partie du Pila en est couverte, on en voit aussi du côté de Moncrotier, &c.
- Pinus abiés*. *Linn.* dans les bois du Dauphiné.
- Bryonia alba*. *Linn.* sur les côtés &c au bas de Pila.
- Salix rosmarini folia*. *Linn.* au bas du Pila, aux bords de quelques ruisseaux.
- Hippophaë rhamnoides*. *Linn.* au bas de Pila dans les îles du Rhône & près de Lyon, à l'île Moigniat, aux Brotteaux au-dessous de la Pape. Le Tamarisc d'Allemagne & la Guimauve se trouvent dans les îles du Rhône en remontant près de Grollée, des Avcinières, &c.
- Humulus lupulus*. *Linn.* il croit assez communément dans les hayes des vallons des montagnes du Lyonnais.
- Tamus communis*. *Linn.* dans les Brotteaux de l'Hôpital, à la Tourrette en Lyonnais, au bas de Pila dans les fossés remplis d'herbes.
- Populus nigra*. *Linn.* dans les lieux aquatiques au bas du Pila.
- Mercurialis perennis*. *Linn.* dans le haut Bugey.
- Andropogon ischaenum*. *Linn.* dans toute la province.
- Cenchrus racemosus*. *Linn.* sur la montagne de Roye en franc Lyonnais.
- Acer campestre*. *Linn.* *Isérable* en patois Lyonnais; on en voit à Pila une variété à grandes feuilles.
- Ophioglossum vulgatum*. *Linn.* dans les prés marécageux près de Tarantaise & près de Lyon, au-dessous de la plaine de S. Fond.
- Osmunda spicant*. *Linn.* on en trouve à Pila.
- Osmunda lunaria*. *Linn.* dans les prés de la grande Chartruse.
- Asplenium trichomanes*. *Linn.* dans les fissures des rochers humides.
- Asplenium adiantum nigrum*. *Linn.* dans tout le Lyonnais.
- Polypodium filix femina*. *Linn.* à Pila contre les rochers, le long de Cier.
- Polypodium aculeatum*. *Linn.* dans les lieux humides & ombragés de Pila, dans quelques bois du Lyonnais, à Eyrieux en Dauphiné.
- Adiantum capillus veneris*. *Linn.* aux environs de Condrieux, sur le rivage du Rhône, dans la grotte de Fontanières près de Lyon.
- Lycopodium clavatum*. *Linn.* dans les bois de Pila.
- Sphagnum palustre*. *Linn.* dans les lieux humides des bois près des sources, au-dessus de la Grange, avec la rosée du soleil.
- Fontinalis antipyretica*. *Linn.* contre les rochers sur lesquels coulent les eaux des sources.

Lichen islandicus. Linn. dans les bois, au-dessus de la Grange.

Lichen nivalis. Linn. il n'est pas rare à Pila.

Lichen pyxidatus. Linn. contre les Balmes, dans les pâturages de tout le Lyonnais.

Chara vulgaris. Linn. dans des fossés d'eau stagnante, à Pila & dans nos provinces, en Doimbes, &c.

Tremella noctua. Linn. commune dans la province.

Peziza lentifera. Linn. à Pila & dans les montagnes du Lyonnais.

Clavaria coralloides. Linn. dans les bois des montagnes de Pila & du Lyonnais.

Lycoperdon cervinum. Linn. on en voit à Pila & dans les montagnes au-dessus de Grenoble.



CATALOGUE

*des différens ouvrages qui ont paru sur la
Botanique de France.*

GÉNÉRALITÉ DE PARIS.

HISTOIRE des plantes qui naissent aux environs de Paris, par M. Pitton Tournesfort, dont il y a eu une seconde édition, revue & augmentée, par M. Bernard de Jussieu, en 2 vol. *in-12.*

Botanicon parisiense, *in-fol. cum fig. Æneis* authore D. Vaillant. 1 vol.

Le Botaniste François, par M. Barbeau du Bourg, 2 vol. *in-12.*

Manuel de Botanique, par M. du Chesne, 1 vol. *in-12.*

GÉNÉRALITÉ DE SOISSONS.

Voyez les *Botanicons particuliers* rapportés dans cet ouvrage.

GÉNÉRALITÉ D'ORLEANS.

Observations sur les plantes des environs d'Etampes, d'Orléans & du Poitou, par M. Guertard, de l'Académie Royale des Sciences, 2 vol. *in-12.*

GÉNÉRALITÉ D'ALSACE.

Tournesfortius Alsaticus, authore Lindern, 1 vol. *in-12.*

Mappi historia plantarum, *cum fig. Æneis*, 1 vol. *in-12.*

Floræ argentoratensis prodromus, autore Spelmann,
Botanices professore.

GÉNÉRALITÉ DE PROVENCE.

Plantes des environs d'Aix, avec fig. 1. vol. *in-fol.*
par M. Garidel.

Gerardi flora Gallo provincialis, 1 vol. *in-8.*

GÉNÉRALITÉ DE LANGUEDOC.

Botanicon Monspeliense, autore D. Magnol.

Methodus foliorum, autore D. Sauvages, medicinæ
professore, 1 vol. *in-8.*

Gouan flora Monspeliensis, 1 vol. *in-8.*

GÉNÉRALITÉ DE LORRAINE.

Dictionnaire historique des plantes de la Lorraine,
1 vol. *in-fol.* manuscrit, par M. Marquet, médecin
Botaniste du duc Léopold.

Autre Dictionnaire historique des plantes de la Lor-
raine, en forme d'Herbier, *in-fol.* forme d'Atlas, 3 vol.
manuscrits, par le même; ces deux ouvrages sont entre
les mains du sieur Buchoz, auteur de cet ouvrage,
il n'a pu retirer ce dernier ouvrage des mains de M.
Gautier, chanoine régulier, qui en avoit fait l'acqui-
sition de l'auteur dans un moment de découragement,
qu'à force d'argent.

Traité historique des plantes de la Lorraine, par
l'auteur de ce Dictionnaire, 10 vol. petit *in-8.* ornés
de planches, chez Fétil, libraire, rue des Cordeliers.

Tournefortius Lotharingæ, 1 vol. petit *in-8.* par le
même.

GÉNÉRALITÉ DE BOURGOGNE.

Plantes des environs de Dijon, par M. Collet, avec

deux lettres adressées à M. de Tournesort ; cet ouvrage est fort rare actuellement , on en trouve l'extrait dans ce Dictionnaire.

Liste des plantes de Bourgogne , par M. le Clerc, médecin à Semur. *Voyez* les Botanicons particuliers de ce Dictionnaire.

Liste des arbres de la Bourgogne , par M. d'Aubenton. *Voyez* aussi les Botanicons particuliers de cet ouvrage.

GÉNÉRALITÉ D'AUVERGNE,

Plantes d'Auvergne , par Dom Emmanuel Fournault, religieux Bénédictin. *Voyez* les Botanicons particuliers.

Liste des plantes d'Auvergne , par M. Lemonnier , de l'Académie Royale des Sciences ; consultez les Botanicons particuliers , & le Traité de la Méridienne , qui fait suite au recueil des Mémoires de l'Académie ; M. Richard , jardinier du roi à Trianon , nous avoit promis le *Flora* du Mont d'Or en Auvergne , qu'il avoit rédigé lui-même ; mais nous ne l'avons pu avoir au moment de la rédaction de cet ouvrage.

GÉNÉRALITÉ DU BERRI.

Liste des plantes qui croissent dans le Berri , par M. Lemonnier ; consultez les Botanicons particuliers , & le Traité de la Méridienne ci-dessus cité.

GÉNÉRALITÉ DE BRETAGNE.

Liste des plantes des environs de Nantes , par M. Bonamy. *Voyez* les Botanicons particuliers.

GÉNÉRALITÉ DE NORMANDIE.

Liste des plantes des environs de Rouen , par Mes-

fleurs Pinard & d'Angerville. *Voyez* les Botanicons particuliers.

Liste des plantes des environs de Caen. *Voyez* les Botanicons particuliers.

P A Y S D' A N J O U.

Liste des plantes qui croissent aux environs d'Angers, par M. Dupaty. *Voyez* les Botanicons particuliers.

ROUSSILLON ET DIOCÈSE DE NARBONNE.

Liste des plantes qui croissent dans le Roussillon & le diocèse de Narbonne. *Voyez* les Botanicons particuliers, & le *Traité de la Méridienne.*

GÉNÉRALITÉ DE CHAMPAGNE.

Liste des plantes qui viennent aux environs de Rheims, par M. Raussin. *Voyez* les Botanicons particuliers.

GÉNÉRALITÉ DU LYONNOIS, FORÈS ET BEAUJOLAIS.

Démonstrations Botaniques à l'usage de l'Ecole vétérinaire, 2 vol. in-8. par M. l'abbé Rosier.

Liste des plantes qui croissent aux monts Pilats; consultez les Botanicons particuliers, & deux ouvrages imprimés, dont l'un est intitulé: *Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle du Lyonnais, Forêts & Beaujolois*, par M. Dolac, avocat au parlement, & l'autre a pour titre: *Voyage au mont Pila.*

GÉNÉRALITÉ DE PICARDIE.

Liste des plantes qui croissent en Picardie, par le

fieur Jourdain , jardinier Botaniste. *Voyez* les Botanicons particuliers,

Liste des plantes qui croissent aux environs de Beauvais , par M. Demars. *Voyez* les Botanicons particuliers de cet ouvrage.

GÉNÉRALITÉ DU LIMOUSIN ET DU QUERCY.

Liste des plantes des environs de Souillac & de Beaulieu en Bas-Limousin , par Dom Emmanuel Fournault : consultez les Botanicons particuliers.

ALPES ET PYRÉNÉES.

Institutiones rei herbariæ , authore Tournefortio ; consultez aussi les Botanicons particuliers.

GÉNÉRALITÉ DE FRANCHE-COMTÉ.

Les plantes qui croissent dans cette province sont à-peu-près les mêmes que celles de la Suisse ; on peut par conséquent avoir recours pour les plantes de cette province au Traité de M. Haller , intitulé : *Enumeratio plantarum Helveticarum* , seconde édition , avec planches.

F L A N D R E.

La Flandre ne fournit pour plantes que celles qui viennent aux environs de Paris , excepté quelques plantes aquatiques qui se trouvent sur-tout dans la Hollande ; on peut donc consulter pour cette province les Botanicons de Hollande.

Nous avons encore quelques ouvrages généraux sur les plantes de la France , notamment un ouvrage in-fol. intitulé : *Plantarum per Galliam , Italiam & hispaniam observatarum icones* , authore Barretero.

OBSERVATIONS

GÉNÉRALES.

DANS le *Flora* général de la France que nous avons donné dans cet ouvrage, nous avons fait mention de 2080 plantes que nous avons observées dans nos différentes courses d'herborisations ; M. Adanson dans ses familles des plantes prétend qu'il y en a 3000, nous ne nous doutons nullement de cette vérité, nous pensons même que le nombre en est plus considérable ; car si nous faisons une récapitulation exacte tant des Botanicons particuliers que nous avons rapportés à la suite de ce Dictionnaire, que de ceux qui étoient déjà imprimés, il est vraisemblable que nous trouverions plus de 1000 plantes dont il n'a pas été fait mention dans notre *Flora* général, c'est par cette raison que nous avons publiés les différens *Flora* manuscrits qu'on nous a communiqués, & que nous avons indiqués ceux qui se trouvoient déjà imprimés pour y avoir recours ; par ce moyen nous avons tâché de faire connoître à nos lecteurs toutes les différentes plantes de la France qui ont été observées jusqu'à nos jours, en attendant que des yeux plus clairvoyans en puissent observer de nouvelles, car il est probable qu'elles n'ont pas toutes été découvertes. En finissant cet ouvrage nous ne pouvons assez marquer notre reconnoissance aux personnes zélées qui ont bien voulu nous faire part de leurs découvertes sur les plantes, nous espérons qu'elles continueront aussi à la suite de nous faire part de celles qu'elles auront faites sur la minéralogie & l'hydrologie de la France, nous en ferons usage avec la même reconnoissance ; elles nous mettront par-là en état de poursuivre l'histoire

naturelle entière du royaume , que nous avons commencée par celle des végétaux. Pour ne rien laisser à désirer sur la Botanique de France, nous allons donner ici une liste de tous les auteurs François qui ont travaillé sur cette partie de l'histoire naturelle , avec le titre de leurs ouvrages ; nous nommerons ensuite les professeurs de Botanique qui enseignent actuellement les plantes dans le royaume , & nous indiquerons les jardins de Botanique tant publics que particuliers qu'on y cultive , après quoi nous rapporterons les différentes tables que nous avons annoncées dans notre préface , pour rendre encore notre Dictionnaire plus usuel que n'ont coutume de l'être des ouvrages de cette nature.

LISTE DES AUTEURS FRANÇOIS

qui ont écrit sur la Botanique.

LE premier auteur de France qui a écrit sur la Botanique est *Corbichon* ; son ouvrage est *in-folio* ; il a été imprimé à Lyon en 1482 , il est intitulé : *le Propriétaire* , & est orné de 8 figures en bois , qui suivant M. Adanson sont très-mauvaises.

Le second auteur Botaniste François est *Gueroult*, *Gueroaldus* ; son ouvrage a pour titre : *Interpretatio in cæmilium macrum* ; il a été imprimé à Paris sous format *in-12.* en 1517 , & renferme 67 figures en bois , qui sont très-mauvaises.

Le troisième est *Ruelle* , *Ruellius* ; cet auteur est connu par un ouvrage qu'il a publié à Paris en 1536 , sous un format *in-folio* , & qui est intitulé : *Commentarii in Dioscoridem*. On y remarque 382 figures en bois qui représentent 737 plantes , & qui sont médiocrement faites. On a encore imprimé à Lyon en 1552 ,
sous

sous format in-12. un autre ouvrage de cet auteur, qui a pour titre : *De naturâ stirpium*.

Bellon est le quatrième auteur Botaniste François, (*Bellonius*) ; il a publié deux ouvrages : le premier est son *Voyage au Levant*, il est in-4. & a paru à Paris en 1553 ; il contient 20 figures en bois, dont les unes sont médiocres & les autres bonnes, Le second est in-folio ; il a été imprimé en 1605, & a pour titre : *De arboribus coniferis*.

Thevet occupe le cinquième rang par son antiquité parmi les Botanistes François ; il nous a laissé deux ouvrages, un qui a pour titre *Cosmographie*, & qui a été imprimé à Lyon en 1554, sous format in-4. il s'y trouve 11 figures en bois qui sont très-mauvaises ; l'autre a paru aussi sous format in-4. à Paris en 1557.

Le sixième Botaniste François qui a publié des ouvrages sur les plantes est Dugort ; l'ouvrage que nous avons de cet auteur a pour titre : *Le Bénéfice commun* ; il a été imprimé à Rouen en 1555, & est orné de 58 figures en bois qui sont médiocres.

7. Duchoul est encore un ancien auteur François qui a écrit sur la Botanique ; il a donné l'histoire du Chêne, *Quercus historia*, il l'a orné de 14 figures en bois qui sont médiocres ; cet ouvrage a été imprimé à Lyon in-8. en 1555.

Dupin, Pinæus est le huitième auteur François qui a parlé des plantes dans ses écrits ; son ouvrage est intitulé : *Historia plantarum Dioscoridis*, il a été publié sous format in-12. en 1561 à Léide, & en 1567 à Lyon ; on trouve dans cet ouvrage 616 figures en bois, qui sont gravées fort médiocrement.

9. Pena est un auteur François, dont les ouvrages sont imprimés à la suite de ceux de Lobel, qui est originairement Flamand ; l'ouvrage de Lobel est intitulé *Historia stirpium* : il a paru in-folio à Londres en 1570, avec 2191 figures en bois qui sont assez bonnes ; ce même ouvrage a été réimprimé en 1681 à Anvers,

avec celui de *Pena*, qui a pour titre : *Adversaria stirpium*, & qui a pour format l'*in-folio*.

Gohori, auteur peu connu, peut passer pour le dixième auteur François qui a travaillé sur les plantes ; nous avons de lui une *Instruction sur le Petun*, avec deux figures en cuivre qu'on trouve bonnes ; cet ouvrage a paru *in-12* à Paris en 1572.

11. *Lecluse*, *Clusius*, est plus connu dans la République des Lettres par ses ouvrages que l'auteur précédent ; il passe pour être un des fondateurs de la Botanique ; l'ouvrage qu'il a publié est intitulé : *Rariorum plantarum historia*. Son ouvrage a d'abord paru *in-8*, en 1576, il a ensuite été réimprimé *in-folio* à Anvers en 2 volumes en 1611 ; les figures qui y sont gravées en bois, sont au nombre de 1385, M. Adanson les regarde comme bonnes.

Linocier peut passer pour le douzième auteur François qui a écrit sur les plantes : nous avons de lui une *Histoire des plantes*, qui a paru à Paris *in-16*, en 1584, avec 691 figures en bois, dont les unes sont médiocres, & les autres bonnes.

13. *Dalechamp* est trop fameux dans la Botanique pour n'en pas faire mention ici ; il est originaire François ; il a publié à Lyon en 1587, sous format *in-fol.* un ouvrage intitulé : *Historia generalis plantarum*. Cet ouvrage a été réimprimé à Lyon en deux volumes, en 1653, il contient 2731 figures en bois, qui ne sont que médiocres.

14. *Tremblay* a publié en 1588 à Rouen, sous format *in-8*, un ouvrage qui a pour titre : *Les fleurs de Macer*, dans lequel il se trouve sept figures en bois qui sont médiocres.

15. En 1598 il a paru à Montpellier un ouvrage *in-8*, qui a pour titre *Onomastikon*, dont l'auteur est *Richiet de Belleval* ; cet ouvrage est orné de 52 planches en cuivre, qui sont très-mauvaises, & dans lesquelles se trouvent 700 plantes.

16. Robin a publié *in-12.* en 1601, & *in-folio* en 1608, *Le jardin d'Henri IV.* Cet ouvrage est orné de 214 figures en cuivre qui ne sont que médiocres.

17. Duret, autre auteur François, a donné à Paris en 1605, sous format *in-12.* une *Histoire admirable des plantes*, dans laquelle se trouvent 24 figures en bois médiocres & mauvaises.

18. Nous avons de Paul Reneaume, aussi auteur Botaniste François, un ouvrage *in-4.* qui a paru en 1611, & qui a pour titre : *Specimen historiae plantarum.* Cet ouvrage est orné de 48 figures en cuivre, qui passent pour bonnes, & qui représentent 144 plantes.

19. Langlois & Le Clerc, François d'origine, ont donné au public en 1620, un ouvrage intitulé : *Livre de fleurs*, *in-fol.* dans lequel se trouvent 100 figures en cuivre, qui passent pour être médiocres.

20. *Le jardin de Louis XIII.* a paru *in-fol.* en 1623, il est orné de 91 planches en cuivre, qui contiennent 213 figures; les auteurs de cet ouvrage se nomment Vallet & Brodeur, l'édition est de Paris,

21. En 1628 a paru à Paris un ouvrage *in-8.* intitulé : *De la nature des plantes*, l'auteur se nomme Gui de la Brosse; cet ouvrage a été réimprimé en 1640, sous format *in-fol.* il contient 50 figures en cuivre, qui passent pour être bonnes.

22. *Le Theatrum floræ de Firens*, parut en 1632 à Paris, *in-fol.* Il s'y trouve 257 figures en cuivre qui sont médiocres.

23. Cornuti, *Cornutus*, occupe un rang très-distingué parmi les Botanistes François; nous avons de lui deux ouvrages de Botanique, l'un intitulé *Enchiridion parisiense*, qui a été imprimé à Paris en 1635. & qui est orné de 78 figures en cuivre gravées médiocrement, & contenant 87 plantes, & l'autre a pour titre : *Historia plantarum canadensium.*

24. On voit au cabinet des Estampes du Roi une collection très-nombreuse de plantes parfaitement

peintes par de fameux artistes, tels que messieurs *Robert*, *Joubert*, *Aubriet* & mademoiselle *Basseporte*; cette collection a été commencée en 1653, & se continue journellement. On fait monter ces dessins à plus de 5000, qui se trouvent reliées en 50 volumes *in-fol.*

25. Il parut en 1655 un volume *in-fol.* intitulé : *Livre de bouquets*; ce volume contient 50 figures en cuivre qui sont bonnes; l'auteur se nomme *Toulouse*, son nom n'est cependant pas des plus illustres en Botanique.

26. *Flacourt*, auteur François, publia en 1661, à Paris, *in-4.* l'*Histoire de Madagascar*, avec 151 figures en cuivre qui sont des plus mauvaises.

27. *Chabré*, qui passe pour un des fondateurs de la Botanique, est un auteur François; il a publié un ouvrage *in-fol.* en 1666, qui est intitulé : *Sciagrafia*, & qui est orné de 3374 figures en bois qui passent pour très-médiocres; cet ouvrage a été réimprimé à Genève en 1677, aussi *in-fol.*

28. Nous placerons suivant sa date, parmi les auteurs Botanistes, dans le vingt-huitième rang, *Roche-fort*; nous avons de cet auteur un ouvrage intitulé : *Histoire naturelle des Antilles*, qui a paru à Paris sous format *in-12.* en 1667, & qui a été réimprimé *in-4.* à Rotterdam en 1681; il se trouve dans cet ouvrage 32 figures en cuivre mauvaises.

29. *Dodart* est le premier des auteurs Botanistes François qui ait fait graver en cuivre des planches bonnes, & pour mieux dire, parfaites; elles sont au nombre de 43, & elles sont insérées dans un ouvrage qui a pour titre : *Mémoires pour l'histoire des plantes*, imprimé d'abord *in-fol.* à Paris en 1676, & réimprimé *in-4.* en 1731.

30. En 1689, MM. *Robert*, *Chatillon*, *Bosse*, François d'origine, ont publié *in-fol.* un ouvrage intitulé : *Plantes de l'Académie*, qu'ils ont orné de 319 planches en cuivre, qui sont bonnes & même parfaites.

31. *Magnol* mérite à juste titre le nom de Botaniste,

il étoit professeur à Montpellier ; nous avons de lui trois ouvrages sur les plantes, tous imprimés dans ladite ville, & sous format *in-8*. Le premier a paru en 1686, il est intitulé : *Botanicon Monspelienſe*, il contient 22 figures en cuivre qui ſont médiocres, & ces figures représentent 2000 plantes ; le ſecond eſt connu chez les Botanistes, ſous le titre de *Prodromus hiftoriæ generalis plantarum*, & le troiſième ſous celui de *Caracter plantarum*.

32. *Blegny*, quoique peu connu, peut paſſer pour le trente-deuxième auteur François qui a écrit ſur les plantes ; ſon ouvrage a paru à Lyon *in-12*. en 1688, il eſt intitulé : *Le bon uſage du Thé, Caffé & Chocolat* ; on y voit trois figures en cuivre, qui ſont mauvaiſes.

33. *Jean Marchant* eſt après *Dodart* celui des auteurs François qui ait mérité un vrai rang parmi les Botanistes ; il a prononcé pluſieurs mémoires ſur les plantes à l'Académie Royale des Sciences ; ces mémoires ſont partie des recueils de cette ſavante Compagnie, & renferment plus de 100 planches en cuivre qui ſont bonnes & parfaites.

34. La France ſe fera toujours un honneur d'avoir eu parmi ſes Botanistes le célèbre *P. Plumier*. Ce grand Botaniste a publié pluſieurs ouvrages ſur les plantes qui contiennent plus de 838 figures en cuivre bonnes & parfaites, ſans ombre ; les ouvrages qu'il a donnés ſont les *Plantes de l'Amérique, in-fol.* en 1693, réimprimées *in-4* en 1703. *Nova genera plantarum Americarum, in-fol.* Paris, 1705. *Fougères d'Amérique, in-fol.* Amſterdam, 1755. On trouve un recueil conſidérable de ſes ouvrages en manuſcrits, au Cabinet des Eſtampes du roi.

35. Que dirai-je du fameux *Pitton de Tournefort*, ſon ſeul nom lui ſuffit ; nous n'avons jamais eu en France de Botaniste comme cet auteur, & peut-être n'en aurons-nous jamais ; on peut bien dire qu'il eſt le vrai pere de la Botanique, & ſ'il ſ'eſt trouvé depuis

quelques auteurs qui sont parvenus à acquérir une réputation dans cette science , on peut dire que les ouvrages de ce savant les ont beaucoup aidés dans leurs travaux. Nous avons de cet auteur plusieurs ouvrages : ses *Elémens de Botanique*, en trois volumes in-8. qui ont paru en 1694, sont très-recherchés dans les cabinets des curieux pour la beauté des gravures ; son ouvrage intitulé : *Institutiones rei herbariæ*, n'est pas moins estimable, il est en 3 volumes in-4. les planches y sont supérieurement gravées ; on préfère cependant pour la beauté des planches les *Elémens de Botanique* aux *Instituts* ; cet ouvrage a paru pour la première fois en 1700, M. de Jussieu en a donné une édition. Le troisième ouvrage de M. de Tournefort est son *Voyage au Levant*, les planches en sont aussi artistement gravées ; il a encore publié ses *Herborisations des environs de Paris*, en 2 vol. in-12. &c on lui attribue en outre un *Traité des médicamens*, en 2 volumes, dont on vient de publier à Paris une seconde édition. On trouve dans le recueil de l'Académie Royale des Sciences, plusieurs excellens mémoires de cet auteur.

36. En 1700. N. Robert, françois, a donné au public un ouvrage in-4. orné de 53 planches en cuivre qu'on dit bonnes, &c qui a pour titre : *Variæ florum species*.

37. Spon est un auteur François qui a fait imprimer en 1705 à Constantinople un *Traité de Botanique* in-4. intitulé : *Beccanda Asiatica*, dans lequel, au rapport de Linneus, il se trouve des figures.

38. François Petit est un autre auteur François qui peut aussi obtenir une place entre les auteurs Botanistes de cette nation, puisqu'il a donné au public en 1710, trois lettres sur le *Dantia* ; ces lettres ont été imprimées in-4. à Namur, &c sont ornées de 8 figures en cuivre qui passent pour bonnes.

39. M. Nicolas Marchant a publié plusieurs *Mémoires sur la Botanique*, dans le recueil de ceux de

l'Académie, entr'autres sur l'*Hypoxylon*, avec six figures en cuivre qui sont bonnes & parfaites.

40. M. *Nissole* a aussi publié des *Mémoires sur la Botanique*, dans le recueil de ceux de l'Académie des Sciences, avec 9 figures.

41. M. de *Reaumur*, ce grand observateur de la nature, a parcellément publié des *Mémoires sur les plantes*, dans le recueil de l'Académie, entr'autres sur le *Fucus*, le *Nostoch*, &c. il les a fait orner de 13 figures.

42. M. *Antoine de Jussieu*, dont le nom est cher chez les Botanistes François, a donné dans le recueil de l'Académie plusieurs excellens Mémoires de sa composition, entr'autres sur le *Corispermum*, le *Cassé*, &c. Il se trouve dans ces Mémoires 7 figures en cuivre qui sont bonnes & parfaites.

43. M. *Lahire* a encore publié dans le même recueil des Mémoires sur quelques plantes, telles que la *Figue*; le *Drakokéfalous*, avec 2 planches en cuivre bonnes & parfaites.

44. Tout le monde connoît le *Dictionnaire des drogues de Lémery*, dont il y a déjà eu plusieurs éditions, cet ouvrage est in-4. & se trouve orné de 304 figures en cuivre qui sont mauvaises.

45. Le P. *Barrelier*, Jacobin, auparavant médecin de la Faculté de Paris, a laissé à sa mort 1324 planches gravées qui représentent 1392 plantes, qu'il a observées tant en France, qu'en Italie & en Espagne; parmi ces planches les unes sont médiocres & d'autres bonnes; M. Antoine de Jussieu a mis au jour ces planches en 1714, sous le titre de *Plantæ per Galliam, Hispaniam, Italiam*, & sous le format in-fol.

46. Nous sommes redevables au P. *Feuillé*, d'un ouvrage qui a pour titre: *Plantes du Pérou & du Chili*; il y a dans cet ouvrage 146 figures en cuivre qui sont médiocres & bonnes; il a été publié à Paris en 2 volumes in-4. en 1714, & en 3 volumes en 1725.

47. *Garidel* a donné en 1715 in-fol. l'*Histoire des*

plantes de la Provence, avec 100 figures en cuivre qui sont médiocres, & qui représentent 1400 plantes. Cet ouvrage a été imprimé aux frais de l'Hôtel-de-ville d'Aix; l'auteur a cependant eu beaucoup à souffrir de la jalousie de ses compatriotes; je sais par expérience jusqu'où elle se peut porter, pour avoir publié l'Histoire des plantes de la Lorraine; je n'ai pas eu cependant l'avantage de Garidel, aucun Hôtel-de-ville ne s'est chargé de l'impression de mon ouvrage.

48. *M. Danti Disnard* a donné dans le recueil de l'Académie des Sciences, quelques Mémoires de sa composition sur les plantes, avec 10 figures en cuivre qui sont bonnes & parfaites.

49. *Vaillant* est après *Tournefort* un des Botanistes François dont le nom sera à jamais inscrit dans la classe des savans en ce genre d'étude. Nous avons de lui plusieurs mémoires insérés dans ceux de l'Académie; il a publié en outre en 1718, un ouvrage in-4. intitulé: *Structure des fleurs*; il nous a aussi donné le *Botanicon Parisiense*, dont il y a eu une édition en Hollande in-fol. en 1727, avec environ 300 figures en cuivre, qui sont parfaites & incomplètes.

50. *Lafitau* est aussi un auteur François qui a publié un mémoire sur le *Ginsén*, ce mémoire a paru à Paris in-12. en 1718. avec une bonne figure en cuivre.

51. Le P. *Labat* a donné au public en 1722, sous format in-12. un ouvrage de sa composition, intitulé: *Voyage d'Afrique & d'Amérique*, avec 44 figures en cuivre qui passent pour médiocres.

52. *Trant*, auteur François, a donné en 1724, dans le recueil des Mémoires de l'Académie, un *Mémoire sur les plantes*.

53. *Lindern*, auteur Alsacien, a publié à Strasbourg en un volume in-12. année 1728, un ouvrage intitulé: *Tournefortius Alsaticus*, avec 18 figures en cuivre qui passent pour médiocres; il y a eu en 1747 une seconde édition de cet ouvrage.

54. Nous devons à M. Duhamel, membre de l'Académie Royale des Sciences, plusieurs excellens ouvrages sur les plantes ; outre plusieurs mémoires qui se trouvent insérés dans le recueil de l'Académie ; entre les différens ouvrages qu'il a publiés , les principaux sont : 1.^o *La Physique des arbres* , en 2 volumes in-4. avec planches en cuivre : 2.^o *Le Traité des arbres & arbrustes qui peuvent croître en France* , en 2 volumes in-4. avec 250 figures en cuivre & en bois , bonnes & médiocres : 3.^o un *Traité sur la Garance* , in-12 avec une figure en cuivre : 4.^o un *Traité sur les Arbres fruitiers* , en 2 volumes , avec planches en cuivre très-bien exécutées.

55. M. François des Marchais. Cet auteur a publié en 1730, son *Voyage dans la Guinée & la Cayenne* , en 3 vol. in-12. avec deux planches en cuivre qui ne sont que médiocrement bonnes.

56. C'est en 1733 qu'a paru à Paris en 2 vol. in-4. l'*Histoire des drogues de Pomet* , avec 220 figures en cuivre , qui passent pour être mauvaises.

57. M. de la Condamine a publié en 1738 , dans le recueil de l'Académie Royale des Sciences , un *Mémoire sur le Quinquina*.

58. Nous sommes redevables à M. Bernard de Jussieu , de plusieurs Mémoires sur les plantes , qui se trouvent aussi publiés dans l'excellent recueil de l'Académie , tels que ceux sur la *Pillulaire* .le *Plantain* , &c.

59. M. Segnier , secrétaire de l'Académie de Nîmes, a publié deux *Traités* sur la Botanique ; le premier est la *Bibliothèque des auteurs Botaniques* , en un volume in-4. auquel on a joint depuis peu un supplément : le second est la *Liste des plantes de Vérone* , in-12. en trois vol. avec 1200 planches en cuivre qui sont assez bonnes.

60. M. Sauvage , professeur en médecine à Montpellier, mérite à juste titre un rang parmi les auteurs Botanistes François ; il a publié en 1743 , un *Projet*

D'une méthode sur les feuilles, in-4. qu'il a réellement exécuté par un autre ouvrage qui a pour titre : *Méthode sur les feuilles*, & qui a été imprimé à la Haye en 1731, in-8.

61. Les Botanistes ont de grandes obligations à M. Guettard ; après Tournefort & Vaillant, il est un des Botanistes François qui ait fait les plus belles découvertes sur les plantes ; il a découvert leurs glandes, leurs poils, en un mot tous leurs vaisseaux excrétoires ; il a fait part au public de ses découvertes & de plusieurs autres, tant dans ses *Observations sur les plantes d'Estampes*, en 2 vol. in-12. que dans plusieurs Mémoires qui se trouvent insérés dans le recueil de l'Académie Royale des Sciences ; nous avons encore de cet excellent auteur un ouvrage très-intéressant, en 3 vol. in-4. intitulé : *Mémoires pour servir aux sciences & aux arts*, ornés de très belles planches.

62. En 1744, a paru à Paris en 5 vol. in-12. une *Histoire de la Nouvelle France*, ornée de 98 planches en cuivre, qui représentent plusieurs plantes, par Charlesvoix.

63. M. Adanson, de l'Académie Royale des Sciences, s'est fait une réputation dans la Botanique, tant par son excellent *Voyage au Sénégal*, i v. 4. orné de 200 planches, que par ses *Familles des plantes*, in-8. 2 vol. ouvrage à la tête duquel il a placé une préface qui est la vraie histoire de la Botanique & des différens systèmes qui ont paru jusqu'à nos jours ; nous avons encore de cet auteur érudit, différens mémoires insérés dans le recueil de l'Académie.

64. M. Gerard, Provençal, a donné en 1761, un *Flora des plantes de Provence*, in-8. il les a rangés par famille.

65. M. Gouan, professeur de Botanique à Montpellier, a publié deux ouvrages sur la Botanique, en 2 vol. in-8. dont l'un est intitulé : *Flora Monspeliensis*, & l'autre, *Hortus Monspeliensis*.

66. M. Duchesne fils , malgré sa grande jeunesse , a mis au jour deux ouvrages in-12. dont l'un est intitulé : *Manuel de Botanique* , & l'autre , l'*Histoire des Fraises* ; ce dernier ouvrage lui a fait beaucoup d'honneur ; nous en avons donné l'extrait dans ce Dictionnaire à l'article *Fraisier*.

67. M. Barbeau Dubourg a publié dans ces derniers temps 2 volumes in-12. sur les plantes des environs de Paris , qu'il a intitulé : *Botaniste François* , il a puisé la plupart de cet ouvrage dans les ouvrages de Linnæus , qu'il a tâché de rendre à la portée d'un chacun.

68. M. Spielmann , professeur en Botanique à Strasbourg , a fait imprimer in-12. le catalogue des plantes du jardin de cette ville , sous le titre de *Floræ argentoratensis prodromus*.

69. M. l'abbé Rosier a mis au jour en 2 vol. in-8. un ouvrage fort usuel intitulé ; *Démonstrations Botaniques à l'usage des Ecoles vétérinaires* , la plupart des professeurs de Botanique de province s'en servent pour leurs démonstrations.

70. Nous avons oublié de parler dans la liste des auteurs de Botanique de M. l'abbé Collet , qui vivoit du temps de Tournefort. Cet auteur a publié un *Traité sur les plantes des environs de Dijon* , & *Deux Lettres critiques sur les ouvrages de Tournefort*.

71. Mappus , Botaniste Alsacien , mérite bien aussi une place parmi les auteurs Botanistes de la nation ; nous avons de lui en un vol. in-4. l'*Histoire des plantes d'Alsace & des montagnes des Vosges* , ornées de planches en cuivre médiocres.

72. François Marquet , médecin Botaniste du duc Léopold , a laissé pour Œuvres posthumes de Botanique , un *Dictionnaire des plantes de la Lorraine* , en 3 vol. in-fol. forme d'Herbier.

73. Un Anonyme a publié pendant le courant de l'année dernière , un ouvrage in-8. intitulé : *Voyage au mont Pila , dans la province du Lyonnais* , contenant

des observations sur l'histoire naturelle de cette montagne & des lieux circonvoisins , suivies du catalogue raisonné des plantes qui y croissent.

74. Nous avons aussi mis au jour quelques ouvrages de Botanique , & nous espérons encore en publier à la suite ; ceux qui paroissent actuellement sont : 1.^o *Le Traité historique des plantes de la Lorraine* , en 11 vol. petit in 8. orné de 200 planches gravées en taille-douce , chez Fetil , libraire à Paris , rue des Cordeliers.

2.^o *Le Tournefortius Lotharingiæ , ou Catalogue des plantes qui croissent en Lorraine , rangées suivant le système de Tournefort* , 1 vol. petit in-8. chez Durand , libraire , rue S. Jacques , & chez Fetil , rue des Cordeliers.

3.^o *La Médecine rurale & pratique , tirée uniquement des plantes usuelles de la France , appliquées aux différentes maladies qui régnent dans les campagnes , ou Pharmacopée végétale & indigène* , contenant les formules tirées du règne végétal , ensemble l'explication sommaire des vertus de chaque plante , & les définitions symptomatiques des maladies , 1 vol. in-12. chez Delalain , libraire.

4.^o *Lettres sur la méthode de s'enrichir promptement , & de conserver sa santé par la culture des végétaux* , 5 vol. in-8. chez Durand , libraire , rue. S. Jacques.

5.^o *Manuel médical & usuel des plantes , tant exotiques qu'indigènes* , auquel on a joint un catalogue raisonné des plantes , rangées par famille , des observations pratiques sur l'usage qu'on en peut faire dans la plupart des maladies , & différens discours sur la Botanique , 2 vol. in-12. chez Humblot , libraire , rue saint Jacques.

6.^o *Le Dictionnaire raisonné universel des plantes , arbres & arbustes de la France* , contenant la description des végétaux du Royaume , considérées relativement à l'agriculture , au jardinage , aux arts & métiers , à l'économie domestique & champêtre , & à la médecine.

eine des hommes & des animaux, auquel on a joint un *Flora Gallica*, en 4 vol. in-8. Ce Dictionnaire est le présent ouvrage.

7.^e *Manuel alimentaire & usuel des plantes, tant indigènes qu'exotiques, qui peuvent servir d'alimens & de boisson aux différens peuples, avec la méthode de les préparer*, en 1 vol. in-8. chez Costard, libraire, rue S. Jean de Beauvais.

8.^e *Toilette de Flore ou Essai sur les plantes qui peuvent servir d'ornement aux dames, avec la manière de préparer les essences, les pommades, les eaux de senteur, &c.* 1 vol. in-12. chez Valade, libraire, rue S. Jacques.

9.^e *La nature considérée sous ces différens aspects, ou Lettres périodiques sur les animaux, les végétaux & les minéraux*, 1 vol. in-12. le second sous presse, chez Costard, libraire, rue S. Jean de Beauvais.

Suite de plantes gravées tant d'après nature que d'après les meilleurs maîtres, pour servir d'intelligence aux différens ouvrages de Botanique de M. Buchoz, notamment à son Dictionnaire des plantes, arbres & arbustes de la France, chez Durand, libraire, rue S. Jacques, chez Costard, libraire, rue S. Jean de Beauvais, & chez Fetil, libraire, rue des Cordeliers.

Les ouvrages suivans sont prêts à être mis sous presse.

Botanique des artistes.

Dictionnaire de matière médicale des végétaux, à l'usage des hommes & des animaux.

Traité des arbres tant utiles qu'agréables.

Chymie des végétaux.

Manuel des fleurs & plantes champêtres, propres à décorer les parterres.

Traité des plantes d'agriculture & de jardinage.

Traité des plantes qui peuvent servir d'alimens aux différens animaux de la terre.

Histoire générale de tous les végétaux connus, considérée sous tous les aspects possibles.

LISTE DES PROFESSEURS

de Botanique de la France.

P A R I S.	{ M. Le Monnier , professeur.
	{ M. de Jussieu , démonstrateur.
Montpellier.	M. Gouan , démonstrateur.
Toulouse.	M. du Bernard.
Bordeaux.	M. Caster.
Besançon.	M. Rognon.
Nantes.	M. Bonamy.
Angers.	M. Berthélot du Paty.
Caen.	M. Desmoueux.
Rouen.	M. Pinard.
Rheims.	M. Raullin.
Strasbourg.	M. Spielmann.
Nanci.	{ M Bagard , professeur.
	{ M. Fuchoz , ancien démonstrateur.
Lyon.	M. de Tourrette.
Amiens.	M. * * *

JARDINS PUBLICS DE BOTANIQUE.

1.^o Le Jardin royal des plantes de Paris : on y démontre tous les ans environ 3500 espèces ou variétés de plantes.

2.^o Le Jardin de Montpellier : on y cultive environ 7 à 800 plantes.

3.^o Le Jardin de Rouen ; les plantes qui s'y trouvent se portent à près de 600.

4.^o Le Jardin de Caen ; on y démontroit anciennement 1500 plantes , mais le nombre en est beaucoup diminué.

5.^o Le Jardin d'Amiens ; le terrain est immense , il y a beaucoup de plantes , mais ce ne sont que des plantes répétées

6.^o Le Jardin de Strasbourg ; ce jardin est très-bien entretenu ; le nombre des plantes qu'on y cultive se trouve détaillé tout au long dans le *Flora argentoratensis prodromus*.

7.^o Le Jardin de Lyon ; la liste des plantes qu'on y démontre pour l'usage de l'Ecole vétérinaire peut se porter à 5 ou 600.

8.^o Le Jardin de Nanci ; le nombre des plantes s'est porté au commencement de son établissement environ à 1000 , mais actuellement il s'y en trouve au plus 400.

2.^o Le Jardin des Apothicaires de Paris ; on faisoit autrefois des cours publics dans ce jardin , mais en 1769 les médecins de la Faculté ont obtenu arrêt contre les apothicaires, qui leur défend de faire à l'avenir de pareils cours.

JARDINS PARTICULIERS DE BOTANIQUE.

1.^o Le Jardin de Botanique le mieux garni de toute l'Europe est le Jardin royal de Trianon : on y compte plus de 4000 espèces de plantes qui y sont entretenues avec toute la magnificence digne du grand monarque qui en fait le sujet de ses amusemens ; M. Richard en est le jardinier inspecteur , on peut dire qu'il ne néglige rien pour en augmenter journellement la collection.

Le second Jardin particulier qui mérite le plus après le Jardin royal de Trianon , est le Jardin de Mgr le duc de Noailles à S. Germain-en-Laie ; quand on se promène dans les bosquets de cet illustre amateur , on croit être au milieu des forêts de la Caroline & de la Virginie ; c'est le premier seigneur de la France qui a inspiré du goût pour la Botanique.

3.^o On voit encore à S. Germain un Jardin qui mérite à juste titre de porter le nom de Jardin Botanique ; il appartient à M. Trochereau de la Berliere , associé de l'Académie royale de Rouen ; parmi les plantes curieuses qu'on y cultive , on y trouve le *Phytolaca* en arbre : le Sang de dragon , le Jujubier de ferre chaude , le *Kigellaria* mâle & femelle , différentes espèces de *Pittonia* , le *Camara* , le *Cangarata* , le *Malpigia* , le *Benjoin* , le *Bonduc* , le Charme à fruit de houblon , toutes les différentes espèces d'*Azerole* , le *Grewia* , le Laurier de Bourbon , l'*Apanachine* , le *Rhus* à trois feuilles , le *Ptoëica* , le *Magnolia rustica* , l'*Anona* , & quantité d'autres dont l'énumération seroit trop longue.

4.^o On peut mettre au nombre des beaux Jardins de Botanique , sur-tout quant à la partie des arbrisseaux de pleine terre , le Jardin de Malherbe , qui appartient à M. le premier président de la Cour des Aides. Ce curieux possède très-bien la Botanique ; il a été lui-même herboriser dans les montagnes des Pyrénées & dans une partie de l'Espagne.

5.^o Le Jardin de M. le président du Portail au Vaudreuil , sur la route de Rouen , mérite à juste titre de tenir un rang distingué parmi les Jardins de Botanique , surtout pour ce qui concerne les arbrisseaux de pleine terre.

6.^o Nous nous garderons bien de passer sous silence le Jardin

de M. le chevalier de Jansin à Chaillot ; on trouve généralement dans ce Jardin tout ce qui peut exciter la curiosité des amateurs en arbres , arbrustes & arbrisseaux.

7.^o Nous avons encore vu un Jardin de Botanique aux environs de Paris , qui est entretenu avec toute la propreté possible ; il appartient à M. Cochin , ancien échevin de cette capitale , & il est situé au village de Châtillon , on y remarque sur-tout un Saule oriental d'une très-belle hauteur , qui forme lui seul avec ses branches pendantes , une loge d'une grandeur considérable ; M. Cochin est uniquement amateur.

8.^o Le sieur Rouyer , marchand épicier à Paris , possède aussi un petit Jardin de Botanique dans le fauxbourg S. Martin de cette capitale ; cet épicier y fait annuellement des démonstrations du petit nombre de plantes communes qu'il y cultive ; il fait aussi pendant la belle saison toutes les semaines des herborisations en campagne.

9.^o Il y a un jardinier dans le même fauxbourg S. Martin , qui cultive plusieurs plantes étrangères , & même en assez grande quantité ; il en fait commerce. Les amateurs pourront s'adresser à lui , de même qu'au jardinier des apothicaires , lorsqu'ils voudront former des Jardins de Botanique.

10.^o On voit sur la route d'Angers un très-beau Jardin de plantes tant indigènes qu'exotiques , qui appartient à M. le comte de Turin , ancien capitaine de cavalerie au service du roi ; cet amateur y a fait construire des serres chaudes.

11.^o La Lorraine possède un Jardin de Botanique très-intéressant , sur tout en plantes étrangères , il appartient à M. le comte de Custine d'Auxflame , ce Jardin est situé à S. Max , à une demi lieue de Nanci.

12.^o J'ai encore ouï vanter un autre Jardin particulier de Botanique , qui appartient à M. de Lisle , fermier général , mais je ne puis en rendre compte ici , ne l'ayant jamais vu.

HERBIERS.

LES Herbiers les plus connus & les plus considérables en France suivant M. Adanson , sont ceux de M. de Tournefort & de M. Vaillant , déposés l'un & l'autre au Jardin du roi. Le premier renferme 4000 espèces , & le second 9000 , ou 12000 variétés ; le troisième est celui de M. de Jussieu , dont le nombre de plantes se porte à 8000 espèces ; le quatrième appartient à M. Adanson , il renferme aussi 8000 espèces ou 10000 variétés ; le cinquième enfin est celui du docteur Marquet , il contient toutes les plantes de la Lorraine , & se trouve entre les mains de son gendre , auteur de ce Dictionnaire,

L I S T E

LISTE

DES PLANTES

Dont on a expliqué la culture & les propriétés dans ce Dictionnaire.

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. A BRICOTIER. | 24. Amandier. |
| 2. Absynthe. | 25. Amarante. |
| 3. Acacia commun. | 26. Ambrosie. |
| 4. Acanthe. | 27. Ammi. |
| 5. Ache. | 28. Anagyris. |
| 6. Aconit. | 29. Ancholie. |
| 7. Acorus. | 30. Anemone. |
| 8. Adonide. | 31. Angélique. |
| 9. Agaric. | 32. Anis. |
| 10. Agripaulme. | 33. Anthore. |
| 11. Aigremoine. | 34. Arbousier. |
| 12. Ail. | 35. Argentine. |
| 13. Aircelle. | 36. Aristoloche. |
| 14. Alaterne. | 37. Armoise. |
| 15. Alcée. | 38. Arrêre-bœuf. |
| 16. Algue. | 39. Arroche. |
| 17. Aliboufier. | 40. Arrichaut. |
| 18. Alisier. | 41. Asperge. |
| 19. Alleluia. | 42. Asphodele. |
| 20. Alliaire. | 43. Aster. |
| 21. Alpisfe. | 44. Astragale. |
| 22. Alype. | 45. Aubépine. |
| 23. Alysson. | 46. Aubergine. |
| | 47. Aunée. |

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 48. Aune. | 85. Botrys. |
| 49. Avoine. | 86. Boucage. |
| 50. Aurone. | 87. Bouillon Blanc. |
| 51. Azedarach. | 88. Bouleau. |
| 52. Azerolier. | 89. Bourdon. |
| 53. Bacille. | 90. Bourgene. |
| 54. Baguenaudier. | 91. Bourrache. |
| 55. Balaustier. | 92. Bourse à Pasteur. |
| 56. Ballotte. | 93. Boviste. |
| 57. Balsamine. | 94. Boyau de Chat. |
| 58. Barbarée. | 95. Broffière. |
| 59. Barbe de Bouc. | 96. Brunelle. |
| 60. Barbe de Chèvre. | 97. Bruyère. |
| 61. Barbe de Jupiter. | 98. Bugle. |
| 62. Bardane. | 99. Buglosse. |
| 63. Basilic. | 100. Buis. |
| 64. Bassinet. | 101. Buisson ardent. |
| 65. Beccabunga. | 102. Buflerole. |
| 66. Bec de Grue. | 103. Butome. |
| 67. Belladonna. | 104. Cabaret. |
| 68. Belle de nuit. | 105. Caille-lait. |
| 69. Bellevedere. | 106. Calement. |
| 70. Benoitte. | 107. Calcebasle. |
| 71. Berce. | 108. Cameleon blanc. |
| 72. Berle. | 109. Cameline. |
| 73. Bétoine. | 110. Camomille. |
| 74. Betterave. | 111. Campanule. |
| 75. Biénague. | 112. Camphrée. |
| 76. Bistorte. | 113. Canfe. |
| 77. Blattaire. | 114. Canneberge. |
| 78. Bled. | 115. Capillaire. |
| 79. Bled de Turquie. | 116. Caprier. |
| 80. Bled de Vache. | 117. Capucine. |
| 81. Blette. | 118. Cardinale de marais. |
| 82. Bluet. | 119. Cardon. |
| 83. Bois de Sainte Lucie. | 120. Carotte. |
| 84. Bon Henry. | 121. Carroubier. |

122. Carthame.	158. Ciste.
123. Carvi.	159. Citronier.
124. Cassis.	160. Citrouille.
125. Cataire.	161. Cive.
126. Centaurée.	162. Clandestine.
127. Cerfeuil.	163. Clematite.
128. Cerifier.	164. Cnichaut.
129. Ceterach.	165. Coignassier.
130. Chemeras.	166. Colchique.
131. Champignon.	167. Comaret.
132. Chanterelle.	168. Concombre.
133. Chanvre.	169. Condritille.
134. Chapeau d'Evêque.	170. Conserva.
135. Chardons.	171. Confoude.
136. Chardon bénit.	172. Conyse.
137. Chardon commun.	173. Coq.
138. Chardon à foulon.	174. Coquelourde.
139. Chardon hémorrhoi- dal.	175. Coqueret.
140. Chardon marie.	176. Coralline.
141. Chardon nain.	177. Coralloïde.
142. Charme.	178. Coriandre.
143. Chataignier.	179. Corne de Cerf.
144. Chauffe-trappe.	180. Corneille.
145. Chelidoine.	181. Cornouiller.
146. Chêne.	182. Cornuet.
147. Chenille.	183. Coronille.
148. Chervis.	184. Coronope.
149. Chèvre-feuille.	185. Corrigiole.
150. Chichorée.	186. Coucoumelle.
151. Chiendent.	187. Coudrier.
152. Chou.	188. Couleuvrée.
153. Christophoriane.	189. Courge.
154. Ciboule.	190. Couronne impériale.
155. Ciguë.	191. Crapaudine.
156. Cinanchine.	192. Cresson.
157. Circée.	193. Cresson des prés.
	194. Cresson de fontaine.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 195. Cretelle. | 232. Erable. |
| 196. Croisette. | 233. Ers. |
| 197. Cumin sauvage. | 234. Escourgeon. |
| 198. Cupidoune. | 235. Espargoule. |
| 197. Carage. | 236. Esparule. |
| 200. Cuscute. | 237. Eternue traçante. |
| 201. Cymbalaire. | 238. Etique aigrette. |
| 202. Cynoglosse. | 239. Eupatoire. |
| 203. Cypres. | 240. Euphrase. |
| 204. Cycise. | 241. Fausse Lyümachie. |
| 205. Delphinette. | 242. Fenouil. |
| 206. Dentaire. | 243. Fenugrec. |
| 207. Dentelaire. | 244. Fer à Cheval. |
| 208. Dent de lion. | 245. Férule. |
| 209. Digitale. | 246. Fétaque. |
| 210. Dompte-venin. | 247. Fève. |
| 211. Doronic. | 248. Féverole. |
| 212. Double feuille. | 249. Figuier. |
| 213. Douce-amère. | 250. Filaria. |
| 214. Doucette. | 251. Filipendule. |
| 215. Douve. | 252. Filicule. |
| 216. Drave. | 253. Fléchière. |
| 217. Droue. | 254. Flouve. |
| 218. Echalotte. | 255. Fongère. |
| 219. Ecuelle d'eau. | 256. Fraïlier. |
| 220. Egagrophile de mer. | 257. Frêne. |
| 221. Ellebore blanc. | 258. Fritillaire. |
| 222. Ellebore noir. | 259. Froment. |
| 223. Elleborine. | 260. Fucus. |
| 224. Endormie. | 261. Fumane. |
| 225. Epeautre. | 262. Femeterre. |
| 226. Epervière des bois. | 263. Fusain. |
| 227. Epi d'eau. | 264. Fustet des Cottoyeurs. |
| 228. Epinars. | 265. Galeope jaune. |
| 229. Epine jaune. | 266. Garance. |
| 230. Epine vinette. | 267. Genêt. |
| 231. Eponge de mer. | 268. Genièvre. |

T A B L E S.

7

269. Gentiane.	306. Jafione.
270. Germandrée.	307. Jasmin.
271. Gesse.	308. If.
272. Geom.	309. Illécébra.
273. Girandole d'eau.	310. Immortelle.
274. Girouille.	311. Impératoire.
275. Glaycul.	312. Jonc.
276. Globulaire.	313. Jonc marin.
277. Grasette.	314. Jonquille.
278. Gratiolle.	315. Joubarbe.
279. Gratteron.	316. Iris.
280. Gremil.	317. Jujubier.
281. Grenouillette.	318. Julienne.
282. Gioscillier.	319. Jusquiame.
283. Guainier.	320. Ivette.
284. Guêde.	321. Kermès.
285. Guimauve.	322. Laiche.
286. Gui.	323. Laitron.
287. Haricot.	324. Laitue.
288. Helianthème.	325. Lambrusque.
289. Heliotrope.	326. Lamier.
290. Hépatique des jardins.	327. Lampourde.
291. Herbe à cotton.	328. Lampfane.
292. Herbe aux cueilleurs.	329. Larme de Job.
293. Herbe aux panaris.	330. Lavande.
294. Herniole.	331. Laureole.
295. Hêtre.	332. Laurier.
296. Hieracium.	333. Laurier cerise.
297. Houblon.	334. Lautier rose.
298. Houx.	335. Laurier thym.
299. Houx frêlon.	336. Lèche.
300. Hydre cornu.	337. Lemma.
301. Hypociste.	338. Lentibulaire.
302. Hyssope.	339. Lentille.
303. Jacée.	340. Lentille d'eau.
304. Jacinthe.	341. Lentisque.
305. Jacobée.	342. Lichen.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 343. Lichnide. | 380. Melon d'eau. |
| 344. Liège. | 381. Menianthe. |
| 345. Lierre. | 382. Menthe. |
| 346. Lierre terrestre. | 383. Mercuriale. |
| 347. Lilac. | 384. Meum. |
| 348. Limoselle. | 385. Micoconlier. |
| 349. Lin. | 386. Mignardise. |
| 350. Linaire. | 387. Mille feuille. |
| 351. Liseron. | 388. Mille pertuis. |
| 352. Livesche. | 389. Millet. |
| 353. Lonicère. | 390. Minson. |
| 354. Lonkite. | 391. Mniole hygrometre. |
| 355. Lotier. | 392. Moly. |
| 356. Lupin. | 393. Monnoyère. |
| 357. Luzerne. | 394. Morelle. |
| 358. Lycopode. | 395. Morfgeline. |
| 359. Lys. | 396. Morilles. |
| 360. Maceron. | 397. Mors du Diable. |
| 361. Macre. | 398. Moschatelline. |
| 362. Marguerite. | 399. Mouron. |
| 363. Marjolaine. | 400. Mouffe. |
| 364. Marisque. | 401. Moufferon. |
| 365. Marochemin. | 402. Moutarde. |
| 366. Marronier d'Inde. | 403. Mufle de Veau. |
| 367. Marrube aquatique. | 404. Muguet. |
| 368. Martagon. | 405. Mûrier. |
| 369. Marum. | 406. Muscari. |
| 370. Masse d'eau. | 407. Myrthe. |
| 371. Masse au Bedeau. | 408. Narcisse. |
| 372. Massette. | 409. Nard celtique. |
| 373. Matricaire. | 410. Naver. |
| 374. Mauve. | 411. Nayade. |
| 375. Melèze. | 412. Néflier. |
| 376. Melilot. | 413. Nénuphar. |
| 377. Melinet. | 414. Nerprun. |
| 378. Melisse. | 415. Nez coupé. |
| 379. Melon. | 416. Nid d'oiseau. |

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 417. Nielle. | 454. Patience. |
| 418. Nombril de Venus. | 455. Patte de lièvre. |
| 419. Noctoch. | 456. Patte d'oie. |
| 420. Noyer. | 457. Pavot. |
| 421. Nummulaire. | 458. Pêcher. |
| 422. Obier. | 459. Pédiculaire. |
| 423. Ocre. | 460. Peigne de Venus. |
| 424. Œil de Bœuf. | 461. Pensée. |
| 425. Œillet. | 462. Perce-feuille. |
| 426. Œnanthe. | 463. Perce-mouffe. |
| 427. Oignon. | 464. Perce-neige. |
| 428. Olivier. | 465. Perticaire. |
| 429. Ophioglosse. | 466. Persil. |
| 430. Ophrise. | 467. Pervenche. |
| 431. Oranger. | 468. Peise d'eau. |
| 432. Oreille de souris. | 469. Petasite. |
| 433. Oreille d'ours. | 470. Peucedane. |
| 434. Orge. | 471. Peuplier. |
| 435. Origan. | 472. Pigamon. |
| 436. Orme. | 473. Piloselle. |
| 437. Ornithogalle. | 474. Phalangère. |
| 438. Orobanche. | 475. Phlomis. |
| 439. Orobe. | 476. Pied de chat. |
| 440. Oranger. | 477. Pied de cheval. |
| 441. Orpin. | 478. Pied de lion. |
| 442. Ortie. | 479. Pied d'oiseau. |
| 443. Orvale. | 480. Pied de veau. |
| 444. Oseille. | 481. Pieride épineuse. |
| 445. Osier. | 482. Pimprenelle. |
| 446. Paliure. | 483. Pin. |
| 447. Panais. | 484. Pistachier. |
| 448. Panicaut. | 485. Pivoine. |
| 449. Panis. | 486. Pioulade. |
| 450. Pariétaire. | 487. Plantain. |
| 451. Parnassia. | 488. Platane. |
| 452. Passerage. | 489. Plicaire. |
| 453. Patate. | 490. Plume d'eau. |

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 491. Poherbe. | 528. Reine des prés. |
| 492. Poireau. | 529. Renoncule. |
| 493. Poirée. | 530. Renouée. |
| 494. Poirier. | 531. Reseda. |
| 495. Pois. | 532. Rhue. |
| 496. Pois chiche. | 533. Ricin. |
| 497. Poivre d'Inde. | 534. Riz. |
| 498. Polypode. | 535. Romarin. |
| 499. Polygale. | 536. Ronce. |
| 500. Polytric. | 537. Roquette. |
| 501. Pomme d'amour. | 538. Roquette de mer. |
| 502. Pomme de merveille. | 539. Rosier. |
| 503. Pommier. | 540. Roseau. |
| 504. Populago. | 541. Rosolis. |
| 505. Pouliot. | 542. Roulette. |
| 506. Pourpier. | 543. Rubéole. |
| 507. Pourpier de mer. | 544. Sabine. |
| 508. Prêle. | 545. Safran. |
| 509. Primevère. | 546. Sainfoin. |
| 510. Prunier. | 547. Salade de porc. |
| 511. Ptarmique. | 548. Salicaire. |
| 512. Pulicaire. | 549. Salicor. |
| 513. Pulmonaire. | 550. Salsifis. |
| 514. Putier. | 551. Sanicle. |
| 515. Pyrole. | 552. Santoline. |
| 516. Queue de souris. | 553. Sapin. |
| 517. Quintefeuille. | 554. Sarrafin. |
| 518. Radix. | 555. Sarrerte. |
| 519. Raifort. | 556. Sarriette. |
| 520. Raigrass. | 557. Satyrion. |
| 521. Raisin de mer. | 558. Sauge. |
| 522. Raisin de renard. | 559. Saule. |
| 523. Rapette. | 560. Sauve-vie. |
| 524. Rapistre. | 561. Saxifrage. |
| 525. Rapontic. | 562. Scabieuse. |
| 526. Rave. | 563. Scammonée de Mont- |
| 527. Régliſſe. | pellier. |

564. Sceau de Notre-Dame.
 565. Sceau de Salomon.
 566. Schenanche.
 567. Scille d'automne.
 568. Scirpe.
 569. Scolopendre.
 570. Scorfonère.
 571. Scrophulaire.
 572. Seigle.
 573. Seneçon.
 574. Serpolet.
 575. Sefeli de montagnes.
 576. Sherard.
 577. Sifon.
 578. Smilax.
 579. Solanum.
 580. Soldanelle.
 581. Sorbier.
 582. Sorbier des oiseleurs.
 583. Soucy.
 584. Soude.
 585. Soulier de Notre-Dame.
 586. Sphaigne.
 587. Stachique.
 588. Staphisaigre.
 589. Stréchas arabe.
 590. Statice.
 591. Stellaire graminée.
 592. Sumac.
 593. Sureau.
 594. Sylvie.
 595. Syringa.
 596. Tabac.
 597. Taliëtron des boutiques.
 598. Tamarisc.
 599. Tanaisie.
 600. Terre grièpe.
 601. Terre noire.
 602. Thalspie.
 603. Thym.
 604. Tillcul.
 605. Thlaspi.
 606. Tithymale.
 607. Toque.
 608. Tormentille.
 609. Tourrette.
 610. Toute saine.
 611. Tréfle.
 612. Tremble.
 613. Tribule terrestre.
 614. Trique-madame.
 615. Troëne.
 616. Truffe.
 617. Tubéreuse.
 618. Tulipe.
 619. Tuililage.
 620. Vaciet.
 621. Valeriane.
 622. Velar.
 623. Velvotte.
 624. Verge d'or.
 625. Véronique.
 626. Verveine.
 627. Vesce.
 628. Vesceron.
 629. Vigne.
 630. Violette.
 631. Violon.
 632. Violier.
 633. Vipérine.
 634. Usnée.

635. Vulnéraire.

639. Yeble.

636. Vulvaire.

640. Yeuse.

637. Xerantheme.

641. Zenigole.

638. Xilolsteon.

T A B L E

*Des noms synonymes des Plantes dont il est
parlé dans ce Dictionnaire.*

A.

ABIES, voyez Sapin.

Abticorée, voyez Pêcher.

Abrotanum, voyez Aurone.

Abſin menue, voyez Absynthe.

Abſyntha, voyez Absynthe.

Abſynthium, voyez Absynthe.

Acacia des jardins, voyez Acacia commun.

Acacia noſtras, voyez Prunier.

Acanthus, voyez Acanthe.

Acer, voyez Erable.

Acetofa, voyez Oseille.

Ache d'eau, voyez Berle.

Ache de montagnes, voyez Berle.

Achillæa, voyez Millefeuille, Ptarmique.

Aconitum, voyez Aconit, Anthore.

Acornier, voyez Cornouiller.

Adæa, voyez Christophoriana.

Adam, voyez Pommier.

Adiantum, voyez Capillaire, Polytric.

Admirable, voyez Pêcher.

Admirable jaune, voyez Pêcher.

Adonide, voyez Renoncule.

Adonis, voyez Adonide.

Adonis , voyez Adonide.

Adoxa , voyez Moschatelline.

Agaricus , voyez Champignon , Chanterelle , Agaric ,
Coucoulle , Oronge , Moufferon , Pivoulade.

Agarres , voyez Kermès.

Ageratum , voyez Ptarmique.

Aglaudeau , voyez Olivier.

Agouen , voyez Arrête-bœuf.

Agoure de Lin , voyez Cuscute.

Agrana , voyez Prunier.

Agretto faouivage , voyez Oseille.

Agrimonia , voyez Aigremoine.

Agron , voyez Houx.

Agrostis , voyez Eternue traçante.

Agrostoma , voyez Lychnide.

Agruncles , voyez Prunier.

Aiglantine , voyez Ancholic.

Aigrette , voyez Oseille.

Aiguille , voyez Peigne de Venus.

Ajonc ; voyez Jonc marin.

Aira , voyez Canfe.

Alaternus , voyez Alaterne.

Alcea , voyez Alcée , Bourdon.

Alchimilla , voyez Pied de lion.

Alcyonum , voyez Egagrophille.

Alga , voyez Conferva.

Aligoufier , voyez Aliboufier.

Alkekenge , voyez Coqueret.

Alkekengi , voyez Coqueret.

Allium , voyez Ail , Échalotte , Moly , Porreau.

Alnus , voyez Aulne.

Alouche de Bourgogne , voyez Alifier.

Alouette blanche , voyez Pommier.

Alouette rousse , voyez Pommier.

Alfine , voyez Espergoule , Morfgeline.

Alfine , voyez Morfgeline.

Althæa , voyez Guimauve.

Alviez, voyez Pin.

Alypum, voyez Alype.

Alysie de montagnes, voyez Alysson.

Amadouvier, voyez Agaric.

Amaranthus, voyez Amaranthe, Blette.

Amarl, voyez Bois de Sainte Lucie.

Ambicoutier, voyez Abricotier.

Amboise, voyez Poirier.

Ambrette, voyez Pommier, Poirier.

Ambrette sauvage, voyez Jacée.

Ambrosia, voyez Ambrosie.

Amérolie, voyez Patte d'oie.

Amelou, voyez Olivier.

Amer mouffe, voyez Pommier.

Ammi, voyez Ammi.

Amome, voyez Sison.

Ampoulon, voyez Olivier.

Amygdalus, voyez Amandier.

Anacampteros, voyez Orpin.

Anagallis, voyez Mouron.

Anagyris, voyez Anagyris.

Anchericum, voyez Phalangère.

Anchusa, voyez Buglosse.

Andropogon, voyez Brosfière.

Androsæmum, voyez Toute-saine.

Androsæmum, voyez Toute-saine.

Anemone, voyez Anemone, Sylvie.

Anemone, voyez Hépatique.

Anethum, voyez Fenouil.

Angelica, voyez Angélique, Livêche.

Angélique, voyez Poirier.

Anguria, voyez Melon d'eau, Pastèque.

Anis doux, voyez Fenouil.

Anois, voyez Aulne.

Anonis, voyez Arrête-bœuf.

Anteaugros, voyez Pommier.

Anthemis, voyez Œil de bœuf.

- Anthyllis* , voyez Barbe de Jupiter , Vulnéraire.
Anthroxanthum , voyez Flouve.
Antirrhinum , voyez Cymbalaire , Muffe de veau.
Aparine , voyez Gratteron , Sherard.
Aparinette , voyez Rubéole.
Apis , voyez Pommier.
Apium , voyez Ache , Anis , Persil.
Appetit , voyez Cive.
Aquifolium , voyez Houx.
Arbre de Paradis , voyez Olivier.
Arbre de Judée , voyez Gainier.
Arbre de sagesse , voyez Bouleau.
Arbrisseau terrible , voyez Alype.
Arbutus , voyez Arbousier , Bussierole.
Arcemisa , voyez Armoise.
Archangélique , voyez Angélique , Lamier.
Archiduc d'été , voyez Poirier.
Arctium , voyez Bardane.
Argielas , voyez Jonc marin.
Arjals , voyez Jonc marin.
Aristolochia , voyez Aristoloche.
Armeniaca , voyez Abricotier.
Arnica , voyez Doronic.
Arroche , voyez Patte d'oie.
Arroche puant , voyez Vulvaire.
Artemisa , voyez Armoise.
Artemisia , voyez Absynthe , Armoise , Aurone.
Artichaut sauvage , voyez Chardon-marie , Jonc marin.
Arum , voyez Pied de veau.
Arum , voyez Pied de veau.
Arundo , voyez Roseau.
Asclepias , voyez Dompsevenin.
Ascyrum , voyez Millepertuis.
Asparagus , voyez Asperge.
Asperugo , voyez Rapette.
Asperula , voyez Cinanchine , Rubéole.
Asperule , voyez Rubéole.

- Asphodelus* , voyez Asphodèle.
Aspic , voyez Lavande.
Asplenium , voyez Capillaire , Ceterach , Scolopendre.
Aster , voyez Aulnée , Conyse.
Astragalus , voyez Astragale , Sainfoin.
Atriplex , voyez Arroche , Pourpier de mer , Vulvaire.
Atropa , voyez Belladonna.
Aubepin , voyez Aubepine.
Aubervilliers , voyez Laitue.
Aubifoin , voyez Bluet.
Auboors , voyez Cytise.
Avelinier , voyez Coudrier.
Avena , voyez Avoine.
Averno , voyez Aulne.
Auguo , voyez Algue.
Aunet , voyez Aulne.
Aune noir , voyez Bourgene.
Avoine , voyez Pommier.
Avou , voyez Kermès.
Aureillette , voyez Petite Chelidoine.
Auricula Judæ , voyez Sureau.
Auricula ursi , voyez Oreille d'ours.
Aurore , voyez Renoncule.
Azarum , voyez Cabaret.
Azedarach , voyez Azedarach.

B.

- B**ACINET , voyez Renoncule.
Baguenaudier des jardins , voyez Coronille.
Baguenaudier d'hiver , voyez Percencige.
Bagnolet , voyez Laitue.
Ballote , voyez Ballote.
Balsamina , voyez Balfamine.
Bapaume , voyez Laitue.
Barba caprina , voyez Barbe de Chèvre.
Barba jovis , voyez Barbe de Jupiter.

- Barbeau , voyez Bluet.
 Barbe de lin , voyez Cuscute.
 Barbe de moine , voyez Cuscute.
 Barbe sur aube , voyez Vigne.
 Barbouquine , voyez Barbe de Bouc.
 Batavia , voyez Laitoc.
 Blâton d'or , voyez Violier.
 Baume , voyez Menthe.
 Becabongue , voyez Beccabunga.
 Bec de Cicogne , voyez Bec de Grue.
 Bec de Lièvre , voyez Perce-feuille.
 Bec d'Oie , voyez Argentine.
 Beden , voyez Pommier.
 Behen blanc , voyez Lychnade.
Belladonna , voyez Belladonna , Solanum.
 Belladonna , voyez Solanum.
 Belle à voir , voyez Bellevedere.
 Belledame , voyez Belladonna & Arroche.
 Bellefille , voyez Pommier.
 Bellegarde , voyez Pêcher.
Bellis , voyez Marguerite.
 Bellissime , voyez Poirier.
 Berberis , voyez Epine vinette.
 Bergamotte d'automne , voyez Poirier.
 Bergamotte d'été , voyez Poirier.
 Bergamotte d'Hollande , voyez Poirier.
 Bergamotte de Pâques , voyez Poirier.
 Bergamotte Suisse , voyez Poirier.
 Besançon , voyez Renoncule.
 Besi de Cassel , voyez Poirier.
 Besi de Chaumontel , voyez Poirier.
Beta , voyez Poirée.
Beta rubra , voyez Betterave.
 Bete , voyez Poirée.
Betonica , voyez Bétoine , Crapaudine.
Betula , voyez Aulne , Bouleau.
 Beurré gris , voyez Poirier.

- Beurré rouge , voyez Poirier.
Beurré verd , voyez Poirier.
Bidens , voyez Cornuet.
Bidens , voyez Cornuet.
Bigarreautier , voyez Cerisier.
Bipinelle , voyez Pimprenelle.
Bisforta , voyez Bistorte.
Blagny , voyez Pommier.
Blanc , voyez Pommier.
Blanc d'eau , voyez Nénuphar.
Blanc doré , voyez Pommier.
Blanc d'Hollande , voyez Peuplier.
Blanchette , voyez Doucette.
Blanc molet , voyez Pommier.
Blanquette à longues queues , voyez Poirier.
Blanquette musquée , voyez Poirier.
Blattaria , voyez Blattaire.
Blaverole , voyez Bluet.
Bled de renard , voyez Bled de vache.
Bled de Smyrne , voyez Froment.
Bled noir , voyez Bled de vache , Sarrafin.
Blittum , voyez Blette.
Bluet , voyez Airelle.
Bois à Capelan , voyez Fusain.
Bois à faire des lardoires , voyez Fusain.
Bois bénit , voyez Buis.
Bois blanc , voyez Bouleau , Peuplier.
Bois de Sainte Lucie , voyez Cerisier.
Bois franc , voyez Houx.
Bois gentil , voyez Laureole.
Bois puant , voyez Anagyris.
Boletus , voyez Champignon , Morille.
Bon Chrétien d'Espagne , voyez Poirier.
Bon Chrétien d'été , voyez Poirier.
Bon Chrétien d'hiver , voyez Poirier.
Bon Henry , voyez Patte d'oie.
Bon homme , voyez Bouillon blanc.

- Bonne dame , voyez Arroche.
 Bonnet de prêtre , voyez Fusain.
 Bonnette , voyez Brunelle.
 Bonvalet , voyez Pommier.
Borrage , voyez Bourrache.
 Bos vol , voyez Renoncule.
Botrys , voyez Botrys.
 Botrys , voyez Patte d'oie.
 Bouillard , voyez Aulne , Bouleau.
 Bouillon noir , voyez Bouillon blanc.
 Bouillon sauvage , voyez Phlomis.
 Boulette , voyez Globulaire.
 Bouquetine , voyez Boucage.
 Bourcette , voyez Doucette.
 Bourdaine , voyez Bourgène.
 Bourdelois , voyez Vigne.
 Bourdieu , voyez Pêcher.
 Bourdon musqué , voyez Poirier.
 Bourg-épine , voyez Nerprun.
 Bourguignons , voyez Vigne.
 Bourroche , voyez Bourrache.
 Boursette , voyez Bourse à Pasteur.
 Bouteille , voyez Olivier.
 Bouton d'argent , voyez Ptarmique , Renoncule.
 Bouton noir , voyez Belladonna.
 Bouton d'or , voyez Bassinet , Renoncule.
 Branche urtine , voyez Acanthe , Berce.
 Brande , voyez Bruyère.
 Brançlis , voyez Sorbier des oiseleurs.
Brassica , voyez Chou , Roquette.
 Brignole , voyez Prunier.
 Brimbelle , voyez Airelle.
Bromos , voyez Drone.
Brunella , voyez Brunelle.
 Brunette , voyez Brunelle.
 Brusque , voyez Jong marin.
 Bryone , voyez Couleuvrée.

Bryonia, voyez Couleuvrée.

Bryovino, voyez Couleuvrée.

Büdeni, voyez Poirier.

Buglossum, voyez Buglosse.

Bugrande, voyez Arrête-bœuf.

Bugrane, voyez Arrête-bœuf.

Bugrave, voyez Arrête-bœuf.

Bugula, voyez Bugle.

Bulbocastanum, voyez Terre-noix.

Banias, voyez Roquette, Massé au Bedeau.

Bunium, voyez Terre-noix.

Buphtalmum, voyez Œil de bœuf.

Bupleurum, voyez Percefeuille.

Bursa pastoris, voyez Bourse à Pasteur.

Butomus, voyez Butome.

Buxus, voyez Buis.

C.

CACALIA, voyez Pied de cheval.

Cade, voyez Genièvre.

Cageralle, voyez Mercuriale.

Caillebotte, voyez Obier.

Cakile, voyez Roquette de mer.

Calamandrier, voyez Germandrée.

Calamintha, voyez Lierre terrestre, Calament.

Calamus aromaticus, voyez Acorns.

Calceolus marianus, voyez Soulier de Notre-Dame.

Calebasse, voyez Courges.

Calendula, voyez Soucy.

Caltha, voyez Populago, Soucy.

Calville d'automne, voyez Pommier.

Calville d'été, voyez Pommier.

Cambé, voyez Chanvre.

Cameline, voyez Alysson.

Camomille, voyez Cameline.

Camomille romaine, voyez Camomille.

Campane, voyez Perce-neige.

- Campanette* , voyez *Liseron*.
Campanula , voyez *Campanule*.
Camphorasma , voyez *Camphrée*.
Camphorata , voyez *Camphrée*.
Cana , voyez *Roseau*.
Canailée , voyez *Lentille d'eau*.
Cannabis , voyez *Chanvre*.
Canne , voyez *Roseau*.
Caoulet , voyez *Chou*.
Capelets , voyez *Pallure*.
Capiton , voyez *Fraisiert*.
Capparis , voyez *Caprier*.
Caprifolium , voyez *Chèvrefeuille*.
Capriole , voyez *Coronope*.
Capsicum , voyez *Poivre de Guinée*.
Caratonia , voyez *Carroubier*.
Cardamina , voyez *Cresson des prés*.
Cardaminum , voyez *Capucine*.
Cardiaca , voyez *Agripaulme*.
Cardière , voyez *Chardon à foulon*.
Cardouffes , voyez *Epine-vinette*.
Cardus , voyez *Cnichaut* , *Chardon commun* , *Chatardon marie* , *Chardon nain* , *Chausse-trappe*.
Cardus Benedictus , voyez *Chardon bénit*.
Cardus vinearum , voyez *Chardon hémorrhoidal*.
Carex , voyez *Laiche*.
Carlina , voyez *Chardon marie* , *Carline*.
Carline , voyez *Cameleon blanc*.
Carouge , voyez *Caroubier*.
Carpendu , voyez *Pommier*.
Carpinus , voyez *Charme*.
Carthamus , voyez *Carthame*.
Carvi , voyez *Carvi*.
Caryophyllata , voyez *Benoitte*.
Caryophyllus , voyez *Œillet* , *Stellaire graminée*.
Casse-lunette , voyez *Bluet*.
Cassepierre , voyez *Pariétaire*.

- Casseter de Poitevin , voyez Cassis.
Cassolette , voyez Julienne , Poirier.
Cassida , voyez Toque.
Castanea , voyez Châtaignier , Maronier d'Inde.
Catananfe , voyez Cupidonne.
Catapuce , voyez Tithymale.
Cataria , voyez Catairc.
Caucalis , voyez Girouille.
Caulecebus , voyez Chou.
Caule flori , voyez Chou.
Cauquerot , voyez Pied de veau.
Célery , voyez Ache.
Céléstine , voyez Chichorée.
Celsifi commun , voyez Salsifis.
Celtis , voyez Micocoulier.
Centaurea , voyez Chardon bénit , Jacée.
Centaurée bleue , voyez Toque.
Centinode , voyez Renouée.
Cepa , voyez Ciboule , Echalotte , Oignon.
Cepula , voyez Cive.
Ceraſtium , voyez Oreille de souris.
Ceraſus , voyez Cerifier , Bois de Sainte Lucie , Putiet.
Ceratophyllum , voyez Hydre cornu.
Cerifier des Alpes , voyez Cerifier.
Cerifier à grappes , voyez Putiet.
Cerinthe , voyez Melinet.
Cernillet , voyez Lychnide.
Cerre , voyez Geſſe.
Cervis , voyez Guainier.
Chamaeceraſus , voyez Lonicère.
Chamaedrys . voyez Germandrée , Marum.
Chamaemelum , voyez Camomille.
Chamaenerion , voyez Fauſſe Lyſimachie.
Chamaepytiſis , voyez Yvette.
Chanceret , voyez Chanvre.
Chanvre ſauvage , voyez Cornuet.
Chaquene , voyez Prêle.

Chara , voyez Girandole d'eau.

Chardon à bonnetier , voyez Chardon à foulon.

Chardon à carder , voyez Chardon à foulon.

Chardon aux ânes , voyez Chardon hémorrhoidal.

Chardon à cent têtes , voyez Panicaut.

Chardon argenté , voyez Chardon marie.

Chardon blanc , voyez Chardon marie.

Chardon des vignes , voyez Chardon hémorrhoidal.

Chardon étoilé , voyez Chauffe-trappe.

Chardon laité , voyez Chardon marie.

Chardon lochar , voyez Chardon marie.

Chardon Notre-Dame , voyez Chardon marie.

Chardon Roland , voyez Panicaut.

Chardon Roullaur , voyez Panicaut.

Charmille , voyez Charme.

Chasse-boffe , voyez Corneille.

Chasselas , voyez Vigne.

Chasselas noir , voyez Vigne.

Chasse-puce , voyez Conyse.

Châtaigne d'eau , voyez Maere.

Châtaigne de terre , voyez Terre-noix.

Chaupoinr , voyez Arrêrè-bœuf.

Cheiranthus , voyez Violier.

Chelidonium , voyez Chelidoine , Bon Henty , Grande
Chelidoine , Pavor.

Chenopodium , voyez Bellevedère , Vulvaire , Patte
d'oie.

Chêne verd , voyez Yeuse.

Chevaler , voyez Pied de veau.

Chevalot , voyez Bluet.

Cheval Bayard , voyez Pied de veau.

Chèvrefeuille , voyez Lonicère.

Chevreuse hâtive , voyez Pêcher.

Chevreuse tardive , voyez Pêcher.

Chichoracée , voyez Epervière de bois , Hieracium.

Chichorée bâtarde , voyez Cupidonne.

Chichorium , voyez Chichorée.

- Chiendent du Parnasse, *voyez Parnassia*.
 Chiendent, *voyez Raigrass*.
 Chironis, *voyez Chervis*.
 Chondrille, *voyez Condrille*.
 Chou à la serpente, *voyez Pied de veau*.
 Chou de mer, *voyez Soldanelle*.
 Chou de Milan, *voyez Chou*.
 Chou-fleur, *voyez Chou*.
 Chou marin, *voyez Soldanelle*.
 Chou nouet, *voyez Chou*.
 Chou rave, *voyez Chou*.
Chrysanthemum, *voyez Marguerite*.
 Chuquette, *voyez Doucette*.
 Churle, *voyez Terre-noix*.
 Ciboule, *voyez Oignon*.
 Ciboule de S. Jacques, *voyez Ciboule*.
Cicer, *voyez Pois chiche*.
Cicuta, *voyez Ciguë*.
Cinara, *voyez Antichant*.
Circæa, *voyez Circée*.
 Cioutas, *voyez Vigne*.
Cirsium, *voyez Chardon, Cnichaut*.
 Ciste bas, *voyez Helianthème*.
Cistus, *voyez Ciste, Fumane, Hélianthème*.
Citreum, *voyez Citronier*.
 Citronnelle, *voyez Melisse*.
Citrus, *voyez Citronier, Oranger*.
 Clairiette, *voyez Doucette*.
Clandestina, *voyez Clandestine*.
 Clanc, *voyez Erable*.
Clavaria, *voyez Barbe de Chèvre*.
 Claujol grand, *voyez Pied de veau*.
Clematitis, *voyez Clematite*.
Clematis, *voyez Clematite*.
Clinopodium, *voyez Roulette*.
 Cloche, *voyez Campanule*.
 Cloche blanche, *voyez Perce-neige*.

- Clochette* , voyez Campanule.
Clochente , voyez Pommier.
Cnicus , voyez Chardon bénit , Cnichaut.
Cocasse , voyez Laitue.
Coccimelea , voyez Prunier.
Cochêne , voyez Sorbier des oiseleurs.
Cochlearia , voyez Herbe aux cuillers.
Cœuret , voyez Cerisier.
Colchicum , voyez Colchique.
Colefa , voyez Chou.
Colmar , voyez Poirier.
Colombine , voyez Ancholie.
Colsa , voyez Chou.
Colutea , voyez Baguenaudier.
Comarum , voyez Comaret.
Confanon , voyez Pavot.
Conserva , voyez Egagrophille , Algue.
Conium , voyez Ciguë.
Consire moyenne , voyez Bugle.
Consoude moyenne , voyez Bugle.
Consoude royale , voyez Delphinette.
Contrescu , voyez Pied de veau.
Convallaria , voyez Sceau de Salomon , Muguet.
Convolyulus , voyez Liseron , Soldanelle.
Conysa , voyez Conysle.
Coquelicot , voyez Pavot.
Coque , voyez Pavot.
Coq des jardins . voyez Coq.
Coquelourde des jardiniers , voyez Lychnide.
Coquerette , voyez Coqueret.
Coqueret jaune , voyez Sylvie.
Coquille , voyez Laitue.
Coralloïde à calice , voyez Lichen.
Coralloides , voyez Lichen , Barbe de Chèvre.
Corail rouge , voyez Poire de Guinée.
Cordiale , voyez Agripaume.
Cordeliète , voyez Figuier.

- Coriandrum*, voyez Coriandre.
Coridale, voyez Fumeretierre.
Corinthe, voyez Vigne.
Cormeau, voyez Olivier.
Cormier, voyez Sorbier.
Cormier des chaisseurs, voyez Sorbier des oiseleurs.
Corner, voyez Pied de veau.
Cornier, voyez Cornouiller.
Cornus, voyez Cornouiller.
Corona imperialis, voyez Couronne impériale.
Coronilla, voyez Coronille.
Coronopus, voyez Corne de cerf.
Corrigiola, voyez Corrigiole.
Corrigiole, voyez Renouée.
Corylus, voyez Coudrier.
Coste, voyez Pommier.
Cotinus, voyez Fustet.
Cotyledon, voyez Nombril de Vénus.
Coucoubré d'asé, voyez Concombre.
Coucoureumassio, voyez Concombre.
Coudoukier, voyez Coignassier.
Couleuvrée noire, voyez Sceau de Notre-Dame.
Coumene, voyez Marrube aquatique.
Courge, voyez Calabasse.
Courgeolo, voyez Liseton.
Coussinet de marais, voyez Canneberge.
Coussinotte, voyez Pommier.
Crambé, voyez Chou.
Cramoisie, voyez Renoncule.
Crataegus, voyez Azerolier, Aubepine, Alisier.
Crêpe, voyez Laitue.
Cresson alenois, voyez Cresson.
Cresson des Indes, voyez Capucine.
Cresson du Pérou, voyez Capucine.
Crête de coq, voyez Pédiculaire.
Crista galli, voyez Pédiculaire.
Criste marine, voyez Bacile.

- Crithmum* , voyez Bacile.
Crocus , voyez Safran.
Croïſce , voyez Croïſette.
Cruciata , voyez Croïſette.
Cucumis , voyez Concombre , Melon , Melon d'eau ,
 Paſteque.
Cucumis afininus , voyez Concombre.
Cucurbita , voyez Calebaſſe , Citrouille , Courges.
Cuiſſe madame , voyez Poirier.
Cuminoides , voyez Cumin.
Cuminum , voyez Cumin.
Cumin des prés , voyez Catvi.
Cuou de muelo , voyez Figuier.
Cupreſſus , voyez Cyprès.
Cuſcuta , voyez Cuſcute.
Cuve de Vénus , voyez Chardon à Foulon,
Cyanus , voyez Bluet.
Cydonia , voyez Coignaffier.
Cynanchinum Monſpeliacum , voyez Scammonée de
 Montpellier.
Cynogloſſum , voyez Cynogloſſe.
Cynofurus , voyez Cretelle.
Cyperus , voyez Mariſque.
Cytifus , voyez Cytiſe.
Cyriſo geniſta , voyez Geneſt.

D.

- D**AMASGHII ſpecies , voyez Soulier de Notre Dame.
 Dame d'onze heures , voyez Ornithogalle.
 Damas gtis , vſyez Prunier.
 Damas noir , voyez Prunier.
 Damette , voyez Satyrion.
 Daphne , voyez Laureole.
 Datura , voyez Endormie.
 Daucus , voyez Biſnague , Carotte.
 Dauphine , voyez Laitue.

Dei toueros , voyez Helianthème.

Delphinium , voyez Delphinette , Staphisaigre.

Dens leonis , voyez Dent de lion , Piloselle.

Dentaria , voyez Dentaire.

Distamne blanc , voyez Frasinelle.

Digitalis , voyez Digitale , Gratiolle.

Dipsacus , voyez Chardon à Foulon.

Donicera , voyez Xilosteon.

Doronicum , voyez Doronic.

Double Damas , voyez Prunier.

Donce-amère , voyez Solanum.

Double de Troie , voyez Pêcher.

Doux évêque , voyez Pommier.

Donx neret , voyez Pommier.

Doux reté , voyez Pommier.

Doyenné , voyez Poirier.

Draba , voyez Drave , Cardinale de marais.

Dracunculus , voyez Prarmique.

Drap d'or , voyez Renoncule.

Dreuche , voyez Laiche.

Dreuillier , voyez Alifier.

Drosera , voyez Rosfolis.

Drullier , voyez Alifier.

Durcher , voyez Cerisier.

Dur naveau , voyez Paliure.

E.

EBBNE de Crète , voyez Barbe de Jupiter.

Ebénier des Alpes , voyez Cytise.

Ecarlate , voyez Pommier.

Echium , voyez Vipérine.

Eclaire , voyez Chelidoine.

Eclairiette , voyez Petite Chélidoine.

Elæagnus , voyez Olivier.

Elychrysium , voyez Immortelle.

Emerus , voyez Coronille.

Emerus , voyez Coronille.

Enula campana , voyez Aunée.

Eperon de chevalier , voyez Delphinette.

Ephedra , voyez Raisin de mer.

Epicé , voyez Pommier.

Epicia , voyez Sapin.

Epi fleuri , voyez Stachique.

Epilobium , voyez Fausse Lyfimachie.

Epimedium , voyez Chapeau d'évêque.

Epinars sauvage , voyez Bon Henry.

Epine blanche , voyez Aubepine.

Epine blanche sauvage , voyez Chardon commun.

Epurge , voyez Tithymale.

Equiculé , voyez Pommier.

Equisetum , voyez Pesse d'eau, Girandole d'eau, Hydre cornu.

Erica , voyez Bruyère.

Eruca , voyez Roquette.

Errum , voyez Ers, Lentille.

Erucago , voyez Masse au bedeau.

Eryngium , voyez Panicaut.

Erysimo similis , voyez Tourette.

Erysimum , voyez Alliaire, Barbarée, Velar.

Escudes , voyez Nombril de Vénus.

Escuelles communes , voyez Nombril de Vénus.

Espargoutte , voyez Matricaire.

Esparute , voyez Sainfoin.

Espic , voyez Lavande.

Esquo , voyez Agaric.

Esula , voyez Tithymale.

Eupatoire d'Avicenne , voyez Eupatoire.

Eupatoire d'eau , voyez Cornuet.

Eupatoire femelle , voyez Cornuet.

Eupatoire des Grecs , voyez Aigremoine.

Eupatoire de Mesué , voyez Ptarmique.

Eupatorium , voyez Eupatoire.

Euphorbia , voyez Tithymale.

Euphrasia , voyez Euphrase.

Evonymus , voyez Fusain.

F.

F *ABA* , voyez Féve , Féverolle.

Fagopyrum , voyez Sarrafin.

Fagus , voyez Hêtre.

Falabriguier , voyez Micoconlier.

Fau , voyez Hêtre.

Fausse brancurline , voyez Berce.

Fausse Senille , voyez Renouée.

Fausse Yvraie , voyez Raigras.

Faux Pistachier , voyez Nez coupé.

Faux Seigle , voyez Raigras.

Faux Sycomore de Provence , voyez Azedarach.

Felongene , voyez Chelidoine.

Fenabregue , voyez Micoconlier.

Fenouil de porc , voyez Peucedane.

Fenouillette , voyez Pomme.

Fenouil marin , voyez Bacile.

Ferrum equinum , voyez Fer à cheval.

Ferula , voyez Férule.

Festuca , voyez Droue , Fétuque , Raigras.

Fétu , voyez Droue.

Féve , voyez Haricot.

Féve épaisse , voyez Orpin , Pivoulade.

Feugère , voyez Fougère.

Fengerole , voyez Filicule.

Ficus , voyez Figuier.

Figue aulique , voyez Figuier.

Figué fer , voyez Figuier.

Figué , voyez Figuier.

Figues fleurs , voyez Figuier.

Figuo Blanguo communo , voyez Figuier.

Figuo esquillarelo , voyez Figuier.

Figuo doou Sant Ésprit , voyez Figuier.

Figuo graiffano , voyez Figuier.

Figuo mouiffonno , voyez Figuier.

Filago , voyez Herbe à coton.

Filieula , voyez Filicule.

Filicule, voyez Capillaire, Sauve-vie.

Filipendula , voyez Filipendule, Reine des prés.

Filius ante patrem , voyez Tussilage.

Filix , voyez Filicule, Fougère.

Flambe, voyez Iris.

Flèche d'eau, voyez Fléchière.

Fleur du Soleil, voyez Héliantheme.

Faniculum , voyez Fenouil.

Fœnum græcum , voyez Fenugrec.

Foirole, voyez Mercuriale.

Follette, voyez Arroche.

Fougère commune, voyez Fougère.

Fougère femelle, voyez Fougère.

Fougère mâle, voyez Fougère.

Fouinier, voyez Hêtre.

Fouteau, voyez Hêtre.

Foyard, voyez Hêtre.

Fragaria , voyez Fraisier.

Framboisier, voyez Ronce.

Frangula , voyez Bourgeon.

Franc Osier, voyez Saule.

Franc Picard, voyez Peuplier.

Frequin, voyez Pommier.

Frechillon, voyez Troëscne.

Fritillaria , voyez Fritillaire, Couronne impériale.

Froment locar, voyez Epeautre.

Froment rouge, voyez Epeautre.

Fromental, voyez Raigrass.

Fruillier, voyez Fraisier.

Fucus , voyez Boyau de chat.

Fumaria , voyez Fumeterre.

Fungus , voyez Chanterelle, Champignon, Coucou-

mellé , Morille , Moufferon , Pivoulade , Truffe,
Fufeau , voyez Pied de veau.

G.

GALANDE , voyez Pêcher.
Galanthus , voyez Percencige.
 Galantine , voyez Ancholie.
Galeopsis , voyez Galcope jaune.
 Galinot , voyez Barbe de Chèvre.
 Galiot , voyez Benoîte.
 Galiote , voyez Benoîte.
Galium , voyez Gratteron , Caille-lait.
 Gamet , voyez Vigne.
 Gands de Notre-Dame , voyez Campanule , Digitale ,
 Ancholie.
 Gantelée , voyez Campanule.
 Garderobe , voyez Aurone.
 Gariot , voyez Benoîte.
 Garou , voyez Laureole.
 Garronier jaune , voyez Violier.
 Gasse , voyez Lychnide.
 Gazon d'Espagne , voyez Statice.
 Gazon d'Olympe , voyez Statice.
 Géant de Constantinople , voyez Renoncule.
 Géant de Rome , voyez Renoncule.
 Genest épineux , voyez Jonc marin.
 Genibré , voyez Genièvre.
 Geniébré , voyez Genièvre.
 Genipi , voyez Absynthe.
Genista , voyez Jonc marin , Genest.
 Genouillet , voyez Sceau de Salomon.
Gentiana , voyez Gentiane.
 George , voyez Laitue.
 Geraine , voyez Bec de Grue.
 Geraine cicurine , voyez Bec de Grue.

- Geraine mauve*, voyez *Bec de grue*.
Geranion, voyez *Bec de grue*.
Geranium, voyez *Bec de grue*.
Gerille, voyez *Chanterelle*.
Germaine, voyez *Pommier*.
Germandrée aquatique, voyez *Chamarras*.
Germandrée bâtarde, voyez *Véronique*, *Matum*.
Geum, voyez *Benoitte*, *Geum*.
Girard Rauffin, voyez *Cabaret*.
Giroflée des Dames, voyez *Julienne*.
Giroflée d'eau, voyez *Plume d'eau*.
Giroflée jaune, voyez *Violier*.
Giroflée musquée, voyez *Julienne*.
Girofler jaune, voyez *Violier*.
Girouette, voyez *Pommier*.
Gladiolus, voyez *Glayeul*.
Glandau, voyez *Olivier*.
Gland de terre, voyez *Minfon*.
Glaucium, voyez *Pavot*.
Glayeul puant, voyez *Spatule*.
Glechoma, voyez *Lierre terrestre*.
Globularia, voyez *Alype*, *Globulaire*.
Glycyrrhiza, voyez *Réglisse*.
Gnaphalium, voyez *Pied de chat*, *Immortelle*.
Gobet, voyez *Cerisier*.
Gouais, voyez *Vigne*.
Graine de Canarie, voyez *Alpiste*.
Graine sans nœuds, voyez *Canse*.
Gramen, voyez *Alpiste*, *Canse*, *Chiendent*, *Cretelle*,
Eternue traçante, *Etique aigrette*, *Flouve*, *Leiche*,
Massette, *Schenanthe*.
Gramen dactylon, voyez *Brossière*.
Grande Centaurée, voyez *Centaurée*.
Grande Chelidoine, voyez *Chelidoine*.
Grande Consue, voyez *Consoude*.
Grande Consoude, voyez *Consoude*.
Grande Eclaire, voyez *Chelidoine*.

- Grande Esule , voyez Tithymale.
 Grande Immortelle , voyez Xerantheme.
 Grande Joubarbe , voyez Joubarbe.
 Grande Lunaire , voyez Bulbonac.
 Grande Marguerite , voyez Marguerite.
 Grande Ortie , voyez Ortie.
 Grande Pervenche , voyez Pervenche.
 Grande Scrophulaire , voyez Scrophulaire.
 Grand Housson , voyez Houx.
 Grand Junc , voyez Scirpe.
 Grand Liseron , voyez Liseron.
Grasso figuo barnissato , voyez Fignier.
 Graonselle , voyez Pavot.
 Gras de mouton , voyez Lampane.
 Grasette , voyez Orpin.
 Grenouillette , voyez Renoncule.
 Grenouillette blanche , voyez Sylvie.
 Grenouillette des bois , voyez Sylvie.
 Grisse de loup , voyez Plicaire.
 Griotier , voyez Cetifier.
 Grisaille , voyez Peuplier.
 Gros Adam blanc , voyez Pommier.
 Gros Amer doux , voyez Pommier.
 Gros Barrelet , voyez Navel.
 Gros Coq , voyez Pommier.
 Gros Damas de Tours , voyez Prunier.
 Gros Fenou , voyez Férule.
 Grosse Allemande , voyez Laitue.
 Grosse Blonde , voyez Laitue.
 Grosse Mignone , voyez Pêcher.
 Grosse Rouge , voyez Laitue.
 Gros Sucrin de Tours , voyez Melon.
Grosso Campanetto , voyez Liseron.
Grossularia , voyez Cassis , Groseillier.
 Groseillier à fruit noir , voyez Cassis.
 Gros Retombet de Provence , voyez Laureole.
 Groat , voyez Pommier.

Grenadier, voyez Balauftier.
 Grundbir, voyez Patate.
 Guignier, voyez Cerisier.
 Guidelier, voyez Cerisier.
 Gueule de lion, voyez Mufle de veau.

H.

*H*ALICACABUM, voyez Coqueret.
 Hanebane potelée, voyez Julienne.
 Haute Branche, voyez Pommier.
Hedera arborea, voyez Lierre.
Hedera terreſtris, voyez Lierre tetteſtre.
Helianthemum, voyez Fumane, Patate, Hélianthème.
Helenium, voyez Aulné.
Heliotropium, voyez Heliotrope.
Helleborus, voyez Ellebore blanc, noir.
Helleborina, voyez Elleborine.
 Hémorroïdale, voyez Petite Chélidoine.
 Hémorocale de Valence, voyez Narciffe.
 Hépatique d'eau, voyez Renoncule.
 Hépatique des bois, voyez Rubéole.
 Hépatique à étoile, voyez Rubéole.
 Hépatique de fontaine, voyez Lichen.
Heracleum, voyez Berce.
 Herbe à Lait, voyez Polygale.
 Herbe aux Teigneux, voyez Petafite.
 Herbe à Prêtre, voyez Pied de veau.
 Herbe à la Coupure, voyez Confoude, Millefeuille.
 Herbe aux Puces, voyez Conyſe, Pulicaire.
 Herbe aux Pucerons, voyez Conyſe.
 Herbe aux Moucherons, voyez Conyſe.
 Herbe à la Fièvre, voyez Bourſe à Paſteur.
 Herbe au Cancer, voyez Dentelaire.
 Herbe à Squinancie, voyez Cinanchine.
 Herbe aux Magiciennes, voyez Circée.
 Herbe aux Gueux, voyez Clématite.

Herbe aux Chats , voyez Cataire.

Herbe aux Mittes , voyez Blattaire,

Herbe à Jaunir , voyez Gaude.

Herbe à Pauvre homme , voyez Gratiolle.

Herbe aux Œilleis , voyez Alliaire.

Herbe aux Poules , voyez Gremil.

Herbe aux Verrues , voyez Hélianthème.

Herbe à Epervier , voyez Hieracium.

Herbe au Charpentier , voyez Millefeuille.

Herbe aux Poulets , voyez Morsgeline.

Herbe aux Ecus , voyez Nummulaire.

Herbe à Cent maux , voyez Nummulaire.

Herbe aux mammelles , voyez Lampane.

Herbe à Éternue , voyez Parmique.

Herbe Cachée , voyez Clandestine.

Herbe de S. Laurent , voyez Sanicle.

Herbe de Notre-Dame , voyez Pariétaire.

Herbe des Egyptiens , voyez Marrube aquatique.

Herbe de S. Fiacre , voyez Bouillon blanc.

Herbe de Sainte Othilie , voyez Delphinette.

Herbe du Feu , voyez Ellebore noir.

Herbe de S. Christophe , voyez Christophorane.

Herbe de S. Etienne , voyez Circée.

Herbe de l'Hyronnelle , voyez *Chelidonium*.

Herbe de S. Jean , voyez Armoise , Millepertuis.

Herbe de S. Pierre , voyez Bacile.

Herbe de Ste Cunegonde , voyez Eupatoire.

Herbe de S. Antoine , voyez Fausse Lyfimachie.

Herbe de Ste Catherine , voyez Bâsamine.

Herbe de S. Benoît , voyez Benoîte.

Herbe des Fièvres , voyez Germandrée.

Herbe de S. Guillaume , voyez Aigtemoine.

Herbe de Bœuf , voyez Alleloia.

Herbe d'or , voyez Hélianthème.

Herbe de S. Jacques , voyez Jacobée.

Herbe de la Paralytie , voyez Primevere.

Herbe de S. Paul , voyez Primevere.

- Herbe de S. Innocent , voyez Renouée.
 Herbe d'Amour , voyez Reseda.
 Herbe dorée , voyez Jacobée.
 Herbe Grasse , voyez Grassette.
 Herbe Huileuse , voyez Grassette.
 Herbe Mauve , voyez Reseda.
 Herbe militaire , voyez Millefeuille.
 Herbe musquée , voyez Moschatelline.
 Herbe à la Reine , voyez Tabac.
 Herbe aux Poux , voyez Staphisaigte.
 Herbe aux Teignes , voyez Patience.
 Herbe au Coq , voyez Coq.
 Herbe à Charpentier , voyez Barbarée.
 Herbe à Robert , voyez Bec de grue.
 Herbe à Squinancie , voyez Bec de grue.
 Herbe aux Vers , voyez Tanaisie.
 Herbe au Chantre , voyez Velar.
 Herbe aux Langues , voyez Bec de grue.
 Herbe de la Rupture , voyez Sceau de Salomon.
 Herbe de l'Ambassadeur , voyez Tabac.
 Herbe de Sainte Croix , voyez Tabac.
 Herbe de Sainte Barbe , voyez Barbarée.
 Herbe de Sainte Marie , voyez Tanaisie.
 Herbe du Grand Prince , voyez Tabac.
 Herbe Sainte ou Sacrée , voyez Tabac.
 Herbe Sacrée , voyez Verveine.
 Herbe S. Quirin , voyez Tussilage.
Herba Paris , voyez Raisin de renard.
Herbo Betturo , voyez Phlomis.
Herbo de la Puto , voyez Tussilage.
Herbo laurino , voyez Lauréole.
 Hérissonné , voyez Girouille.
 Herlossier , voyez Sorbier des oiseaux.
Herniaria , voyez Herniole.
 Herpette , voyez Lichen.
Hesperis , voyez Alliaire.
Hieracium , voyez Hicracium , Pulmonaire , Salade

- de pote , Epervière des bois , Picride.
Hipericum , voyez Toute saine , Millepertuis.
Hippocastanum , voyez Maronnier d'Inde.
Hippocrepis , voyez Fer à cheval.
Hippuris , voyez Pesse d'eau.
Hisperis , voyez Julienne.
Holosteo affinis , voyez Queue de souris.
Hordeum , voyez Oige , Escourgeon.
Horminum , voyez Orvale.
Hottonia , voyez Plume d'eau.
Houx fragon , voyez Houx frelon.
Humulus , voyez Houblon.
Hyacinthus , voyez Muscari , Jacinthe , Tubéreuse ,
 Hyacinthe.
Hydrocotyle , voyez Ecuelle d'eau.
Hyosciamus , voyez Jusquiame.
Hypericum , voyez Millepertuis.
Hypnum , voyez Usnée.
Hypochaëris , voyez Nietacium.
Hypochoëris , voyez Salade de pote.
Hypocistis , voyez Hypociste.
Hyslope de Garigues , voyez Héliantheme.
Hyssopus , voyez Hyslope.

I.

- J** *ACEA* , voyez Jacée , Sarrette.
 Jacinthe étoilée , voyez Scille d'automne , Ornithogalle.
Jacobæa , voyez Jacobée.
 Jalap , voyez Belle de nuit.
Jalappa , voyez Belle de nuit.
 Jargonelle , voyez Poirier.
 Jarnotte , voyez Terre noix.
Jasione , voyez Jasione.
Jasminum , voyez Jasmin.
 Jaune dotée , voyez Renoncule.
 Jaunet , voyez Pommier.

Jenne rouge , voyez *Laitue*.
Iles , voyez *Yebles*.
Ilex , voyez *Kerimès* , *Yeuse* , *Houx*.
Illecebrum , voyez *Herbe aux panaris*.
Immortelle jaune , voyez *Immortelle*.
Impatiens , voyez *Balsamine*.
Imperatoria , voyez *Angélique* , *Impératoire*.
Impératrice , voyez *Prunier*.
Incomparable , voyez *Narcisse*.
Jombarbe , voyez *Joubarbe*.
Inula , voyez *Aulnée*.
Jonc odorant , voyez *Acorus*.
Jonc fleuri , voyez *Butome*.
Joubarbe des vignes , voyez *Orpin*.
Ipreau , voyez *Orme* , *Peuplier*.
Iris , voyez *Espatule*.
Isambert , voyez *Poirier*.
Isatis , voyez *Gnêde*.
Ischæmum , voyez *Schnanthé*.
Italie , voyez *Laitue*.
Juliane , voyez *Julienne*.
Julienne jaune , voyez *Barbarée*.
Julienne , voyez *Fève*.
Juncus , voyez *Jonc*.
Juniperus , voyez *Genièvre* , *Sabine*.
Ivraie , voyez *Chiendent*.

K.

KALI , voyez *Soude*.
 Keiri , voyez *Violier*.

L.

LACH de pute , voyez *Tithymale*.
Lacryma Jobi , voyez *Larmes de Job*.
Laduca , voyez *Condrille* , *Laitue*.
Lagæcia , voyez *Camin*.

Lagopus , voyez Pied de lièvre.

Laiceron , voyez Laitton.

Lait battu , voyez Fumctêtre.

Lamium , voyez Lamier.

Lampéau , voyez Vigne.

Lampsana , voyez Lampfane.

Landes , voyez Jonc marin.

Langue de bœuf , voyez Buglosse , Chichotée , Pied de veau , Scolopendre.

Langue de Cerf , voyez Scolopendre.

Langue de chien , voyez Cynoglosse.

Langue de passereau , voyez Renouée.

Langue d'oiseau , voyez Stellaire graminée.

Langue de vache , voyez Confonde.

Laourietin , voyez Laurier tin.

Lapathum , voyez Patience , Rhapontic , Violon.

Lappa , voyez Bardane.

Lapsane , voyez Rapistre.

Las pineas , voyez Pin.

Larix , voyez Meleze.

Lathraea , voyez Clandestine.

Lathyris , voyez Tithymale.

Lathyrus , voyez Mynson , Gesse.

Lavendula , voyez Lavande.

Laureola , voyez Lauteole.

Laurier amandier , voyez Laurier cerise.

Lauro-cerasus , voyez Laurier cerise.

Laurus , voyez Laurier , Laurier tin.

Lemma , voyez Lemma.

Lemna , voyez Lentille d'eau.

Lens , voyez Lentille.

Lentibularia , voyez Lentibulaire.

Lenticula , voyez Lentille d'eau.

Lentille d'Espagne , voyez Gesse.

Lentiscus , voyez Léntisque.

Leontodon , voyez Dent de lion.

Leonurus , voyez Agripaulme.

- Lepidium* , voyez Cresson , Passérage.
Leucanthemum , voyez Marguerite.
Leucoium , voyez Violier , Perceneige.
Lichen , voyez Lichen.
Lichnis , voyez Lychnide.
Lichenoides , voyez Lichen.
Lierne , voyez Clematite.
Ligusticum , voyez Séseli de montagnes , Livesche.
Ligustrum , voyez Troëscne.
Lilac des Indes , voyez Azederach.
Lilas de terre , voyez Vacier.
Lilium , voyez Lys , Martagon.
Lilium convallium , voyez Muguet.
Limon , voyez Citronnier.
Limosella , voyez Limoselle.
Linaria , voyez Linaire , Belvedere , Velvotte.
Lingua cervina , voyez Scolopendre.
Lin sauvage , voyez Linaire.
Linum , voyez Lin.
Liseron épineux , voyez Smilax.
Liseron piquant , voyez Smilax.
Liseron rude , voyez Smilax.
Lithospermum , voyez Gremil.
Lizet , voyez Liseron.
Lobelia , voyez Cardinale de marais.
Lods ebous , voyez Yeble.
Lolium , voyez Raigrass.
Lonchitis , voyez Lonkite.
Long bois , voyez Pommier.
Longue vissée , voyez Laitue.
Lonicera , voyez Chèvrefeuille , Lonicère.
Loque , voyez Douce-amère.
Lotier odorant , voyez Tréfle.
Lotus , voyez Lotier , Tréfle.
Louise bonne , voyez Poirier.
Lou pin , voyez Pin.
Lunaria , voyez Bulbonac , Fer à cheval.

Lupinus , voyez Lupin.

Lupulus , voyez Houblon.

Luteola , voyez Gaude.

Lychnis , voyez Lychnide.

Lycope , voyez Marrube aquatique.

Lycoperdon , voyez Boviste , Truffe.

Lycopersicon , voyez Pomme d'amour.

Lycopodium , voyez Lycopode , Plicaire.

Lycopus , voyez Marrube aquatique.

Lys d'étang , voyez Nénuphar.

Lys de montagnes , voyez Martagon.

Lys des Vallées , voyez Magnét.

Lys sauvage , voyez Martagon.

Lysimachia , voyez Corneille , Nummulaire.

Lysimachie , voyez Corneille.

Lithrum , voyez Salicaire.

M.

MACERET , voyez Airelle.

Mache , voyez Doucette.

Maclou , voyez Anthote.

Macuillon , voyez Gesle , Minson.

Magdeleine blanche , voyez Pêcher.

Magnemon , voyez Jacée.

Mahaleb , voyez Bois de Sainte Lucie.

Mahaleb arabum , voyez Putiet.

Main coupée des anciens , voyez Platane.

Majorana , voyez Marjolaine.

Maire-Siouvo , voyez Chèvrefeuille.

Malagué , voyez Bois de Sainte Lucie.

Malherbe , voyez Thalapfie.

Mallette à berger , voyez Bourse à pasteur.

Malherbe , voyez Dentelaire.

Malhois , voyez Pommier.

Malva , voyez Alcée , Mauve , Bourdon.

Malvoïfies , voyez Vigne.

- Malus* , voyez Pommier.
Malus aurantia , voyez Orange.
Manuguetto , voyez Calament.
Marceau , voyez Saule.
Marchantia , voyez Lichen.
Margal , voyez Raigras.
Marie la douce , voyez Pommier.
Marie Honfroy , voyez Pomunier.
Marie vulgaire , voyez Soude.
Margaridier , voyez Camomille.
Marguerite bleue , voyez Globulaire.
Marquette , voyez Pied de veau.
Marquise , voyez Poirier.
Marrube blanc , voyez Marochemin.
Marrube fêride , voyez Ballotte.
Marrube noir , voyez Ballotte.
Marrubin noir , voyez Ballotte.
Marrubium album , voyez Marochemin.
Martin sec , voyez Poirier.
Massugno , voyez Ciste.
Matricaria , voyez Camomille, Matricaire.
Marum , voyez Marum.
Mandui , voyez Pavot.
Mayenne , voyez Aubergine.
Mays , voyez Bled de Turquie.
Médaille , voyez Bulbonac.
Medica , voyez Luzerne.
Medicago , voyez Luzerne.
Melampyre , voyez Bled de vache.
Melampyrum , voyez Bled de vache.
Melia , voyez Azederach.
Meliers , voyez Vigne.
Melidor , voyez Renoncule.
Melisse , voyez Calament.
Melissa , voyez Melisse.
Melilotus , voyez Melilot.
Melo , voyez Melon.

Melon d'eau , voyez Pastèque.

Melongena , voyez Aubergine.

Melongene , voyez Aubergine.

Mentha , voyez Menthe.

Menthe coq , voyez Coq.

Menthe d'eau , voyez Pouliot.

Menthe de marais , voyez Pouliot.

Menuet rouge , voyez Mouron.

Menuchon rouge , voyez Mouron.

Menyanthes , voyez Menianthe.

Mercurialis , voyez Mercuriale.

Merisier , voyez Cerisier.

Merveille d'hiver , voyez Poirier.

Merveille , voyez Balfamine.

Mespilus , voyez Buisson ardent , Néflier , Aubépine.

Meûre Jean , voyez Poirier.

Meum , voyez Meum.

Mezercon , voyez Laureole.

Miançon , voyez Minson.

Millefeuille aquatique , voyez Plume d'eau.

Millefolium , voyez Millefeuille , Plume d'eau.

Mil , voyez Miller.

Millium , voyez Miller.

Miougranié , voyez Balauftier.

Mirabellier , voyez Prunier.

Mirabilis , voyez Belle de nuit.

Mirlilot , voyez Melilot.

Miroir du temps , voyez Mouron.

Mnium hygrometrum , voyez Mïole , Hygrometre.

Molène , voyez Bouillon blanc.

Momordica , voyez Concombre , Pomme de merveille.

Montmorency , voyez Cerisier.

Montagnard tardif , voyez Narcisse.

Monstre rouge , voyez Renoncule.

Mopordum , voyez Chardon commun.

Morelle grimpane , voyez Douce amère.

Morelle , voyez Solanum.

Morillons , *voyez* Vigne.

Moschatella , *voyez* Moschatelline.

Morus , *voyez* Mûrier.

Moureau , *voyez* Olivier.

Mouride , *voyez* Pied de veau.

Mouron d'eau , *voyez* Beccabungue.

Moustarde , *voyez* Moutarde.

Mousse terrestre , *voyez* Plicaire.

Muguet des bois , *voyez* Rubéole.

Mûrier des Hayes , *voyez* Ronce.

Muscadelle , *voyez* Poirier.

Muscadet , *voyez* Pommier , Vigne.

Muscat d'Allemagne , *voyez* Poirier.

Muscat d'août , *voyez* Poirier.

Muscat , *voyez* Poirier , Vigne.

Muscate , *voyez* Rosier.

Muscate robine , *voyez* Poirier.

Muscari , *voyez* Muscari.

Muscus , *voyez* Mousse , Nostoch , Plicaire , Mniole ,
Coralloïde.

Musette d'Anjou , *voyez* Poirier , Percemousse.

Myagrum , *voyez* Cameline.

Myosotis , *voyez* Oreille de Souris.

Myosirus , *voyez* Queue de Souris.

Myrrhis , *voyez* Cerfeuil.

Myrthus , *voyez* Myrthe.

Myttille , *voyez* Airelle.

N.

NALAS , *voyez* Nayade.

Napel , *voyez* Aconit.

Napellus , *voyez* Aconit.

Napus , *voyez* Navet.

Narcisso-leucoium , *voyez* Perceneige.

Narcissus , *voyez* Jonquille , Narcisse.

Nard , *voyez* Rosier.

Nard sauvage , voyez Cabaret.

Nardus , voyez Nard celtique.

Nasitor , voyez Cresson.

Nasturtium , voyez Cresson , Cresson de fontaine , Cresson des prés.

Nepeta , voyez Cataire.

Nerion , voyez Laurier rose.

Neslier , voyez Néslier.

Nicotiana , voyez Tabac.

Nidus avis , voyez Nid d'oiseau.

Nielle bâtarde , voyez Lychnide.

Nigella , voyez Nielle.

Noble épine , voyez Aubépine.

Noirprun , voyez Nerprun.

Noli me tangere , voyez Balsamine.

Noisetier , voyez Coudrier.

Nostoc , voyez Nostoch.

Nymphaea , voyez Nénuphar.

O.

OBIER stérile , voyez Obier.

Ochrus , voyez Ochre.

Ocimoïdes , voyez Lychnide.

Ocimum , voyez Basilic.

Œillet , voyez Liseron.

Œil de bœuf , voyez Marguerite.

Œil de Christ , voyez Aster.

Œillet des champs , voyez Lychnide.

Œnanthe , voyez Œnanthe.

Olea , voyez Olivier.

Olive picholine , voyez Olivier.

Olivier saule , voyez Zenigole.

Onobrychis , voyez Sainfoin.

Onopordum , voyez Chardon hémorrhoidal.

Ophris , voyez Ophrise.

Ophrise double feuille , voyez Double feuille.

- Ophris*, voyez Nid d'oiseau.
Opulus, voyez Obier.
 Orange musquée, voyez Poirier.
 Orange rouge, voyez Poirier.
Orcanette, voyez Buglosse.
Orchide, voyez Satyrion.
Orchis, voyez Satyrion.
Orchis, voyez Satyrion.
 Oreille d'âne, voyez Confonde.
 Oreille de lièvre, voyez Percefeuille.
 Oreille de rat, voyez Piloselle.
 Oreille d'homme, voyez Cabaret.
 Oreillette, voyez Cabaret, Doucette.
 Orge d'automne, voyez Escourgeon.
Origanum, voyez Marjolaine, Origan.
Orcoselinum, voyez Persil.
 Ormeau, voyez Orme.
 Orme Ypreau, voyez Orme.
 Ormin, voyez Orvale.
 Ornithogalle sphérique, voyez Narcisse.
Ornithogallum, voyez Ornithogalle.
Ornithopodium, voyez Pied d'oiseau.
Orobanche, voyez Orobanche, Hypociste.
 Orseille, voyez Lichen.
 Ortie blanche, voyez Lamier.
 Ortie grêche, voyez Ortie.
 Ortie jaune, voyez Galéope jaune.
 Ortie morte, voyez Lamier, Galéope jaune.
Oryza, voyez Ris.
 Osier, voyez Saule.
 Osier blanc, voyez Zenigole.
 Osier jaune, voyez Saule.
 Osier noir, voyez Saule.
 Osier rouge, voyez Saule.
 Osmonde, voyez Fougère.
 Onmieu, voyez Orme.
 Oxalide, voyez Alleluia.

Oxys, voyez Alleluia.

P.

PADUS, voyez Putiet.

Pain blanc, voyez Obier.

Pain de Coucon, voyez Alleluia.

Pain de Crapaud, voyez Pied de veau.

Pain de Lièvre, voyez Pied de veau.

Pain d'oiseau, voyez Illecebra.

Pain de Pourceau, voyez Pied de veau.

Palais de Lièvre, voyez Laitron.

Palma Christi, voyez Ricin.

Palme de Christ, voyez Ricin.

Panicum, voyez Panis, Millet.

Panis, voyez Panis.

Pantagruelion, voyez Chanvre, Eupatoire.

Papas, voyez Patate.

Papaver erraticum, voyez Pavot.

Paquerette, voyez Marguerite.

Paquette, voyez Marguerite.

Patelle voyez Patience.

Paresseuse, voyez Laitue.

Parietaria, voyez Pariétaire.

Pariette, voyez Raisin de Renard.

Parnassie, voyez Parnassia.

Parnassia, voyez Parnassie.

Paronichia, voyez Herbe aux Panaris.

Pas d'âne, voyez Tussilage.

Passerine, voyez Lauréole.

Passifleur, voyez Coquelourde, Lychnide.

Passion, voyez Laitue.

Passépierre, voyez Bacille.

Passerose, voyez Bourdon, Renoncule.

Passivelours, voyez Prunier.

Pastel, voyez Guède.

Pastenade, voyez Panais.

- Paſteque* , voyez Melon d'eau.
Paſtinaca , voyez Panais.
Patate de Virginie , voyez Patate.
Patte de Loup , voyez Plicaire.
Pavis , voyez Pêcher.
Pavot cornu , voyez Pavot.
Pavot des Jardins , voyez Pavot.
Peau de Vache , voyez Pommier.
Pece , voyez Sapin.
Pedicularis , voyez Pediculaire.
Pelotte de neige , voyez Obier.
Pentaphilloïdes , voyez Argentine.
Peonia , voyez Pivoine.
Pepo , voyez Citrouille.
Perceboſſe , voyez Coronille.
Percefeuille , voyez Saxifrage.
Percemouſſe , voyez Mouſſe.
Perdrigon , voyez Prunier.
Perdrigon de Cernay , voyez Prunier.
Perdrigon violet , voyez Prunier.
Perelle de murailles , voyez Lichen.
Periploca Monſpeliaca , voyez Scammonée de Mon-
 pellier.
Perpignan , voyez Laitue.
Perſica , voyez Pêcher.
Perſicaria , voyez Perſicaire , Curage.
Perſil de Bouc , voyez Boucage.
Pervinca , voyez Pervenche.
Peſſe , voyez Sapin.
Petaſites , voyez Petaſite.
Petit Manoir , voyez Pommier.
Petit moulin à vent , voyez Pommier.
Petite Chappe . voyez Pommier.
Petite Mignonne , voyez Pêcher.
Petite Joubarbe , voyez Illecebra.
Petite Conſonde , voyez Brunelle.
Petite Conſère , voyez Brunelle , Marguerite.

- Petit Muguet, *voyez* Caillelait.
 Petite Eclaire, *voyez* Petite Chélidoïne.
 Petite Esule, *voyez* Tithymale.
 Petite Scrophulaire, *voyez* Petite Chélidoïne.
 Petite Garance, *voyez* Cinanchine.
 Petit Laurier rose, *voyez* Fausse Lyſimachie.
 Petit Houx, *voyez* Houx frelon.
 Petit Gloutteron, *voyez* Lampoutde.
 Petit Liseron, *voyez* Liseron.
 Petit Damas noir, *voyez* Prunier.
 Petite Chélidoïne, *voyez* Renoncule.
 Petit Muguet, *voyez* Rubéole.
 Petite Marguerite, *voyez* Marguerite.
 Petit Chêne, *voyez* Germandrée.
 Petite Sauge, *voyez* Sauge.
 Petrole, *voyez* Bruyère.
 Petron, *voyez* Genièvre.
 Pet d'âne, *voyez* Chardon commun.
 Petelin, *voyez* Pistachier.
Petum, *voyez* Tabac.
Peucedanum, *voyez* Peucedane, Angélique.
 Peuple, *voyez* Peuplier.
 Peuplier blanc, *voyez* Peuplier.
 Peuplier ipreau, *voyez* Peuplier.
 Peuplier noir, *voyez* Peuplier.
Phalangium, *voyez* Phalangère.
Phalus, *voyez* Champignon, Morille.
Phalaris, *voyez* Al piste.
Phaseolus, *voyez* Haricot.
Philadelphus, *voyez* Syringa.
Philantrope, *voyez* Gratteron.
Phisalis, *voyez* Coqueret.
Phleum, *voyez* Massette.
Phlomis, *voyez* Phlomis.
Picarde, *voyez* Féve.
Picea, *voyez* Sapin.
 Pichotte batnissotte, *voyez* Viguier,

- Pichot sené, voyez Alype.
Picris, voyez Picride épineuse.
 Piéchatin, voyez Pied de chat.
 Pied d'Alouetre, voyez Delphinette.
 Pied de Coq, voyez Grenouillette.
 Pied de Corbin, voyez Grenouillette.
 Pied de Cheval, voyez Pommier.
 Pied de Geline, voyez Fumeterre.
 Pied de Lièvre, voyez Patte de Lièvre.
 Pied de Loup, voyez Marrube aquatique, Plicaire.
 Pied de Pigeon, voyez Bec de Grue.
 Pigan, voyez Olivier.
 Pilon, voyez Pied de Veau.
 Pimpernelle, voyez Pimprenelle.
 Pimpinelle, voyez Pimprenelle.
 Pimprenelle saxifrage, voyez Boucage.
 Pimprenelle blanche, voyez Boucage.
Pimpinella, voyez Anis, Pimprenelle.
 Piment d'eau, voyez Curage.
 Piment, voyez Botrys.
Pinus, voyez Sapin, Meleze, Pin.
 Pineaux, voyez Vigne.
 Pin d'Ecosse, voyez Pin.
 Pin de Genève, voyez Pin.
 Pin à roche, voyez Pin.
Pinguicula, voyez Sanicle.
Pisum, voyez Ochre, Pois.
Pistachia, voyez Pistachier.
 Pivoine, voyez Renoncule.
 Pissenlit, voyez Dent de Lion.
 Plane, voyez Erable.
Plantaginella, voyez Limoselle.
Plantago, voyez Plantain, Pulicaire, Coronope.
 Plante royale, voyez Basilic.
Platanus, voyez Platane.
 Platane d'Orient, voyez Platane.
 Platane de Virginie, voyez Platane.

Plateau à fleurs blanches , voyez Nénuphar.

Plumbago , voyez Dentelaire.

Plumette , voyez Plume d'eau.

Poa , voyez Poherbe.

Poire à la Reine , voyez Poirier.

Poire d'Ambre , voyez Poirier.

Poire Royale , voyez Poirier.

Poire Rose , voyez Poirier.

Poire du Prince , voyez Poirier.

Poire de Naples , voyez Poirier.

Poire de terre , voyez Patate.

Pois carré , voyez Gesse.

Pois quarré , voyez Gesse.

Poivre d'eau , voyez Curage.

Poivre de Guinée , voyez Poivre d'Inde.

Polygala , voyez Poligale.

Polygonatum , voyez Sceau de Salomon.

Polygonifolia , voyez Corrigiole.

Polygonum , voyez Bistorte , Renouée , Curage , Perficairé , Sarrafin.

Polypodium , voyez Filicule , Lonkite , Polypode , Fougère.

Polytricum , voyez Percemouffe.

Polytric doré , voyez Percemouffe.

Pomme épineuse , voyez Endormie.

Pomme de Châtaignier , voyez Pommier.

Pomme tapone , voyez Pommier.

Pomme de terre , voyez Patate.

Pomme de Berlin , voyez Laitue.

Pomme de mer , voyez Egagrophille de mer.

Pomus , voyez Pomier.

Poncirado , voyez Meleze.

Populago , voyez Populago.

Populus , voyez Peuplier.

Populus tremula , voyez Tremble.

Porrum , voyez Poireau.

Portefeuille , voyez Rapette.

- Potentilla* , voyez Argentine , Quintefeuille.
Ponceau , voyez Pavot.
Portail , voyez Poirier.
Porte-chapeau , voyez Paliure.
Portulaca , voyez Pourpier.
Potaloc , voyez Patate.
Potiron , voyez Citrouille.
Poule grasse , voyez Doucette.
Pouliot de mer , voyez Panicaud.
Pourprée , voyez Pêcher.
Primerole , voyez Primevère.
Primula , voyez Oreille d'ours , Primevère.
Prunus , voyez Laurier-Cerise , Bois de Sainte Lucie ,
 Prunier.
Prunelle , voyez Brunelle , Vigne.
Prunellier , voyez Prunier.
Pseudo-acacia , voyez Acacia commun.
Psyllium , voyez Pulicaire.
Ptarmica , voyez Ptarmique.
Pucelage , voyez Pervenche.
Pucelle de Saintonge , voyez Poirier.
Pulmonaria , voyez pulmonaire.
Pulmonaire des François , voyez Pulmonaire.
Pulmonaire de terre , voyez Lichen.
Pulsatilla , voyez Coquelourde.
Punica , voyez Balauftier.
Puîne blanche , voyez Trocfac.
Pyracantha , voyez Buisfon ardent.
Pyrus , voyez Coignaffier , Poirier.
Pyrethre fawage , voyez Ptarmique.
Pyrola , voyez Pyrole.

Q.

- Q**UEUE d'Arondelle , voyez Fléchière.
 Queue de Cheval , voyez Preile.
 Queue de Poireau , voyez Vacier.
 Queue de Pourceau , voyez Peucedane.

Queue de Renard , voyez Bled de Vache.

Quercillet , voyez Stæchas arabe.

Quercus , voyez Yeuse, Chêne.

Quinquefolium , voyez Comaret, Double-feuille.

Quintefeuille de marais , voyez Comaret.

Quintefeuille rouge , voyez Comaret.

R.

RABOIS , voyez Pommier.

Racine amidonnière , voyez Pied de veau.

Racine des femmes battues , voyez Sceau de Notre-Dame.

Racine du S. Esprit , voyez Angélique.

Racine vierge , voyez Sceau de Notre-Dame.

Raguette , voyez Patience.

Raisfort , voyez Radix.

Raiponce , voyez Campanule.

Raisin de bois , voyez Airelle.

Raisin d'ours , voyez Bassierole.

Rambouillet , voyez Pommier.

Rambour , voyez Pommier.

Rameau d'or , voyez Violier.

Ranunculus , voyez Grenouillette , Hépatique des jardins , Petite Chelidoine , Adonide , Bassinet , Douve , Renoncule.

Rapa , voyez Rave.

Raphanus , voyez Raisfort.

Rapistrum , voyez Rapiître.

Rapunculus , voyez Jassione.

Rapuntium , voyez Cardinale des marais.

Rosen , voyez Rosier.

Rasque , voyez Cuscute.

Ravanel des Italiens , voyez Radi.

Rave , voyez Raisfort.

Ravenon , voyez Rapiître.

Ravenelle , voyez Violier.

Razinet , voyez Joubarbe.

- Recife*, voyez *Benoitte*.
Regardez-moi des Jardiniers, voyez *Scabieuse*.
Régence, voyez *Chichorée*.
Régliſſe ſauvage, voyez *Aſtragalle*.
Reine Claude, voyez *Prunier*.
Renette, voyez *Pommier*.
Renette douce, voyez *Pommier*.
Renoncule, voyez *Baſſinet*.
Renoncule bulbeuſe, voyez *Grenouillette*.
Renouvellet, voyez *Pommier*.
Renue, voyez *Renouée*.
Repriſe, voyez *Orpin*.
Reſeda, voyez *Gaude*, *Ricin*.
Reviromance, voyez *Dompte-venin*.
Réveille matin, voyez *Tithymale*.
Rhabarbarum, voyez *Rapontic*.
Rhamnus, voyez *Alaterne*, *Jujubier*, *Bourgene*, *Nerprun*.
Rheum, voyez *Rapontic*.
Rhodiola, voyez *Orpin*.
Rhubarbe des moines, voyez *Rapontic*.
Rhue des murailles, voyez *Sauve-vie*.
Rhue des prés, voyez *Pigamon*.
Rhus, voyez *Fuſtet*, *Sumac*.
Rhuta, voyez *Rhue*.
Ribes, voyez *Caſſis*.
Ricinus, voyez *Ricin*.
Ricinoïdes, voyez *Ricin*.
Ricochet, voyez *Barbe de Bouc*.
Rieble, voyez *Gratteron*.
Rimberge, voyez *Menthe*.
Ringuilli, voyez *Clématite*.
Ris ſauvage, voyez *Joubarbe*.
Rognon de Caux, voyez *Haricot*.
Rognon de Coq, voyez *Vigne*.
Romaine, voyez *Renoncule*.
Ronce du mont Ida, voyez *Framboiſier*.

- Rondette , voyez Cabaret.
Rongerelle , voyez Bled de Vache.
Roquette des champs , voyez Masse au Bedeau.
Rosa , voyez Rosier.
Roseau aromatique vulgaire , voyez Acorus.
Rose , voyez Rosier.
Rose de Boutdeaux , voyez Rosier.
Rose de Bourgogne , voyez Rosier.
Rose de Gueldres , voyez Obier.
Rose de Mai , voyez Rosier.
Rose d'Outremer , voyez Bourdon.
Rose de Provins , voyez Rosier.
Rosée du Soleil , voyez Rosolis.
Rosen , voyez Rosier.
Rosmarinus , voyez Romarin.
Rossane , voyez Poirier.
Rouget , voyez Pommier.
Rouffe , voyez Pommier.
Rougeole , voyez Pied de Lièvre.
Rouvé , voyez Chêne.
Rouvre , voyez Chêne.
Ronge herbe , voyez Bled de Vache.
Rouge vulgaire , voyez Renoncule.
Rousseler , voyez Poirier.
Royale , voyez Laitue , Poirier.
Roy d'été , voyez Poirier.
Rubeola , voyez Cinanchine.
Rubia tinctorum , voyez Garance.
Rybisso , voyez Adonide.
Rubus , voyez Ronce.
Rubus idæus , voyez Framboisier.
Ruda , voyez Rhue.
Rudo , voyez Rhue.
Rumex , voyez Oseille , Patience , Violon.
Ruscus , voyez Houx frêlon.
Ruta muraria , voyez Sauve-vie.
Rys , voyez Riz.

Ryz , voyez Riz.

S.

- SABINA* , voyez Sabine.
 Sabor , voyez Soulier de Notre-Dame.
 Sadrée , voyez Sattiette.
 Safran bâtard , voyez Cathame.
 Sagette , voyez Fléchière.
 Sagittaire , voyez Fléchière.
 Sain bois , voyez Lanréole.
 Saint Basile , voyez Pommier.
 Saint George , voyez Pommier.
 Saint Germain d'hiver , voyez Poirier.
 Sainte Catherine , voyez Prunier.
 Salade de Chanoine , voyez Doucette.
 Salade royale , voyez Doucette.
 Salamine , voyez Renoncule.
Saliarnes , voyez Olivier.
Salicaria , voyez Salicaire.
Salicornia , voyez Salicor.
 Salicotte , voyez Soude.
Salix , voyez Saule , Osier.
 Salsifi des ptés , voyez Barbe de Bouc.
 Salsifi d'Espagne , voyez Scorsonère.
Salsola , voyez Soude.
Salvia , voyez Orvale , Sauge.
 Sambequier , voyez Suteau.
 Sambuc , voyez Sureau.
Sambucus , voyez Sureau.
Sambucus humilis , voyez Yeble.
 Sang de Dragon , voyez Patience.
 Sanguinaite , voyez Renouée , Coronope.
 Sanguine , voyez Laitue.
Sanguisorba , voyez Pimprenelle.
 Sanicle à l'éperon , voyez Grassette.
Sanicula , voyez Sanicle.
Santolina , voyez Santoline.

Saponaria , voyez Lychnide.

Saponaire , voyez Lychnide.

Sar , voyez Gesle.

Satureia , voyez Teigne , Sarriette.

Sauge , voyez Pommier.

Sauge en arbre , voyez Phlomis.

Sauge franche , voyez Sauge.

Sauge de Jérusalem ou de Béthléem , voyez Pulmonaire.

Savinier , voyez Sabine.

Saumoiteaux , voyez Vigne.

Savorée , voyez Sarriette.

Saupuden , voyez Yeble.

Sauto Oulame , voyez Condrille.

Saxifraga , voyez Boucage , Geum.

Scabiosa , voyez Scabieuse , Mors du diable.

Scabieuse des bois , voyez Mors du diable.

Scabieuse des brebis , voyez Jasionne.

Scandix , voyez Cisteuil , Peigne de Vénus.

Scariole , voyez Chichorée.

Scarole , voyez Chichorée.

Sceptre des Maîtres d'école , voyez Bouleau.

Schlarée , voyez Orvale.

Schænus , voyez Marisque.

Scilla autumnalis , voyez Scille d'automne.

Scirpus , voyez Scirpe.

Scolymus , voyez Epine jaune.

Scoparia , voyez Genest.

Scordium , voyez Chamarras.

Scorpioïdes , voyez Chenille.

Scorfonera , voyez Scorfonère , Terre grêpe.

Scutellaria , voyez Toque.

Secale , voyez Seigle.

Secrette , voyez Chardon hémorrhoidal.

Securidaca , voyez Coronille.

Sedum , voyez Triquemadame , Joubarbe , Iilecebra ;
Orpin.

Selagine , voyez Plicaire.

- Semper vivum* , voyez Joubarbe.
Senecio , voyez Jacobée , Senecçon.
Senellier , voyez Aubépine.
Sené bâtard , voyez Coronille.
Senegré , voyez Fenugrec.
Senevé , voyez Montarde.
Serapias , voyez Elleborine.
Serpente , voyez Pied de veau.
Serpillum , voyez Serpolet.
Seraphique , voyez Renoncule.
Serra , voyez Pied de veau.
Serratula , voyez Sarrette , Chardon hémorrhoidal.
Servantine , voyez Fignier.
Serynga , voyez Syringa.
Sesame bâtard , voyez Cameline.
Sesame d'Allemagne , voyez Cameline.
Seuguion , voyez Bureau.
Sherardia , voyez Sherard.
Sideritis , voyez Crapandine.
Sidonienne , voyez Renoncule.
Signet de Salomon , voyez Sceau de Notre-Dame.
Silene , voyez Lychnide.
Silique , voyez Fougère , Carroubier.
Siliquastrum , voyez Guainier.
Sinapi , voyez Rapistre.
Sinapis , voyez Montarde.
Sifarum , voyez Chervis.
Sifon , voyez Sifon.
Sisymbrium , voyez Cresson de fontaine , Barbarée.
Sium , voyez Chervis , Berle.
Sium aromaticum , voyez Sifon.
Smilax , voyez Smilax.
Smyrnium , voyez Maccron.
Solanum , voyez Aubergine , Patate , Solanum , Coqueret , Moréle.
Solanum scandens , voyez Douce amère.
Soldanella , voyez Soldanelle.

- Soldanelle* , voyez *Liseron*.
Solidago , voyez *Verge d'or*.
Sonchus , voyez *Condrille* , *Terre gteppe* , *Laitron*.
Sorbus , voyez *Sorbier*.
Sorbier sauvage , voyez *Sorbier des oiseleurs*.
Souchet , voyez *Lychnide*.
Soucy d'eau , voyez *Populago*.
Soucy de marais , voyez *Populago*.
Sourbeiretto , voyez *Aigremoine*.
Sourbié , voyez *Sorbier des oiseleurs*.
Soufouine , voyez *Salicor*.
Soufre végétal , voyez *Plicaire*.
Spartium , voyez *Genest* , *Jonc marin*.
Spergula , voyez *Espargoule*.
Spergule , voyez *Espargoule*.
Sphagnum , voyez *Sphaigne des marais*.
Spinacia , voyez *Epinars*.
Spiræa , voyez *Filipendule*.
Sphondylion , voyez *Berce*.
Spongia , voyez *Eponge de mer*.
Stachis , voyez *Stachique*.
Stachys , voyez *Stachique*.
Stæchas arabica , voyez *Stæchas arabe*.
Stæchas citrin , voyez *Immortelle*.
Staphylodendron , voyez *Nez coupé*.
Staphyllæa , voyez *Nez coupé*.
Statice , voyez *Statice*.
Stellaria , voyez *Stellaire*.
Stellera , voyez *Laurcole*.
Stipa , voyez *Etique aigrette*.
Stramonium , voyez *Endormie*.
Suber , voyez *Chêne*.
Succisa , voyez *Mors du diable*.
Succise , voyez *Mors du diable*.
Sucré verd , voyez *Poirier*.
Suisse gris , voyez *Haricot*.
Sureau en grappes , voyez *Sureau*.

Suroü, voyez Terre-noix.

Sycomore, voyez Erable.

Sylvange, voyez Poirier.

Symphitum, voyez Consoude.

Syringa, voyez Lilac, *Syringa*.

Sysymbrium, voyez Thaliâtron des boutiques.

T.

TABOURET, voyez Bourse à Pasteur.

TACODET, voyez Tussilage.

Tæda, voyez Pin.

Tamier, voyez Sceau de Notre-Dame.

Tamnus, voyez Sceau de Notre-Dame.

Tanacetum, voyez Tanaisie, Coq.

Taperie, voyez Caprier.

Targinia, voyez Lichen.

Tartonraire, voyez Laureole.

Taxus, voyez If.

Teigne, voyez Cuscute.

Telephium, voyez Orpin.

Tenon, voyez Arrête-bœuf.

Terebenthus, voyez Pistachier.

Terre grepie, voyez Terre griêpe.

Tête cornue, voyez Cornuet.

Tête de moineau, voyez Jacée.

Tête de veau, voyez Musle de veau.

Teton de Vénus, voyez Pêcher.

Teucrium, voyez Yvette, Pouliot, Germandrée, Chamarras.

Thalpsia, voyez Thalpsie.

Thaliâtron, voyez Pigamon.

Thaliâtrum, voyez Pigamon.

Thlaspi, voyez Bourse à Pasteur, Alysson, Thlaspi.

Thé des Vosges, voyez Lichen.

Thérébinthe, voyez Pistachier.

Thouroux, voyez Pied de veau.

Thymælea , voyez Laureole.

Thymus , voyez Thym.

Tiers de montagnes , voyez Narcisse.

Tilia , voyez Tilleul.

Tillot , voyez Tilleul.

Tinus prior , voyez Laurier tin.

Tithymalus , voyez Tithymale.

Tornabone , voyez Tabac.

Topinambour , voyez Patate.

Tormentilla , voyez Tormentille.

Tortelle , voyez Velar.

Tournesol , voyez Héliantheme.

Toute-bonne , voyez Orvale.

Toute-épice , voyez Nielle.

Tragopogon , voyez Salisfix , Barbe de Bouc.

Tragoselinum , voyez Boucage.

Trainasse , voyez Renouée.

Trapa , voyez Macre.

Trafcalan jaune , voyez Millepertuis.

Tréfle aigre , voyez Alleluia.

Tréfle d'eau , voyez Menyanthe.

Tremella , voyez Champignon , Boyau de chat.

Tremier , voyez Bourdon.

Tribulus , voyez Macre.

Tribulus terrestris , voyez Tribule terrestre.

Tribuloides , voyez Tribuloide.

Trichomanes , voyez Politiic.

Trifolium , voyez Melilot , Pied de Lièvre , Tréfle.

Triolet des prés , voyez Tréfle.

Trippe madame , voyez Trique madame.

Trique madame , voyez Joubarbe.

Triticum , voyez Froment , Epeautre.

Trompe-caïaire , voyez Figuier.

Tropaeum , voyez Capucine.

Trucheron , voyez Millepertuis.

Truffe , voyez Patate.

Tuber , voyez Truffe.

Tue-brebis , voyez *Graslette*.
Tue-chien , voyez *Colchique*.
Tue-loup , voyez *Aconit*.
Tulippa , voyez *Tulipe*.
Turbith bâtard , voyez *Thalpsie*.
Turquet , voyez *Bled de Turquie*.
Turquette , voyez *Herniole*.
Turritis , voyez *Tourrette*.
Tussilagé , voyez *Tussilage*.
Tussilago , voyez *Petasite* , *Tussilage*.
Typha , voyez *Masse d'eau*.

V.

VACCINIUM , voyez *Airelle* , *Canneberge*.
Valentia , voyez *Croisette*.
Valeriana , voyez *Doucette* , *Valeriane* , *Nard celtique*.
Vence , voyez *Pervenche*.
Veraire , voyez *Ellebore blanc*.
Veratrum , voyez *Ellebore blanc*.
Verbascum , voyez *Blattaite* , *Bouillon blanc*.
Verbena , voyez *Verveine*.
Verdelle , voyez *Olivier*.
Vergne , voyez *Aulne*.
Vermiculaire âcre , voyez *Illecebra*.
Verne , voyez *Aulne*.
Veronica , voyez *Beccabunga* , *Véronique*.
Véronique d'eau , voyez *Beccabunga*.
Verrucaire , voyez *Hélianthème*.
Versailles , voyez *Laitue*.
Vesce noire , voyez *Eris*.
Vesse de loup , voyez *Boviste*.
Viburnum , voyez *Viourne*.
Vicia , voyez *Vesce* , *Vesce-ron*.
Vigne sauvage , voyez *Lambrusque*.
Vigne de Judée , voyez *Douce-amère*.
Vignoble , voyez *Mercuriale*.

Vioche , voyez Clématite.

Vinca , voyez Pervenche.

Viorne , voyez Clématite.

Viola , voyez Pensée.

Violier bulbeux , voyez Perceneige.

Violette de Février , voyez Perceneige.

Violette tardive , voyez Pêcher.

Violette de Damas , voyez Julienne.

Virga aurea , voyez Conyse , Verge d'or.

Virgoulense , voyez Poirier.

Viscum , voyez Gui.

Visnague , voyez Bisnague.

Vitis , voyez Lambrusque.

Vitis idæa , voyez Airelle.

Vitis vinifera , voyez Vigne.

Ulex , voyez Jonc marin.

Ulmaria , voyez Reine des prés.

Ulva , voyez Boyau de chat.

Volet , voyez Nénuphar.

Vouëde , voyez Guëde.

Urtica , voyez Ortie.

Uva ursi , voyez Buëserole.

Vulneraria , voyez Vulnéraire.

Volvaire , voyez Patte d'oie.

X.

XANTHIUM , voyez Lampourde.

Xeranthemum , voyez Xeranthème.

Xilosteon , voyez Xilosteon.

Y.

YVET , voyez Orme.

Z.

ZEA, voyez Bled de Turquie, Epeautre.

Ziziphus, voyez Jujubier.

Zoute, voyez Choux.

TABLE DES MALADIES

*Pour lesquelles on a indiqué des plantes
dans cet Ouvrage.*

A.

ABSCESS, Tome I. pages 261, 272, 416, 594. T. III.
389.

Abscès du foie, T. II. 348.

Abscès internes, T. III. 280.

Acretés des humeurs, T. II. 487.

Acretés de poitrine, T. III. 296.

Affections catharreuses, T. III. 111.

Affections de la tête, T. III. 163.

Affections du cerveau, T. I. 183.

Affections hypocondriaques, T. II. 281.

Affections hystériques, T. II. 330, 452, 504.

Affections nerveuses, T. III. 153.

Affections de poitrine, T. I. 499.

Affections soporeuses, T. I. 499, 541. T. II. 183. T. III.
167, 253, 504.

Aigreurs d'estomac, T. II. 328.

Angine, T. I. 213, T. III. 98.

Ankyloses, T. I. 248. T. II. 193. T. III. 193.

Anus, T. I. 446.

Aphthes, T. III. 131.

Aphthes ulcérés de la gorge, T. III. 430.

- Apoplexie , T. I. 307 , 541. T. II. 134 , 309 , 358 , 361 , 513. T. III. 163 , 167 , 262 , 299 , 330 , 502 , 516.
- Aposthumes , T. I. 499. T. III. 110.
- Apretés de la peau , T. I. 252.
- Ardeur d'urine , T. I. 64 , 360 , 506. T. II. 112 , 219 , 295 , 304 , 388.
- Assoupissement , T. III. 262.
- Asthme , T. I. 79 , 83 , 91 , 92 , 138 , 201 , 258 , 283 , 455 , 489 , 499 , 527 , 554 , 573 , 574 , 597 , 624. T. II. 38 , 39 , 40 , 115 , 134 , 183 , 228 , 273 , 281 , 328 , 331 , 439 , 478 , 495 , 505 , 577 , 608. T. III. 3 , 37 , 41 , 188 , 282 , 339 , 358 , 359 , 421 , 425 , 430 , 437.
- Atrophie , T. I. 386.
- Avortement , T. I. 188. T. II. 646.

B.

- B**ÉGAYEMENT , T. II. 183.
- Blessures , T. I. 184 , 500. T. II. 335 , 415 , 439 , 494 , 573. T. III. 43 , 135 , 164 , 239 , 360 , 361 , 441.
- Blessures internes , T. III. 135.
- Bouffissure , T. I. 284 , 290.
- Bourdonnement d'oreille , T. II. 560.
- Bruissement , T. II. 438.
- Brûlure , T. I. 42 , 124 , 151 , 444 , 493 , 603. T. II. 2 , 147 , 229 , 399 , 429 , 452. T. III. 43 , 244 , 374 , 388.
- Bubons , T. II. 578. T. III. 126.

C.

- C**ACHEXIE , T. I. 214 , 218 , 647 , 516 , 527 , 567. T. II. 60 , 282 , 391 , 608. T. III. 80.
- Calcul , T. I. 6 , 71 , 97 , 98 , 116 , 126 , 134 , 138 , 149 , 155 , 210 , 278 , 432 , 469 , 534. T. II. 38 , 87 , 391 , 560. T. III. 437.

Cancer,

Cancer, T. I. 24, 35, 42, 124, 164, 171, 173, 341, 415, 421, 457, 515. T. II. 89. T. III. 164, 305, 361, 431, 438.

Cancer des narines, T. I. 343.

Cancers ulcérés, T. I. 279.

Cardialgie, T. I. 35.

Carreau, T. II. 252.

Catharres, T. I. 177, 244, 567. T. II. 42, 361. T. III. 84, 299, 364.

Cataracte, T. I. 573. T. II. 188.

Chancres, T. I. 226. T. II. 611.

Chancres de la bouche, T. III. 239.

Charbon, T. I. 24. T. II. 128. T. III. 43, 322, 361.

Charbons pestilentiels, T. III. 126.

Chassie, T. II. 190.

Chlorosis, T. I. 92. T. II. 292. T. III. 222.

Chute, T. I. 178.

Chute des cheveux, T. I. 261.

Cloux, T. II. 516. T. III. 43.

Cochemar, T. II. 643.

Colique, T. I. 6, 42, 55, 64, 71, 83, 134, 288, 297, 369, 377, 387, 516, 573, 593, T. II. 40, 252, 257, 304, 309, 405, 410, 497, 506. T. III. 126, 154, 383.

Colique convulsive, T. I. 79.

Colique d'estomac, T. II. 466.

Colique hystérique, T. II. 292.

Colique néphrétique, T. I. 32, 98, 237, 253, 254.

Colique des peintres, T. II. 410.

Colique du Poitou, T. II. 466.

Colique ventreuse, T. I. 8, 41, 283, 574. T. II. 134, 196, 305, 327, 331, 466, 532, 535. T. III. 301, 370.

Colique utérine, T. II. 348.

Condilomes, T. III. 482.

Consumption, T. II. 211.

Constipation, T. I. 252. T. II. 360.

- Contusions, T. I. 126, 130. T. II. 89, 335, 336, 375, 573. T. III. 100, 164, 235, 247.
- Convulsions, T. I. 35, 66, 537, 541. T. II. 216, 466, 643.
- Cequeluche, T. I. 24. T. III. 41, 130.
- Corrosion des gencives, T. I. 213.
- Cors, T. I. 42. T. III. 322.
- Coups de soleil, T. II. 494.
- Cours de ventre, T. I. 88, 147, 164, 369, 478, 486, 506, 577, 583. T. II. 51, 275, 334, 529, 570, 580, 594. T. III. 98, 108, 111, 129, 135, 179, 286, 288, 341, 364, 374, 437, 482.
- Crachement de sang, T. I. 37, 178, 187, 204, 222, 226, 231, 295, 360, 369, 374, 386, 462, 579. T. II. 89, 128, 327, 336, 375, 495, 533, 560, 598, 611. T. III. 81, 101, 104, 111, 133, 148, 179, 238, 275, 286, 297, 363, 399, 437.
- Crête de fondement, T. III. 126.
- Crevasse de mammelles, T. I. 444.

D.

- D**ARTRES, T. I. 161, 363, 389, 415, 429, 462, 546, 551, 630, 647. T. II. 36, 177, 221, 264, 525, 575. T. III. 99, 280, 361, 366, 372, 482.
- Défaillance, T. II. 307, 363. T. III. 164.
- Dégoutir, T. II. 69. T. III. 167.
- Délire, T. II. 147.
- Délire mélancholique, T. III. 506, 508.
- Démangeaisons de la peau, T. I. 551. T. III. 76, 482.
- Dents gâtées, pourries & cariées, T. I. 215. T. II. 437, 439. T. III. 482.
- Descente de l'anüs, T. III. 47.
- Descente, T. II. 486.
- Descente des enfans, T. III. 277.
- Descente de matrice, T. II. 146.
- Dévolement, T. II. 389, 502. T. III. 313.

Diarrhée, T. I. 52, 83, 178, 219, 428, 476, 507.

T. II. 70, 375. T. III. 22, 148, 162, 179, 313, 320,
340, 432.

Difficulté de respirer, T. I. 83, 295.

Difficulté d'uriner, T. II. 579. T. III. 433.

Dislocations, T. III. 181.

Douleurs de côté, T. I. 178, 527.

Douleurs d'oreilles, T. I. 184. T. II. 227, 328.

Douleurs de ventre, T. I. 204. T. III. 110.

Douleurs après l'accouchement, T. I. 277.

Douleurs des reins, T. I. 573.

Douleurs de dents, T. II. 227, 478. T. III. 100.

Douleurs des jambes, T. I. 381.

Douleurs internes, T. II. 400.

Douleurs du bas-ventre, T. II. 400.

Douleurs de rate, T. II. 525.

Douleurs de tête, T. III. 433.

Douleurs rhumatifantes, T. I. 28.

Durétés, T. III. 110.

Durétés de la rate, T. III. 37. 286.

Durétés des mammelles, T. II. 399, 573.

Durétés du ventre, T. II. 213.

Durillons de mammelles, T. I. 173.

Dysenterie, T. I. 30, 37, 52, 61, 64, 65, 147, 164,
171, 178, 187, 204, 205, 219, 226, 231, 369,
374, 462, 464, 476, 506, 516, 597. T. II. 77, 89,
150, 336, 375, 389, 405, 415, 502, 511, 535,
570, 575, 594, 598, 611. T. III. 81, 92, 98, 101,
102, 111, 135, 148, 162, 183, 235, 238, 275,
340. 362, 388, 433, 437. 482, 483.

Dysenterie bilieuse, T. III. 483.

Dysurie, T. I. 464.

E.

EBULLITION de sang, T. II. 526.

Echymoses, T. II. 115.

Ecoulemens de la matrice, T. II. 527.

Ectouelles, T. I. 254, 261, 389, 491, 520, 523, 597.

T. II. 49, 56, 63, 139, 147, 221, 277, 567, 646,

T. III. 74, 131, 163, 183, 292, 400.

Effervescence de sang, T. II. 69. T. III. 79.

Effervescence des humeurs, T. III. 67.

Embarras du foie, T. II. 608.

Empiémie, T. III. 359.

Enfant mort, T. I. 91.

Enflure, T. II. 389. T. III. 110.

Enflure des gencives, T. I. 99.

Engelures, T. II. 384, 439. T. III. 43, 131.

Engorgemens du toie, T. I. 342.

Engourdissemens, T. I. 183. T. III. 485, 516.

Enrouement, T. I. 415, 594. T. II. 535. T. III. 76, 430.

Entorses, T. I. 462. T. III. 181, 366.

Epilepsie, T. I. 24, 80, 179, 233, 245, 277, 307, 486, 489. 538, 541, 597. T. II. 79, 182. 193, 221, 279, 299, 361, 405, 466, 513. T. III. 34, 107, 126, 153, 163, 189, 299, 359, 366, 374, 425, 427.

Epilepsie utérine, T. III. 426.

Erépisées, T. I. 290, 630. T. II. 147, 292, 526, 567. T. III. 74, 186, 296, 359, 482.

Eternuement, T. II. 221.

Etourdissemens, T. I. 183, 245. T. II. 79. T. III. 164, 436, 516.

Etranglement de matrice, T. II. 55.

Excoriation de la gorge, T. III. 400.

Excoriation du palais, T. III. 101.

Exomphale, T. III. 239.

Exostoses, T. II. 567.

Extinction de voix, T. I. 597. T. III. 222, 430.

F.

Feu volage, T. I. 647.

Fièvres, T. I. 6, 154, 184, 242, 323, 464, 541. T. II. 405. T. III. 144, 362, 383, 502.

Fièvres ardentes, T. I. 64, 428. T. II. 146, 388. T. III. 102, 275.

Fièvres bilieuses, T. II. 502.

Fièvres chaudes, T. III. 79.

Fièvres colliquatives, T. I. 623.

Fièvres intermittentes, T. I. 9, 87, 92, 146, 177, 214, 244, 253, 260, 267, 334, 523, 567, 361, 445, 516, 631. T. II. 47, 49, 60, 146. T. III. 106, 111, 148, 322, 327, 366, 380, 440, 608.

Fièvres malignes, T. I. 85, 156, 309, 334, 444. 523, 572. T. II. 70, 208, 384, 431, 495, 577. T. III. 117, 135, 322, 366, 437, 505.

Fièvres lentes, T. I. 261. T. II. 147.

Fièvres pourprées, T. I. 79, 516.

Fièvres pestilentiellles, T. II. 463. T. III, 505.

Fièvres putrides, T. I. 603. T. III. 505.

Fièvres quartes, T. I. 24, 335, 527. T. II. 126. T. III. 37, 380.

Fièvres tierces, T. I. 290. T. II. 498, 594. T. III. 163, 427.

Fistules, T. I. 164, 334, 415. T. III. 164.

Fistule lacrymale, T. I. 416.

Fleurs blanches, T. I. 31, 69, 226, 342, 369, 456, 495, 623, 597. T. II. 177, 308, 327, 328, 334, 575, 600. T. III. 75, 81, 108, 163, 180, 238, 262, 297, 362, 363, 388, 394, 399, 524.

Flux, T. I. 52, 187, 233, 374, 387. T. II. 70, 211, 355, 405, 506, 527, 611. T. III. 97, 107, 148, 362.

Flux de sang, T. I. 88. T. II. 86, 328, 334, 575. T. III. 313, 333, 364.

Flux hémorrhoidal, T. I. 538. T. III. 148.

Flux céliaque, T. I. 597.

Flux menstruel & immodéré, T. II. 535, 598. T. III. 111.

Flux menstruel supprimé, T. III. 221, 222.

Fluxions, T. I. 171, 177. T. II. 150, 190, 387. T. III. 299, 302.

Fluxion catharreuse, T. I. 261.

Fluxion des yeux, T. I. 542. T. III. 293.

Fluxions froides, T. I. 233.

Fluxions de la gorge, T. II. 384.

Fluxions de poitrine, T. II. 532, 533. T. III. 484.

Foiblesse d'estomac, T. III. 262.

Folie, T. I. 538, 548.

Foulure, T. I. 38. T. III. 366.

Fracture, T. II. 567. T. III. 223.

Furoncles, T. I. 222, 499. T. II. 506. T. III. 484.

G.

GALLE, T. I. 42, 91, 156, 202, 209, 214, 294, 389, 464, 496, 504, 538. T. II. 108, 221, 264, 411, 525, 526, 570. T. III. 74, 94, 164, 191, 293, 361, 438.

Gangrène, T. I. 10, 55, 299, 310. T. II. 128. T. III. 67, 164, 361, 421.

Gencives ulcérées, T. II. 275.

Gerçures des lèvres, T. III. 43.

Gerçures des mains, T. III. 366.

Glaïres, T. II. 641.

Glandes, T. III. 110.

Gonflement de la rate, T. III. 441.

Gonorrhée, T. I. 38, 147, 187, 623, 308. T. II. 112, 114, 127, 295, 334, 509, 645. T. III. 81.

Gonorrhée virulente, T. I. 506. T. III. 247.

Goutte, T. I. 42, 100, 154, 183, 205, 254, 295, 309, 415, 489, 493, 504, 527. T. II. 30, 42, 49,

- 146, 156, 157, 193, 208, 229, 257, 292, 335, 362, 391, 404, 495. T. III. 76, 282, 298, 302, 341, 364, 370, 525, 526.
- Goutte sciatique, T. I. 32. T. II. 216, 535. T. III. 503.
- Gratelle, T. I. 499. T. II. 264, 570. T. III. 110, 438.
- Gravelle, T. I. 138, 237, 278, 597. T. II. 63, 84, 112, 139, 495, 506, 611. T. III. 324, 363, 433, 482.
- Gravier, T. II. 410, 417. T. III. 41, 341, 397.

H.

H A L E, T. I. 88. T. III. 283.

Hémorrhagies, T. I. 35, 154, 164, 219, 226, 231, 335, 462, 478, 506, 579. T. II. 70, 150, 211, 275, 334, 399, 452, 495, 575, 593, 594, 600. T. III. 70, 81, 97, 108, 148, 161, 179, 238, 262, 388, 399, 363, 374, 433, 505.

Hémorrhagies du nez, T. II. 375, 532.

Hémorrhagies utérins, T. I. 538.

Hémorrhoides, T. I. 6, 88, 91, 98, 124, 148, 161, 186, 204, 205, 236, 254, 255, 297, 364, 444, 577. T. II. 146, 208, 216, 252, 334, 341, 375, 399, 439, 494, 535, 581. T. III. 3, 6, 43, 81, 111, 126, 135, 292, 293, 298, 333, 363, 395, 398, 526.

Hernie, T. I. 98, 462, 495, 597. T. II. 93, 114, 415, 494, 529, 646. T. III. 81, 111, 148, 283, 360, 363.

Hétisie, T. III. 161.

Hoquet, T. I. 83. T. II. 327, 328.

Humeurs froides, T. II. 336. T. III. 164.

Hydrocécé, T. I. 456, 568.

Hydropisie, T. I. 25, 42, 107, 164, 214, 242, 258, 290, 291, 297, 307, 310, 363, 447, 455, 471, 489, 490, 499, 523, 527, 567, 579, 630. T. II. 30, 35, 42, 60, 63, 70, 94, 126, 134, 139, 150,

156, 253, 348, 391, 439, 512, 527, 594. T. III.
 37, 76, 117, 157, 263, 311, 322, 336, 340, 366,
 373, 380, 421, 440, 484, 502, 524, 525, 526.
 Hydropisie ascite, T. I. 72, 482.
 Hydropisie anasarque, T. I. 283, 284.
 Hypocondriacé, T. I. 386, 499. T. II. 335, 452.

I.

J AUNISSE, T. I. 8, 71, 98, 138, 198, 214, 242,
 260, 283, 284, 290, 293, 297, 310, 363, 464,
 471, 516, 623. T. II. 30, 94, 112, 156, 213, 281,
 384, 503, 525, 527, 594, 608. T. III. 37, 41, 76,
 111, 163, 297, 304, 322, 366, 425, 437, 440,
 524.

Îlète, T. I. 647.

Incontinence d'urine, T. I. 187. T. II. 331, 334.

Incube, T. II. 643.

Indigestions, T. I. 288. T. II. 308, 358, 478. T. III.
 167, 262.

Inflammation, T. I. 220, 516. T. II. 304, 399. T. III.
 186, 235, 244, 383, 421, 505.

Inflammations des amygdales, T. I. 213. T. III. 253.

Inflammations du bas-ventre, T. II. 304, 305.

Inflammations du foie, T. I. 37.

Inflammations des glandes, T. I. 222.

Inflammation du gosier, T. II. 452. T. III. 92.

Inflammation de la gorge, T. I. 72, 131, 415. T. II.
 88. T. III. 341, 400.

Inflammation des mammelles, T. I. 416.

Inflammation des parties génitales, T. II. 277.

Inflammation de la rate, T. I. 37. T. III. 482.

Inflammation des reins, T. I. 64. T. II. 102, 388.

Inflammation du scrotum, T. III. 525.

Inflammation des testicules, T. III. 525.

Inflammation de la trachée artère, T. I. 72.

Inflammation de la vessie, T. I. 64. T. III. 324.

Inflammation des viscères, T. I. 537.

Inflammation des yeux, T. I. 198, 252, 444, 493. T. II. 115, 188, 251, 276. T. III. 74, 101, 102, 111, 126, 148, 322, 342.

Insomnie, T. III. 275.

Ischurie, T. II. 467, 513. T. III. 431.

L.

LADRERIE, T. II. 496.

Lait coagulé, T. I. 576. T. III. 296, 298.

Langueurs hystériques, T. III. 504.

Larmolement, T. II. 190.

Lentilles, T. III. 283.

Lépre, T. I. 415.

Léthargie, T. II. 309, 358. T. III. 330, 502.

Leucophlegmatie, T. I. 455. T. II. 94. T. III. 482.

Lochies supprimées, T. I. 70. T. III. 75.

Loupes, T. I. 80, 297, 491. T. II. 127, 496. T. III. 193.

Luxation, T. I. 38, 462. T. II. 381.

M.

MALADIES chroniques, T. I. 8, 180, 489, 541. T. II. 126, 403, 509. T. III. 245, 302, 437.

Maladies de cerveau, T. II. 307.

Maladies du bas-ventre, T. III. 365.

Maladies des femmes, T. III. 4.

Maladies des enfans, T. II. 526.

Maladies convulsives, T. III. 504.

Maladies inflammatoires, T. I. 218.

Maladies inflammatoires du bas-ventre, T. II. 570.

Maladies inflammatoires de poitrine, T. III. 40.

Maladies hypocondtiagues, T. I. 231. T. III. 489.

Maladies hystériques, T. I. 233.

- Maladies du foie, T. I. 177, 179, 226, 290. T. II. 35, 108, 213, 286, 326. T. III. 297.
- Maladies des intestins, T. II. 40.
- Maladies de poitrine, T. I. 154, 204, 249, 283, 415, 602. T. II. 598. T. III. 279, 282, 286, 421.
- Maladies des poumons, T. I. 593. T. II. 115, 533. T. III. 222, 430, 431.
- Maladies de l'estomac, T. II. 40, 196. T. III. 221.
- Maladies de matrice, T. I. 260.
- Maladies de la peau, T. I. 205, 215, 225, 516. T. II. 18, 213, 570, 585. T. III. 37, 157, 302, 361.
- Maladies de la rate, T. I. 36, 290, 309. T. II. 35, 108, 139, 196, 213, 273, 286, 516.
- Maladies des reins, T. I. 260, 593. T. II. 40, 177, 273, 310. T. III. 117, 133.
- Maladies populaires, T. I. 461.
- Maladies du méésentère, T. II. 35.
- Maladies des mammelles, T. III. 131.
- Maladies des nerfs, T. II. 183, 497.
- Maladies de l'utérus, T. II. 292, 643.
- Maladies de la vessie, T. I. 593. T. II. 196, 273. T. III. 117, 133.
- Maladies soporeuses, T. III. 359.
- Maladies des yeux, T. I. 516. T. II. 497. T. III. 179, 189, 394, 432, 441.
- Maladies vénériennes, T. I. 126, 154, 233, 631. T. II. 42, 375. T. III. 302.
- Mal caduc, T. II. 307.
- Manie, T. I. 541. T. II. 335, 336, 505, 506, 508.
- Maux de dents, T. I. 515. T. II. 513. T. III. 164, 388.
- Maux de gorge, T. I. 38, 164, 369, 594. T. II. 69, 512, 513, 529. T. III. 239, 441.
- Maux de tête, T. I. 54, 83, 243. T. II. 404, 405, 573. T. III. 144, 153.
- Maux de ventre, T. I. 360.
- Mélancholie, T. I. 217, 218, 231, 538, 571. T. II. 193, 309, 336.

Membres luxés, T. I. 149.

Ménstrues, T. II. 560.

Mentruisures, T. I. 297. T. III. 43, 100, 181, 282, 283.

Migraine, T. I. 10, 183, 184, 245, 290. T. II. 182, 229, 439, 579. T. III. 6, 84, 182, 339, 436, 441.

Morsures, T. I. 59, 205, 221. T. II. 328, 350, 438, 508.

Morsures de chiens enragés, T. I. 360, 534.

Morsures de serpens, T. II. 273.

Morsures de vipères, T. I. 85, 415, 428. T. III. 336.

Morsures venimeuses, T. II. 567.

Mouvements convulsifs, T. I. 94, 216, 307, 516. T. II. 182, 183, 335. T. III. 286, 425.

Mouvements spasmodiques, T. II. 463.

N.

NAUSÉES, T. II. 70, 196.

Néphrétique, T. I. 55, 64, 126, 210, 277, 307, 361, 429, 471, 516, 527, 573. T. II. 39, 40, 77, 84, 112, 133, 305, 404, 410, 439, 535, 575. T. III. 94, 107, 148, 433, 437, 514.

O.

OBSTRUCTIONS, T. I. 183, 214, 218, 260, 386, 429, 469, 506, 527, 623. T. II. 115, 196, 205, 293, 328, 643. T. III. 37, 67, 289, 424, 358, 366, 433, 437, 503.

Obstructions du foie, T. I. 8, 24, 264, 284, 295, 455. T. II. 88. T. III. 41, 111, 163, 286, 524.

Obstructions du bas-ventre, T. II. 30.

Obstructions de la matrice, T. I. 30, 575. T. III. 298.

Obstructions de la rate, T. I. 8. T. II. 389. T. III. 111, 163, 525, 364.

Obstructions des viscères, T. I. 35, 91, 138. T. II. 156.

Ixxv] T A B L E S.

Odontalgie, T. I. 630. T. II. 43.

Œdème, T. III. 482.

Ophthalmie, T. II. 190, 275, 497.

Oppression de poitrine, T. III. 97.

Orthopnée, T. I. 201.

P.

PALES couleurs, T. I. 290, 293, 297, 363, 567.
T. II. 112, 282, 358, 391, 527, 608. T. III. 322,
366, 440.

Palpitation, T. I. 35, 218, 231, 537. T. II. 307. T. III.
179, 286.

Panaris, T. III. 126, 388.

Paralytie, T. I. 28, 138, 183, 247, 264, 307, 489,
527. T. II. 156, 182, 183, 196, 252, 307, 358,
360, 361, 363, 391. T. III. 84, 163, 167, 191,
241, 262, 302, 322, 330, 370, 374, 395, 502,
503, 516.

Parotides, T. II. 264.

Passion hystérique, T. I. 35, 92, 138, 218, 247, 255,
293, 489. T. II. 281, 329, 331, 497. T. III. 131,
153, 154, 164, 180, 336, 360, 425, 521.

Passion hypocondriaque, T. III. 164.

Passion iliaque, T. II. 252. T. III. 360.

Péripleurmonie, T. I. 64, 218.

Pertes de sang, T. I. 147, 167, 178, 187, 222, 226,
369, 504, 506. T. II. 51, 89, 177, 211, 334, 355,
375, 415, 486, 509, 532, 600. T. III. 79, 81, 108,
148, 161, 181, 238, 239, 276, 285.

Peste, T. I. 79, 334, 469, 597. T. II. 350, 438, 440,
503. T. III. 151, 437.

Petite vérole, T. I. 65, 66, 72, 73, 156, 309, 334,
572. T. II. 190, 208, 323, 495, 573, 577. T. III.
152, 223, 289, 322.

Phrénésie, T. III. 183.

Phthyie, T. I. 226, 266, 309, 516, 577. T. II. 211,
228, 594. T. III. 259, 437, 505.

- Picotement de venue , T. I. 360.
 Pienne , T. I. 32 , 116 , 154 , 276. T. II. 93 , 506 , 538.
 T. III. 94 , 111.
 Piquures ; T. I. 80 , 232.
 Piquures de mouches , T. II. 329.
 Piquures de scorpions , T. II. 216.
 Piquures de tendons , T. III. 43.
 Pissemens de pus , T. III. 81.
 Pissemens de sang , T. I. 35 , 210 , 219 , 247 , 369 , 374.
 Plaies , T. I. 50 , 222 , 226 , 232 , 290 , 308 , 500 , 502 ,
 529 , 567. T. II. 92 , 276 , 277 , 334 , 415 , 494 ,
 579 , 611. T. III. 67 , 148 , 239 , 247 , 262 , 286 ,
 360 , 361 , 520.
 Plaies des tendons , T. II. 2 , 235.
 Pleurésie , T. I. 11 , 64 , 155 , 218 , 254 , 298 , 334 ,
 335 , 342 , 415 , 486. T. II. 89 , 252 , 336 , 355 , 495 ,
 503 , 532 , 533 , 568. T. III. 3 , 97 , 104 , 133 , 241.
Plica Polonica , T. I. 18.
 Poison , T. I. 597. T. II. 451. T. III. 131.
 Pollutions nocturnes , T. I. 623.
 Polypes , T. II. 608.
 Polypes du nez , T. I. 499.
 Porreaux , T. III. 193.
 Poux , T. I. 25 , 648. T. II. 183 , 573. T. III. 361.
 Priapisme , T. III. 362.
 Puanteur , T. I. 42. T. III. 163.
 Puces , T. III. 361 , 365.
 Pulmonie , T. III. 161.
 Punaises , T. III. 365.

R.

- R**AGE , T. I. 59 , 236 , 541.
 Régles immodérées , T. III. 98.
 Relâchement de l'anüs , T. I. 38.
 Relâchement de la luette , T. III. 253.
 Relâchement de la matrice , T. I. 38.
 Relâchement scorbutique des gencives , T. III. 400

Rétention d'urine, T. I. 98, 198, 254, 335, 429, 516.
T. II. 65, 133, 309, 310, 355, 478, 495, 611. T. III.
363, 437, 514, 516.

Rhumatisme, T. I. 184, 233, 247, 254, 334, 342,
415, 504. T. II. 35, 156, 182, 198, 208, 229,
335, 336, 391, 452, 492, 495, 535. T. III. 84,
365, 485, 503, 525.

Rhumes, T. I. 64, 121. T. II. 77, 281, 388, 532. T. III.
134, 299, 421.

Rhumes de cerveau, T. II. 279, 478. T. III. 102.

Rhumes opiniâtres, T. II. 532. T. III. 130.

Rougeole, T. I. 72, 334, 572. T. II. 208, 495, 573.

Rougeurs, T. I. 88, 198. T. III. 394.

Rouffeurs du visage, T. I. 583.

S.

Saignement du nez, T. I. 220. T. II. 218.

Sang grumelé, T. I. 521. T. III. 363.

Sanie des yeux, T. III. 482.

Sarcocolle, T. I. 97.

Schiste du foie, T. I. 500. T. II. 281. T. III. 286.

Schiste, T. III. 304.

Scliatique, T. I. 126, 184, 242, 254, 295, 490. T. II.
156, 336, 362, 391, 452, 515. T. III. 157, 370.

Scorbut, T. I. 24, 30, 42, 72, 99, 161, 180, 188,
202, 210, 213, 215, 335, 499, 647. T. II. 90, 358,
374, 502, 526, 608. T. III. 37, 75, 153, 262, 244,
277.

Scrophules, T. III. 322, 370.

Sécheresse de la gorge, T. II. 560.

Spasmes, T. I. 126, 245, 253. T. II. 122, 466.

Sphacèle, T. I. 92.

Squinancie, T. I. 38, 72, 476. T. II. 146, 410, 532.
T. III. 342, 505.

Stérilité, T. I. 439, 464.

Strangurie, T. I. 210, 277, 374, 573.

Suffocations , T. I. 337.

Suffocations de matrice , T. I. 94, 179. T. II. 403. T. III. 155, 341.

Suppressions des lochies, T. I. 69, 91, 201, 260, 490. T. II. 282.

Suppression des mois, T. I. 30, 91, 98, 201, 260, 264, 276, 310, 469, 490. T. II. 279, 281, 309, 330, 331, 478. T. III. 262, 321, 366.

Suppression des urines, T. II. 279, 310, 331, 384, 478. T. III. 262.

Superpurgation, T. I. 337.

Surdité, T. I. 69, 184.

Syncope, T. I. 626. T. III. 179, 504.

T.

TACHES de la cornée, T. III. 280.

Taches de la peau, T. III. 283, 438.

Taches de petite vérole, T. III. 186.

Taches du visage, T. I. 330, 383. T. II. 323, 381. T. III. 193.

Taies des yeux, T. I. 198, 361. T. II. 497.

Teigne, T. I. 42, 261, 490, 496. T. II. 41, 66, 77, 127, 190, 227, 264. T. III. 145, 241, 366.

Tenisme, T. I. 204, 374. T. II. 335. T. III. 102.

Toux, T. I. 64, 204, 261, 283, 293, 295, 516, 541, 567, 573, 574, 624. T. II. 38, 115, 150, 151, 212, 273, 281, 328, 384, 405, 472, 495, 512, 532, 535, 577, 579, 608. T. III. 34, 37, 67, 111, 186, 228, 359, 370, 430, 437.

Toux catharrale, T. I. 31.

Toux convulsive, T. I. 506. T. III. 76.

Toux férine, T. III. 130.

Torticolis, T. II. 279.

Tranchées, T. I. 30, 42, 64, 377. T. II. 149, 229, 579. T. III. 503.

Tranchées des femmes, T. I. 69.

Tranchées des enfans , T. II. 328, 384.

Tremblemens , T. I. 184, 415, 557. T. II. 156, 183, 279. T. III. 394, 425.

Tremblemens de nerfs , T. II. 335.

Tumeurs , T. I. 100, 248, 519, 530, 583, 594. T. II. 127, 177, 257, 276, 281, 305, 498, 503, 506. T. III. 223, 262, 296, 298, 322, 364, 529.

Tumeurs des bourses , T. I. 38.

Tumeurs œdémateuses , T. I. 247.

Tumeurs froides , T. II. 496.

Tumeurs lymphatiques , T. II. 190.

Tumeurs des mammelles , T. I. 523, 530. T. II. 293, 300. T. III. 145, 431.

Tumeurs du foie , T. III. 191.

Tumeurs schirreuses , T. I. 457.

Tumeurs scrophuleuses , T. I. 491, 519. T. II. 66, 172, 264. T. III. 145, 293.

Tumeurs de la rate , T. II. 139. T. III. 41.

Tumeurs du scrotum , T. I. 568. T. III. 126.

Tumeurs des testicules , T. I. 30. T. III. 34.

Tumeurs des yeux , T. III. 370.

Tympanite , T. II. 305.

V.

VAPEURS , T. I. 127, 180, 184, 245, 489. T. II. 182, 292, 309, 328, 497, 506. T. III. 143, 262, 330.

Venin , T. I. 259. T. II. 340, 348.

Vents , T. III. 36.

Vers , T. I. 35, 85, 92, 107, 415, 603. T. II. 292, 336, 411, 451, 559. T. III. 79, 100, 193, 241, 292, 297, 324, 363.

Vers de l'oreille , T. II. 43.

Vers solitaire , T. II. 227, 411. T. III. 37.

Vérole , T. I. 47, 57. T. III. 364.

Verrues , T. III. 193, 322, 379.

Vertige :

Vertige, T. I. 489. T. II. 79, 183, 279, 307, 328, 361, 513. T. III. 84, 163, 164, 193, 262, 286, 366, 374.

Ulcères, T. I. 24, 55, 91, 92, 149, 156, 222, 226, 236, 308, 345, 415, 441, 476, 480, 506, 519, 529, 546. T. II. 47, 146, 180, 229, 336, 400, 415, 498, 578, 579, 594, 611. T. III. 43, 67, 79, 135, 148, 286, 322, 329, 360, 361.

Ulcères cancéreux, T. I. 335. T. II. 87. T. III. 395.

Ulcères carcinomateux, T. I. 173. T. III. 291.

Ulcère de la bouche, T. I. 252. T. III. 111, 239, 441.

Ulcère de la gorge, T. I. 72. T. III. 183, 400.

Ulcère des gencives, T. III. 300.

Ulcères fistuleux, T. I. 88.

Ulcères internes, V. I. 50, 184. T. II. 494. T. III. 239, 280.

Ulcères malins, T. I. 342.

Ulcères des poutmons, T. I. 462. T. III. 188, 437.

Ulcères de poitrine, T. III. 247.

Ulcères des jambes, T. III. 438.

Ulcères des prostatas, T. III. 247.

Ulcères des reins, T. I. 432, 462. T. III. 111, 247.

Ulcères sordides, T. I. 496.

Ulcères de vessie, T. III. 247.

Ulcères des vésicules séminales, T. III. 247.

Ulcères vénériens, T. II. 347.

Vomissement, T. I. 10, 259, 307, 444. T. II. 70, 114, 253, 328, 405, 466. T. III. 111, 297.

Vomissement bilieux, T. I. 187.

Vomissement de sang, T. II. 327.

Vomica, T. III. 276, 359.

Vue affoiblie, T. I. 574.



T A B L E

Des plantes qui conviennent aux animaux domestiques , tant pour alimens que pour médicamens.

Tome I.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| A BSYNTHÉ , page 11. | Bardane , 156. |
| Acacia , 16. | Becabunga , 161. |
| Agripaulme , 36. | Bec de grue , 165. |
| Aigremoine , 38. | Belladonna , 172. |
| Ail , 43. | Belle de nuit , 175. |
| Alcée , 48. | Benoitte , 178. |
| Algue , 49. | Berle , 181. |
| Alpiste , 56. | Bétoine , 184. |
| Alysson , 60. | Bistorte , 188. |
| Amandes , 66. | Bléd de Turquie , 193. |
| Ammi , 69. | Bourrache , 219. |
| Ancholie , 73. | Bourse à pasteur , 220. |
| Angélique , 79. | Bruyères , 224. |
| Anthore , 85. | Bugle , 225. |
| Arboufier , 86. | Bufleroie , 237. |
| Argentine , 88. | Butome , 240. |
| Aristoloché , 92. | Cabaret , 244. |
| Armoise , 95. | Caillelait , 246. |
| Artère-bœuf , 98. | Caméleon blanc , 250. |
| Asperges , 117. | Camomille , 254. |
| Aunée , 127. | Caprier , 264. |
| Avoine , 134. | Carotte , 276. |
| Baguenaudier , 144. | Cattoubier , 281. |
| Balaustier , 147. | Carthame , 283. |
| Barbarée , 151. | Carvi , 289. |

Cassia, 291.	Gentiane, 48.
Chamaras, 310.	Germandrée, 49.
Chardon bénit, 335.	Gesse, 51.
Chardon marie, 343.	Grassette, 59.
Charme, 350.	Gratiolle, 62.
Châtaigner, 360.	Gaude, 76.
Choux, 414.	Gui, 79.
Cigœ, 422.	Herniole, 93.
Citrouille, 432.	Hêtre, 96.
Clématite, 440.	Houblon, 108.
Concombre sauvage, 457.	Houx frêlon, 111.
Confonde, 463.	Jacée, 116.
Coqueret, 472.	If, 124.
Coriandre, 474.	Ivette, 155.
Cornouiller, 478.	Laitron, 163.
Cresson, 496.	Lamier, 177.
Cresson des prés, 497.	Lavande, 183.
Cresson de fontaine, 499.	Lauréole, 188.
Cumin sauvage, 501.	Laurier, 197.
Curage, 503.	Laurier cerise, 198-200.
Digitale, 520.	Laurier rose, 202.
Dompte-venin, 523.	Lentille, 207.
Ellebore blanc, 538.	Lentisque, 210.
Ellebore noir, 542.	Liège, 226.
Endormie, 548.	Lierre terrestre, 229.
Escourgeon, 563.	Livèche, 260.
Espargoule, 564.	Luzerne, 265.
Espatule, 565.	Maceron, 274.
Fenugrec, 577.	Marguerite, 277.
Féverole, 584.	Marochemin, 282.
Filipendule, 597.	Marronnier d'Inde, 284.
Fougère, 603.	Marum, 288.
Froment, 644.	Masse au bedeau, 290.
Fumeterre, 647.	Matticaire, 293.
Fustet, 649.	Melon, 323.
	Menthe, 329.
	Meum, 331.

Tome II.

Garance, 30.

Millet, 338.
 Monnoyère, 340.
 Morsgeline, 343.
 Mouron, 350.
 Muguet, 363.
 Murier, 370.
 Nard celtique, 382.
 Navet, 388.
 Nénufar, 389.
 Nielle, 398, 399.
 Noyer, 414.
 Oenanthe, 433.
 Oranger, 467.
 Origan, 479.
 Orobanche, 491.
 Ortie, 496.
 Panais, 507.
 Panicaut, 510.
 Panis, 511.
 Pariétaire, 513.
 Passerage, 515.
 Patate, 522.
 Persil, 573.
 Piloselle, 595.
 Pied d'oiseau, 601.
 Pied de Vénus, 609.
 Plantain, 646.

Tome III.

Pois, 34.
 Polypode, 37.
 Polygale, 39.
 Pouliot, 76.
 Prele, 81.
 Pulicaire, 101.
 Pyrole, 108.

Quintefeuille, 111.
 Raigras, 123.
 Reine des prés, 135.
 Renouée, 148.
 Rhue, 152.
 Romarin, 162.
 Roquette de mer, 168.
 Rosolis, 189.
 Roulette, 190.
 Sabine, 193.
 Sainfoin, 234.
 Salade de porc, *ibid.*
 Salicaire, 235.
 Sanicle, 239.
 Santoline, 241.
 Sarrafin, 251.
 Sauge, 263.
 Saule, 275.
 Scammonée de Montpel-
 lier, 281.
 Scrophulaire, 293.
 Smilax, 303.
 Soucy, 323.
 Statice, 331.
 Sureau, 342-343.
 Tabac, 362.
 Taliétron des boutiques,
 363.
 Tamarisc, 365.
 Tanaisie, 366.
 Thym, 370.
 Tilicul, 374.
 Thlaspi, 376.
 Toque, 386.
 Tormentille, 388.
 Tréfle, 394.
 Troesne, 400.

Tuffilage, 422.
 Valériane, 429.
 Verveine, 440.

Véice, 443.
 Yeble, 526.

T A B L E

*Des plantes , arbres & arbuscles dont on a donné
 la culture.*

Tome I.

ABRICOTIER, 3.
 Absynthe, 8.
 Acacia, 13.
 Acanthe, 17.
 Ache ou Céleri, 19.
 Aconit, 27.
 Adonide, 32.
 Ail, 39.
 Aitelle, 45.
 Alaterne, 46.
 Aliboufier, 50.
 Allier, 51.
 Alleluia, 53.
 Alpisfe, 56.
 Amandier, 61.
 Amarante, 67.
 Anagyris, 70.
 Anémone, 74.
 Angélique, 77.
 Anis, 82.
 Arroche, 99.
 Artichaut, 102.
 Asperge, 109.

Aubépine, 121.
 Aubergine, 122.
 Anne, 528.
 Avoine, 132.
 Azedarach, 139.
 Azerolier, 140.
 Bacile, 141.
 Baguenandier, 142.
 Grenadier, 144.
 Basilic, 158.
 Belle de nuit, 174.
 Bellevedere, 176.
 Betterave, 184.
 Bled de Turquie, 191.
 Bluet, 197.
 Bouleau, 208.
 Bourdon, 212.
 Bourgene, 214.
 Bourrache, 217.
 Bruyère, 224.
 Buglosse, 228.
 Buis, 233.
 Buisson ardent, 237.

Calébaſſe , 248.
 Capriet , 262.
 Capécine , 265.
 Cardons , 268.
 Carotte , 271.
 Carvi , 288.
 Caſſis , 289.
 Cerfeuil , 295.
 Ceriſier , 301.
 Champignons , 314.
 Chanvre , 323.
 Chardon bénit , 334.
 Chardon à bonnetier , 338.
 Chardon marie , 342.
 Charme , 347.
 Châtaignier , 351.
 Chêne , 366.
 Chervis , 373.
 Chèvrefeuille , 376.
 Chichorée , 378.
 Chou , 399.
 Ciboule , 419.
 Cifte , 426.
 Citronier , 428.
 Citrouille , 431.
 Cive , 433.
 Clématite , 440.
 Coignafſier , 442.
 Concombre , 448.
 Coq , 466.
 Coqueret , 470.
 Coriandre , 475.
 Corne de cerf, *ibid.*
 Cornouiller , 478.
 Coudrier , 485.
 Courges , 492.
 Creſſon , 496.

Creſſon de fontaine , 498.
 Cyprès , 509.
 Cytife , 512.
 Epeautre , 549.
 Epinars , 552.
 Epine-vinette , 555.
 Erable , 559.
 Eſcourgeon , 563.
 Eſpargoule , 564.
 Eſpatule , 565.
 Fenouil , 571.
 Péve , 581.
 Péverole , 584.
 Figuier , 588.
 Fraiſier , 610.
 Framboiſier , 625.
 Frêne , 629.
 Froment , 635.
 Fuſſet , 648.
 Fuſſet des Corroyeurs , 650.

Tome II.

Garance , 3.
 Gaude , 31.
 Genêt , 35.
 Genevrier , 37.
 Girouille , 54.
 Groſeillier , 68.
 Guainier , 72.
 Guéde , 73.
 Haricot , 81.
 Hêtre , 95.
 Houblon , 99.
 Houx , 109.
 Houx frêlon , 111.
 Hyſſope , 115.

Jacinthe, 118.	Néflier, 386.
Jasmin, 121.	Nerprun, 390.
If, 124.	Nez coupé, 396.
Jonc marin, 136.	Noyer, 402.
Jonquille, 143.	Obier, 417.
Jubier, 151.	Osillet, 423.
Julienne, 152.	Oignon, 435.
Laitue, 164.	Olivier, 442.
Lavande, 181.	Oranger, 454.
Laureole, 187.	Oreille d'ours, 470.
Laurier, 194.	Orge, 474.
Laurier-cerise, 198.	Orme, 484.
Laurier-rose, 202.	Oseille, 501.
Laurier-rin, 203.	Paliure, 505.
Lentille, 207.	Panais, 507.
Lentisque, 209.	Patate, 519.
Liège, 223.	Pavot, 534.
Lilac, 230.	Pêcher, 539.
Lin, 233.	Perceneige, 569.
Lupin, 263.	Perfil, 571.
Luzerne, 265.	Peuplier, 582.
Lys, 272.	Pied de veau, 602.
Marguerite, 276.	Pin, 619.
Marjolaine, 279.	Pistachier, 639.
Maronnier, 283.	Platane, 647.
Martagon, 287.	
Meleze, 296.	
Melisse, 307.	
Melon, 313.	
Menthe, 316.	
Millet, 337.	
Morille, 345.	
Montarde, 357.	
Mûrier, 364.	
Myrthe, 373.	
Narcisse, 377.	
Navet, 383.	

Tome III.

Poireau, 2.
Poirée, 5.
Poirier, 19.
Pois, 24.
Poivre d'Inde, 35.
Pommier, 48.
Pourpier, 77.
Primevere, 82.
Prunier, 90.

Putiet, 105.	Scorfonère, 287.
Radix, 113.	Seigle, 294.
Raifort, 114.	Sifon, 301.
Raigrass, 119.	Smilax, 302.
Rave, 130.	Sorbier, 312.
Renoncule, 139.	Sorbier d'oiseleurs, 315.
Ricin, 157.	Soude, 324.
Riz, 158.	Statice, 331.
Romarin, 163.	Sumac, 333.
Ronce, 165.	Tabac, 351.
Roquette des jardins, 167.	Tamarisc, 364.
Rosier, 172.	Thym, 369.
Safran, 194.	Tilleul, 371.
Sainfoin, 225.	Tréfle, 390.
Salisfix, 237.	Triquetmadame, 398.
Sanicle, 238.	Truffe, 404.
Santoline, 240.	Tubéreuse, 407.
Sapin, 243.	Tulipe, 414.
Sarrafin, 250.	Vesce, 442.
Sarriette, 252.	Vigne, 448.
Sauge, 261.	Violier, 517.
Saule, 269.	Xilosteon, 522.

T A B L E

*Des plantes qui conviennent à l'homme
pour alimens.*

Tome I.

A BRICOTIER, 4.	Airelle, 45.
Absynthe, 9.	Alisier, 52.
Ache ou Céleri, 25.	Alleluia, 53.
Ail, 41.	Amandier, 61.

Angélique, 80.
 Anis, 83.
 Arroche, 100.
 Antichant, 106.
 Asperge, 116.
 Aubergine, 123.
 Avoine, 134.
 Azerolier, 140.
 Bacile, 141.
 Balauftier, 146.
 Basilic, 158.
 Betterave, 186.
 Bled de Turquie, 193.
 Bouleau, 210.
 Bourrache, 217.
 Buglosse, 230.
 Canneberge, 259.
 Caprier, 263.
 Capucine, 266.
 Cardon, 270.
 Carotte, 273.
 Carvi, 288.
 Cassis, 289.
 Cataire, 294.
 Cerfeuil, 296.
 Cerisier, 302.
 Champignon, 318.
 Chardon à foulon, 339.
 Châtaignier, 360.
 Chêne, 368.
 Chenille, 372.
 Chervis, 375.
 Chichorée, 383.
 Chiendent, 386.
 Choux, 411.
 Ciboule, 419.
 Citronnier, 429.

Citrouille, 432.
 Cive, 433.
 Coignassier, 443.
 Concombre, 453.
 Coq, 466.
 Coriandre, 474.
 Corne de cerf, 476.
 Cornouiller, 478.
 Coudrier, 485.
 Courge, 492.
 Cresson, 495.
 Cresson de fontaine, 498.
 Cumin sauvage, 501.
 Doucette, 531.
 Droue, 533.
 Echaloite, 534.
 Epinars, 553.
 Epine vinette, 555.
 Erable, 560.
 Escoutgeon, 563.
 Fenouil, 573.
 Féve, 582.
 Figuier, 593.
 Fougère, 602.
 Fraîsier, 618.
 Framboisier, 625.
 Frêne, 632.
 Froment, 643.

Tome II.

Genièvre, 39.
 Gesse, 51.
 Groseillier, 69.
 Guainier, 72.
 Haricor, 84.
 Houblon, 108.

Jasmin, 122.
 Jujubier, 151.
 Laitue, 174.
 Laurier, 196.
 Lentille, 208.
 Lin, 251.
 Macre, 275.
 Marjolaine, 279.
 Melon, 323.
 Melon d'eau, 324.
 Millet, 328.
 Minfon, 318.
 Morilles, 346.
 Moufferon, 356.
 Moutarde, 357.
 Mûrier, 370.
 Navet, 384.
 Néflier, 387.
 Noyer, 405.
 Oignon, 438.
 Olivier, 451.
 Oranger, 463.
 Orge, 473.
 Orobe, 492.
 Oseille, 503.
 Panais, 506.
 Panis, 511.
 Pastèque, 516.
 Patate, 517.
 Patte de lièvre, 529.
 Pavor, 536.
 Pêcher, 555.
 Persil, 572.
 Pied de veau, 604.
 Pimprenelle, 611.

Pin, 624.

Tome III.

Poirier, 18.
 Pois, 30.
 Pois chiche, 34.
 Poivre d'Inde, 36.
 Pomme de Merveille, 43.
 Pommier, 66-72.
 Pourpier, 79.
 Pourpier de mer, 80.
 Prunier, 94.*
 Putiet, 107.
 Radix, 113.
 Raifort, 116.
 Rapette, 126.
 Rave, 130.
 Rhue, 156.
 Riz, 161.
 Rosier, 184.
 Safran, 218.
 Salsifix, 236.
 Sarrafin, 251.
 Scorfonère, 289.
 Seigle, 294.
 Sorbier, 313.
 Sorbier d'oiseleur, 320.
 Soucy, 323.
 Sureau, 340.
 Terre-noix, 367.
 Thym, 370.
 Triquemadame, 398.
 Truffe, 405.
 Vigne, 483-486.

T A B L E

*Des plantes qu'on emploie pour les arts
& métiers.*

Tome I.

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| A LATIERNE, 47. | Chêne, 370. |
| Algue, 49. | Chiendent, 386. |
| Alifier, 52. | Cinanchine, 424. |
| Alydon, 60. | Clématite, 440. |
| Amandier, 67. | Coignassier, 443. |
| Aune, 130. | Comaret, 448. |
| Azedarach, 139. | Conserva, 461. |
| Bouleau, 211. | Cornouiller, 479. |
| Bourgène, 215. | Coudrier, 487. |
| Boyaude chat, 221. | Delphinette, 513. |
| Broisième, <i>ibid.</i> | Droue, 533. |
| Bruyère, 224. | Egagrophille de mer, 535. |
| Buis, 234. | Epervière des bois, 550. |
| Buisson ardent, 235. | Epine vinette, 556. |
| Calebasse, 249. | Erable, 561. |
| Cameline, 251. | Etique aigrette, 566. |
| Canfe, 258. | Fenouil, 576. |
| Carthame, 284. | Fer à cheval, 579. |
| Cerfeuil, 299. | Fèves, 583. |
| Cerisier, 307. | Fougère, 603. |
| Chanvre, 329. | Frêne, 629. |
| Chardon à foulon, 339. | Froment, 644. |
| Chardon nain, 343. | Fucus, 645. |
| Charme, 349. | Fusain, 649. |
| Châtaignier, 359. | Fustet des corroyeurs, 650. |

Tome II.

Galéopse jaune , 11.
 Garance , 29.
 Gaude , 33.
 Genêt , 36.
 Genevrier , 44.
 Grassette , 59.
 Gratteron , 64.
 Gremil , 65.
 Gaude , 75.
 Gui , 79.
 Hêtre , 97.
 Houblon , 108.
 Houx , 110.
 Houx frêlon , 112.
 Jasmin , 121.
 If , 124.
 Immortelle , 133.
 Jone , 136.
 Jone marin , 139.
 Jonquille , 144.
 Iris , 150.
 Kermès , 156.
 Laiche , 161.
 Lampourde , 179.
 Lauréole , 188.
 Lichen , 214.
 Lichnide , 220.
 Liège , 225.
 Lierre , 227.
 Lin , 242.
 Lupin , 264.
 Lycopode , 270.
 Marguerite , 278.

Maronnier d'Inde , 185.
 Masse d'eau , 289.
 Meleze , 298.
 Micocoulier , 332.
 Millepertuis , 336.
 Millet , 338.
 Mniole hygromètre , 339.
 Mors du diable , 348.
 Mouffe , 355.
 Mûrier , 371.
 Néflier , 387.
 Nerprun , 394.
 Nez coupé , 397.
 Noyer , 403.
 Œil de bœuf , 419.
 Origan , 479.
 Orme , 485.
 Oseille , 504.
 Osier , *ibid.*
 Perecrouffe , 568.
 Peuplier , 581.
 Pied de veau , 605.
 Pin , 626.
 Platane , 649.

Tome III.

Poirier , 22.
 Pommier , 64.
 Prêle , 80.
 Prunier , 92.
 Ronce , 166.
 Roseau , 185.
 Safran , 224.
 Salicor , 236.
 Santoline , 241.

Sapin, 245.	Soude, 324.
Sarrette, 252.	Sumac, 333.
Saule, 273.	Sureau, 342.
Scirpe, 284.	Tilleul, 374.
Seigle, 296.	Troëfne, 400.
Smilax, 303.	Vigne, 510.
Sorbier, 313.	Xilosteon, 522.
Sorbier des oiseleurs, 319.	Zenigole, 527.
Soucy, 323.	

EXPLICATION

Des termes de botanique, de médecine, d'agriculture & de jardinage employés dans ce Dictionnaire.

A.

ABAISSER, terme de jardinage; c'est couper une branche d'arbre près de son tronc.

Abattis de bois, signifie coupe de bois. Il ne faut pas faire un trop grand abattis de bois dans les forêts qui sont en coupe, mais il faut se régler là-dessus selon les ordonnances.

Abri, c'est un lieu à couvert du soleil, du vent, du froid, & où l'air est modérément agité; un abri est nécessaire dans un jardin; c'est-là qu'au commencement de l'automne on replante en place quelques espèces de laitue; à la fin de l'été du plan de choux pommés, en mai des artichauts, &c. L'abri d'un mur est favorable aux poiriers de haute tige greffés sur coignassier; quoique plantés dans une terre humide & grasse, qui tempère leur sécheresse, il leur arriveroit souvent de s'éclater & de ne point s'élever, s'ils n'avoient pas cet avantage.

Abrité, terme usité parmi les jardiniers ; il signifie, être à l'abri ; les fruits gèlent souvent lorsqu'ils ne sont pas bien abrités.

Abroué, se dit d'un bois mal fait, c'est-à-dire, de celui dont les broutes ou bourgeons ont été broutés par le bétail.

Absorbans, ce sont des remèdes qui absorbent les humeurs âcres qui peuvent se trouver dans l'estomac ; ces sortes de remèdes s'emploient très-fréquemment dans les maladies que l'on suppose être occasionnées par un vuide ; on qualifie encore en termes de botanique d'*absorbans*, les vaisseaux ou sœurs des plantes qui sont destinés à pomper l'humidité de l'air.

Absorber, ce terme s'entend des branches gourmandes qui naissent sur les arbres fruitiers, & qui ôtent aux autres branches la plus grande partie de la nourriture dont elles ont besoin.

Absterfifs, c'est la même chose que *déterfis*. Voyez ce mot.

Accolage, c'est la manière dont on attache la vigne, pour que l'air & le soleil agissent mieux sur le raisin, & qu'élevé au-dessus de la terre, rien ne l'empêche de mûrir parfaitement.

Accrue, terme d'eaux & forêts ; c'est une étendue de bois qui se trouve aggrandie sans avoir été ni plantée ni semée, mais par des semences qui y ont levé naturellement.

Accroissement, c'est la manière plus ou moins belle avec laquelle croissent les végétaux ; dans le Journal économique du mois de décembre 1751, on trouve la description d'une machine pour mesurer l'accroissement graduel des plantes.

Ados, s'entend de la terre qu'on a élevée en talus le long de quelque mur exposé au midi, afin d'y semer pendant l'hiver & le printemps quelques herbages ou salades qu'on n'auroit pas bien en pleine terre.

Adoucissans, terme de matière médicale ; ce sont des

remèdes qui tempèrent l'acrimonie des humeurs, humectent les parties malades, calment les douleurs, résolvent & dissipent les humeurs âpres.

Affaïssement, les jardiniers se servent de ce mot pour exprimer que les terres qu'ils ont porté nouvellement en quelques endroits, ou qu'ils ont remué à certaine profondeur, & qui paroissent d'abord surpasser la superficie de la terre voisine, viennent ensuite à s'abaïsser.

Affaïsser, s'emploie dans le jardinage par rapport aux terres & aux couches d'un jardin : *cette terre s'est affaïssée*, cette couche s'affaïsse beaucoup.

Affiler, terme d'agriculture : on dit que *les bleds sont affilés*, pour signifier, que les fanes des bleds sont si fines & si pointues, qu'il semble que ce ne soit que des filets; le mot d'*effiler* dans ce cas vaudroit mieux que celui d'*affiler*.

Affinoir, c'est le seran ou peigne de fer avec lequel on affine le chanvre ou le lin.

Agens de la germination, ce sont l'air & l'eau; l'humidité seule fait germer plusieurs graines exposées à l'air. On fait lever des graines dans l'eau sans l'intermède de la nature; mais l'eau, sans l'air, est insuffisante. M. Homberg a essayé de faire germer plusieurs graines sous le récipient de la machine pneumatique; quelques-unes n'ont pas levé, toutes les productions ont été foibles; par conséquent, c'est par défaut d'air, que les graines trop profondément enterrées, réussissent mal, ou ne lèvent pas; mais selon l'observation de M. Duhamel, elles s'y conservent quelquefois trop longtemps; ce qui fait paroître alors, sur les terrains nouvellement & profondément défoncés, plusieurs plantes qu'on n'y voyoit pas précédemment. Voyez ce que j'ai dit de l'air & de l'eau pour la végétation, dans mon premier volume du traité historique des plantes de la Lorraine.

Agglutinans, ce sont des remèdes propres à fortifier les fibres, épaisir les liqueurs, & unir entr'eux les solides; la plupart des agglutinans sont visqueux & gluans.

Aigrette, ce mot se dit en botanique d'une semence qui est surmontée d'une aigrette : celle-ci est simple ou branchue ; la simple est composée de filets , la branchue est divisée en rameaux : on appelle ces rameaux plumeux , quand ils imitent une plume ; l'aigrette est encore ou sur un pied , ou elle n'en a point ; dans le dernier cas on la nomme *sessile* , voyez plus bas ce qu'on entend par ce nom ; elle adhère pour lors à la semence. L'aigrette sur un pied qu'on nomme *stipe* , est portée par un pédicule ; le principal usage des aigrettes est de faciliter la dispersion des semences , qui portées par les vents vont reproduire au loin de nouveaux individus de la même espèce.

Aigrette , c'est une espèce de brosse ou de pinceaux de poils très-fins , qui se trouve à l'extrémité supérieure des semences de plusieurs plantes : on nomme en botanique cette aigrette *pappus* , ou *pappi*.

Aigue , s'entend en botanique d'une feuille qui se termine en pointe.

Aiguille , en latin *Acumen* ou *Acus* ; les botanistes se servent de ce mot pour désigner , soit un pistil , soit une semence , soit toute autre partie d'une plante , dont la forme menue & longue est terminée en pointe.

Aiguillon ou *Piquant* , c'est une production dure , terminée par une pointe fragile , placée sur les riges & sur les branches ; il est quelquefois recourbé , quelquefois triple ; l'aiguillon se développe avec les autres parties de la plante , & paroît être une prolongation de l'aubier ou de l'écorce , puisqu'il se détache avec elle de la tige , comme on peut le remarquer dans l'épine vinette ou la ronce ; M. Duhamel compare l'aiguillon aux ongles des animaux.

Aillée , *Empenée* , *Pinnée* , *Pinnatum* , s'entend d'une feuille composée de folioles rangées en manière d'ailes , des deux côtés & le long d'un pétiole commun ; quand les folioles sont de grandeurs inégales , on dit que la feuille est aillée par interruption , *interrupte pinnatum*.

La feuille aîlée est quelquefois terminée par une foliole seule qu'on nomme impaire ; quelquefois par deux de ses folioles opposées , quelquefois par un ou plusieurs filets appelés vrilles, mains. La feuille aîlée est tantôt alterne , tantôt opposée ; le sommeil des plantes est très - visible dans ces feuilles ; pendant la chaleur du jour, les folioles opposées des feuilles aîlées se relèvent sur leur pétiole commun , & forment avec lui un angle droit, en rapprochant leurs surfaces supérieures ; si le ciel se couvre , elles se rabattent , & s'étendent sur le même plan que leur pétiole commun. Pendant la nuit elles s'abaissent encore plus , & s'unissent en-dessous du pétiole commun comme les feuillets d'un livre , en s'appliquant les unes contre les autres par leurs surfaces inférieures , tandis que la foliole impaire, placée à l'extrémité de la feuille, se replie pour venir toucher les bords des premières folioles ; c'est là ce que Linnéus nomme le sommeil des plantes. Outre les feuilles aîlées , il y a encore des semences auxquelles on donne ce nom ; ces semences sont entourées d'une espèce d'aîle , *ala* ; telles sont les semences de quelques ombellifères , de l'érable, du tulipier.

Ailes , ce sont en termes de jardinage des branches d'arbres ou d'autres plantes qui poussent à côté l'une de l'autre. Les botanistes nomment aîles , *alæ*, les deux pétales qui sont placées latéralement entre le pavillon & la nacelle dans les fleurs légumineuses ; à l'article précédent nous avons fait voir que ce nom pouvoit aussi s'approprier à certaines feuilles ou semences.

Aisselle , en latin , *Axilla* , c'est l'angle ou sinus qui se forme par l'union, soit de deux branches, soit du pédicule d'une feuille avec la tige. Il y a des boutons & des fleurs qui naissent dans les aisselles des feuilles.

Alexipharmques , ce sont des remèdes qui agissent en augmentant & réveillant l'action ou la réaction des solides & des fluides du corps humain, qui donnent de la tension aux fibres nerveuses , rendent le cours du sang

beaucoup plus libre , agacent les fibres , leur font reprendre promptement leur élasticité , & divisent en même temps & atténuent les fluides ; la plupart de ces remèdes détruisent l'effet des morsures venimeuses & des poisons coagulans en détruisant la coagulation du sang ; c'est même par rapport à cette vertu qu'on leur a donné leurs noms.

Alexitères , ce sont des remèdes alexiphatmaques , dont il a été parlé à l'article précédent.

Alkalescentes , on qualifie de ce nom les plantes qui donnent le plus d'alkali volatil ; telles sont le raifort , la moutarde , le cochlearia des jardins , &c.

Altérans , ce sont des remèdes dont l'effet est de corriger le vice du sang , des esprits & des liqueurs , sans agir comme font les purgatifs.

Alterne , on se sert de cette épithète pour désigner la position des branches sur la tige , & celle des feuilles , boutons , fleurs & fruits , le long des tiges & des branches. On dit que les différentes parties sont alternes ou placées alternativement , quand deux de même genre ne se rencontrent pas sur la même ligne.

Amande , c'est la semence qui est renfermée dans une espèce de boîte ligneuse qui se trouve dans les fruits , qu'on nomme pour cette raison *fruits à noyau*.

Amentacées , ce mot se dit des fleurs à chaton , qui sont des espèces de fleurs attachées plusieurs ensemble autour d'un filet commun.

Amplexicaules , on dit que les feuilles d'une plante sont amplexicaules , lorsqu'elles enveloppent par leur base la tige , comme il arrive dans la plupart des feuilles en cœur , en flèches.

Analeptiques. Voyez *Restaurans*.

Androgyne , ce terme a été employé par Vaillant , pour exprimer la rencontre des sexes mâle & femelle dans une même fleur.

Angiospermie , c'est une division de la quatorzième classe de Linnæus ; cette division comprend les plantes

dont les semences ne sont pas nues dans le calice, mais renfermées dans une enveloppe particulière.

Angles des feuilles, ce sont des parties saillantes d'une feuille considérée comme entière; on n'entend donc sous ce nom que les angles saillans; les angles rentrans sont compris sous le nom de sinus, voyez article *Sinus*: on appelle tige rayée, plissée, celle qui a deux angles marqués.

Annuelles, ce sont les plantes qui meurent tous les ans; il y en a d'autres dont les tiges & les feuilles périssent chaque année, mais dont la racine est vivace au moins pour l'année suivante.

Anodins, ce sont des remèdes qui adoucissent ou apaisent les douleurs.

Anomales, ce sont des fleurs composées de plusieurs pièces irrégulières & dissemblables, & accompagnées ordinairement d'un nectar, telles sont la violette, la capucine.

Antheres, ce sont les sommets des étamines des fleurs.

Antidotes, on qualifie de ce nom les remèdes dont l'effet est de guérir les maladies provenant de malignité ou de causes cachées: on appelle aussi antidote tout remède qu'on administre contre les venins, les poisons & les maladies pestilentiellles.

Anti-scorbutiques, ce sont les remèdes qui sont indiqués contre le scorbut: il y en a de deux sortes, des doux & des âcres.

Antiseptique, on nomme ainsi toute substance qui peut retarder les progrès de la putréfaction, ou la prévenir.

Apéritifs, ce sont des remèdes dont l'effet est de dissoudre les parties du sang lorsqu'elles sont mutuellement trop rapprochées, de diviser & d'atténuer la lymphe, d'agir sur toute la masse des humeurs, & de procurer en général la liberté de la circulation.

Apétale, c'est une fleur qui n'a point de pétales,

mais un calice & des étamines, ou un calice & des pistils, ou des étamines & des pistils sans calice. Tournefort donne à cette espèce de fleur le nom de fleur à étamines, & Vaillant celui de fleurs incomplètes.

Approche, ce mot se dit de la greffe: on dit greffer par *approche*, lorsqu'après avoir mis deux arbres à côté l'un de l'autre, on fait à chacun une incision disposée de manière qu'en rapprochant les branches entaillées, leurs liber & leurs aubiers se touchent à nud; la simple union des écorces suffit à cette greffe.

Aquatique, ce mot s'entend dans cet ouvrage des plantes qui se plaisent dans l'eau & dans les endroits marécageux.

Arbre, c'est un végétal composé d'une tige ou tronc principal, qui s'élève à une grande hauteur, qui se divise par la partie supérieure en plusieurs branches, & par la partie inférieure en racines: toutes ces substances ont une écorce plus ou moins solide, & une substance ligneuse.

Arbuste, c'est une plante vivace qui a une tige ligneuse, qui persiste pendant l'hiver, mais qui ne s'élève qu'à la hauteur des herbes.

Arbrisseau, c'est un végétal qui a une tige ligneuse & durable, qui s'élève plus que l'arbuste & moins que l'arbre.

Arbres sauvages, ce sont ceux qui viennent naturellement dans les bois sans culture: on donne le nom de forestiers à ceux de ces arbres propres à faire la masse des forêts.

Arbres fruitiers, ce sont ceux dont l'espèce est propre à fournir des fruits bons à manger.

Arbres nains, on qualifie de ce nom les arbres qui se tiennent très-bas; on donne aussi ce nom à des arbres en buisson, dont on assujettit la tige par la taille.

Arbres de haute futaie ou de haut vent, ce sont ceux qu'on laisse s'élever autant qu'ils en sont capables, & que l'économie ne permet d'abattre que quand on voit qu'ils ne profitent plus.

Arbres de haute tige, on entend par ce nom les arbres de jardin, qu'on élève de façon à pouvoir former une tige de 5, 6 ou 7 pieds de haut, on même davantage.

Arbres de plein vent, ce sont des arbres fruitiers plantés dans des jardins, dans des vergers, dans des vignes & aussi dans les-champs; on les laisse parvenir à toute leur hauteur; leur fruit est communément meilleur que celui des mêmes espèces venu sur des buissons ou sur des espaliers.

Arbres de demi-vent ou de demi-tige, ce sont ceux dont on borne la tige à l'élévation de trois ou quatre pieds.

Arbres conifères, ce sont des arbres dont l'espèce porte des fruits faits en cône.

Arbres résineux, on appelle de ce nom tous les arbres dont il sort une résine, soit naturellement, soit par des incisions.

Arbres de réserve, ce sont des arbres qu'on excepte de la vente de ceux qui sont avec eux dans une même forêt.

Aromatique, on donne ce nom aux plantes qui ont une odeur forte & en même temps agréable.

Arquée, inflexum, se dit d'une feuille qui décrit une espèce d'arc en se tournant vers la plante.

Lorsqu'une fleur est inclinée vers la terre, le pédoncule auquel tient cette fleur se nomme aussi *arqué, cernuis*.

Arrêter, c'est un terme d'usage pour les arbres; il signifie, couper l'extrémité d'une tige ou d'une branche, pour empêcher qu'elle ne s'étende trop; on applique encore ce nom aux melons: on dit par exemple, qu'on arrête des melons ou des concombres, lorsqu'on les taille quand ils ont trop de bras ou de branches, ou qu'ils les ont trop longues.

Arrondi, ce mot s'applique aux feuilles, panneaux, stigmates & tiges: on dit qu'une feuille est arrondie, lorsqu'elle est sans aucun angle, *rotunda*: on donne

pareillement cette dénomination aux panneaux d'une fil-
que , lorsqu'elle se trouve aussi sans angle , &c.

Articulation , les botanistes emploient ce terme pour
exprimer l'union de plusieurs pièces mises bout à bout ;
on remarque v. g. une espèce d'articulation dans les
nœuds du gui & de la vigne avant qu'ils soient endurcis ;
on donne le nom de feuille articulée à celle qui croît du
sommet d'une autre ; on appelle pareillement tige arti-
culée , celle qui est garnie de nœuds dans sa longueur ,
comme les chalumeaux de froment : les racines genouil-
leuses sont aussi formées d'espèce d'articulation ; la partie
d'une tige ou d'une branche qui est comprise entre deux
nœuds , est nommée par plusieurs Botanistes , *articulus*
culmi.

Ascendante , *ascendens* , est un terme de Botanique :
on s'en sert pour exprimer , 1.^o une tige qui s'élève sans
fournir des branches sur les côtés ; 2.^o une branche qui
prend une direction perpendiculaire par opposition aux
branches qui s'écartent.

Aspect , c'est l'exposition d'un mur ou d'une côte re-
lativement au soleil.

Assoupissans , voyez *Narcotiques*.

Aubier , c'est une jeune couche ligneuse qui est entre
l'écorce & le bois , & qui n'est encore qu'un bois impar-
fait , destiné à devenir bois , lorsqu'une couche nouvelle ,
par succession de temps , l'aura enveloppée.

Avorter , ce terme , en fait de plantes , s'entend de
celle dont le stigmate se trouve altéré dans le temps de
la floraison , soit par des insectes , une gelée subite , ou
de longues pluies ; les jardiniers au lieu de dire pour lors
qu'une semence avorte , se servent d'un autre terme équi-
valent ; *le fruit coule*. Il est donc très-facile de rendre sté-
rile une plante , il ne s'agira que de la châtrer : on coupe
les anthères ou sommets des étamines avant que la pou-
sière fécondante s'en soit détachée pour s'introduire par
l'intermède du stigmate jusqu'au germe , la semence
deviendra pour lors inféconde , malgré sa maturité ,

comme l'œuf d'une poule qui n'a pas éprouvé les approches d'un coq.

Aillaire, les Botanistes donnent ce nom à tout ce qui naît dans les aisselles des feuilles ou des branches.

B.

BACCIFERES, ce sont des plantes dont les fruits sont des baies.

Baie, c'est une espèce de fruit qui est recouvert d'une enveloppe membraneuse & qui renferme les semences éparées dans une pulpe succulente, où l'on ne trouve aucune division de loges. La Baie est ordinairement ovale, ronde, & souvent ombiliquée.

Bâle, c'est un calice composée d'une, de deux ou de trois valvules, espèces d'écaille ordinairement transparentes par leurs bords, & le plus souvent terminées par un filet pointu qu'on nomme *barbe*. La bâle est le calice des graminées.

Barbe, c'est le filet pointu qui termine les valvules des bâles.

Bâtardes, ce sont des plantes qui proviennent du mélange spontané des poussières fécondantes de plusieurs plantes du même genre; & cependant d'espèces différentes.

Bédegvar, c'est un corps bisarre, couvert de filamens verts, jaunes ou rougeâtres, qu'une mouche fait naître sur le rosier sauvage; ce corps nourrit des larves ou vers parmi des œufs déposés & produit des mouches semblables à celles qui les ont pondus.

Berceau d'une plante, ce sont les lobes; nous en parlerons dans un article séparé.

Bicapsulaire, ce terme s'applique au péricarpe, lorsqu'il est à deux capsules.

Bijuger, se dit d'une feuille aîlée, dont les folioles latérales sont attachées par paire au nombre de deux de chaque côté.

Bilobée, se dit d'une feuille fendue en deux, dont les angles sont arrondis en lobes.

Binée, se dit d'une feuille composée de deux folioles sur un pétiole commun.

Bis-annuelle, on donne cette épithète aux plantes vivaces qui perdent à la vérité leurs tiges pendant l'hiver, mais qui persistent pendant deux ans par leurs racines.

Bois, c'est cette charpente, dont les parties étroitement unies & resserrées dans les arbres, composent le corps ligneux, & qui est extérieurement recouverte d'une enveloppe qu'on nomme écorce.

Bois blanc, on qualifie ordinairement de ce nom la partie de l'arbre qu'on nomme aubier, voyez *Aubier*; il y a des arbres qui se nomment communément *Bois blanc*, tels que les saules, les peupliers, &c. Ces sortes d'arbres n'ont presque point d'*aubier*.

Bordure des feuilles, on entend par-là le limbe ou bord de la feuille, abstraction faite du disque.

Bourgeons, les cultivateurs entendent par ce mot la jeune pousse d'une plante, d'où l'on dit, ébourgeonner un arbre, pour dire, couper les nouvelles pousses superflues; le terme Bourgeon chez les Botanistes exprime un corps destiné à la reproduction; il renferme selon eux les rudimens d'une ou de plusieurs parties de la plante, produites par la plante mère; c'est le *germen Plinii*, corps, qui comme la graine, renouvelle l'espèce, l'*hypernaculum*, Linn. comme qui diroit, le lieu où les nouvelles parties passent l'hiver. Le bourgeon sert à défendre ces parties du contact de l'air & des injures des insectes, jusqu'à leur parfait développement; il est situé ou sur les tiges, ou sur les racines; celui qui tient aux tiges prend le nom de bouton; celui qui tient à la racine se nomme cayeu.

Bourrelets, ce sont en matière de végétation des espèces de bulbes composées de fibrilles & de mamelons qui n'ont besoin qu'une certaine humidité pour

se développer ; ces bouriclets ne sont , à parler strictement , formés que par les fucs arrêtés dans leurs cours.

Bourse , c'est une enveloppe épaisse qui renferme certains champignons avant leur développement , & qui éclate ensuite pour faire passage à la plante , ce qui s'observe très-bien dans la morille. *

Bouton , c'est un petit corps arrondi , un peu allongé , quelquefois terminé en pointes ; il varie dans sa forme suivant les diverses espèces , & peut servir à les faire distinguer les unes des autres pendant l'hiver ; c'est précisément dans cette saison qu'on les aperçoit à l'extrémité des jeunes rameaux ; on les trouve aussi le long des branches , fixés par un court pédicule , sur des renflemens ou espèces de petites consoles qui ont servi d'attaches aux feuilles , dans l'aisselle desquelles ils se sont formés l'année précédente ; les plantes annuelles & les vivaces qui perdent leurs tiges pendant l'hiver , n'ont point de bouton , & dans le nombre même de celles qui les conservent , quelques-unes en sont dépourvues.

Le bouton est formé par plusieurs parties artistement arrangées ; à l'extérieur on remarque des écailles assez dures , souvent hérissées de poils , creusées en cuiller , & en recouvrement les unes sur les autres ; ces écailles sont implantées dans les lames intérieures de l'écorce , dont elles paroissent être un prolongement ; leur usage est de défendre les parties internes du bouton , qui par leur développement doivent fournir les unes des fleurs , des feuilles , des stipules , les autres des périoles & des écailles , & qui toutes sont encore repliées , tendres , délicates , enduites d'une humeur visqueuse , quelquefois résineuse & odorante : les écailles extérieures tombent après l'entier développement des parties internes. On distingue ordinairement trois sortes de bourons ; les boutons à fleurs , les boutons à feuilles , & les boutons qui sont tout à la fois & à fleurs & à feuilles. Le bouton à fleur ou à fruit renferme les rudimens d'une ou de plusieurs fleurs concentrées , repliées sur elles-mêmes &

enveloppées d'écailles; dans plusieurs arbres on le trouve communément à l'extrémité de certaines petites branches plus courtes que les autres, moins lissées, & chargées de feuilles; les écailles extérieures du bouton à fleur sont plus dures que les intérieures, les unes & les autres sont en-dedans garnies de poils, & en général plus renflées que celles du bouton à feuilles. Le bouton à fleur est ordinairement plus gros, plus court, presque carré, moins uni, moins pointu, terminé par une pointe obtuse. Le bouton à feuilles, ou à bois, contient les rudimens de plusieurs feuilles enroulées, diversement repliées & enveloppées au-dehors par des écailles qui produisent principalement des stipules; on les nomme boutons à bois, parcequ'avec les feuilles ils donnent des branches; ils sont ordinairement plus pointus que les boutons à fleur, c'est même par cette marque distinctive que les jardiniers les reconnoissent. Le bouton à fleurs & à feuilles est plus petit que les précédens; il produit des fleurs & des feuilles, mais de deux manières différentes; tantôt les fleurs & les feuilles se développent en même temps; tantôt les feuilles naissent sur un petit rameau qui fleurit dans la suite. Le cayeu tient lieu de bouton aux plantes bulbeuses; il reproduit l'espèce, & remplace l'individu par le développement de la plante qu'il renferme en racourci; si au mois de janvier on examine ce cayeu à la loupe, il paroît distinctement dans le centre de la bulbe.

Bouture, c'est la méthode de faire pousser des racines à une branche, soit par l'extrémité qui tenoit au tronc dont elle est détachée, soit par le bout opposé qui devoit porter des branches, ou même par l'un & l'autre bout, en repliant la branche pour les planter tous les deux.

Bractée, autrement *feuille florale*, c'est une petite feuille distinguée des autres par sa forme, & souvent par sa couleur; elle paroît avec la fleur, & l'accompagne toujours dans certaines espèces. Les feuilles florales ser-

vent suivant les naturalistes , à caractériser les espèces , sur-tout dans les genres nombreux ; elles caractérisent la Lavande , le Stœchas , la Couronne impériale , &c. & forment au-dessus de leurs fleurs une touffe de feuilles qu'on nomme chevelure.

Brillante , c'est une des épithètes qu'on donne quelquefois à une feuille glabre , c'est-à-dire , à une feuille qui est sans poils.

Brou , on qualifie de ce nom la chair qui sert d'enveloppe à un fruit.

Bulbe , c'est une espèce de racine ronde ou ovale , garnie à sa partie inférieure d'une portion charnue, d'où partent des fibres qui servent comme d'autant de pompes à la plante pour tirer de la terre les sucs qui lui sont propres. Cette portion est , à proprement parler , la vraie racine , & la bulbe est le berceau de la tige qui doit se développer. On distingue quatre espèces de bulbes : les écailleuses , les solides, les tuniquées & les articulées.

Bulbeuses , c'est l'épithète qu'on donne à une espèce de racine dont nous venons de faire mention à l'article précédent.

Bulbifères , ce mot s'entend des plantes dont les racines sont en bulbe , voyez *Bulbe*.

C.

CALICE , c'est un corps évasé à l'extrémité du péduncule par l'épanouissement ou le renflement duquel il est formé ; il porte & enveloppe en partie les organes de la fructification. Tournefort le distingue en proprement dit & improprement dit : le premier renferme les organes de la fructification jusqu'à leur état de perfection ; le second ne les accompagne pas jusqu'à cet état , & pour lors le pistil devient fruit. Linnæus distingue de sept espèces de calice , le périclypthe , l'enveloppe , le spathe , la balle , le chaton , la coiffe & la bourse.

Campaniforme, on donne ce nom aux plantes dont les fleurs sont en forme de cloche ; ces sortes de fleurs sont à-peu-près également évasées dans toutes leurs parties ; les campaniformes dont le corps est plus allongé & le fond plus étroit, se nomment campaniformes tubulées, au lieu que les précédentes sont des campaniformes proprement dites.

Cannelée, c'est une épithète qu'on donne à une feuille, lorsqu'en la considérant dans une direction perpendiculaire, on lui remarque des cannelures ; on applique encote souvent ce nom aux tiges des plantes.

Capités, veut dire en manière de tête ; on se sert de ce terme pour désigner les fleurs dont les bouquets sont ramassés en tête.

Capsule, c'est une espèce de péricarpe ; on la définit une enveloppe charnue & succulente avant sa maturité, composée de panneaux, qui en mûrissant deviennent secs & élastiques. Quelques capsules sont d'une seule pièce, & s'ouvrent par le haut, d'autres par le bas, d'autres horizontalement en deux portions hémisphériques, & d'autres enfin longitudinalement ; la capsule n'a qu'une seule cavité ; elle est cependant quelquefois intérieurement divisée par des cloisons en plusieurs loges.

Caractères Botaniques, ce sont les parties essentielles des plantes par lesquelles elles se ressemblent ou diffèrent entr'elles. Linneus divise ces caractères en quatre espèces : en factices, en essentiels, en naturels & en habituels. Le factice est celui qui se tire d'un signe de convention, tels que sont ceux qui sont déterminés par la plupart des méthodes ; l'essentiel est un signe remarquable & si approprié aux plantes qui le portent, qu'il ne convient à aucune autre, tel est le nectar des aconits ; le naturel se tire de tous les signes que peuvent fournir les plantes, & comprend par conséquent le factice & l'essentiel ; on s'en sert pour distinguer les classes, les genres & les espèces, & l'habituel enfin connu par Tour-

nefert sous le nom de port de la plante , consiste dans la conformation générale d'une plante , considérée suivant le résultat & l'ensemble de toutes ses parties dans leur position , leur accroissement , leurs grandeurs respectives , & tous autres rapports qui les rapprochent ou les différencient entr'elles.

Carène , c'est le pétales inférieur qui représente l'avant d'une nacelle , d'où lui est venu son nom ; il se divise quelquefois en deux pièces qui ont chacune leur attache.

Carinée , se dit d'une feuille qui est faite en forme de carène , c'est-à-dire , qui est creusée dans le milieu & relevée par le bout.

Cartilagineuse , s'entend d'une feuille dont les bords sont distingués par une espèce de cartilage.

Caryophyllées , ce sont des fleurs composées de plusieurs pétales , dont l'onglet est caché dans un calice d'une seule pièce sur les bords , les lames des pétales sont disposées en roue.

Caulinaire , on donne cette épithète à la feuille qui tient à la tige : on qualifie aussi de ce nom les fleurs , fruits , & leurs péduncules , qui tirent leur origine de cette même tige ; ils sont placés quelquefois à son extrémité , quelquefois aux aisselles des branches ou des feuilles , quelquefois mêmes ils sont après , & sortent même des branches.

Cayeux , ce sont de petites bulbes ou oignons qui naissent à côté des anciennes , quelquefois avec une promptitude surprenante ; le cayeu ne convient qu'aux plantes bulbeuses , il leur tient lieu de bouton , ainsi que nous l'avons dit à l'article *Bouton* , voyez cet art.

Charnue , on nomme feuille charnue , une feuille qui est pleine de pulpe ou substance charnue ; on donne aussi ce nom aux substances pulpeuses & succulentes.

Chaton , c'est une espèce de filer , d'axe ou de poinçon ressemblant en quelque sorte à la queue d'un chat ; il porte un amas de fleurs mâles ou femelles , presque

toujours dépourvues de pétales & de calice , mais il est garni d'écailles qui y suppléent.

Chaume , c'est une espèce de tuyau , ou de tige fistuleuse , destinée aux plantes graminées ; le collet de la racine du chaume est composé de nœuds qui produisent plus ou moins de jets qu'on nomme *tables*. Le chaume est ordinairement articulé , c'est-à-dire , coupé par des nœuds distribués de distance en distance ; il est aussi souvent garni de feuilles , que les agriculteurs nomment *faîne*.

Chevelure , on donne ce nom à une touffe de feuilles qui se forment au-dessus de certaines fleurs. Voyez *Bractée*.

Chevelue , on appelle ainsi les ramifications les plus menues des racines , qui sont quelquefois aussi fines que des cheveux ; ces ramifications se prolongent en terre , & s'étendent prodigieusement , c'est dans elle que réside la plus grande force de succion.

Cilicé , se dit d'une feuille qui est garnie de poils parallèles comme des cils.

Circonférence des feuilles , c'est le contour des feuilles observé , abstraction faite des sinus & des angles ; on entend par conséquent par ce mot , toute figure qui se présente comme un anneau comprimé de diverses manières ; on donne aussi le nom de circonférence au contour des fleurs ombellifères & des radiées.

Cloison , c'est la division intérieure des capsules ; quand il y en a plusieurs , la capsule se nomme multiloculaire ; dans les siliques il regne aussi en toute leur longueur une cloison membraneuse ; les semences qui se trouvent renfermées dans les deux espaces que laisse la cloison , sont attachées comme à un placenta à l'une & l'autre suture longitudinale des panneaux , au moyen d'un filet qui fait l'office de cordon ombilical.

Coëffe , c'est l'enveloppe mince , membraneuse , qui enveloppe la fructification dans plusieurs espèces de mousses.

Cœur ; on dit qu'une feuille est en forme de cœur , lorsqu'elle est ovoïde & échancrée à la base , quand l'échancrure est au sommet , on ajoute pour lors que la feuille est en forme de cœur renversé. On dit encore souvent qu'une semence est en forme de cœur , quand elle en a réellement la figure ; il y a des stipules en cœur , voyez *Stipules*.

Cohérentes , on appelle feuilles cohérentes , lorsque deux feuilles opposées l'une à l'autre sur une tige , s'unissent par leur base.

Coin , on dit quelquefois d'une feuille , qu'elle est en forme de coin ; l'extrémité du coin est pour lors du côté du pétiole.

Collet , c'est la base du tronc d'un arbre , & la partie supérieure de la racine , ou pour mieux dire , c'est la réunion du tronc avec la racine.

Commun , on donne cette épithète au receptacle qui porte des fleurs composées de l'aggrégation de plusieurs petites fleurs.

Complette , se dit d'une fleur qui renferme généralement toutes les parties qui lui sont ordinairement propres , telle que le calice , la corolle , l'étamine & le pistil.

Composée , cette épithète se donne aux feuilles , aux fleurs , aux tiges , aux dispositions & aux vrilles ; une feuille composée est celle dont le pétiole est terminé par plusieurs épanouissemens , c'est-à-dire , celle qui est formée de la réunion de plusieurs feuilles. On nomme folioles les petites feuilles qui la composent. Les fleurs composées sont dans le système de Tournefort celles qui étant rassemblées en grand nombre dans une enveloppe comme une espèce de calice différent du calice propre , ont en même temps cinq étamines réunies par leur sommet qui forment une gaine traversée par le pistil ; elles se divisent en fleuts à fleuron , en fleurs à demi-fleurons , & en fleurs composées de fleurons & de demi-fleurons. La tige composée est celle qui en se ramifiant cesse de

paroître une tige. La disposition des fleurs & des fruits prend aussi le nom de composée, lorsque le péduncule est branchu, rameux; la vrilte se dit quelquefois composée, lorsqu'elle se trouve divisée en deux ou trois filets.

Comprimée, c'est une épithète qu'on donne aux feuil- lorsqu'elles sont applaties.

Concave, c'est une épithète que M. Guettard a donnée à certaines espèces de glandes en petites outres; ces glandes sont toujours placées sur le pétiole, ou à la base des feuilles; on donne aussi souvent le nom de concaves aux feuilles qui ont naturellement cette disposition.

Cône, c'est une espèce de péricarpe, il est composé d'écaillés ligneuses, appliquées les unes contre les autres, s'ouvrant par le haut, & fixées par le bas sur un axe qui occupe le centre.

Congeneres, on nomme ainsi des plantes qui, quoique différentes, ont entr'elles des rapports constants dans leurs parties essentielles.

Conglobées, se dit des feuilles qui se trouvent ramassées en forme de boule.

Conifères, on qualifie de ce nom toutes les plantes dont les fruits sont en cône.

Conjugulée, on donne cette épithète à une feuille composée, dont les folioles latérales sont attachées par paires.

Convexe, on dit qu'une feuille est convexe, lorsqu'elle en a la figure.

Coque, c'est une espèce de péricarpe composée d'une seule piece, qui s'ouvre de bas en haut, d'un seul côté & sans suture.

Cordiforme, signifie en forme de cœur.

Cornet, on dit qu'un nectar est en cornet, lorsqu'il en a la forme.

Corolle, c'est la partie la plus apparente d'une fleur, elle est ordinairement colorée, quelquefois odorante, souvent divisée en feuilles; elle est portée par le calice,

avec

avec lequel les jardiniers la confondent quelquefois ; suivant le système sexuel de Linnæus, la corolle forme le palais où se célèbrent les nœces des plantes. Tournefort a tiré de la corolle la distinction particulière de chacune de ses classes.

Corimbe, on dit que des fleurs sont en corimbes, lorsqu'elles sont rassemblées en un bouquet composé de fleurs qui sont portées par de petits péduncules, attachés à un péduncule commun ; les petits péduncules inférieurs étant graduellement plus longs que les supérieurs, de manière qu'ils montent tous au même niveau ; les botanistes nomment *fastigiati*, les fleurs en corimbe, dont les bouquets sont horizontalement aplatis comme s'ils eussent été tondus au ciseau ; quand les fruits d'une plante sont disposés de la même manière que les susdites fleurs, ils se nomment pareillement fruits en corymbe ; le corymbe est proprement dit, le terme moyen entre la grappe & l'ombelle ; ses fleurs sont pédunculées comme les leurs, mais les péduncules du corymbe montent graduellement comme ceux de la grappe, & arrivent tous à la même hauteur comme ceux de l'ombelle.

Cosmétique, on appelle ainsi tout ce qui sert à entretenir ou procurer la beauté de la peau.

Cosse, on nomme ainsi les panneaux qui forment la silique ou gousse des plantes légumineuses.

Côtés des feuilles, *latera* ; ce mot est pris pour le port général de la feuille, en sorte que pour appercevoir ses côtés, il faut la considérer dans une direction perpendiculaire.

Cotoneuse, se dit d'une feuille qui est couverte de poils que la vue ne distingue point, mais que le tact annonce.

Cotyledons, ce sont deux corps réunis, très-visibles dans la fève & dans toutes les semences des légumineuses, sur-tout lorsqu'elles ont resté quelque temps dans la terre, ou dans l'eau. Voyez *art. Lobes*.

Couche, *Bulbes en couches ou tuniquées*, c'est-à-dire, formées de plusieurs tuniques, qui s'enveloppent les unes dans les autres.

Couche, terme de jardinage : on nomme ainsi une quantité de fumier chaud, rangé & entassé avec art pour opérer l'accroissement des plantes malgré tous les mauvais temps. *Couche* se dit encore des fibres du bois des arbres qui sont placées longitudinalement les unes sur les autres.

Couler, terme de jardinage, qui se dit des fruits qui ayant fleuri n'ont pas ensuite noué ; on nomme bleds coulés, ceux dont les épis ne contiennent que de petits grains vuides de farine.

Courante, se dit d'une feuille aîlée, dont les folioles se prolongent sur la tige, formant quelquefois des articulations. On donne encore cette épithète à une feuille simple qui suit la tige, de manière qu'elle y est collée depuis la base jusqu'à son milieu, & qu'elle est libre depuis son milieu jusqu'à son extrémité.

Couronne, on nomme ainsi dans les fleurs radiées les demi-fleurons qui en occupent la circonférence. Quand il s'agit de fruits, on appelle couronne simple, un ornement formé par une membrane, ou par des poils qui terminent certaines semences.

Couverte, se dit d'une semence qui est renfermée dans un péricarpe quelconque.

Crenelée, se dit d'une feuille dentée, dont la dent est tournée en dehors, sans se recourber ni vers la base, ni vers le sommet ; cette dent est quelquefois aiguë, quelquefois arrondie, quelquefois garnie elle-même de dentelures.

Croissant, on dit qu'une feuille est en croissant, lorsqu'elle est coupée comme une faux.

Cruciforme, se dit d'une fleur qui a quatre pétales disposés en forme de croix.

Cryptogamie, on donne ce nom aux plantes qui ont de si petites fleurs qu'on ne peut les appercevoir, ou qui les ont renfermées dans le fruit.

Cucurbitacées, se dit des plantes qui sont de la famille des courges.

D.

DÉCAISSER, terme de jardinage ; il se dit des arbres qu'on ôte des caisses où ils étoient.

Decandrie, ce terme désigne que les fleurs n'ont que dix étamines.

Déchauffer, terme d'agriculture ; on dit qu'une terre déchauffe, quand elle est de nature à se gonfler beaucoup dans les grandes gelées, & s'affaisser aux dégels. On dit encore déchauffer un arbre, pour signifier, ôter en automne une partie de la terre qui est sur les racines, afin que l'eau des pluies & des neiges de l'hiver y pénètre mieux.

Décoction, liqueur où on a bouilli une substance végétale.

Décoller, terme de jardinage qui se dit particulièrement des greffes qui se séparent de leur sujet.

Défenses, ce sont les supports des plantes ; on en distingue de plusieurs espèces, de chacune desquelles nous parlerons dans son article.

Demi-fleuron, c'est un pétale formé par un tuyau étroit, qui s'évase par le haut, & se termine en grande lèvre, ou espèce de langue, d'où lui est venu le nom de *pétale à languette* ; le bout de cette languette a souvent quelques dentelures ; le reste est comme aux fleurons.

Dentée, se dit d'une feuille, quand ses bords ont des pointes horizontales, distinctes & égales.

Dentelée, se dit aussi d'une feuille qui est découpée en dentelures moins égales & écartées les unes des autres.

Descendante, les Botanistes nomment ainsi la partie de la tige qui s'enfonce perpendiculairement, & produit des racines latérales.

Déobstruant, remède propre à lever les obstructions.

Diadelphie, on qualifie de ce nom des fleurs hermaphrodites, dont les étamines sont réunies par leurs filets comme en deux faisceaux qui diffèrent l'un de l'autre par leur forme ; l'un fait une gaine & entoure le pistil, l'autre en est séparé.

Diaphorétiques, ce sont des remèdes qui ont la vertu d'exciter la transpiration.

Diandriques, on appelle ainsi les fleurs qui ont deux étamines.

Dichotome, c'est-à-dire, fourchue, qui se bifurque ou se divise en fourche.

Didynamiques, ce sont des fleurs hermaphrodites à quatre étamines, dont deux sont plus longues que les autres.

Digitée ou en éventail, se dit d'une feuille à découpures profondes, formant de longs appendices, comme des doigts ; une feuille digitée est mise au nombre des feuilles composées.

Digyniques, ce sont les fleurs qui ont deux pistils.

Diphille, on qualifie ainsi un périanthe qui a trois pièces, & une vrille qui est divisée en trois filers.

Diœciques, ce sont les plantes qui ont des fleurs mâles & des femelles sur des individus séparés.

Dipsacées, M. Vaillant a donné ce nom à une feuille de plantes, dont la fleur a du rapport à celle du chardon à bonnetier.

Disque, c'est la partie qui occupe le centre des fleurs radiées & qui est un assemblage de fleurons ; on se sert encore de ce terme pour désigner toute l'étendue d'une fleur composée de plusieurs pétales.

Diurétique, c'est un remède qui tend à procurer un écoulement plus abondant des urines, en déchargeant le sang de ses sérosités superflues.

Dodecandriques, on appelle ainsi les fleurs qui ont douze étamines.

Dragons, ce sont des jeunes tiges qui s'élèvent des racines rampantes des arbres, arbrisseaux & arbustes.

Drapé, les Botanistes appellent ainsi des feuilles velues, & dont le tissu est serré.

Dru, terme d'agriculture, qui signifie, épais, touffu.

E.

*E*BOURGEONNER, c'est retrancher les bourgeons superflus; cette opération consiste à ôter avec la serpette toutes les branches inutiles, ou celles qui font de la confusion, ou qui empêchent qu'un arbre ne fasse un bel effet, pour que les autres branches se fortifient.

Ecailleux, se dit de différentes parties d'une plante, qui se trouvent disposées en forme d'écailles.

Echancrée, se dit d'une feuille dont les bords sont entamés, comme si on en avoit emporté une pièce avec des ciseaux.

Echaudé, terme d'agriculture. On nomme bled échaudé celui dont le grain maigre, sec, ridé & flétri contient peu de farine.

Echinée, se dit d'une semence couverte de piquans.

Ecorcer le bois, signifie, le peler, en ôter l'écorce; c'est ordinairement dans le mois de mai que se fait cette opération.

Ecussoner, c'est une opération par laquelle on substitue les branches d'un arbre à celles qui sont naturelles à un autre.

Effaner, c'est la même chose qu'effeuiller, ôter les feuilles à un arbre.

Efflorescence, les Botanistes se servent de cette expression pour désigner les temps respectifs où les fleurs s'épanouissent.

Egayer un arbre qui est en espalier, c'est-à-dire, le palisser si proprement que les branches soient également parragées des deux côtés.

Elliptique, se dit d'une feuille plus longue que large, dont les deux extrémités ont la même largeur, & sont formées l'une & l'autre par les mêmes segmens de cercle.

Embryon, c'est la partie des pistiles qui doit devenir fruit.

Emmenagogues, remèdes propres à faire venir les règles.

Emolliens, remèdes destinés à amollir les duretés.

Emoussée, se dit d'une feuille qui est terminée par une échancrure obtuse.

Emulsion, c'est une boisson qui approche de la couleur & de la consistance du lait.

Encaisser, terme de jardinage; il signifie, mettre un arbre dans une caisse.

Engrais, terme d'agriculture; on nomme ainsi toutes les choses qui servent à fertiliser les terres.

Enneandriques, fleurs qui ont neuf étamines.

Ente, c'est la même chose que greffe.

Entier, se dit d'un chaume qui n'a aucune espèce de branche; on désigne aussi par ce nom une feuille qui n'a point de sinus.

Entonnoir, une fleur en forme d'entonnoir, c'est celle qui est en tuyau surmonté d'un disque ou évasement.

Enveloppe, c'est une espèce de calice qui embrasse plusieurs fleurs ramassées ensemble, qui chacune peuvent avoir leur périanthe particulier; c'est le calice improprement dit de Tournefort.

Epanouissement, ce terme se dit de quelques fleurs, qui après leur développement s'ouvrent & se ferment à certaines heures du jour & de la nuit; les heures de l'épanouissement varient en raison de la chaleur & des autres causes, qui élèvent dans les vaisseaux des pétales les sucs qui les forcent à s'étendre & à se redresser; elles varient donc comme le temps de la floraison selon l'espèce de la plante, la température du climat & celle de la saison; Linnéus a déterminé ces heures sur plusieurs plantes observées dans le jardin d'Upsal; il appelle le tableau de cette détermination, l'*Horloge de Flore*; selon M. Adanson, il ne diffère guères que d'une heure sur celui qu'on pourroit faire pour Paris;

le botaniste Suédois appelle solaires les fleurs qui s'épanouissent & se forment pendant le jour ; il les divise en trois espèces , les équinoctiales , les tropiques & les météoriques. Les équinoctiales sont celles qui s'ouvrent & se ferment à une heure fixe ; les tropiques sont celles qui s'ouvrent le matin & se ferment le soir , plutôt ou plus tard , selon la brièveté ou la longueur du jour ; les météoriques sont celles dont l'heure de l'épanouissement est dérangée par la température de l'athmosphère ; tel est le Laitron de Sibérie qui se ferme la nuit , si le lendemain doit être un jour sercin ; tel est aussi le Souci d'Afrique , lorsqu'il n'est pas épanoui à six heures du matin , on est assuré qu'il pleuvra dans la journée ; les sucs qui contribuent à son expansion peuvent être comparés à la liqueur du baromètre ; en général les fleurs à demi-fleurons s'ouvrent le matin ; les Malvacées avant midi , les Becs de Grue le soir ; la Belle de Nuit & le Cierge rampant, la nuit, &c. L'heure où elles se forment est également déterminée.

Épi , on nomme fleurs en épi celles qui sont sessiles , & rassemblées sur un péduncule commun , allongé souvent en forme de cône.

Épiderme , c'est l'enveloppe générale des plantes.

Épine , c'est une production dure , quelquefois ligneuse , toujours adhérente au corps de la plante , dont on ne peut détacher l'une sans déchirer l'autre ; elle est donc une expansion du corps ligneux , & peut être comparée aux cornes des animaux qui adhèrent aux os du crâne. L'épine est ou simple ou triple ; quelques épines sont distribuées sur les tiges & sur les branches ; d'autres sur les périoles , d'autres sur les feuilles ; sur leurs nervures ; sur les calices , sur les fruits , &c. Quelques plantes perdent leurs épines , les unes par la culture , les autres en vieillissant.

Épineux , se dit des tiges , des feuilles & des fruits qui ont des épines.

Eplucher, terme de jardinage, se dit des fruits dont on ôte une partie, & sur-tout les plus petits, quand il y en a trop de noués; ce mot s'entend aussi du bois mort & des branches chiffonnes, qu'il faut prendre soin d'ôter aux arbres.

Ergotés, se dit des épis de seigle qui se prolongent quelquefois en forme de corne.

Etamine, c'est la partie mâle de la génération; elle est renfermée dans l'intérieur de la corolle ou du calice: si la fleur est à pétale, elle varie en nombre; sa forme est ordinairement celle d'un filet surmonté d'un bouton qui renferme une poussière: on y distingue donc trois parties; 1.^o le filet, c'est une espèce de pédicule qui supporte le sommet; 2.^o le sommet ou anthère, il paroît au dehors comme un bouton; c'est un petit sac, une capsule qui a une ou deux cavités, & qui est fixé à la pointe du filet, c'est le véritable organe de la génération, il varie dans sa forme; 3.^o la poussière fécondante, elle est contenue dans l'intérieur du sommet, & s'en échappe lorsque la maturité la fait en-trouvrir.

Etendard, c'est le pétale supérieur plié en dos d'âne, quelquefois relevé des fleurs papillonacées.

Êtété, se dit d'un arbre dont on a coupé la tête & les branches.

Étioler, se dit des plantes qui pour être trop pressées entr'elles, ou qui étant autrement privées d'air s'élèvent trop haut, & qui au lieu d'être grosses & fortes, deviennent par là foibles & menues; les feuilles des plantes fort étiolées n'ont point la couleur verte de celles qui se portent bien; la privation de la lumière du soleil paroît en être cause en partie.

Etoilée, se dit des feuilles, lorsqu'il y en a plus de six verticillées.

Evacuans, remèdes qui vident sensiblement les humeurs, ou par haut ou par bas, ou par la surface de la peau.

Evasée, c'est-à-dire, ouvert dans le milieu un arbre en buisson qui se ferre trop.

Eventail, une feuille en éventail est la même chose qu'une feuille digitée.

Eunuques, ce sont en botanique des fleurs stériles, dont le germe avorte sans produire des semences fécondes.

Exotiques, c'est-à-dire, plantes étrangères à notre climat.

F.

F*ANE*, c'est la même chose que feuille.

Faucher, c'est couper l'herbe des prés ou les tiges des grains avec un instrument que l'on nomme *faulx*, l'ouvrier est appelé faucheur.

Faucille, instrument qui sert à couper d'une main l'herbe, les bleds, &c. que l'on tient à poignée de l'autre main.

Faux bois, terme de jardinage; on nomme ainsi des branches menues, chiffonnes, & mal conditionnées, qui sont incapables de devenir belles.

Femelles, on appelle fleurs femelles celles qui ont un, deux ou plusieurs pistils sans étamines.

Fente, se dit de la greffe; pour cette opération, on coupe transversalement la branche ou la tige du sujet qu'on veut enter; on la fend ensuite longitudinalement; on taille l'extrémité de la greffe en forme de coin; on l'introduit dans la fente du sujet de manière que les aubiers des deux arbres coïncident exactement.

Feuillage, terme qui signifie les feuilles considérées en gros & dans leur ensemble avec les branches ou rameaux, & même avec les fleurs & les fruits.

Feuilles, ce sont des substances déliées, plates & minces, qui servent d'ornement aux plantes, & qui viennent ordinairement au printemps pour tomber au commencement de l'automne; on les divise en trois classes, en simples, composées & déterminées. Les sim-

ples sont celles dont le pétiole n'en porte qu'une ; on considère dans les simples la circonférence , les angles , les sinus , la bordure , la surface , le sommet & les côtés.

1.^o La circonférence ; elle dépend du contour de la feuille considérée sans sinus & sans angles , abstraction faite des divisions qu'elle peut avoir ; une feuille considérée de cette manière , est orbiculaire ou ronde , lorsque la longueur & la largeur sont égales , & lorsque les bords sont également éloignés du centre , & sous-orbiculaire , lorsqu'elle a plus de largeur que de longueur ; celle qui est en forme d'œuf est plus longue que large ; sa base ou sa partie inférieure forme un segment de cercle , pendant que la supérieure se rétrécit vers le sommet ; lorsque cette feuille est attachée au pétiole par sa partie la plus étroite , elle a la forme d'œuf renversé. La feuille elliptique ou ovale est celle qui est plus longue que large , & dont les parties supérieures & inférieures sont de même largeur , l'une & l'autre même segment de cercle , l'oblongue contient par sa longueur plusieurs fois sa largeur ; elle a l'une & l'autre extrémité plus étroite qu'un segment de cercle : on appelle feuille en forme de coin , celle dont la longueur surpasse la largeur , & dont la partie inférieure se rétrécit peu à peu depuis la supérieure jusqu'à la base. 2.^o Les angles , ils sont les parties saillantes de la feuille considérée comme entière ; on distingue en conséquence les feuilles en lancéolées , linéaires , subulées , rhomboïdes , triangulaires , deltoïdes , oreillées & arrondies ; les lancéolées sont celles qui sont rétrécies par l'extrémité & par la base ; les linéaires ou filiformes sont rétrécies par les extrémités , mais parallèles dans leur longueur ; quand ces dernières sont terminées en pointe , elles prennent pour lors le nom de subulées ou en forme d'ailène. Les rhomboïdes sont celles qui sont à quatre côtés , dont les côtés correspondans forment quatre angles , deux aigus & deux obtus ; les triangulaires sont à trois angles , les deltoïdes à quatre angles , les quin-

angulaires à cinq angles ; les oreillées ont deux appendices ou oreilles à la base près du pétiole ; & les arrondies enfin sont sans aucun angle. 3.^o Les sinus ou échancrures ; ce sont les échancrures des feuilles qui forment dans leur disque des angles rentrants ; en ce sens la feuille est en cœur, cordiforme, lorsqu'elle est ovoïde & échancrée à sa base ; quand son échancrure est au sommet, on dit qu'elle est en cœur renversé ; elle est reniforme, lorsqu'elle est en forme de rein ; en croissant, lorsqu'elle est coupée comme une faux ; en fer de flèche, quand elle est triangulaire, échancrée à sa base ; en fer de pique, lorsque les pointes font un crochet vers la base, en s'écartant considérablement ; quand plusieurs caractères se trouvent réunis dans une même feuille, on emploie pour les désigner des termes composés, comme en forme de cœur ovale, en forme de cœur en fer de flèche, en forme de pique en cœur. La première partie du mot composé annonce le caractère dominant ; la seconde exprime la modification particulière. La feuille en forme de violon, est une feuille oblongue serrée par les côtés, plus large par le haut & encore plus par le bas ; la feuille fendue en deux, est une feuille partagée par le haut en deux parties, dont les bords inférieurs en dedans de la découpure sont droits ; il y en a qui sont fendues en trois, en quatre. On appelle feuilles découpées en trois lobes, celles qui sont partagées jusqu'au milieu en trois parties écartées les unes des autres, & qui ont les bords arrondis. On remarque encore parmi les différentes feuilles, celles qui sont en forme de main ouverte ; elles se partagent en plusieurs parties depuis le haut jusqu'au delà du milieu, ou presque jusqu'à la base ; 2.^o celles qui sont découpées en forme d'ailes, c'est-à-dire, qui ont plusieurs sinus latéraux séparés par de longues découpures horizontales ; 3.^o les déchiquetées, qui ont plusieurs sinus jusqu'au milieu de la feuille, & dont les lobes sont eux-mêmes découpés ; il y en a aussi qui ont sur

leurs côtés des sinus séparés par des lobes peu découpés, & qu'on nomme remplis de sinus; si leurs lobes latéraux sont linaires, on les appelle sinuées dentées, & sinuées en arrière, lorsque les lobes sont aigus & tournés vers leur base. Une feuille est partagée en cinq, lorsqu'elle est découpée en cinq parties jusqu'à la base; en deux, lorsqu'elle est coupée en deux parties, ainsi du reste; la feuille entière n'a aucun sinus, même dans le disque de la fleur.

4.^o La bordure : elle marque les diversités qui se rencontrent sur le limbe & au bord même de la feuille, pourvu qu'elles n'intéressent pas le disque; on n'y comprend point celles qui se rencontrent à la bordure du sommet. En considérant les feuilles de la sorte, elles sont dentelées, leur bordure est pour lors garnie de pointes horizontales de même consistance que la feuille, distinctes & séparées les unes des autres. Il y en a aussi qu'on a appellées à dent de scie; elles ont la bordure garnie d'angles aigus, c'est-à-dire, les dentelures posées les unes sur les autres en manière de thuyes, & ordinairement tournées vers le sommet; on en distingue de trois sortes; les unes ont les dentelures tournées vers la base; d'autres ont les dentelures émoussées & les troisièmes enfin ont deux sortes de dentelures, les plus petites sur les plus grandes: on remarque aussi des feuilles crénelées, dont la bordure est garnie d'angles ou dentelures contiguës & tournées en dehors sans être aucunement courbées, ni vers le sommet; ni vers la base; ces sortes de feuilles sont crénelées de trois façons, ou elles ont des dentelures aiguës, ou elles les ont arrondies, ou elles en ont de plus petites sur de plus grandes. Les feuilles considérées toujours suivant la bordure, sont ou godronnées, dont la bordure est marquée dans toute sa longueur de lobes qui font chacun un segment de cercle, entremêlés de sinus obtus, ou cartilagineux, dont la bordure est distinguée par une espèce de cartilage de la substance membraneuse ou

charnue de la feuille ; ou ciliées , c'est-à-dire , bordées tout autour de poils ou de filets parallèles ; comme les cils des paupières ; ou déchirées , dont la bordure est composée de segmens entassés de grandeur & de figure différente ; ou crépues & frisées , qui sont onduées , plissées , & en même temps dentelées , crénelées , déchiquetées , déchirées ; telles sont les feuilles de la tanaïsie crépue , ou rangées , qui ont des sinus dans leur disque , & d'autres plus petits & obtus à leur bordure , ou enfin tout-à-fait entières , dont la bordure est entière & sans aucune découpe.

5.^e La surface d'une feuille montre ce qui se rencontre au-dessus & au revers. Les feuilles ainsi considérées , sont drapées ou cotoneuses , c'est-à-dire , couvertes de poils que l'œil ne peut pas distinguer , telles sont les feuilles de la Jacobée maritime ; elles sont encore velues , ou pour mieux dire , garnies de poils apparens , telles sont les feuilles du Cortufa. D'autres sont hérissées de poils ; elles ont par conséquent la surface parsemée de filets fragiles , telles sont les feuilles de Bourrache ; ces feuilles sont encore raboteuses , lorsque leur disque est couvert de petites inégalités ; elles sont piquantes , si leur surface est hérissée de pointes cartilagineuses , piquantes & faciles à arracher ; elles sont épineuses , quand elles ont le disque ou la bordure armée de pointes cartilagineuses , piquantes & tellement adhérentes à la feuille , qu'on ne sauroit les en séparer sans l'offenser ; elles sont mammelées , c'est-à-dire , elles ont la surface couverte de mamelons ou de très-petites vésicules ; elles sont lissées , je veux dire , lustrées , comme si on les avoit polies exprès , telles sont les feuilles de l'Angélique de Canada ; elles sont plissées , de la base desquelles sortent des vaisseaux ou nervures qui s'étendent jusqu'aux bords ; les unes élevant , & les autres abaissant alternativement le disque de la feuille à angles aigus ; telles sont les feuilles de Pied de-lion ; elles sont onduées & ont la partie du disque plus étendue qu'un

cercle de même diamètre, en sorte que les bords s'abaissent & s'ouvrent symétriquement ; elles sont ridées, c'est-à-dire, qu'elles ont des veines enfoncées, qui laissent entr'elles des espaces plus étroits que la substance du disque, de façon que la chair interposée surmonte, telles sont les feuilles de la Sauge ; elles sont veinées, c'est-à-dire, parsemées de vaisseaux très-branchus, où l'on apperçoit une grande quantité d'anastomoses ; elles sont nerveuses, dont les vaisseaux sont simples & s'étendent parallèlement de la base vers le sommet, sans aucune ramification ; enfin elles sont nues, c'est-à-dire, opposées à toutes celles dont nous venons de parler.

6.^o Le sommet ; il représente les diversités qui se rencontrent à l'extrémité supérieure des feuilles. Les feuilles considérées sous cet aspect sont ou tronquées, dont le sommet est terminé par une ligne transversale ; ou émoussées, dont le sommet est terminé par un sinus obtus, ou rongées au sommet, c'est-à-dire, tronquées & partagées au sommet par un sinus aigu & ouvert, ou échancrées, qui ont une petite entaille au sommet ; ou obtuses & terminées par un segment de cercle ; ou aiguës, terminées par un angle aigu ; ou pointues, terminées par un sommet pointu ; ou enfin obtuses avec une pointe, dont le sommet est obtus & terminé par une petite pointe aiguë.

7.^o Les côtés. Pour considérer les côtés d'une feuille, il faut l'examiner dans une situation perpendiculaire ; on appelle teretes les feuilles qui sont cylindriques, excepté le sommet qui ne l'est pas d'ordinaire ; fistuleuses, celles qui sont creuses en dedans, ce qui est facile à connoître lorsqu'on les coupe transversalement ; telles sont les feuilles d'oignon ; charnues, celles qui sont pleines de pulpe ou substance charnue entre les membranes, formant les surfaces supérieures & inférieures, telles sont les feuilles des plantes succulentes ; membraneuses, dont les membranes ne renferment point de pulpes ; déprimées, qui portent une empreinte

comme si elles avoient été du côté qui regarde la tige ; comprimées , qui portent la même empreinte des deux côtés opposés , qui ne regardent point la tige ; plates ou applaties , qui sont déprimées & dont la longueur peut être censée horizontale ; convexes , qui sont déprimées & relevées dans leur milieu ; concaves , qui sont déprimées & creusées dans leur milieu ; en gouttière , qui sont déprimées & creusées en gouttière , suivant toute leur longueur en forme d'épée , qui sont comprimées & affichées par leurs deux bords avec une arrête convexe dans toute leur longueur , en forme de sabre , telle que la feuille du *Mesembryanthemum*. Ces espèces de feuilles sont comprimées en fer de lance , dont les côtés sont convexes dans leur partie inférieure , le bord extérieur affilé , & l'intérieur obtus & plus droit ; en forme de doloire , c'est-à-dire , qu'elles sont comprimées , sous-orbiculaires , obtuses , saillantes & affilées en dehors , presque cylindriques par leurs parties inférieures ; en forme de langue , elles sont linaires , obtuses , charnues , déprimées , convexes en-dessous & ordinairement cartilagineuses à leur bordure ; à trois faces , qui ont trois faces planes & presque en même temps toujours subulées ; à trois arrêtes , qui ont trois faces creusées en gouttière , & les arrêtes affilées & membraneuses ; fillonnées , qui sont entourées d'arrêtes sans nombre , seulement entremêlées de sinus obtus ; & enfin cannelées , qui sont empreintes de lignes creusées parallèlement en toute leur longueur.

Les feuilles composées se divisent en composées proprement dites , en recomposées , & en surcomposées. Les feuilles composées sont formées de plusieurs feuilles simples réunies ensemble & portées sur un même pétiole. On nomme folioles , les feuilles qui forment la feuille composée : les composées proprement dites , ne sont que le produit d'une seule composition ; elles sont en éventail , lorsqu'elles rassemblent plusieurs folioles au sommet d'un pétiole commun , ou pour mieux dire ,

lorsqu'elles sont composées de plus de quatre folioles ternées, quand elles portent trois folioles à l'extrémité d'un pétiole commun : quand les feuilles n'ont point de pétiole commun, on les nomme ternées à feuilles sessiles, & ternées à feuilles pétiolées, lorsqu'elles ont chacune leur pétiole. Binnées, si elles ont deux folioles sur un pétiole commun ; rameuses, quand elles portent plusieurs folioles sur un pétiole commun & branchu ; ailées ou en forme d'aîles, lorsqu'elles sont composées de folioles rangées des deux côtés le long d'un pétiole commun. Les feuilles composées sont encore faites en manière de lyre, elles sont formées d'une seule feuille simple, qui se divise dans la partie inférieure, de telle sorte que les découpures d'enbas s'écartent du corps de la feuille, & sont détachées de la plus grande qui occupe le haut. Il y en a encore qu'on appelle conjuguées, qui sont composées d'une seule paire de folioles ; elles sont ou sans vrilles, ou avec des vrilles, ou avec des pétiotes membraneux, ou enfin avec des pétiotes accompagnés de stipules.

Les feuilles recomposées sont celles dont le pétiole commun se partage deux fois avant de se charger de folioles ; elles sont composées de feuilles composées elles-mêmes chacune de trois folioles, telles que les feuilles de l'Épimedium, ou de feuilles doublement conjuguées, ou de feuilles déjà composées d'aîles.

Les feuilles surcomposées sont celles dont le pétiole commun se subdivise plus de deux fois avant que de se charger de folioles ; ou le pétiole de ces feuilles se partage trois fois en trois branches avant d'admettre des folioles, ou le pétiole pousse trois divisions en aîles, avant que de se charger de folioles.

Outre les feuilles simples & composées dont nous venons de parler, il y a des auteurs qui en admettent encore d'autres qu'ils nomment déterminées ; la détermination des feuilles consiste dans cette différence qui fait distinguer une feuille sans avoir égard à sa structure

ni à la forme. En considérant ainsi les feuilles, on prend garde à leur direction, à leur lieu, à leur insertion & à leur situation.

1.^o La direction est cette expansion que la feuille acquiert depuis la base jusqu'au sommet ; les feuilles considérées sous cet aspect , sont ou arquées , qui se retournent vers la plante , ou dressées , qui font un angle fort aigu avec la perpendiculaire ; ou ouvertes , qui s'écartent de la perpendiculaire presque à angle droit ; ou horizontales , qui font angle droit avec la perpendiculaire ; ou roulées , dont la partie supérieure se roule en-dessous ; ou radiantes , qui poussent une racicule de leur sommet , ainsi qu'on le remarque dans les fougères ; ou enracinées , qui poussent des racines de dessous son disque ; on en fin flottantes , qui se soutiennent à la surface de l'eau , telles que les feuilles de nénuphar.

2.^o Le lieu de la feuille est l'endroit de la plante où elle est attachée ; les feuilles examinées sous cet aspect se divisent en séminales , radicales , florales , rameuses , caulines , & sous-alaires. La séminale est celle qui sort la première de la semence germée ; la radicale , celle qui sort immédiatement de la racine sans être attachée à la tige ; la rameuse , celle qui est posée sur une branche ; la cauline , celle qui sort de la tige ; la sous-alaire , celle qui se trouve sous les ramifications , ou de l'aisselle de laquelle il sort une ou plusieurs branches ; la florale enfin , celle qui se trouve proche de la fleur & qui ne pousse jamais sans elle.

3.^o L'insertion est aussi une chose qu'on doit remarquer dans l'examen des feuilles ; c'est la manière avec laquelle elles sont attachées à la plante : ainsi considérées , elles sont ou en rondache , c'est-à-dire , que leur pétiole s'attache au disque même & non pas à la base , ou au bord de la feuille , telle que la feuille de Nénuphar ; ou pétiolés & à queue , dont le pétiole entre dans le bord de la base ; ou sessiles & sans queue , qui nais-

sont immédiatement sur la tige ou sur les branches sans aucun pétiole ; ou courantes , dont la partie inférieure s'étend au-delà de la base , en descendant le long de la tige & des branches , & y est adhérente ; telles sont les feuilles de Chardon ; ou embrassant la tige , amplexicaules , dont la base s'étend de façon qu'elle environne la tige de tout côté ; ou embrassant à demi la tige , dont les lobes de la base sont trop courts pour l'embrasser totalement ; ou enfilées , dont le disque est transpercé par la tige , la branche ou le péduncule sans aucune adhérence à ses bords ; ou cohérentes , c'est-à-dire , opposées , dont les bases s'unissent de part & d'autre & ne font qu'un seul corps , telles que les feuilles de l'Empatoire ; ou enfin en gaine , dont la base porte sur un cylindre ou tuyau qui enveloppe de toute part la tige , une branche , ou le péduncule , telles que les feuilles du *Lapathum*.

4.^o La situation des feuilles sert aussi à les faire distinguer ; elle dépend de la position de chaque feuille par rapport aux autres : on en distingue de dix espèces considérées sous cet aspect ; 1.^o les articulées , qui croissent du sommet l'une de l'autre ; 2.^o les éroilées , dont il y en a plus de six verticillées , ou rangées comme par anneaux autour de la tige ; 3.^o les ternes , les quaternes , ce sont les précédentes rangées trois à trois , quatre à quatre , telles que les feuilles du *Laurier-rose* ; 4.^o les opposées , elles sont ainsi nommées , parceque la tige se trouve entre deux feuilles posées vis-à-vis l'une de l'autre ; 5.^o les alternes , qui sont rangées comme par degrés en montrant le long de la tige de part & d'autre alternativement ; 6.^o les dispersées , qui sont parsemées sur la plante sans aucun ordre ; 7.^o les entassées , qui sont tellement pressées qu'on n'en peut découvrir distinctement la situation ; 8.^o les écailleuses , ou arrangées en manière de ruiles ou d'écailles , qui sont entassées & en même temps dressées ; 9.^o celles qui sont en paquets , c'est-à-dire , qui sortent plusieurs ensemble d'un même

point , telles sont les feuilles de Meleze ; 10.^o enfin celles qui sont articulées sur les branches.

Fibreux , se dit d'une racine qui est composée de fibres ou de filamens ; cette espèce de racine varie dans sa direction , dans sa substance , dans sa forme & dans sa durée , de-là on la nomme suivant sa direction traçante , stolonifère , perpendiculaire , fusiforme & napiforme ; suivant sa substance elle est appelée charnue , ligneuse , suivant sa forme simple , branchue & dichotome.

Filet , en terme de Botanique se dit en général de tout corps menu & assez long : on dit un filet ligneux , un filet cortical ; les folioles des feuilles conjuguées sont portées par un filet commun ; le nom de filet est spécialement attribué au pédicule qui supporte les sommets des étamines.

Fistuleuse , se dit d'une feuille , d'une tige ou d'un stile qui forme un tuyau ou canal , dont l'intérieur est creux.

Fleur , c'est la partie de la plante qui contient les organes de la fructification des végétaux ; on distingue dans la fleur le calice , la corolle , l'étamine & le pistil ; on parle de toutes ces parties de la plante en autant d'articles séparés. Les fleurs se divisent en simples & composées ; les simples sont celles qui sont seules dans un calice ; les composées sont celles qui étant rassemblées en grand nombre dans une enveloppe comme une espèce de calice différent du calice propre , ont en même temps cinq étamines réunies par leurs sommets qui forment une gaine traversée par le pistil ; les fleurs simples se subdivisent en fleurs d'une seule pièce , on les nomme monopétales , & en fleurs de plusieurs pièces qu'on appelle polypétales.

Les fleurs simples monopétales sont régulières ou irrégulières. Les fleurs simples monopétales régulières , sont celles dans lesquelles toutes les parties de la corolle sont coupées uniformément & placées à égale distance d'un

jamais interverti entre les diverses espèces, mais le temps où l'on sème, l'accélère ou le retarde pour les annuelles & même pour les vivaces la première année ; la température de la saison influe encore sur les unes & sur les autres ; elles sont toujours plus hâtives dans les pays chauds : il s'ensuit de-là que les plantes cultivées hors de leur terroir natal ne fleurissent que dans le temps où la chaleur du lieu qu'elles habitent est égale à celle qui les eût fait fleurir dans leur pays.

Florale, c'est une fleur qui est près de la fleur, & qui ne paroît qu'avec elle.

Flosculeuse, voyez *Fleur*.

Flottante, se dit d'une feuille qui surnage l'eau.

Flute, se dit d'une espèce de greffe qui se pratique de la manière suivante. Dans le temps de la sève, on prend des greffes du même diamètre que le sujet ; on coupe circulairement l'écorce de celui-ci, de manière qu'on en puisse enlever un anneau : on détache de la greffe un anneau de l'écorce de la même étendue, & chargé d'un ou de plusieurs boutons, on l'introduit sur le sujet à la place de l'écorce qu'on lui a enlevée, & on couvre le tout de cire.

Foliation, on nomme ainsi une espèce de roulement que les feuilles éprouvent dans le bouton ; ce roulement par sa diversité distingue les plantes, encore mieux que les formes extérieures du bouton : mais on ne peut bien l'observer que lorsque la sève a développé les parties internes ; développement qui commence pendant l'hiver, & qui n'est sensible qu'au printemps ; selon Linnæus les feuilles sont roulées dans le bouton sous dix formes principales, qui déterminent autant de foliations différentes : 1.^o quelquefois la feuille est repliée de manière que ses bords latéraux sont roulés sur eux mêmes en dedans, tel que dans le Chèvrefeuille ; cette foliation peut être simple, alterne ou opposée ; 2.^o quelquefois les bords latéraux sont roulés en dehors, comme dans Romarin ; cette foliation peut être opposée ; 3.^o où les

bords d'une feuille sont compris alternativement entre les bords d'une autre feuille , comme on le remarque dans l'Œillet ; 4.^o ou bien le bord d'un des côtés d'une feuille enveloppe le bord de l'autre côté de la même feuille roulée en spirale , en manière de croûte , tel que dans le Balifier ; cette foliation comprend quelquefois plusieurs feuilles ; 5.^o où les feuilles se recouvrent parallèlement , de sorte que les deux bords d'une feuille aboutissent aux deux bords de la feuille opposée , comme dans le Troëſne ; 6.^o les feuilles sont quelquefois en recouvrement les unes sur les autres , de manière que les deux bords de la feuille intérieure sont embrassés par celle qui la recouvre , comme dans l'Iris ; 7.^o quelquefois les bords d'une feuille se rapprochent parallèlement l'un de l'autre , comme dans le Chêne ; 8.^o ou bien la feuille est plusieurs fois plissée & repliée sur elle-même , longitudinalement , comme dans l'Erable ; 9.^o ou les feuilles sont repliées en bas vers le pétiole , comme dans l'Aconit ; 10.^o enfin ou elles sont roulées en-dessous , en spirales transversales , en sorte que leur sommet occupe le centre , comme dans les Fougères.

Folioles, ce sont les petites feuilles qui forment les feuilles ailées & doublement ailées , voyez *art. feuille*.

Follicule, c'est en terme botanique une bourse membraneuse qui enveloppe des semences ; telles sont les vésicules du colurea & de l'alkekenge : ce mot signifie aussi chez les botanistes une glande creuse.

Fomentation , c'est un remède qui se prépare ordinairement avec la décoction des plantes émollientes & rafraîchissantes pour amollir les duretés du bas-ventre , ou avec les liqueurs astringentes pour fortifier & resserrer les fibres.

Fond , c'est un terme d'agriculture , qu'on donne pour synonyme à terrain. On dit : *un bon fond* , *un mauvais fond* , *un fond de tuf* , *d'argille* , &c. Toutes ces dénominations signifient qu'un terrain est plus ou moins propre pour nourrir & élever des plantes.

Fruification, (*parties de la*) on entend par ces mots les parties de la plante qui servent à sa reproduction; ces parties sont rangées de la manière suivante: le périanthe de la fleur enveloppe le réceptacle, d'où naît alternativement la corolle; dans l'intérieur de la corolle sont placés les filamens, à la pointe desquels sont attachés les anthères ou sommets. Le germe occupe le centre du réceptacle, au sommet duquel on remarque un stilet qui soutient par son extrémité supérieure le stigmate: lorsque tout cela est passé, le germe se change en péricarpe, appuyé sur le calice, renfermant des semences attachées au réceptacle du fruit.

Fruit; c'est la production que fait un arbre ou une plante, tant pour la multiplication de son espèce que pour la nourriture de l'homme. Son étymologie vient du latin *frui*, parceque c'est la partie de la semence qui nous fournit les alimens; on distingue dans le fruit le péricarpe, la semence & le réceptacle. Le péricarpe est formé du germe grossi, & renferme les petites semences ou graines; il manque quelquefois: on en compte huit espèces; savoir la capsule, la coque, la silique, la gouffe, le fruit à noyau, la pomme ou fruit à pepins, la baie & le cône. Nous parlerons de chacun de ces péricarpes dans autant d'articles séparés.

Fusifforme, se dit d'une racine pivotante qui imite un fuseau.

G.

GAINE, (*feuille en*) est une feuille dont la base forme une espèce de tuyau qui entoure la tige.

Gargarisme, c'est un médicament liquide, dont on se sert en gargarisant la bouche & le gosier sans rien avaler.

Gazon, c'est une terre couverte d'herbes menues & courtes; on fait venir le gazon en le semant ou en le plaquant. Pour semer le gazon, on se sert de la graine qu'on appelle communément graine de haut pré; on

seme cette graine sur la fin de l'automne ; pour le plaquer , on coupe dans quelque pelouse pleine d'herbe fine le dessus par piéces quarrées , de l'épaisseur d'environ trois poudes sur environ un pied de largeur , & à-peu-près un pied & demi de long , & avec la bêche ou la houe , on sépare le dessus d'avec le fond , ensuite on les va placer promptement à l'endroit que l'on veut gazonner.

Geminée , se dit de deux feuilles qui sortent toutes les deux ensemble ; on donne encore cette épithète aux stipules , lorsqu'elles sont placées deux à deux.

Générale , se dit d'une ombelle qui en renferme plusieurs particulières.

Genre , c'est un terme de Botanique , qui signifie l'assemblage de plusieurs plantes qui ont un caractère commun , établi sur la structure de certaines parties , qui distinguent essentiellement ces plantes de toutes les autres.

Germe , c'est la partie supérieure du pistile qui porte sur le réceptacle : il fait les fonctions d'uterus ou de matrice ; il renferme les embrions des semences , & les organes qui servent à leur nutrition.

Germer , c'est l'action d'une semence qui montre les commencemens de sa radicle. Toute semence qui germe est en état de produire une plante.

Germination , c'est le premier développement des parties qui sont contenues dans les germes des semences. La chaleur & l'humidité l'accélèrent en général & la fortifient ; voyez les différentes dissertations qui se trouvent à la tête du premier volume du Traité historique des plantes de la Lorraine , qui se trouve chez Fétil , libraire , à Paris.

Glandes , ce sont des petits corps vésiculeux qu'on trouve sur les feuilles & sur les jeunes tiges de plusieurs plantes. M. Guettard est le premier de tous les Botanistes qui en a fait la découverte ; il en distingue de sept espèces principales : 1.^o les glandes en vessie , comme dans la Glaciale ; 2.^o celles en écailles , comme

dans la Fougère ; 3.^o celles en globules , comme dans les Labiées ; 4.^o celles en lenrilles , comme dans le Bouleau ; 5.^o celles en petits grains milliaires, comme dans le Sapin. Ces cinq espèces examinées à la loupe, paroissent supportées par des pédicules ; 6.^o celles en godet, comme dans l'Abricotier ; 7.^o celles en petites outres , comme dans la Gaude , ces dernières sont sessiles. Les glandes sont diversement situées sur les parties des plantes ; la plupart se trouvent sur les feuilles & à leurs bords. On trouve des vésiculaires sous quelques calices , comme dans le Millepertuis ; les lenticulaires sont distribuées sur les jeunes pousses ; les glandes concaves ou à godet sur le pétiole ou à la base des feuilles , comme dans le Pêcher , le Cerisier. Tous ces corps paroissent produits par le renflement de quelques portioncules du tissu cellulaire. Il suinte de plusieurs une liqueur visqueuse , ou bien on y trouve une poussière blanche & des fils formés du desséchement de cette liqueur ; de-là on a conclu qu'ils étoient les organes de quelque sécrétion , mais il n'est pas prouvé qu'ils soient restraints à cette fonction. Les glandes fournissent des caractères essentiels à la distinction de plusieurs plantes , comme le Bois de Sainte-Lucie , l'Amandier , les Cassies , les Sensitives , &c.

Gousse , c'est un fruit capsulaire oblong , qui a la forme d'une *silique* , mais qui suivant les auteurs les plus exacts , en diffère en ce qu'il n'est pas divisé longitudinalement par une cloison , qu'il est produit par une fleur légumineuse , comme celle du Pois , du Genêt , &c. que ces deux cosses ou panneaux sont assemblés en dessus & en dessous par une suture longitudinale , & que les semences sont presque toujours attachées alternativement au limbe supérieur de chaque cosse.

Grain , c'est un terme d'agriculture qui se dit ordinairement des semences qui viennent dans les épis , & qui servent à la nourriture des hommes & des animaux :

on les distingue en gros & menus. Les menus sont l'orge l'avoine , les pois , les vesces , le maïs , le sarrasin & le millet ; on donne le nom de grains à certains fruits en grappe , comme le raisin , le sureau.

Graine, c'est une semence que produisent les plantes, & qui sert à conserver l'espèce. Les graines paroissent après les fleurs sur les mêmes plantes , quand ces fleurs sont fécondes.

Graminées , se dit des plantes qui appartiennent au caractère général des gramens proprement dits.

Grappe , on se sert de ce mot pour désigner les fruits qui se trouvent rassemblés comme les graines du raisin , en sorte que chaque fruit se trouve soutenu par un petit péduncule , attaché à un péduncule commun qui les porte tous.

Grelot , (*fleur en*) la fleur en grelot est celle dont la forme est à-peu-près semblable à ces espèces de sonnettes qu'on appelle grelots. Les fleurs en grelot ont un pétale d'une seule pièce, qui fait un ventre ou une espèce de globe , & dont la partie supérieure est étroite ; la fleur du muguet est de ce genre.

Griffe , c'est un terme de fleuriste qui est synonyme à celui de *pâte*.

Grimpante , se dit d'une tige qui s'attache par des vrilles ou espèces de racines sur les corps auprès desquels elle monte.

Grumeleuse , se dit d'une racine qui est en grumeaux.

Gueule , c'est un terme botanique qui se dit d'une fleur labiée ; une fleur en gueule est donc une fleur monopétale , qui est formée par un tuyau ordinairement percé dans le fond , & terminé en devant par une espèce de gueule , représentée par deux lèvres principales plus ou moins écartées , & qui se subdivisent en plusieurs autres pièces.

Gymnospermies , ce sont des plantes qui ont quatre graines nues à découvert au fond de leur calice.

Gynandrie , c'est le nom d'une classe du système de

Linneus , qui comprend toutes les plantes dont plusieurs étamines sont réunies & attachées au pistil , sans adhérer au réceptacle.

H.

HAMEÇON, (*plantes en*) ce sont celles qui ayant des crochets comme des hameçons , s'attachent aux habits ou au poil des animaux.

Hampe , c'est une tige qui porte des fleurs & des fruits sans être chargée de feuilles.

Heptandries , ce sont les plantes qui ont sept étamines.

Herbacée , les Botanistes nomment ainsi ce qui n'a guères plus de consistance que de l'herbe ; les jeunes tiges tendres & succulentes des arbres sont herbacées : on donne encore le nom de plante herbacée à celle qui est tendre & nullement ligneuse.

Herbe , c'est le nom qu'on donne ordinairement aux plantes dont les tiges périssent tous les ans : on distingue les herbes en annuelles , bis-annuelles ou triannuelles , & pérennelles ou vivaces. Les annuelles naissent & meurent la même année après avoir porté leurs fruits ; les bis-annuelles ou triannuelles sont celles qui ne donnent des fleurs & des semences que la seconde ou troisième année après qu'elles ont été semées , elles périssent ensuite ; les pérennelles ne meurent point , elles passent plusieurs années ; on divise encore les herbes en potagères & en sauvages , les sauvages comprennent les plantes médicinales.

Herbier , c'est un recueil de plantes desséchées que l'on conserve entre des feuilles de papier , en forme de porte-feuille , sans les coller , pour pouvoir les déplacer à volonté ; quand on veut cependant les fixer , il faut faire usage de cire d'Espagne , ou bien les coudre sur le papier. On tiendra son herbier dans un lieu sec , renfermé , à l'abri de l'air extérieur ; on le visitera en outre

de temps en temps , pour détruire les mites & les larves d'insectes qui s'y introduisent.

Les plantes qu'on destinera pour un herbier doivent être cueillies dans un temps sec , lorsque le soleil a enlevé l'humidité de la rosée ; à l'heure où les fleurs sont épanouies & les feuilles étendues ; si on n'a pas cette attention , les couleurs se perdent , les feuilles noircissent , les fleurs pourrissent ; les unes & les autres s'arrangent difficilement , lorsqu'on les veut mettre en presse. On prendra deux ou trois pieds de chaque plante , afin de pouvoir les comparer , & de s'assurer par-là que l'individu que l'on cueille n'est pas une variété de l'espèce ; on choisira , autant qu'il sera possible , des sujets garnis de toutes leurs parties , racines , tiges , & sur-tout de leurs fleurs , de leurs fruits , des feuilles supérieures & inférieures qui souvent sont très-différentes dans leurs formes ; à l'égard des arbres on est forcé de se restreindre aux feuilles , aux parties de la fructification , ou à ne cueillir au moins que l'extrémité des jeunes branches. On est souvent obligé d'aller chercher fort loin les plantes qu'on veut mettre dans son herbier , & presque toujours sur les plus hautes montagnes. On nomme herborisations les voyages qu'on fait à cet effet ; dans ces sortes de voyages on n'est pas toujours à même de faire dessécher les plantes sur le champ ; il faut , dans l'intervalle , les envelopper dans des écorces , ou plutôt les enfermer dans des boîtes de fer blanc , qui puissent facilement se porter dans la poche : les plantes quoiqu'un peu froissées , s'y conservent fraîches un jour entier. On se pourvoiera d'une grande quantité de papier gris , sans colle & épais ; on mettra un paquet de trois ou quatre feuilles de ce papier sur une table ; on étendra sur la surface la plante qu'on veut dessécher ; on écartera , on développera toutes ces parties , on en détachera & on en rejettera quelques-unes , afin qu'aucunes ne se recouvrent s'il est possible ; on aura soin sur-tout de ranger les parties de la fleur , en sorte que la fructi-

fication soit bien à découvert, & reconnoissable après la distillation. Si la plante est plus haute que la feuille de papier, on coupera la tige & on placera la racine à côté d'autres ou sur d'autres papiers : on applatira avec le pouce les tiges herbacées qui sont trop grosses, & qui empêcheroient la compression d'agir sur les autres parties de la plante ; si les calices ont trop d'épaisseur, on les coupera verticalement par le milieu, en sorte cependant qu'il y reste des fleurons & des semences ; on peut aussi couper longitudinalement les tiges trop épaisses & trop dures, même les fruits, avec d'autant plus de raison que souvent le plus grand nombre ne peuvent entrer dans un herbier à cause de leur accroissement. Quand la plante sera bien étendue, on la couvrira de trois ou quatre feuilles de papier, sur lesquelles on disposera de la même manière une nouvelle plante ; celle-ci étant disposée, on la recouvre à son tour d'une troisième, & ainsi de suite ; après avoir fini l'opération entière, on recouvre la pile d'un carton fort, ou d'une planche que l'on charge de quelque corps pesant, ou bien pour mieux faire, on la placera sous une presse, dont on ménagera la force à volonté. Si le tas de papier & si le nombre des plantes est trop considérable, on les divisera en deux, ou du moins on placera dans le milieu un carton, ou une planche qui arrête la communication de l'humidité, & qui fasse agir la pression avec égalité dans le centre du tas & aux extrémités. On ne laissera ces plantes en presse que douze ou quinze heures au plus ; ce temps passé, on les tirera de leurs papiers qui se trouveront chargées de beaucoup d'humidité, car si on n'avoit pas cette précaution, elles noirciroient infailliblement, & ne se dessécheroient pas assez vite ; ce n'est que par l'accélération de la dessiccation qu'on peut parvenir à conserver le verd des feuilles & les belles couleurs des pétales. Pour tirer ces plantes des papiers, on commencera d'abord par les découvrir successivement, & on les placera ensuite sur des

paquets de nouvelles feuilles bien séchées ; on choisit le moment de ce changement pour achever de ranger les feuilles des plantes & les autres parties qui conservent encore leur flexibilité ; on se sert de la tête d'une grosse épingle pour étendre celles qui sont froissées ou repliées.

On dispose ainsi chaque espèce dans la situation dans laquelle on veut la conserver , & on remet le tas sous la presse. On laissera dans cet état les plantes pendant quarante-huit heures sans les changer de papiers, surtout si on a interposé un grand nombre de feuilles ; on les renouvellera ensuite une troisième , une quatrième fois , &c. à chaque changement on n'emploiera que des papiers bien desséchés ; si on en manque avant de s'en servir , on fera dissiper toute leur humidité devant le feu ou dans le four ; on ne cessera de donner de nouveaux papiers aux plantes que quand elles auront acquises assez de solidité pour se soutenir dans toutes leurs parties en les soulevant par leurs tiges , c'est pour lors qu'on ne les comprime plus aussi fortement ; le reste de l'humidité s'en échappe d'autant plus aisément que la pression en est moins forte ; on ne les laissera pas cependant entièrement libres , de peur que les feuilles ne viennent à se crispier ; il y a de certains Botanistes qui en agissent autrement ; ils chargent très-peu leurs plantes dans les commencemens , & ils en augmentent successivement la compression. Enfin quand les plantes se soutiendront , ainsi que nous venons de le dire , il ne sera plus nécessaire de renouveler les papiers , la dessiccation s'achèvera dans l'espace de quelques mois , on rangera pour lors les plantes dans son herbier : si l'on s'apperçoit qu'elles conservent encore quelque humidité interne , on les mettra pendant une heure ou deux dans un four dont la chaleur soit telle que la main puisse facilement la supporter. On prendra toutes les précautions que les plantes ne deviennent trop cassantes & ne perdent leurs couleurs ; on se gardera

bien d'enraiser les plantes en trop grand nombre , soit qu'on renouvelle encore les papiers , soit qu'on ne les change plus ; une pile trop forte est sujette à se fermenter ; elle corrompt pour lors les plantes & les fait moisir ; en renouvelant les papiers on séparera donc en différens tas les plantes qui se dessèchent plus ou moins vite : on ne changera que de deux ou trois fois de papiers pour les mousses , les graminées , & les feuilles de la plupart des arbres ; mais quant aux plantes grasses & aqueuses , elles peuvent conserver plus longtemps leur humidité & elles exigent plus de soins ; on écrasera leurs tiges ; souvent même pour empêcher que les feuilles ne s'en détachent , on précipitera la dessication , au moyen d'un fer chaud qu'on passera à différentes reprises sur les plantes qui les recouvrent , on les exposera ensuite pendant quelque temps à l'air , après quoi on les replacera sous la presse dans de nouvelles feuilles de papier sec. C'est ainsi qu'avec ces précautions on conserve quelquefois aux feuilles & même aux pétales de leurs plantes leur couleur naturelle ; si les pétales sont cependant épais , aqueux , & sur-tout rouges , violets ou bleus , il arrive très-souvent qu'ils ne laissent pas de perdre leurs couleurs , quelque soin qu'on en prenne ; on est parvenu cependant par une nouvelle méthode à la leur conserver , du moins au plus grand nombre. On s'y prend pour cet effet de la façon suivante : après avoir applati , écrasé & rangé toutes les parties de la plante de la manière qu'on vient de décrire , on change les feuilles de papier , qui sous la presse se sont chargés de la première eau , & l'on couvre la plante d'une ou de deux feuilles sur lesquelles on étend du sablon fin de l'épaisseur d'un pouce. On l'expose ainsi à la chaleur du soleil pendant plusieurs jours ; on la retire avant la rosée ; l'humidité s'échappe au travers des interstices que laissent les grains de sable , & la dessication en devenant plus prompte , les couleurs se conservent plus sûrement.

Avant de finir l'article du dessèchement des plantes
pour

pour les herbiers , nous y ajouterons la manière de dessécher les fleurs d'ornemens avec tout leur éclat sans les écraser , en conservant même leur forme ; on cueille la fleur dans un temps sec , aussi-tôt qu'elle est bien épanouie ; on a un bocal cylindrique dont l'orifice est de même diamètre que le bocal entier ; on place dans le fond un petit morceau de cire molle , on y fixe l'extrémité de la queue de la fleur , en sorte qu'elle conserve une situation perpendiculaire dans le bocal ; on y verse alors un sablon bien lavé & bien sec ; on l'introduit doucement , en sorte qu'il recouvre exactement toutes les parties de la plante , sur-tout les pétales de la fleur , après quoi on expose le bocal au soleil sans le couvrir ; au bout de quelque temps la fleur est parfaitement desséchée , sans que ses couleurs soient altérées ; on lui rend l'odeur qui lui est propre avec des essences , ou bien par le moyen d'une poudre odorante qu'on insinue jusqu'à l'insertion des pétales. Nous avons déjà rapporté cette méthode pour conserver les fleurs , dans le quatrième volume de *nos Secrets de la nature & de l'art*.

Hérissé , on se sert de ce mot pour exprimer que les poils de certaines plantes sont rudes au toucher , roides , plus ou moins fragiles .

Hermaphrodite , se dit d'une fleur qui contient les organes des deux sexes , savoir , les étamines & les pistiles.

Hexagynie , se dit dans le système de Linnæus d'une fleur qui a six pistiles.

Hexandrie , c'est le nom de la sixième classe de Linnæus ; elle comprend les plantes qui sont à six étamines.

Horizontale , se dit d'une feuille qui est parallèle à l'horison.

Hypocrateriformes , on appelle ainsi des fleurs qui imitent les sous-coupes des anciens , elles sont repliées & applaties à leurs extrémités supérieures , ou elles imitent une molette.

Hydragogues, ce sont des remèdes qui purgent les eaux.

Hystériques, on qualifie ainsi les plantes qui conviennent dans les vapeurs.

I.

J*ACHERE*, on nomme ainsi l'année du repos que l'on donne à une terre; on donne aussi une pareille dénomination à la terre même.

Jalon, c'est un bâton bien droit, pointu par en bas, au haut duquel on met une carte, du linge ou du papier blanc, ou que l'on peint simplement en blanc, le tout pour qu'il puisse être vu plus distinctement.

Icosandrie, c'est le nom que Linnæus donne à sa douzième classe; elle comprend toutes les plantes qui ont une vingtaine d'étamines attachées au calice.

Imbriquée, se dit d'une feuille qui est faite en forme de tuile.

Impaire, on donne ce nom à la dernière foliole qui termine une feuille ailée.

Imparfaite, on donne cette épithète à une fleur à laquelle on ne trouve ni étamines, ni pistile, quoique destinée à en porter.

Incarnatif, c'est un remède qui favorise la germination des nouvelles chairs à la suite d'une suppuration.

Inculte, on nomme terre inculte celle qui est abandonnée à elle-même, & qui ne produit que les végétaux qui y croissent naturellement.

Indigènes, on nomme ainsi les plantes naturelles à un pays.

Infundibuliforme, se dit d'une plante dont la fleur est à-peu-près faite en entonnoir; cette fleur n'a qu'un seul pétale, dont la partie postérieure forme un tuyau assez menu, & dont le haut est évasé, souvent

terminé par plusieurs découpures larges & renversées en dehors.

Infusion, c'est une préparation des matières dont on veut extraire quelque principe, & que l'on met à cet effet macérer dans une liqueur qu'on nomme menstree; la décoction, l'infusion proprement dite, & la macération sont trois opérations qui ne diffèrent entr'elles que par le plus ou le moins de chaleur donnée au menstree; pour la décoction on fait bouillir la liqueur; pour l'infusion, on la donne tiède; dans la macération, il ne faut pas que la chaleur du menstree soit plus forte que celle de l'atmosphère; Ces trois opérations ne sont donc que des coctions à différens degrés; elles comprennent une infinité d'autres préparations auxquels on assigne différens noms, tirés de la nature même des menstrees, de l'usage extérieur & intérieur qu'on en fait, & de l'effet qu'on en attend.

Injection, c'est une liqueur qu'on introduit avec une seringue dans certaines cavités du corps humain, naturelles ou accidentelles, pour laver, déterger, résoudre & guérir les tumeurs & autres maux internes.

Inodore, se dit d'une plante qui n'a point d'odeurs.

Interruption, se dit d'une feuille ailée: on appelle v. g. une feuille ailée par interruption, celle dont les folioles sont de grandeurs inégales.

Irrégulières, on donne ce nom aux fleurs monopétales qui ont une forme moins symétrique dans leur ensemble.

Jus, c'est le suc exprimé des végétaux.

L.

L*ABIÉES*, on nomme fleurs labiées, ou en gueule, celles qui sont terminées inférieurement par un tuyau, supérieurement par un musle à deux lèvres, quelquefois à une seule lèvre inférieure.

Laciniée, se dit d'une feuille déchiquetée en échani-

crures qui sont elles-mêmes découpées dans leurs lobes.

Lait, c'est en botanique la liqueur blanche qui sort de certaines plantes quand on en coupe les tiges, branches, feuilles, racines & fruits; le Figuier, le Tithymale sont de ce genre.

Lancéolée, se dit d'une feuille qui est rétrécie par l'extrémité & par la base.

Lanugineuse, s'applique aussi à une feuille qui ressemble à de la laine au tact.

Legumes, régulièrement on ne devoit appeller ainsi que les semences ou graines qui viennent dans des gouffes; l'usage a cependant étendu ce nom aux racines & à la plupart des autres plantes potagères.

Légumineuse, se dit d'une fleur composée de quatre ou cinq pétales qui ne sont point uniformes entr'eux, & auxquels on a par conséquent donné différens noms. Le pétale supérieur, ordinairement plus grand que les autres, est nommé pavillon ou étendard; tantôt il est déployé & renversé en arrière, tantôt rabattu sur les autres pétales, en sorte qu'il les enveloppe en partie: il est quelquefois échancré dans son milieu; certaines fleurs ont ce pétale assez petit, & il est fort grand dans d'autres. Le pétale d'enbas se nomme *nacelle*, il est ordinairement courbe, il représente cependant quelquefois un sabot; il est d'une seule pièce ou de deux appliquées immédiatement l'une contre l'autre; il forme presque toujours une convexité en dehors & une cavité en dedans. Entre le pavillon & la nacelle, sont les aîles, posées latéralement; tantôt pointues, tantôt plus ou moins arrondies & plus ou moins écartées de l'axe de la fleur; quelquefois rabattues sur la nacelle, de manière à la cacher ou même à la rendre imperceptible. Dans presque toutes les fleurs légumineuses les filers des étamines sont réunis en forme de gaine dans laquelle passe le pistile; un des bords de cette gaine s'attachant à la base du pistile, ou au fond de la fleur, & les sommets

portant sur l'autre bout , les fleurs légumineuses se nomment encore papilionacées.

Lenticulaire, se dit d'une glande de plantes faite en forme de lentille.

Liliacées, on nomme ainsi les plantes dont les fleurs sont de six pétales , quelquefois de trois , ou d'un seul divisé en six , dont la forme approche de celle du Lys , & dont le fruit est presque toujours une capsule patragée en trois loges ; une observation qui se trouve uniforme dans toutes les plantes de cet ordre , c'est que leurs feuilles n'ont que des nervures parallèles , & jamais de transversales.

Lineaires, se dit des feuilles qui sont retrécies par les extrémités , mais parallèles dans leur longueur. *Voyez art. Feuilles.*

Lisse, se dit d'une feuille qui est sans poils ; on donne encore cette épithète aux semences.

Livre, *Liber*, on donne ce nom à la partie intérieure de l'écorce.

Lobes, ce sont deux corps réunis , très-visibles dans la fève & dans toutes les semences légumineuses , sur-tout lorsqu'elles ont resté quelque temps dans la terre ou dans l'eau ; leur substance est farineuse , mucilagineuse , fermentescible. Leur composition résulte de l'épanouissement d'un grand nombre de vaisseaux ramifiés. Les lobes sont appliqués l'un sur l'autre , convexes du côté extérieur , aplatis du côté où ils se touchent , mais intérieurement un peu concaves vers le point par lequel ils se tiennent & se réunissent. Quand la plante lève , les lobes changent de nom , & prennent celui de cotyledons ou feuilles séminales.

Lotion, c'est un remède qui sert à laver , & qui tient le milieu entre la fomentation & le bain ; on emploie souvent pour les lotions la décoction de différentes plantes.

Loupes des arbres, ce sont ces tumeurs ou excroissances des arbres occasionnées par le vice ou surabon-

dance des liqueurs nutritives ; on en fait des ouvrages de marqueterie , & on les prend souvent mal-à-propos chez les artistes pour des racines.

M.

MACÉRATION. Voyez *Infusion*.

Mains ou *Vrilles* , on appelle ainsi des productions menues , ou espèce de filamens , dont la force jointe à la souplesse , sert à plusieurs plantes sarmenteuses pour s'attacher en roulant autour des corps solides qui sont à leur portée.

Mâles , on nomme fleurs mâles , celles qui ont des étamines.

Manche , c'est un bâton rond de trois ou quatre pouces de rour & de quatre pieds de long , avec lequel on emmanche les bûches , les fourches , dont on se sert pour le jardinage.

Marcotte , c'est une opération du jardinage , qui consiste uniquement à recouvrir de terre la souche d'un arbre , ou arbuste , garni de surgeons ; au bout de quelques années , chaque surgeon devient une plante enracinée : la marcotte se pratique aussi en faisant traverser une jeune branche dans un pot ou manequin rempli de terre. Les jardiniers qui veulent tirer d'un sujet beaucoup de plants , coupent son tronc fort près de terre , avant que la sève soit en action ; le tronc qu'ils appellent la mère , jette une grande quantité de branches latérales qu'on couche en terre dès la seconde année , & qui à la troisième se trouvent suffisamment pourvues de racines pour être détachées de la mère & transplantées ; elle en fournit ainsi pendant douze ou quinze ans ; la marcotte réussit sur les œillets comme sur les arbres ; on enfonce un de ses jets en terre par un de ses nœuds , sur lequel on fait une légère incision. L'incision occasionne un bourrelet qui produit des racines , mais elle devient superflue sur plusieurs plantes.

Maraichers, ce sont des jardiniers qui se sont établis autour de Paris & de la plupart des grandes villes, pour n'élever dans leurs jardins que des herbes & des légumes qu'ils portent tous les jours vendre dans les marchés publics ; on nomme leurs jardins *marais*, quoique souvent le terrain ne soit que du sable fort sec.

Masque (fleurs en) ce sont des fleurs monopétales, dont le tuyau est terminé par la partie supérieure par un muſle qui représente comme deux mâchoires.

Maſſicatoires ou *mâchicatoires*, ce sont des médicaments, qui, a force d'être longtemps mâchés, ou simplement tenus dans la bouche, attirent & évacuent la pituite.

Maturation, c'est le temps où après la chute des fleurs les fruits arrivent à leur maturité & dispersent leurs semences. Il varie, comme la floraison, en conservant quelques rapports avec elle.

Maturatif, c'est un topique destiné à procurer une suppuration convenable.

Médicament, c'est tout ce qui peut changer notre nature en mieux ; changer les mauvaises dispositions des solides, & en rétablir les fonctions.

Membraneuse, se dit d'une feuille qui n'a point de pulpe entre les membranes.

Menstrue ou *Vehicule*, c'est un dissolvant humide qui pénétrant dans les plus intimes parties d'un corps sec, sert à en tirer ce qu'il y a de plus subtil & de plus essentiel.

Merrain ou *Merrein*, c'est du bois de chêne ou autre fendu en petites planches minces.

Météoriques, on qualifie ainsi les fleurs dont l'heure de l'épanouissement est dérangée par la température de l'air.

Méthode Botanique, c'est celle qui nous rapproche les plantes semblables, & qui sépare celles qui diffèrent, ou pour mieux dire, c'est celle qui nous apprend à connoître les plantes par classes, genres & espèces ;

les méthodes botaniques qui ont été les plus universellement suivies jusqu'à présent, sont celles de Tournefort & de Linnæus, dont nous allons parler dans les articles suivans. M. Adanson a l'esprit si méthodique, que dès sa jeunesse il a connu soixante méthodes Botaniques.

Méthode de Tournefort, cette méthode est fondée sur la fleur & sur le fruit; elle comprend vingt-deux classes. Les dix-sept premières sont destinées pour les herbes & sous-arbrisseaux, & les cinq dernières pour les arbres & arbrustes. La distinction particulière de chaque classe est tirée de la corolle, en considérant; 1.^o sa présence ou son absence; 2.^o sa disposition simple ou composée; 3.^o le nombre des pétales qui la constituent monopétale ou polypétale; 4.^o la figure des pétales qui est régulière ou irrégulière. Les monopétales régulières forment les deux premières classes; les irrégulières la troisième & la quatrième; les polypétales régulières fournissent les cinq, six, sept, huit & neuvième classes; les irrégulières la dixième & onzième; les composées donnent la douzième, la treizième & la quatorzième classe; les apétales la quinzième, la seizième & la dix-septième. Les classes des arbres & arbrustes sont divisées sur les mêmes principes, mais dans un ordre inverse à celui des herbes; les fleurs apétales forment la dix-huitième classe; les apétales amentacées la dix-neuvième; les monopétales la vingtième; les polypétales régulières rosacées la vingt-unième; les polypétales irrégulières papilionacées la vingt-deuxième.

Voici la clef en abrégé des classes de Tournefort: les fleurs sont propres aux herbes & aux plantes, parmi les fleurs des herbes il s'en trouve qui ont des pétales, & d'autres qui n'en ont point; celles qui ont des pétales sont simples ou composées; les simples sont monopétales ou polypétales, les monopétales sont régulières ou irrégulières; les monopétales régulières sont encore ou campaniformes qui forment la première classe de la méthode Tournefortienne, ou infundibuliformes, & ce

sont celles de la seconde classe. Les monopétales irrégulières se subdivisent encore en personnées, que M. Tournefort met dans sa troisième classe, ou en labiées; ces dernières sont comprises dans la quatrième classe. les fleurs polypétales sont de même que les monopétales régulières ou irrégulières: parmi les régulières il y a les cruciformes, qui forment la cinquième classe; les rosacées la sixième; les ombellifères la septième; les caryophyllées la huitième, & les liliacées la neuvième. Les polypétales irrégulières se subdivisent en papilionacées & en anomales; celles-ci forment l'onzième classe, & celles-là la dixième. Les fleurs composées sont ou flosculeuses, ou semi-flosculeuses, ou radiées; ces trois sortes de distinction donnent lieu à la douzième, treizième & quatorzième classe; les herbes ou fleurs à pétales sont ou à étamines, ou sans fleurs simplement, ou tout-à-la-fois sans fleurs & sans fruits, & on a par cette division la quinzième, la seizième & la dix-septième classe. Les fleurs des arbres sont encore ou à pétales ou pétalées; les apétales se divisent en apétales proprement dites, & en amentacés, & elles constituent la dix-huitième & dix-neuvième classe. Les pétalées sont monopétales ou polipétales; les monopétales forment la vingtième classe; les polipétales sont régulières ou irrégulières; les régulières sont rosacées, & sont comprises dans la vingt-unième classe, & les irrégulières sont papilionacées & font partie de la vingt-deuxième & dernière classe de la méthode de Tournefort. Chaque classe se subdivise ensuite en sections, qui sont des espèces de classes sous-alternes; les principes sur lesquels M. de Tournefort établit ces subdivisions, sont principalement sur le fruit.

Avant que d'entrer dans l'explication des sections, il est à propos de faire précéder quelques observations préliminaires: la première concerne l'origine du fruit; quelquefois le pistile devient fruit, quelquefois c'est le calice. La seconde regarde la situation du fruit & de la

fleur ; dans les fleurs dont le pistile devient le fruit, la fleur & le fruit portent sur le réceptacle ; dans celles au contraire dont le calice devient fruit, le réceptacle de la fleur est sur le fruit, & l'extrémité du péduncule, auquel le fruit est attaché, devient son réceptacle. La troisième observation à faire est sur la substance, la consistance & la grosseur du fruit ; il y a des fruits mous, il y en a de secs, d'autres sont charnus ; d'autres pulpeux, renfermant des substances osseuses ; les uns sont gros, les autres petits : le nombre des cavités donne lieu à la quatrième observation, car on distingue des capsules uniloculaires, multiloculaires ; des fruits bicapsulaires, tricapsulaires ; 1.^o le nombre, la forme, la disposition & l'usage des semences méritent aussi attention ; & en effet, le nombre des semences varie dans les fruits ; il s'y en trouve qui n'en ont qu'une, d'autres deux, d'autres quatre ; la forme des semences varie aussi, on en voit de rondes, d'ovales, de plates, en forme de reins, lisses, raboteuses, ridées, anguleuses, &c. Les semences sont encore ou aigrettées ou sans aigrettes ; d'autres ont un chapiteau de feuilles ; d'autres enfin sont disposées en épis, & quelques-unes sont propres à faire du pain ; une sixième observation est celle qui a pour objet la disposition des fruits & des fleurs ; les fruits sont quelquefois séparées des fleurs sur un même pied, c'est-à-dire, sur une même plante ; quelquefois les fleurs & les fruits sont placés sur des pieds différens. La figure & la disposition de la corolle peuvent fournir matière à une septième observation. Car quand les signes précédens, tirés des fruits, ne paroissent pas suffire à Tournefort pour distinguer ses sections, il y emploie la figure de la corolle. Parmi les fleurs infundibuliformes, les unes sont en forme de rosette, les autres en forme de soucoupe, en forme de roue. Parmi les monopétales irrégulières, les unes ont un capuchon, les autres se terminent en langue, d'autres en anneau. Parmi les labiées, quelquefois la lèvre supérieure ressemble à un

casque , à une faux , quelquefois elle est crenlée en cueiller , quelquefois elle est droite , quelquefois il n'y en a qu'une. Parmi les composées , les fleurons sont réguliers , ou irréguliers , ramassés en bouquet , en boule.

La disposition des feuilles a fourni encore à M. de Tournefort des caractères pour ses sections de la classe des herbes & des arbres papilionacées , & en effet il y en a qui ont trois folioles sur une queue ; d'autres ont leurs folioles opposées sur une côte commune ; d'autres les ont alternatives ou verticillées , c'est à-dire , rangées circulairement autour de la tige. Par le moyen de ces huit observations , & d'autres relatives aux principes généraux concernant les fruits , M. de Tournefort a subdivisé ses vingt-deux classes en cent vingt-deux subdivisions. La première classe , qui est celle des campaniformes , comprend neuf sections , six dans lesquelles le pistile se change en fruit , & trois dans lesquelles il le devient : la première de ces sections comprend donc les plantes dont le pistile devient un fruit mou & assez gros ; la seconde celle dont le pistile devient pareillement un fruit mou , mais assez petit ; la troisième celles dont le pistile se change en un fruit sec à plusieurs loges ; la quatrième , celles dont le pistile se change en un fruit qui ne porte qu'une semence ; la cinquième , celles dont le pistile devient un fruit en gaine ; la sixième , celles dont le pistile devient un fruit sec composé de plusieurs loges ; la septième , celles dont le calice devient un fruit charnu ; la huitième , celles dont le calice devient un fruit sec ; & la neuvième enfin , celles dont le calice devient un fruit à deux pièces adhérentes par leur base. La classe seconde , qui est celle des infundibuliformes , se divise en huit sections , les sept premières renferment des plantes dont le pistile se change en fruits , & la huitième , celles dont le fruit est formé par le calice ; toutes ces différentes sections sont en outre caractérisées , ou par le nombre des semences , ou par la substance du fruit , ou par la forme de la corolle ; il en est de même de

toutes les autres classes ; mais ce ne sont pas encore là toutes les branches de divisions ; les sections se resubdivisent en genres , & le genre est encore l'assemblage de plusieurs espèces , c'est-à-dire , de plusieurs plantes qui ont des rapports communs dans leurs parties les plus essentielles ; la comparaison & la structure particulière de toutes les parties de la fructification , sont , suivant cet auteur célèbre , ce qui doit constituer les genres. Les règles qu'il prescrit pour parvenir à la découverte de ces genres , sont au nombre de cinq : 1.^o lorsque les plantes ont des fleurs & des fruits , on doit toujours les considérer pour la distinction des genres , & se borner à ces signes s'ils sont suffisans ; 2.^o si ces signes sont insuffisans , on aura recours aux autres parties moins essentielles , telles que les racines , les tiges , l'écorce , le nombre des feuilles ; aux qualités des plantes , comme leur couleur , leur goût ; à leur port en général : 3.^o à l'égard des plantes dans lesquelles les fleurs & les fruits manquent , on sont invisibles sans le secours de la loupe , le genre doit être assigné sur ceux de ces derniers caractères qui sont les plus remarquables ; 4.^o on rejettera de la distinction des genres tous les signes superflus , & avant d'admettre un caractère , on prendra bien garde de voir si le genre changeroit dans le cas où ce caractère viendroit à manquer ; 5.^o enfin on considérera l'habitude générale des plantes plus que des variétés particulières qu'une observation minutieuse peut y découvrir. C'est d'après ces règles que Tournefort distingue en général deux sortes de genres , les uns qu'il appelle genres du premier ordre , & les autres ceux du second. Les genres du premier ordre sont ceux que la nature paroît elle-même avoir institués & distingués déterminément par les fleurs & par les fruits ; & ceux du second ordre sont ceux pour la distinction desquels il faut recourir à des parties différentes des fleurs & des fruits.

La théorie de la méthode de Tournefort étant déve-

loppée, voyons actuellement l'usage qu'on en peut faire : il se présente à moi une plante inconnue, telle v. g. que la queue de lion, je n'en fais pas le nom ; il s'agit pour la solution du problème de la connoître.

Pour y pouvoir parvenir il faut déterminer son genre ; mais je ne peux le déterminer que je ne commence par découvrir la classe & la section dans lesquelles elle est comprise.

Pour trouver d'abord la classe, je cueille un brin de cette plante, où se trouvent les parties de la fructification bien distinctes, c'est-à-dire, la fleur & le fruit, en supposant cependant que cette plante soit du nombre de celles qui en portent ; car si elle n'a ni fleurs ni fruits apparens, après s'en être assuré en examinant plusieurs pieds, on ne la détermine pas moins par la marche suivante, à l'aide des principes établis pour les plantes qui n'ont ni fleurs ni fruits ; je considère d'abord la consistance de la tige & des racines, sa hauteur & les autres signes qui peuvent m'apprendre que la plante est herbe ou arbre ; j'y reconnois les caractères qui désignent les herbes, & je vois très-distinctement qu'elle n'est point comprise dans les cinq dernières classes ; il ne m'en reste plus que dix-sept, sur lesquelles je dois me déterminer. J'examine les parties de la fructification de ma plante, & j'y reconnois une fleur à pétales, elle n'est point par conséquent de la dix-septième, de la seizième & de la quinzième classe, qui ne comprennent que des plantes sans pétales ; reste quatorze classes. J'examine ensuite si la fleur pétalée est simple ou composée ; je ne découvre en elle ni fleurons, ni demi-fleurons rassemblés dans un calice ; elle n'est donc pas encore de la quatorzième, de la treizième & de la douzième classe ; je n'en ai plus actuellement qu'onze sur lesquelles je doive me déterminer ; j'examine particulièrement la corolle de la plante, je la disèque en conséquence, je l'observe jusqu'à sa base ; je découvre si elle a plusieurs pétales, ou si le pétale est seulement

divisé par ses bords , & se termine uniquement dans la partie inférieure par un royan , la plante en question a précisément ce dernier caractère : elle est donc monopétale , & ne fait pas partie ni de la onzième , ni de la dixième , neuvième , huitième , septième , sixième & cinquième classes du système , qui ne renferment que des plantes polypétales. Je ne suis plus à présent incertain que sur quatre ; la corolle de ma plante n'est ni en forme de cloche , ni en celle d'entonnoir ; ses parties ne sont pas arrangées symétriquement à égale distance du centre ; cette plante est donc irrégulière , elle n'appartient donc pas à la première ni à la seconde classe ; il faut par conséquent qu'elle soit de l'une ou de l'autre des deux classes qui suivent. J'examine donc pour lors si elle est semblable à un masque ou à un muse à deux lèvres ; sa forme me décide , ses graines d'ailleurs ne sont point renfermées dans une capsule ; la plante que je cherche à connoître est donc labiée , & se trouve conséquemment placée dans la quatrième classe ; mais cette classe renferme encore un grand nombre de plantes , comment pouvoit l'y découvrir ? Je détermine d'abord la section de la classe. Le caractère de la section se tire en général de la considération du fruit ; on a encore égard à d'autres signes , quand le fruit n'en fournit pas d'assez distincts : la division de la classe des labiées est uniquement dans ce cas ; elle se divise en sections selon la figure des corolles , & principalement des lèvres qui la caractérisent : si leurs diverses figures ne sont pas assez présentes à mon esprit ; j'ai recours aux descriptions qu'en donne la méthode : je vois que la corolle de ma plante a deux lèvres , elle ne fait donc pas partie de la dernière section ; la lèvre supérieure n'est pas en forme de casque ou de famille ; elle n'appartient donc pas encore à la première ni à la troisième , puisque la lèvre supérieure n'est pas retroussée , mais elle est creusée en manière de cueiller , & c'est-là le vrai caractère des plantes de la seconde section. La section est présen-

tement connue , j'ai le genre à connoître : dans le nombre de 698 genres qui composent le système entier de Tournefort , je n'ai plus que douze genres à examiner , dont l'assemblage forme la seconde section trouvée de ma quatrième classe pareillement découverte.

Je me rappelle pour lots les caractères qui constituent les genres des plantes dont les fleurs sont visibles ; je fais qu'ils sont tirés en général de la comparaison & de la structure particulière des diverses parties des fleurs & des fruits ; je les examine de nouveau ; j'anatomise toutes les pièces qui les composent ; je compare ce que je vois dans ma plante avec les descriptions de mes douze genres : je compare même ces descriptions entr'elles , & je m'apperois par ce moyen des caractères qui sont communs à plusieurs genres , & de ceux qui distinguent chacun d'eux en particulier.

Une fleur monopétale labiée , dont la lèvre supérieure est creusée en cueiller , & l'inférieure divisée en trois parties ; un pistile fixé au fond de la fleur ; comme un clou posé sur quatre embrions , qui dans les fruits mûrs sont changés en semences renfermées dans une espèce de capsule formée par le calice , sont autant de signes communs à presque tous les genres de cette section ; je compare donc de nouveau , & je remarque que la lèvre supérieure n'est pas creusée précisément en forme de cueiller , mais plutôt en forme de cuile ; or ce caractère n'appartient qu'à deux genres , l'agripaume ou la queue de lion ; les lèvres inférieures de ces deux plantes sont également en trois , mais les semences de la plante dont je cherche le nom ne sont pas anguleuses , elles ne remplissent pas toute la cavité de la capsule formée par le calice , comme il est dit dans la description de l'agripaume ; ce n'est donc pas l'agripaume , c'est conséquemment la queue de lion , & ce qui me confirme le mieux dans cette idée , c'est que ses semences sont oblongues , & la forme de son calice est devenue une capsule longue & tubuleuse , or ces

signes sont les vraies marques caractéristiques de la queue de lion, suivant la description; j'ai donc découvert ma plante, on peut juger par-là de l'utilité des méthodes.

Méthode de Linneus. Suivant cette méthode, les plantes sont rangées par classes, ordres, genres & espèces; pour former les classes, Linneus considère dans les plantes sept objets qui dépendent uniquement des étamines; les étamines sont, suivant ce naturaliste, les parties mâles de la génération, & sont composées de trois pièces, de filet, de semence & de poussières; le pistile renferme les parties femelles, & est formé du germe, du stylet & du stigmate. On remarque 1.^o dans toutes les plantes que les organes de la génération sont ou visibles, ou peu apparens aux yeux, première observation caractéristique tirée de l'apparence ou de l'occultation des étamines; 2.^o parmi les plantes dont les organes de la génération sont apparens, les unes contiennent dans une même fleur les deux sexes, c'est-à-dire, les étamines & les pistiles, & pour cette raison on les appelle hermaphrodites; d'autres n'ont qu'un sexe, & sont nommées plantes mâles, quand elles contiennent les étamines; & plantes femelles, quand elles renferment uniquement les pistiles; second sujet d'observation provenant de l'union ou séparation de l'étamine & du pistile; 3.^o les plantes qui n'ont que les organes d'un sexe portent leurs fleurs mâles ou femelles, ou sur le même pied, ou sur des pieds différens, ou indifféremment, tantôt les mâles sur des pieds différens des femelles, tantôt sur le même; conséquemment cette troisième observation est tirée uniquement de la situation des organes de la génération; 4.^o les étamines se trouvent ordinairement attachées au receptacle, quelquefois cependant elles s'insèrent dans le calice. Nous nommons receptacle, l'extrémité du péduncule sur laquelle reposent immédiatement la fleur & le fruit, ou tous les deux ensemble; c'est ordinairement le centre de

la cavité du calice , qui est quelquefois convexe dans cette partie ; on l'appelle aussi *placenta*, lorsqu'il reçoit les vaisseaux ombilicaux qui servent à transmettre la nourriture aux semences. Le calice est un corps évasé à l'extrémité du péduncule par l'épanouissement ou renflement duquel il est formé. Cette quatrième observation est uniquement due à l'insertion des étamines ; 5.^o il arrive quelquefois que les étamines sont totalement séparées les unes des autres ; d'autres fois elles sont liées par quelques-unes de leurs parties , & réunies de cinq manières , ou en un seul corps , ou en deux corps , ou en plusieurs , ou en forme de cylindre , ou liées au pistile , & c'est leur réunion qui donne lieu à la cinquième observation ; 6.^o on remarque que les étamines sont toutes de même hauteur , sans avoir entr'elles aucune proportion de grandeur respective , ou bien elles sont d'une inégale grandeur déterminée , & pour lors il s'en trouve deux toujours plus petites , les plus grandes étant quelquefois au nombre de deux , quelquefois au nombre de quatre ; c'est de la proportion des étamines que dépend la sixième observation ; 7.^o le nombre des étamines varie dans les fleurs , soit mâles , soit hermaphrodites , & pour lors leur nombre forme la septième & dernière observation. C'est de ces sept observations que Linneus a tiré les caractères distinctifs des vingt-quatre classes de son système.

Les treize premières sont divisées uniquement par le nombre des étamines , si on en excepte la douzième & la treizième , qui ont encore pour caractère distinctif l'insertion des étamines. Les quatorzième & quinzième classes ne se distinguent que par la proportion respective des étamines. Les seizième , dix-septième , dix-huitième , dix-neuvième & vingtième sont formées par la réunion des étamines en quelques parties. Les vingt-unième , vingt-deuxième & vingt-troisième tirent leur distinction de l'union des étamines avec le pistile , ou de leur séparation d'avec lui. La vingt-quatrième n'a pour tout

caractère que l'absence ou le peu d'apparence des étamines. Les treize premières classes comprennent donc les fleurs visibles hermaphrodites, dont les étamines ne sont réunies par aucune de leur partie, & n'observent entr'elles aucune proportion de grandeur; elles se divisent par le nombre des étamines.

La première classe ne renferme que les plantes d'une seule étamine, & se nomme Monandrie, qui signifie plante qui n'a qu'un mari, ou étamine. La seconde contient les plantes à deux étamines, & se nomme Diandrie. La troisième comprend les plantes à trois étamines, ou qui ont trois maris, & se nomme pour cette raison Triandrie. Linneus place dans la quatrième classe les plantes à quatre étamines ou quatre maris, & il la nomme par cette raison Tetrandrie. On rapporte à la cinquième les plantes qui ont cinq étamines ou cinq maris, & on la nomme Pentandrie; la sixième est destinée aux fleurs à six étamines, & s'appelle Hexandrie. On donne le nom d'Heptandriques aux plantes qui ont sept étamines. L'Octandrie est la huitième classe de ce système, & est destinée aux plantes à huit étamines; la neuvième classe est connue sous le nom d'Ennendrie, elle renferme les plantes à neuf étamines. La dixième contient les plantes à dix étamines, & est surnommée Decandrie; l'onzième est la Dodecandrie, c'est-à-dire, la classe qui renferme douze étamines. La douzième & la treizième classe de ce système considèrent l'insertion des étamines indépendamment du nombre. Vingt étamines attachées au calice constituent la douzième classe; c'est uniquement dans l'insertion des étamines que consiste le vrai caractère de cette classe. La treizième se nomme Polyandrie, parcequ'elle renferme des plantes qui ont depuis vingt jusqu'à cent étamines qui ne tiennent pas au calice. La quatorzième & la quinzième classes sont destinées aux plantes dont les fleurs sont visibles hermaphrodites, & dont les étamines ne sont réunies par aucune de leurs parties, mais

dont la longueur est inégale , de sorte qu'il s'y en trouve deux plus petites que les deux autres. La quatorzième se nomme Didynamie ; elle a quatre étamines , dont deux petites , & deux plus grandes ; telles sont les plantes labiées : elle est ainsi nommée , à cause des deux puissances qu'on remarque dans les proportions des étamines. La quinzième est la Terradynamie , c'est-à-dire , la classe qui renferme les plantes à quatre puissances , ou pour mieux dire , qui ont six étamines , dont deux petites opposées l'une à l'autre , & quatre plus grandes. Depuis la seizième classe jusqu'à la vingtième inclusivement , sont renfermées les fleurs visibles hermaphrodites , qui ont leurs étamines à-peu-près égales en hauteur , réunies par quelques-unes de leurs parties. La seizième classe renferme les plantes dont les étamines sont réunies par leurs filets dans un corps , & se nomme pour cette raison Monadelphie , c'est-à-dire , plante qui n'a qu'un frère. Quand ces étamines sont réunies par leurs filets en deux corps , les plantes qui en sont pourvues entrent dans la dix-septième classe , connue sous le nom de Diadelphie. Si plusieurs étamines de la même plante sont réunies par leurs filets en trois ou en plusieurs corps , la classe qui les renferme se nomme Polyadelphie. Lorsqu'on remarque dans une plante plusieurs étamines réunies en forme de cylindre par les sommets , rarement par les filets , la classe qui les renferme se nomme Syngenesie , c'est-à-dire , ensemble ; & on appelle Gynandrie , ou classe à femelle mari , celle qui renferme les plantes qui ont plusieurs étamines réunies & attachées au pistile sans adhérer au sommet ; les vingt-une , vingt-deux & vingt-troisième classes sont destinées aux plantes dont les fleurs visibles ne sont point hermaphrodites , & n'ont qu'un sexe mâle ou femelle , c'est-à-dire , des étamines & des pistiles séparés dans différentes fleurs.

La vingt-unième classe comprend donc les fleurs mâles & femelles séparées sur un même individu :

comme dans le Melon , & par cette raison est appelée *monœcie* , c'est-à-dire , qui n'a qu'une maison. Lorsque les fleurs mâles & femelles sont séparées sur différents individus , comme dans le Chanvre , elles constituent la vingt-deuxième classe , connue sous le nom de *diœcie* , qui veut dire , deux maisons , tel que l'If. La vingt-troisième s'appelle Polygamie ou à plusieurs nœuds , lorsque les fleurs mâles & femelles sont sur un ou plusieurs individus avec des fleurs hermaphrodites , comme la Pariétaire. La vingt-quatrième classe est destinée aux plantes dans lesquelles on ne distingue que difficilement , ou même point du tout , les étamines , & se nomme cryptogamie , telles sont les Fougères. Linnæus a ajouté à toutes ces classes une appendice pour toutes les plantes dont les caractères essentiels ne sont pas encore suffisamment déterminés.

Pour résumer le système de Linnæus , il faut considérer dans les végétaux des vrais mariages ; les uns sont publics & les autres clandestins ; les publics sont connus de tout le monde , & sont représentés par les fleurs dont les parties de la fructification sont visibles à un chacun ; ces mariages sont ou monocliniques , ou dicliniques : les monocliniques sont ceux dans lesquels les maris & les femmes ont un seul & même lit , c'est-à-dire , lorsque toutes les fleurs sont hermaphrodites , & qu'on remarque dans la même fleur les étamines avec le pistil ; dans les monocliniques il y a affinité ou diffinité ; la diffinité est lorsque les maris ne sont pas joints ensemble , c'est-à-dire , lorsque les étamines ne sont attachées entr'elles par aucune de leurs parties ; cette diffinité est accompagnée d'indifférence ou de subordination ; l'indifférence régit , lorsque les maris ne gardent entr'eux aucune subordination , je veux dire , lorsque les étamines n'ont entr'elles aucune proportion de longueur , tel qu'on le remarque dans les monandriques , diandriques , triandriques , tetrandriques , pentandriques , hexandriques , heptandriques , octandriques , ennéandri-

ques , décandriques , dodecandriques , icosandriques & polyandriques.

La subordination régné , lorsque certains maris sont préférés à d'autres , c'est-à-dire , lorsque deux étamines sont plus courtes que les deux autres , comme on le peut voir dans les didynamiques & les tetradynamiques ; l'affinité est lorsque les maris sont proches ou liés ensemble , c'est-à-dire , lorsque les étamines sont attachées entr'elles par quelques-unes de leurs parties, ou avec les pistiles , comme on l'observe dans les monadelphiques , diadelphiques , polyadelphiques , syngenesiques , & gynandriques. Les mariages dicliniques sont ceux dans lesquels les maris & les femmes ont des lits différens , c'est-à-dire , lorsque les fleurs mâles & femelles sont séparées dans la même espèce , telles que les monœciques , les diœciques , & les polygamiques ; enfin les mariages sont clandestins , lorsqu'ils se font en cachette , c'est-à-dire , lorsque les parties de la fructification ne se peuvent voir qu'avec le microscope , telles que les cryptogamiques. La méthode de Linnæus est donc avec raison nommée méthode sexuelle , puisqu'elle est fondée sur le sexe des plantes.

Les classes du système de Linnæus se divisent par ordre ; les ordres sont fondés 1.^o sur les pistiles , comme les classes sur les étamines ; 2.^o on remarque que les pistiles varient en nombre ainsi que les étamines dans les fleurs qui en sont pourvues , ce qui constitue encore un principe pour former les ordres ; 3.^o il faut observer que le nombre des pistiles se prend à la base du style , & non à son extrémité supérieure nommée stigmate , qui se trouve quelquefois divisée sans qu'on puisse compter plusieurs pistiles. Lorsqu'ils sont dénués de style , comme dans les Gentianes , leur nombre se compte par celui des stigmates , qui , en ces cas , sont adhérens au germe.

Le caractère le plus général des ordres se tire du nombre des pistiles ; ainsi le premier ordre d'une classe

comprend les fleurs qui n'ont qu'un pistile ; le second ordre comprend les fleurs qui ont deux pistiles ou deux femelles, & se nomme dyginie. On appelle le troisième ordre trigynie , qui renferme les fleurs qui ont trois pistiles ; tetragynie le quatrième , dont les fleurs ont quatre pistiles ou femelles ; pentagynie l'ordre de celles qui en ont cinq , & qui fait le cinquième ; hexagynie , l'ordre sixième , qui comprend les fleurs qui ont six pistiles ; & enfin polyginie , l'ordre des fleurs qui ont un nombre de pistiles indéterminés , c'est-à-dire , plusieurs femelles.

On subdivise ainsi les treize premières classes ; on appelle une plante monandrique monogynique , celle dont la fleur n'a qu'une étamine & un pistile , ainsi du reste. La didynamie , qui est la quatorzième classe , se subdivise en deux ordres , dont la distinction est tirée de la disposition des graines ; où il y a quatre graines nues à découvert au fond du calice , comme dans les labiées , pour lors l'ordre se nomme gynospemie ; où les graines sont renfermées dans un péricarpe , comme dans les digitales , on appelle cet ordre angiospermie.

La quinzième classe nommée tetradynamie , se divise en deux ordres , dont le caractère est tiré de la figure du péricarpe , qui , dans les plantes de cette classe se nomme silique : 1.^o lorsque le péricarpe est presque rond , garni d'un stile à-peu-près de sa longueur , il constitue le premier ordre , qu'on nomme siliculeux , comme dans l'Alysson ; 2.^o lorsque le péricarpe est très-allongé avec un stile court , il forme le second ordre connu sous le nom de siliqueux , comme dans le Raifort.

Les classes , depuis la seizième jusqu'à la vingt-neuvième inclusivement , excepté la dix-neuvième , ont pour caractères distinctifs de leur ordre , ceux qui constituent toutes les classes qui les précèdent ; la monadelphie qui est la seizième , à laquelle se rapportent toutes les plantes dont les fleurs ont les étamines réunies

par leurs filets dans un seul corps , se subdivise en trois ordres , qu'on appelle pentandrie , decandrie & polyandrie. Les fleurs de la monadelphie-pentandrie , sont celles qui ont cinq étamines réunies par leurs filets en un seul corps ; si elles en ont dix , elles sont de la monadelphie-decandrie , tel est le Bec-de-grue ; & de la monadelphie-polyandrie , comme la Mauve , lorsqu'elles en ont plusieurs.

La monœcie , qui est la vingt-unième , se subdivise en monandrie , diandrie , monadelphie , syngenesie , gynandrie ; la monœcie-monandrique ou diandrique , est celle dont les fleurs mâles n'ont qu'une étamine ou deux , tel est le Concombre sauvage ; s'il y en a plusieurs dans une fleur mâle , & qu'elles se trouvent réunies par un filet dans un seul corps , on appelle la plante monœcie-monadelphie , tel que le Pin ; si elles sont réunies en forme de cylindre par leurs anthères , elles sont de la monœcie-syngenesie ; si les étamines des fleurs mâles s'insèrent dans le lieu qu'occupoit le pistille en cas que la fleur soit hermaphrodite , pour lors ces fleurs sont de la monœcie-gynandrie ; on expliquera de même les ordres de la classe de la diœcie. La polygamie , qui est la vingt-troisième classe , se divise en polygamie-monœcie & en polygamie-diœcie. Les ordres de la syngenesie , ou dix-neuvième classe , ont des caractères distincts assez difficiles à connoître ; comme cette classe comprend les fleurs formées de l'aggrégation de plusieurs petites fleurs , on la nomme génériquement syngenesie-polygamie. Cette polygamie , qui veut dire plusieurs nœces dans la même fleur , se divise de quatre manières , en polygamie égale , superflue , fausse & nécessaire. On ajoute à cette classe un cinquième ordre , qui est la monogamie. La polygamie égale , qui est le premier ordre , comprend les fleurons qui sont hermaphrodites , tant dans le disque que dans la circonférence de la fleur , comme dans la Laitue. La polygamie superflue renferme les fleurs dont les fleurons du disque sont

hermaphrodites , & ceux de la circonférence femelles , telles font les radiées. L'ordre troisiéme , ou polygamie fausse , contient toutes les plantes dont les fleurons hermaphrodites font dans le disque , & les neutres ou stériles dans la circonférence , comme dans la Centaurée. La polygamie nécessaire , qui est le quatrième ordre de cette classe , a les fleurons du disque mâles , & ceux de la circonférence femelles , comme le Souci ; nous avons appelé le cinquième ordre de cette classe , monogamie , auquel se rapportent les fleurs qui , sans être composées de fleurons , ont leurs étamines réunies au cylindre par leur anthère , comme on peut le voir dans la Violette. La cryptogamie ou dernière classe , n'ayant point de caractères appaiens qu'on puisse tirer de sa fructification , se subdivise en quatre ordres , en fougères , en mousses , en aiguës & en champignons.

Les ordres qui ont servi à subdiviser les classes , se subdivisent eux-mêmes en genres : on ne peut mieux comparer les classes des plantes qu'à une armée ; une armée comprend tous les régimens qui forment autant de classes ; chaque régiment se divise en bataillons , ce sont les ordres ; & chaque bataillon se subdivise en compagnies , ce sont les genres.

Linneus pour constituer ces derniers , considère les parties de la fructification , & il les observe chacune en particulier dans tous leurs rapports & dans tout l'ordre suivant ; 1.^o le calice ; 2.^o la corolle & surtout le nectar ; 3.^o les étamines ; 4.^o les pistiles ; 5.^o le péricarpe ; 6.^o les semences ; 7.^o les receptacles : nous appellerons lettres de l'alphabet ces sept caractères , dont les principaux attributs sont le nombre , la figure , la situation & la proportion. En étudiant ces lettres , en les comparant , en les épelant , pour ainsi dire , on parvient à lire & à reconnoître dans chaque planre le caractère générique que l'auteur de la nature lui a empreint.

Prenons pour exemple d'un genre celui du pentaphylloïde , classe icosandrique , ordre polyginie , c'est-

à-dire , que cette plante est du nombre de celles qui ont vingt étamines attachées au calice , & dont le nombre des pistiles est indéterminé. Le calice de cette plante est d'une seule pièce , aplati , divisé par sa moitié en dix parties , parmi lesquelles découpures les alternes sont plus petites & réfléchies ; la corolle a cinq pétales obronds , ouverts , attachés au calice par des ongles ; les étamines sont au nombre de vingt , dont les filets sont en forme d'alène , plus courts que la corolle , insérés au calice ; les sommets sont en forme de lune allongée ; les embryons des pistiles sont nombreux , très-petits , rassemblés ; les stilets sont en forme de cheveux , plus longs que les étamines , insérés au côté de l'embryon ; les stigmates sont obtus ; quant au péricarpe , on n'en remarque aucun. Le receptacle commun des semences est obrond , très-petit , sec , qui persiste après la fleur , couvert de semences & renfermé dans le calice ; les semences sont très-nombreuses & pointues ; on voit par cette manière de décrire les fleurs , combien les lettres de l'alphabet fournissent d'objets à comparer. Linnæus a décrit suivant cette méthode 1239 genres , chaque genre admet encore plusieurs espèces. Cet ingénieux auteur tire les caractères de chaque espèce de toutes les parties extérieures de la plante.

Il s'agit actuellement d'expliquer la manière de connoître une plante quelconque inconnue suivant ce système. Je suppose que je veux connoître l'*Ixia* qui se présente à moi pour la première fois. Imbu de tous les principes élémentaires que nous venons de rapporter , je cueille plusieurs pieds de la plante , ayant soin qu'ils soient fournis de fleurs & de fruits ; l'apparence de ces parties de la fructification , sur lesquelles notre système est fondé , m'annonce d'abord qu'il ne faut pas la chercher dans la vingt-quatrième classe. Je distingue dans toutes les fleurs que j'examine , des étamines & des pistiles ; elles sont donc hermaphrodites , & par conséquent ne font pas partie des vingt-une , vingt-deux , ni

vingt-troisième classe. J'examine les étamines en particulier ; j'observe qu'elles ne sont point attachées au pistile , & qu'elles occupent la place du réceptacle qui leur est destinée ; ces fleurs ne sont donc pas de la vingtième classe. Je m'apperois aussi que les étamines ne sont réunies dans aucune de leurs parties , ni par les filets , ni par les anthères ou sommets ; je conclus donc que la plante n'est pas des seizième , dix-septième , dix-huitième & dix-neuvième classes. Je compare leurs grandeurs respectives , je n'y découvre aucune proportion déterminée , elles sont à-peu-près égales entr'elles ; la plante n'est donc pas des quatorzième ni quinzième classes. Je n'ai donc plus que le nombre des étamines pour me décider ; caractère des treize premières classes : j'en trouve trois , la plante est donc de la troisième classe de la triandrie ; donc au lieu de chercher à la reconnoître sur 1239 genres , le nombre est réduit à 89.

Il s'agit de déterminer l'ordre ; je porte mes regards sur le pistile , parceque je sais que dans la triandrie le nombre des pistiles fixe les ordres ; j'observe le stile jusqu'à sa base , pour m'assurer du nombre des pistiles ; je n'en trouve qu'un , ainsi ma plante est de la triandrie-monogynie ; me voila réduit à la comparaison de dix-huit genres , pour savoir celui que je cherche à reconnoître.

Je parcours les caractères de ces dix-huit genres décrits par l'auteur ; je les compare à ceux de ma plante , un spathe bivalve , une corolle à six pétales , une capsule subovale à trois côtés , divisée en trois loges applaties & en trois valvules ; des semences ob rondes m'apprennent avec certitude que ma plante est du genre des *Ixia*. Mais qu'elle est son espèce ? On n'en trouve que neuf dans Linnæus ; je cherche une plante qui ait les feuilles en forme d'épée , les fleurs éloignées & appuyées sur un péduncule , la panicule fourchue , & je trouve que cet *Ixia* est l'*Ixia* de la Chine , ou la neuvième espèce ;

il doit avoir les fleurs jaunes tachées de rouge , & le stile incliné. Or cet *Ixia* a aussi ces caractères ; donc il se nomme *Ixia ensiformibus foliis remotis , panicula dichotoma , floribus pedunculatis*. Linn. Sp. plant. 32. Qu'y-a-t-il donc de plus commode qu'un pareil système ?

Mettre à fruit , c'est un terme de jardinier ; il se dit d'un arbre qui après avoir été longtemps sans donner du fruit , commence à en produire.

Moëlle , c'est la substance molle & légère qui se trouve dans l'intérieur des végétaux.

Molette , M. Tournefort compare à une molette d'épéon la disposition des pétales , dans les fleurs que l'on nomme plus ordinairement fleurs en roses , ou rosette.

Monadelphe , c'est le nom de la sixième classe de Linnæus , qui renferme des plantes dont les fleurs ont plusieurs étamines réunies par leurs filets en un corps.

Monandrie , nom de la première classe du système de Linnæus , dans laquelle sont comprises toutes les fleurs qui n'ont qu'une étamine.

Monœcie , c'est encore le nom d'une des classes du système de Linnæus , qui renferme les plantes dont les fleurs mâles & femelles sont séparées sur un même individu ; cette classe est la vingt-unième.

Monogamie , on qualifie de ce nom les fleurs qui , sans être composées de fleurons , ont leurs étamines réunies en cylindre par leur anthère.

Monogynie , c'est le nom du premier ordre d'une classe suivant le système de Linnæus ; on qualifie ainsi les plantes qui n'ont qu'un pistile.

Monopétale , on donne ce nom aux fleurs qui n'ont qu'un pétale.

Monophille , se dit d'une enveloppe , d'un périclypthe , d'une vrille : on appelle monophille une enveloppe qui n'est point divisée ; quand un périclypthe est d'une seule

pièce , il s'appelle aussi monophille ; une vrille simple porte pareillement ce nom.

Motte d'un arbre, c'est une certaine quantité de terre qui tient en pelotte aux racines, en sorte qu'elles ne sont pas découvertes. *Lever en motte*, soit un arbre, soit toute autre plante, c'est les tirer de terre avec précaution, pour que les racines restent engagées dans une motte de terre : quand cette motte est trop considérable, surtout pour les plantes que l'on met dans des caisses ou dans des pots, on la rafraîchit ; on appelle motte en terme d'agriculture, une pelotte de terre qui se tient en masse sans se séparer lorsqu'on laboure.

Multicapsulaire, se dit d'un péricarpe dont les loges de la capsule sont tellement distinguées, qu'elles forment plusieurs capsules réunies, mais distinctes.

Multiloculaire, se dit d'une capsule qui est intérieurement divisée par des cloisons en plusieurs loges.

N.

NAIN, se dit en terme de jardinage d'un arbre fruitier qui ne profite pas beaucoup en hauteur, & que l'on tient en buisson ou en espalier.

Napiforme, signifie une chose qui a la forme d'un navet.

Naviculaire, se dit du panneau d'une filique, lorsqu'il est creusé en bateau.

Nécessaire, on donne le nom de *Polygamie nécessaire*, aux plantes dont les fleurons du disque sont mâles, & ceux de la circonférence femelles.

Nectar, c'est une partie de la corolle d'une fleur, destinée à contenir le miel, espèce de sel végétal, sous une forme fluide, qui suinte de la plante, & que les abeilles viennent y chercher ; toutes les fleurs n'en sont pas pourvues ; le nectar ne paroît pas essentiel à la fructification ; il se présente sous plusieurs formes, comme un

flet , comme une écaille , un cornet , un mammelon , un éperon ; quelquefois ce sont des poils , des sillons , des cavités ; quelquefois par sa forme , par ses couleurs , & par son organisation interne , on le reconnoît pour un simple prolongement des pétales , pour un vrai pétale , distingué par son usage & par sa disposition.

Nerveux , se dit des vaisseaux qui s'étendent tout droit dans les fruits ou les feuilles , sans forme de ramifications , & que l'on compare aux nerfs du corps animal.

Neutres , on donne ce nom aux fleurs stériles , dont le germe avorte , sans produire des semences fécondes.

Nôces des plantes , Linneus a découvert par son système les nôces des plantes ; dans l'acte de la fructification , il a très-bien remarqué celui de la génération : la corolle forme selon lui le palais où se célèbrent les nôces , le calice est le lit conjugal , les pétales sont les nymphes , les filets des étamines sont les vaisseaux spermatiques ; leurs sommets ou anthères sont les testicules ; la poussière des sommets est la liqueur séminale ; le stigmate du pistile devient la vulve ; le style est le vagin ou la trompe ; le germe est l'ovaire ; le péricarpe est l'ovaire fécondé ; la graine est l'œuf , & le concours des mâles & des femelles est nécessaire à la fécondation.

Nœuds , ils sont communs aux chaumes , qui sont des tuyaux ou tiges fistuleuses destinées aux plantes graminées ; on voit rarement des chaumes sans être articulés , c'est-à-dire , coupés par des nœuds distribués de distance en distance.

Noix , c'est une espèce de fruit osseux , composé de plusieurs pièces , recouvert d'une enveloppe coriacée , peu succulente , & dans le milieu duquel est contenue la semence ; la chair qui lui sert d'enveloppe se nomme le brou ; Linneus regarde la noix comme la semence même.

Nouées , se dit chez les jardiniers des fleurs qui portent du fruit , soit qu'elles soient femelles , soit qu'elles

soient hermaphrodites. Les agriculteurs disent encore qu'un fruit est noué , lorsque la fleur est passée , & que le fruit commence à grossir.

Noueuse, s'entend d'une racine qui forme des nœuds.

Noyau, (*fruit à*) il est composé d'une pulpe ou chair molle qui renferme un noyau , espèce de boîte ligneuse dans laquelle est contenue la semence ou amende.

Nud, se dit en Botanique des parties qui ne sont point couvertes par d'autres ; ainsi on appelle tige nue , une tige qui n'est pas garnie de feuilles ; fleur nue , celle qui n'a point de calice ; feuille nue , celle qui n'est ni nerveuse , ni veinée ; on dit encore que les semences sont nues ; lorsqu'elles n'ont point d'enveloppe particulière.

Nutation des plantes, on entend en général par ce mot, la faculté donnée à quelques-unes de tourner le disque de leurs fleurs du côté du soleil , en suivant le cours de cet astre ; de sorte que leur disque , le matin , regarde l'Orient , le Sud à midi , l'Occident le soir : on appelle les plantes qui ont cette faculté *Héliotrope*. Messieurs de la Hire, Halles & Bonner , prétendent que ces mouvemens ne sont point l'effet d'une torsion dans la tige , mais du dessèchement des fibres exposées à l'ardeur du soleil , lesquelles en se racourcissant , déterminent la nutation des fleurs & des jeunes tiges ; toutes les plantes ne sont cependant pas douées de ce mouvement , il s'en trouve même qui n'ont pas la faculté de reprendre leur première situation , lorsqu'on la change.

O.

O*BLIQUE*, se dit d'une feuille dont les deux bords deviennent verticaux , en sorte que la base de la feuille a une espèce d'entorse.

Oblongue, on dit qu'une feuille est oblongue , lorsque sa longueur contient plusieurs fois sa largeur.

Obstructions, les plantes sont sujettes à cette maladie,

de même que les animaux ; le temps endureit & obstrue les vaisseaux qui charient l'air & la sève, le suc se corrompt ; la plante ne recevant dès-lors qu'une nourriture viciée ou insuffisante , languit & meurt.

Obtus, se dit en général de ce qui est arrondi à son extrémité.

Oëandrie, c'est le nom de la huitième classe de Linnæus, qui comprend les plantes qui ont huit étamines.

Osilleton, jeune pied qui part de la tige d'une ancienne plante, & qui est garni de racines.

Œsophage des plantes ; les racines remplissent en même temps les fonctions de bouche & d'œsophage ; elles font la première élaboration des sucs qu'elles ont pompées, & les transmettent dans les vaisseaux, dont les collers, la tige, les branches sont fournies principalement dans leur substance médullaire corticale.

Œil, en terme d'agriculture, signifie quelquefois le bouton des arbres & des arbrisseaux, & en terme de jardinage & de botanique, le nombril ou l'ombilic d'un fruit.

Œil dormant, se dit d'une greffe en écusson, qu'on pratique au déclin de la sève, parce que le bouton ne s'ouvre qu'au printemps qui suit.

Œil poussant, se dit pareillement d'une greffe en écusson ; mais elle se pratique au printemps ; quand elle prend, le bouton se développe sur le champ.

Ombelle, c'est une disposition de fleurs qui naissent à l'extrémité de branches fort menues ; ces branches sont assemblées par leur base autour d'un point commun, elles s'écartent par leurs parties supérieures en forme de rayons, & comme les branches d'un parasol.

Ombellifères, se dit des plantes dont la fleur est en ombelle proprement dite ; leurs graines doivent être cueillies le matin, dans le temps que la rosée y subsiste encore ; les ayant ensuite laissé exposées au soleil pendant

quelques jours, on les vanne & on les enferme aussi-tôt.

Ongle ou *Onglet*, c'est l'endroit de la fleur par lequel un pétale s'attache au calice ou au fond de la fleur; cet endroit est souvent d'une consistance épaisse, dure, & à-peu-près blanche.

Oreille, *Oreillette*, *Orillon*, ces trois mots sont synonymes; on entend par-là en jardinage les feuilles féminales d'une plante, & en botanique chaque appendice qui se trouve à la base de certaines feuilles, de quelques pétales, ou de calices.

P.

*P***ANACHÉ**, se dit d'une fleur, d'un fruit, qui sont variés de différentes couleurs.

Panicule, c'est une espèce d'épi qui contient beaucoup de fleurs ou de semences, mais qui diffère de l'épi proprement dit, en ce qu'il forme plusieurs corps séparés à-peu-près comme une grappe.

Panneaux, on se sert en botanique de ce terme, pour exprimer les parties de certains fruits qui ont quelque rapport aux panneaux de menuiserie, & surtout pour désigner les deux battans ou volans qui forment les siliques.

Papillionacées, on nomme ainsi des fleurs qui sont composées de quatre ou cinq pétales, distingués par leur position & par leur forme, dont le supérieur est plié en d'os d'âne, quelquefois relevé, l'inférieur représente l'avant d'une nacelle, & les deux latéraux sont les aîles.

Parasites, ce sont des plantes dont les racines sont attachées à d'autres plantes.

Parasol, (*fleurs en*) voyez *Ombellifères*.

Partielle, se dit de l'enveloppe qui se trouve au bas des petites ombelles.

Patte, c'est un terme de jardinage; il ne se dit que pour

pour les anémones & les renoncules , dont l'oignon ou la racine ressemble en quelque façon à la patte d'un petit animal.

Pavillon , c'est un terme de botanique qui signifie 1.^o la partie évasée d'une fleur en entonnoir ; 2.^o le pétale supérieur des fleurs légumineuses.

Pedicule , c'est la queue des feuilles ; ce terme a encore eu une signification plus étendue ; il désignoit les filets qui servent de supports au sommet des étamines , & en général tout ce qui tient lieu de pied aux organes de la fructification. On nomme à présent péduncule l'espèce de queue où sont attachés la fleur & le fruit.

Pentagone , se dit d'une semence qui est à cinq côtés.

Pentagynie , on nomme ainsi le cinquième ordre des classes de Linneus , qui renferme des plantes dont les fleurs ont cinq pistiles.

Pentandrie , cinquième classe du système de Linneus , dont les plantes ont des fleurs à cinq étamines.

Pepin , c'est la semence des fruits nommés communément fruits à pepin ; l'enveloppe de cette semence est coriacée , & l'endroit où elle se trouve est ordinairement une loge membraneuse.

Perfeuillée , se dit d'une feuille qui est enfilée dans son disque par la tige , sans y adhérer par ses bords.

Perianthe , c'est l'espèce de calice la plus commune , ce calice est ordinairement de plusieurs , ou du moins il est découpé par ses bords ; il n'enveloppe quelquefois qu'une partie de la corolle.

Péricarpe , c'est la partie du germe développé qui renferme les plantes ; il peut être comparé à l'ovaire fécondé ; toutes les plantes n'ont point de péricarpe ; dans celles qui en sont dépourvues , le receptacle ou le calice en font les fonctions & contiennent les semences.

Perpendiculaire , se dit d'une racine qui sort de la semence , & qui se nomme pivot ; cette racine pénètre en terre perpendiculairement.

Personnée, s'entend d'une fleur en masque qui imite un muse à deux lèvres ; les semences de cette espèce de fleur sont renfermées dans une capsule.

Pétale, c'est une production mince, une espèce de feuille ordinairement colorée, composée d'un grand nombre de vaisseaux & d'un tissu cellulaire, ou substance pulpeuse, que Grew nomme *paranchyme*. Toutes ces parties sont recouvertes d'un épiderme, ou plutôt d'une véritable écorce transparente, qui transmet les couleurs du paranchyme.

Pétiole, c'est la queue de la feuille, il est composé de vaisseaux lymphatiques, de trachées & d'un tissu cellulaire, recouvert d'une écorce ; le pétiole est verdâtre, quelquefois cylindrique, & on y distingue souvent des côtes ; il est ordinairement applati en dessus, d'autre fois creusé en gouttière ; il soutient la feuille de diverses manières, ou avec roideur, ou en la laissant pendre.

Picot, terme de fleuriste, c'est la même chose que pistil.

Pinnée, voyez *Aillée*.

Pistile, c'est l'organe femelle de la fructification des plantes ; il se trouve presque toujours au centre de la fleur ; les fleurs qui n'ont que cet organe, sont nommées fleurs femelles ; il varie en nombre, il occupe le centre de la corolle & du receptacle ; sa forme ordinaire est une espèce de mammelon qui se termine en un filet souvent perforé à son extrémité supérieure ; il est donc composé de trois parties, qu'on nomme le germe, le style & le stigmate.

1.^o Le germe, autrement dit l'embryon, est la partie inférieure du pistile, qui porte sur le réceptacle ; il fait les fonctions d'utérus ou de matrice ; il renferme les embryons des semences & les organes qui servent à leur nutrition. Le style est un petit corps plus ou moins allongé, qui porte sur le germe, & qui se termine par le stigmate ; il est ordinairement fistuleux, c'est-à-dire, creusé en tuyau ; on le compare au vagin ; il n'e-

ziste pàs dans toutes les plantes. Le stigmate termine le stile ; il est tantôt arrondi , tantôt pointu , long , affilé , quelquefois divisé en plusieurs parties ; on le regarde comme l'organe extérieur de la génération ; ou comme les lèvres du vagin ; il reçoit la poussière fécondante du sommet de l'étamine , & la transmet par le stile dans l'intérieur du germe pour féconder les semences ; dans les fleurs qui n'ont point de stile , le stigmate adhère au germe , on le nomme alors sessile.

Pivot , c'est le corps principal d'une racine qui s'enfonce perpendiculairement dans la terre , & qui jette de tous côtés des rameaux qui se divisent , & qui après plusieurs subdivisions , deviennent aussi fins que des cheveux .

Placenta , c'est le receptacle d'une fleur , pourvu qu'il reçoive les vaisseaux ombilicaux qui servent à transmettre la nourriture aux semences.

Planche , c'est un terme de jardinage qui signifie ordinairement un quarré long , bien labouré & amendé , sur lequel on plante des fleurs si c'est un compartiment de parterre : ou bien on y fait venir des herbages ou des légumes , si c'est un compartiment de jardin potager.

Plantard ou *Plançon* , c'est une branche assez grosse , qui n'a ni branchage , ni racine , & que l'on met en terre pour produire un arbte.

Plantation , c'est une opération qui consiste à mettre en terre , soit des arbres ou autres végétaux suffisamment garnis de racines , soit des parties entracinées de ces plantes , soit des boutures ou des plantards.

Plante , c'est un nom générique qui comprend tous les végétaux , herbes & arbres. Par plantes on entend ordinairement des corps organisés , qui s'attachent à diverses substances , afin d'en tirer l'aliment qui leur convient pour subsister & croître , & qui se multiplient par les semences qu'ils produisent. Les parties les plus sensibles des plantes sont les racines , les tiges , les feuilles , les fleurs & les fruits. Voyez ce que nous en disons

dans les différens articles qui les concernent, & dans les dissertations préliminaires de notre *Traité historique des plantes de la Lorraine*, qui se trouve chez *Fetil, libraire à Paris*; on divise ordinairement les plantes en arbres, arbrustes & herbes.

Plantule, c'est le rudiment de la tige; elle est étendue dans la cavité des lobes, terminée par un petit rameau, & semblable à une plume, d'où on l'a nommée *plumule*.

Planter, se dit des plantes qu'on met en terre pour acquérir la perfection qui leur convient.

Plantoir, c'est une cheville de bois ou de fer pointu par en bas, avec une espèce de manche par en haut; on l'emploie à faire des trous pour planter les boutures, ou les petites plantes qui n'ont que très-pen de racines.

Platebande, c'est une bande de terre, longue & étroite, qu'on laboure pour y planter des fleurs, ou que l'on ratisse pour faciliter la promenade.

Pleine, se dit d'une fleur, dont les parties, les étamines & les pistiles sont changés en pétales, ce qui la rend absolument stérile, & la distingue de la double qui porte quelques semences fécondes.

Pleine-terre, on nomme communément arbre de pleine-terre, celui qui n'a pas besoin d'être élevé en pot ou en caisse.

Plumieux, on appelle ainsi les rameaux d'une aigrette branchue lorsqu'ils imitent une plume.

Plume, c'est ainsi qu'on nomme la tige d'une plante quand elle commence à sortir de la semence.

Poils, ce sont de petits filets plus ou moins courts, plus ou moins solides, quelquefois visibles aux yeux, d'autres fois seulement par le moyen de la loupe. Presque toutes les parties des plantes, surtout les jeunes tiges, observées de cette manière, paroissent recouvertes de poils; ils se présentent sous plusieurs formes variées, cylindriques dans plusieurs légumineuses; terminées en pointes dans les mauves; en deux pointes courbées dans

quelques fleurs à fleurons ; en hameçon dans l'aigremoine ; tubulées & articulées dans l'orme ; l'usage des poils est de préserver les parties des plantes de l'action des frottemens , du vent , de la chaleur & du froid ; ils sont assez constamment uniformes dans toutes les plantes congénères.

Pointu, se dit d'une feuille, d'un poil, d'un stigmate, d'une stipule , lorsque ces parties sont terminées en pointe.

Polyadelphie, c'est le nom de la dix-septième classe de Linnæus , qui renferme des plantes dont plusieurs étamines sont réunies par leurs filets en trois ou en plusieurs corps.

Polyandrie, c'est le nom que Linnæus a donné à la treizième classe de son système ; il a mis dans cette classe toutes les fleurs qui ont depuis vingt jusqu'à cent étamines qui ne tiennent pas au calice.

Polygames, on nomme ainsi les plantes qui ont toujours des fleurs hermaphrodites, & outre cela des fleurs mâles ou des femelles sur différens pieds , ou sur le même pied : les hermaphrodites sur un pied , les femelles ou les mâles sur un autre , avec ou sans hermaphrodite.

Polyginie, signifie dans le système de Linnæus l'ordre des fleurs qui ont un nombre de pistiles indéterminé.

Port d'une plante, c'est la forme d'une plante considérée dans toutes ses parties d'une manière assez frappante pour la vue , mais difficile à décrire.

Pousse d'un arbre, c'est le jet de l'arbre , sa nouvelle production.

Poussière fécondante, c'est cette poussière qui est contenue dans l'intérieur du sommet des étamines , & qui s'en échappe lorsque la maturité le fait entr'ouvrir ; cette poussière est ordinairement jaune ; c'est la vraie cire brute que les abeilles recueillent , au moyen des broches de poils dont leurs cuisses sont couvertes.

Prolifere, se dit d'une fleur d'où part une tige qui porte soit un bouquet de feuilles, soit une autre fleur; il y a des poires proliferes, de l'œil desquelles il sort des fleurs, des fruits & des feuilles.

Propre, se dit d'un réceptacle qui ne porte que les parties d'une seule fructification, c'est-à-dire, une fleur simple, unique.

Pulpe, c'est la substance médullaire ou charnue des fruits; c'est un tissu cellulaire, ou parenchymateux, ou vésiculaire.

Purgatif, c'est un remède qui fait évacuer les matières qui crouissoient dans l'estomac & les intestins.

Q.

QUARRÉ ou carreau d'un jardin, c'est une division qu'on fait dans les compartimens d'un parterre avec du bois nain, ou de petites plantes, pour y mettre des fleurs.

Quaternées, *Quinées*, ce sont des épithètes qu'on donne aux feuilles, lorsqu'elles se trouvent au nombre de quatre ou de cinq rangées en anneau autour de la tige.

Quinconce, c'est un plan d'arbres disposés en plusieurs rangs parallèles, tant selon la longueur que la largeur, en sorte que le premier arbre du second rang est plus enfoncé & planté au milieu de la diagonale du carré formé par les deux premiers arbres du premier rang; ces cinq premiers arbres peuvent très-bien se représenter par la figure que forme un cinq au jeu de cartes. Ces sortes de quinconces ne sont plus actuellement à la mode; on se contente aujourd'hui de les planter en lignes retournées d'équerre, qui forment un échiquier ou trois carrées; les allées en sont plus régulières & d'égale largeur.

Quinquangulaire, se dit d'une feuille qui est à cinq angles.

R.

RABATTE, signifie en jardinage, tailler un arbre qui pousse foiblement.

Racine, c'est la partie par laquelle la plante s'attache à la terre; il y en a de trois espèces, la bulbeuse, la tubéreuse & la fibreuse. La bulbeuse est ce qu'on appelle communément oignon; il est le plus souvent garni à sa base de racines fibreuses. Les tubéreuses sont solides, par couches, écailleuses, deux à deux, ou plusieurs ensemble, & de différentes figures. La racine fibreuse est composée de plusieurs autres racines plus petites que le tronc d'où elles partent; elle est perpendiculaire, ou horizontale, charnue ou filamenteuse, ou simple, ou branchue.

Radical, se dit d'une feuille qui sort de la racine.

Radiée, signifie fleur composée, dont le milieu ou disque est occupé par des fleurons, & le tour ou la couronne, formés de demi-fleurons qui représentent des rayons.

Rame, signifie chez les jardiniers des branches ou rameaux secs, que l'on pique en terre pour soutenir des plantes flexibles.

Rameau, se dit d'une branche d'arbre coupée pendant l'été pour en tirer des greffes & des écussons. En terme de botanique, on entend communément par rameaux, une tige qui se divise en plusieurs branches.

Ramification, c'est la disposition des branches considérées en elles-mêmes, & relativement les unes aux autres.

Rampant, se dit d'une partie de plantes qui s'étend sur le terrain ou dans la terre, suivant une direction horizontale. On qualifie du nom de rampante, les plantes sarmenteuses, dont les tiges & les branches se couchent sous terre.

Rapprocher, c'est raccourcir les branches des arbres

qui s'ouvrent trop ; les branches raccourcies en produisent de nouvelles à leur extrémité , qui rendent l'arbre plus fourni & plus plein.

Ravaler , c'est rendre un arbre plus court & plus bas qu'il n'étoit , en rognant considérablement de sa hauteur.

Rayons , on entend en jardinage par rayons , des petites raies qu'on fait pour y semer certaines graines que l'on ne sème pas en plein champ.

Rebinage , c'est le troisième labour qu'on donne à la terre.

Receper , c'est-à-dire , couper entièrement la tête à un arbre , soit pour le greffer d'une autre espèce , soit pour lui faire pousser de nouvelles branches , & le rajeunir par ce moyen.

Receptacle , c'est l'extrémité du péduncule , sur laquelle reposent immédiatement la fleur ou le fruit , ou tous deux ensemble ; c'est ordinairement le centre de la cavité du calice , qui est quelquefois convexe en cette partie ; il s'appelle placenta , lorsqu'il reçoit les vaisseaux ombilicaux qui servent à transmettre la nourriture aux semences ; Tournefort le distingue en receptacle propre qui ne porte que les parties d'une seule fructification , c'est-à-dire , une fleur simple , unique & en receptacle commun , qui porte des fleurs composées de l'aggrégation de plusieurs petites fleurs ; Linnæus regarde l'ombelle comme une espèce de réceptacle.

Recolte , se dit en termes d'agriculture de la dépouille que l'on fait des fruits de la terre , mais principalement des bleds & autres grains ; il y a aussi la recolte des plantes pour les herbiers & pour les pharmacies : nous avons parlé de celles pour les herbiers dans l'article qui les concerne ; nous parlerons ici de la recolte des plantes pour les pharmacies ; c'est une chose intéressante dans un ouvrage de la nature de celui-ci.

Il est d'abord de principe que les plantes qui sont produites dans leur climat naturel , sont préférables à

celles que l'on fait pousser par art dans des climats qui leur sont étrangers. Parmi le nombre infini de plantes qui existent, les unes se plaisent dans les bois, d'autres dans les plaines, d'autres sur les montagnes; celles-ci croissent dans les lieux arides & pierreux; celles là se plaisent dans les marais & les lieux aquatiques; d'autres ne paroissent que sur la surface ou au fond de l'eau: il faut donc les aller cueillir dans les lieux qui leur sont propres.

Le choix de la saison est peut-être ce qu'il y a de plus important pour la recolte des plantes & des parties qui les composent; il s'en trouve qui sont dans leur état de vigueur au printemps, d'autres en automne, d'autres en été; quelques-unes demandent à être cueillies en hiver. Chaque partie de la plante a encore ses temps propres pour sa recolte; les racines peuvent être cueillies en toute saison, pourvu qu'elles soient charnues: dans plusieurs plantes herbacées les racines deviennent ligneuses, à mesure que leur rige monte, il ne faut pas attendre ce temps pour en faire la recolte: La plus grande vigueur des racines vivaces est quelques mois après la maturité de leurs graines, & celle des bis-annuelles après le développement des feuilles; on fera donc très-bien d'arracher les premières en automne, & les secondes au printemps.

Quelques personnes rejettent indistinctement toutes les racines rongées par les vers, mais il est de fait que les résineuses, quoique piquées par ces animaux, ne perdent rien de leur qualité.

On peut ramasser les bois en tout temps, mais il faut avoir attention que les arbres dont on les tire ne soient ni trop jeunes ni trop vieux; on récoltera les écorces sur les jeunes arbres & dans l'automne, à moins que ce ne soit des écorces d'arbres résineux, on les recueillera pour lors avant que la sève soit en mouvement. Le temps de cueillir les feuilles est celui où le bouton des fleurs commence à se montrer; quant aux fleurs, si

elles sont de nature à ne pas être séparées du calice, il faudra en faire la récolte au moment de leur épanouissement ; leur vertu est alors plus considérable qu'elle ne seroit , si on les eût ramassées avant ce temps ; les roses de provins , qui sont purgatives lorsqu'elles sont épanouies , deviennent stiptiques après l'épanouissement ; les plantes aromatiques n'acquièrent leur efficacité qu'après la chute de la fleur , & lors de la parfaite maturité de la semence ; il est très-essentiel de cueillir les calices des plantes labiées avec les pétales , parceque la partie odorante s'y trouve renfermée ; il n'en est pas de même des liliacées ; elles n'ont point de calice , toute leur odeur réside dans les pétales , & leurs parties aromatiques fixées dans la poussière fécondante , sont si volatiles , qu'on ne peut les retenir , & qu'on ne les apperçoit qu'en certain temps ; il est par conséquent fort inutile de travailler à dessécher les plantes liliacées ; si l'on veut en tirer les parties actives , il faut les cueillir à l'instant même de la fécondation , & pour fixer leurs parties aromatiques , il faut les enchaîner dans des huiles essentielles. Plusieurs plantes ont des fleurs si petites , qu'on n'en peut conserver les vertus , à moins qu'on ne prenne en même temps les feuilles & souvent les tiges , autrement on donneroit lieu à une trop grande dissipation des parties actives ; on fait usage des petites plantes en leur entier , on ne doit les cueillir que lorsqu'elles sont en vigueur , & on attendra la parfaite maturité des semences pour les ramasser ; on ne laissera pas dans les fruits charnus celles qui y sont renfermées , elles s'y gâteroient ; mais celles qui ont des capsules peuvent très-bien y être conservées ; on choisira les fruits dans leur maturité , ou avant , selon les usages auxquels on les destine.

On emploie dans les pharmacies les plantes sèches ou fraîches : les premières peuvent très-bien suppléer aux secondes ; on cueillera celles qu'on veut employer fraîches un peu avant le lever du soleil , & dans un

beau jour ; mais pour ce qui est de celles qu'on se propose de dessécher , on n'en fera la récolte qu'après que le soleil en aura totalement enlevé l'humidité, sur le midi & dans un jour beau & serein ; on aura encore égard à l'âge des plantes ; l'enfance , l'adolescence , la maturité , la vieillesse , sont pour elles des états très-différens , d'où résultent souvent des propriétés opposées. Les feuilles de mauve & de guimauve , lorsqu'elles sont jeunes , sont très-émollientes & mucilagineuses ; parvenues à leur vieillesse , elles deviennent astringentes , & donnent un acide remarquable par sa stipticité.

Mais ce n'est pas encote assez de savoir faire la récolte des plantes , il faut encore les savoir dessécher ; plus les plantes sont proprement desséchées , mieux elles se conservent ; il faut , s'il est possible , qu'elles ne perdent ni leur couleur ni leur odeur ; en général on les fait sécher à l'air & au soleil , ou dans un grenier qui y soit exposé.

Pour parvenir à conserver la couleur & les vertus des plantes humides , il faut les dessécher avec toute la promptitude possible , de même que celles qui n'ont que très-peu de principes résineux , telle que la Mélisse , la Bourrache , la Véronique. Les plantes inodores demandent de la célérité & les mêmes précautions dans la dessication ; on les exposera dans un lieu bien aéré , autrement l'humidité ne s'en évapore pas assez vite ; les plantes odorantes desséchées promptement gardent leur couleur verte & durent fort longtemps ; on les desséchera à l'ombre dans du papier , pour qu'elles ne perdent pas leurs parties odorantes ; il se trouve cependant des plantes aromatiques qui conservent leur odeur si opiniâtement , qu'on ne risque rien de les faire sécher à l'air libre ; il y a plusieurs plantes qui demandent d'être desséchées avec les feuilles & fleurs toutes ensemble , telles que les Menthes , le Millepertuis , la Germandrée , on en enveloppera pour lors les sommités dans des cornets de papier , on en fera de petits paquets , on les liera & on les suspendra à l'air ; cette

précaution est sur-tout très-bonne pour la petite Centaurée ; on peut garder pendant près de trois ans des herbes bien desséchées , elles ne perdent rien de leurs propriétés pendant tout ce temps ; le Caillelait à fleurs jaunes doit être parfaitement desséché en douze heures , si on veut l'avoir en sa perfection. Les fleurs de Sureau sont à-peu-près dans le même cas ; il faut les faire sécher aussi-tôt la récolte , si on veut les avoir belles ; lorsque les fleurs ont peu de consistance , on les dessèche sans les séparer des tiges , & lentement , d'autant qu'elles ne renferment que très-peu d'eau ; la Matricaire , le Scordium sont de cette nature ; les fleurs des plantes ligneuses , telles que la Mélisse & la Bétoine , peuvent très-bien être séparées des tiges ; les feuilles & les fleurs de Camomille romaine se dessèchent d'ordinaire séparément. Les fleurs de Mauve , de même que celles de Melilot , peuvent encore se sécher seules ; mais quant aux Roses de Provins , il leur faut couper les boutons & leur ôter l'onglet.

Avant de faire sécher les plantes ou quelques-unes de leurs parties , il faut bien les éplucher , en ôter toutes les feuilles mortes & fanées , & en séparer les herbes étrangères. On les expose à l'ardeur du soleil , ou dans un endroit chaud ; on les étend sur des toiles garnies d'un châssis de bois , que l'on suspend pour donner à l'air une libre circulation ; on les remue plusieurs fois le jour ; on les laisse ainsi exposées jusqu'à une parfaite dessiccation , on a sur-tout attention qu'elles ne soient pas amoncelées les unes sur les autres.

Il n'y a aucune préparation préliminaire pour les écorces & les bois ; ils ne demandent seulement que d'être desséchés promptement , lorsqu'ils sont humides. Rien n'est plus mauvais que de renir les racines dans les caves , comme quelques herboristes ont coutume de faire , il faut les dessécher aussi-tôt qu'on les a tirées de terre. Si elles sont dures , petites , un peu aqueuses , on les enfèle & on les suspend dans un lieu

bien aéré, après les avoir mondé, c'est-à-dire, après en avoir détaché tous les filamens, & les avoir essuyé, avec un linge rude; on ne les lavera jamais, ou du moins si on est obligé de le faire, ce ne sera que très-légèrement; on fendra celles qui contiennent un cœur ligneux, on coupera par tranches très-minces celles qui sont charnues, ensuite on les enfilera. Il y a des racines telles que celles de l'*Enula Campana*, qu'on est obligé d'exposer au four, pour les sécher tout-à-coup, & les mettre en poudre dans le besoin; l'air ni le soleil ne leur sont pas suffisans; les racines étant desséchées, on les tiendra exactement renfermées dans un lieu sec à l'abri de l'air, sur-tout celles qui sont pulvérisées; quand on veut dessécher des bulbes & oignons, on les effeuillera & on les exposera à la chaleur du bain marie.

Voyons à présent comment les semences & les fruits peuvent se dessécher, & nous finirons par-là ce qui concerne la dessication des plantes: quand les semences sont farineuses, elles n'exigent qu'une exposition dans un endroit sec & médiocrement chaud; mais si elles sont émulsives, & si elles se trouvent renfermées dans des fruits charnus, telles que les quatre semences froides, il faut pour lors les émonder de leur écorce, mais seulement à mesure qu'on s'en sert. On conduira à une parfaite dessication les semences odorantes: rien ne demande d'être desséché plus promptement que les fruits; on commencera d'abord par les dessécher au feu jusqu'à un certain point de dessication, ensuite au soleil; si on soupçonne qu'il s'y trouve des œufs d'insectes, on poussera la chaleur pour les faire dessécher jusqu'au quarantième degré; on les renfermera ensuite dans un lieu sec, ils se conservent très-longtemps.

Il y a de certaines plantes qui ne peuvent être desséchées, parceque leur vertu réside simplement dans l'humidité; de ce nombre sont l'*Oseille*, le *Pourpier*, la *Joubarbe*, les *Sedums*, les *Cucurbitacées* & les *Crucifères*; on dessèche quelquefois la *Coloquinte*, mais il

faut prendre pour cet effet beaucoup de précautions ; on la dépouille alors de son écorce.

On se gardera bien d'exposer aux injures de l'air les plantes desséchées ; on enfermera soigneusement les aromatiques dans des boîtes vernies au-dehors , ou bien on les conservera dans des vaisseaux de verre ou de terre bien cuite & bien vernissée ; avant d'enfermer les plantes desséchées , on les remuera & on les secouera sur un tamis de crin , afin d'en séparer le sable , les œufs d'insectes , & les petits insectes vivans.

Il y a de certaines plantes sèches qu'on ne peut conserver que très-peu de temps , quelque soin qu'on y donne ; les unes ne durent que quelques mois ; il en faut renouveler d'autres tous les ans , & il s'y en trouve encore qui se maintiennent quelques années. Les fleurs de Violettes n'ont après un mois qu'une odeur d'herbe , quoiqu'il faille cependant avoir l'attention de les tenir dans des vaisseaux bien clos ; la partie odorante de la Violette est la seule qui donne la couleur ; elle s'évapore bientôt : on n'obvie à cet inconvénient qu'en réduisant le suc de violettes à la consistance de sirop ; les fleurs de Bourrache & de Buglosse desséchées perdent toutes leurs vertus ; celles de Mauve , de Bouillon blanc & de Melilot ne la conservent qu'une année , encore faut-il les garder dans des vaisseaux de verre ; on peut garder la Camomille pendant plus longtemps ; les plantes aromatiques bien desséchées & bien conditionnées peuvent durer plusieurs années , excepté seulement la Matricaire & quelques autres de cette nature : les écorces & les bois peuvent se conserver dans leur bonté pendant très-longtemps ; les racines sont bonnes pendant cinq ou six années ; celles sur-tout dont la substance est compacte & résineuse durent plus longtemps que les ligneuses & les fibreuses ; en général on renouvellera le plus souvent que l'on pourra toutes les substances végétales , si on veut les avoir plus efficaces.

Avant de finir l'article concernant les plantes , nous

observerons 1.^o que quand on demande aux herboristes les cinq racines apéritives majeures, ils doivent donner pour telles, celles d'Ache, d'Asperges, de Fenouil, de Persil & de petit Houx ; 2.^o que les cinq racines apéritives mineures sont celles de Caprier, d'Eryngium, de Chiendent, d'Arrête-bœuf & de Garance ; c'est encore une chose que tout herboriste doit savoir ; 3.^o il ne doit pas non plus ignorer qu'il y a cinq herbes qu'on nomme communément émollientes, & qui s'allient toujours ensemble ; ces herbes sont les feuilles de Guimauve, de Branc-urine, de Mauve, de Mercuriale & de Violette ; 4.^o qu'on appelle les quatre fleurs cordiales, celles de Bourrache, de Buglosse, de Roses & de Violettes ; 5.^o qu'on a donné à la Rhue de murailles, au Politruc doré, au Capillaire ordinaire, au Ceterach & à la Scélopendre le nom des cinq plantes capillaires ; 6.^o que les quatre semences chaudes majeures sont celles d'Anis, de Carvi, de Cumin & de Fenouil ; 7.^o qu'il a plu dans les pharmacies d'appeller du nom des quatre semences chaudes mineures, les semences d'Ammi, d'Aurone, de Céleri & de Carotte ; 8.^o les quatre semences froides majeures sont connues de tout le monde : on qualifie ainsi celles de Citrouille, de Concombre, de Calabasse & de Melons ; 9.^o il y a encore les quatre semences froides mineures, qui sont celles d'Endive, de Laitue, de Plantain & de Pourpier. Dès qu'on tient des plantes pour vendre, il faut absolument être instruit de cela, on en a même toujours des mélangées, pour pouvoir s'en servir au besoin.

On donne le nom de Vulnéraires de Suisse à un assemblage de plusieurs simples coupées menu, dont on prend l'infusion comme du thé : on fait encore souvent un mélange de plantes toniques & de plantes pectorales, nous allons rapporter ce qui entre dans ces trois sortes de mélanges ; 1.^o pour les vulnéraires suisses, vous prenez Véronique, quatre onces ; Sanicle, Bugle, de chacun deux onces ; Millepertuis, quatre onces ; Per-

venche , Lietre terrestre , Chardon béni , Scordium , Aigre-moine , Bétoine , Millefeuille , Scolopendre , de chacune deux onces ; fleurs de Pied-de-chat , de Tussilage , de chacune quatre onces , coupez & incisez selon l'art : on met une pincée de ces espèces dans un verre d'eau bouillante , on les laisse infuser pendant dix à douze minutes , on prend cette infusion en forme de thé. Une infusion ainsi préparée est vulnérable , détensive , cordiale , stomachique , propre pour prévenir les dépôts sanguins qui arrivent ordinairement à la suite des coups ou des chutes ; mais on fera cependant toujours bien de faire précéder la saignée.

Pour faire un assemblage d'espèces toniques , prenez feuilles de Mélisse , six gros ; sommités de Caille-lait jaune , neuf gros ; fleurs de Bétoine & de Tilleul , de chacun deux gros ; racines de grande Valériane , de Bardane , de Patience sauvage , de Réglisse , de Guimauve , de Polypode , feuilles de Scolopendre , de chacune trois gros ; coupez & incisez suivant l'art. On en fera usage comme des Vulnéraires Suisses , c'est-à-dire , en infusion théiforme. Ces espèces sont propres pour donner du ton aux fibres ; elles sont céphaliques , vulnérables , hystériques , cordiales & légèrement sudorifiques. Quant aux espèces pectorales , voici les plantes qu'on réunit ordinairement : on prend Capillaire de Canada , quatre onces ; feuilles de Scolopendre , deux onces ; fleurs de Tussilage , de Pied-de-chat & de Millepertuis , de chacune une once & demi ; on les coupe & on les incise suivant l'art ; on en prend l'infusion comme des espèces précédentes ; elles conviennent dans la toux ; elles sont adoucissantes & légèrement vulnérables.

Il n'y a que trois méthodes pour faire usage des plantes dans la médecine ; ou on les prend en décoction , ou en infusion , ou enfin en macération ; nous avons expliqué ce qu'on entend par ces mots dans les articles qui les concernent ; nous avons dit qu'on donnoit le nom de décoctions aux médicamens liquides qu'on

qu'on prépare à l'aide de l'ébullition ; on enlève par cette préparation aux corps qu'on y soumet , les parties qui en peuvent être extraites & séparées , & on les tient par-là suspendues dans les liqueurs où on les place. On appelle ces liqueurs véhicules ou menstrues : on ne doit pas soumettre indifféremment à la décoction toutes les plantes ; la seule partie aromatique fait tout le mérite des plantes qui portent ce nom ; on fera donc très-mal de faire bouillir toutes ces plantes à l'air libre , de même que celles qui agissent par leurs parties volatiles , telles que le Cochlearia , le Beccabunga , les céphaliques , les labiées ; on dépouillerait par l'ébullition toutes ces plantes de leurs vertus ; il n'y a que l'Absynthe qui peut souffrir une longue décoction sans rien perdre de sa qualité ; en général les plantes , du moins leurs feuilles , leurs sommités & leurs fleurs ne doivent être simplement qu'insufées ; c'est la vraie façon de ne pas en laisser échapper tout ce qui s'y trouve de plus précieux & de plus efficace. M. le Camus, docteur régent de la faculté de Paris , a donné sur ce sujet une dissertation qui mériteroit d'être lue de tout le monde pour l'utilité qui en pourroit revenir ; elle est insérée dans le Journal économique , & se trouve encore rapportée dans le recueil des mémoires de ce médecin , qui se vend chez Gagneau , libraire , à Paris.

La vraie manière de prescrire les plantes , c'est de les doser de même qu'on le fait pour tous les autres remèdes de la pharmacie. La livre dont on se sert pour cet effet est composée de seize onces , ou de deux marcs ; les seize onces , autrement la livre , se désignent par ce caractère ℥j. la demi-livre , ou huit onces , par ℥ss. l'once qui vaut huit gros , par ℥j. la demi-once ou quatre gros , par ce signe ℥ss. le gros ou la dragme qui vaut trois scrupules , ou 72 grains , par ℥j. le demi-gros par ℥ss. le scrupule qui contient 24 grains , par ℥. le demi-scrupule qui contient 12 grains , par ℥ss.

le grain , ou la soixante-douzième partie du gros , par g. 1. La brassée ou fascicule se désigne par fasc. j. c'est ce que le bras plié peut contenir ; la poignée ou manipule , est ce que la main peut empoigner , on le désigne par man. j. ou m. j. La pincée ou pugille est ce que peuvent pincer les trois premiers doigts de la main , on la désigne par pugill. j. ou p. j. Les fruits & certaines choses qui sont taillées en morceaux , se désignent par n.^o 1.^o ou n.^o 2 , &c.

Recomposée, se dit d'une feuille qui est en quelque sorte composée deux fois ; son pétiole au lieu de porter des folioles de chaque côté , porte des filets ou petits pétioles , d'où sortent à droite & à gauche des folioles. *Voyez art. Feuilles.*

Recouvrir, se dit en termes de jardinage des plaies faites aux arbres , qui parviennent à se cicatriser.

Recroquebillé, *Recroquevillé*, *Recroquillé*, ce sont trois noms synonymes qui se disent d'une feuille, qui au lieu d'être verte & étendue à son ordinaire , est au contraire toute ramassée en rond , frisée & devenue jaunâtre & galeuse.

Réjetton, c'est la jeune pousse que jette un arbre étêté ou recepé , c'est-à-dire , celui dont on a coupé la tête & les branches , ou celui qu'on a coupé par le pied.

Reinsforme, signifie , en forme de rein.

Repercussif, on nomme ainsi un remède , qui appliqué sur une partie menacée d'inflammation , semble en chasser & repousser les fluides.

Reprise des plantes ; on s'apperçoit qu'une plante a repris , lorsqu'elle fait de nouvelles pousses assez vigoureuses pour donner lieu de présumer qu'elle a jeté en terre de nouvelles racines depuis sa transplantation.

Réseau reticulaire, c'est dans les feuilles la réunion par quelques-unes de leurs parties de plusieurs ramifications qui naissent de l'épanouissement des vaisseaux de la queue ; les mailles de ce réseau sont remplies d'un

tissu cellulaire tendre , qu'on nomme pulpe ou parenchime : le réseau réticulaire est recouvert au dehors d'un épiderme qui paroît une continuation de celui de la queue , & peut-être de celui de la tige. M. de Saussure , professeur à Genève , a prouvé que cet épiderme , comme celui des pétales , est une véritable écorce , composée elle-même d'un épiderme & d'un réseau cortical ; ce dernier est garni principalement à la surface inférieure de la feuille d'un grand nombre de suçoirs ou vaisseaux absorbans , destinés à pomper l'humidité de l'air ; la surface supérieure , tournée du côté du ciel , sert de défense à l'inférieure qui regarde la terre.

Résine , c'est une liqueur ou matière huileuse qui découle de plusieurs sortes d'arbres ; on leur fait souvent des incisions pour la faire sortir plus aisément.

Résolutifs , on donne ce nom à des médicamens qui divisent & atténuent les liqueurs épaissies qui séjournent dans les vaisseaux.

Reserrée , se dit d'une panicule , lorsque les péduncules particuliers se rapprochent.

Restaurans , on qualifie ainsi les remèdes qu'on destine à relever & rétablir les forces diminuées & abattues.

Rhomboïde , on nomme une feuille rhomboïde , celle qui a quatre côtés , dont les côtés correspondans parallèles forment quatre angles , deux aigus & deux obtus.

Rigole , c'est en terme de jardinage une espèce de tranchée , fouillée le plus souvent quarrément de six pieds de large , sur deux pieds & demi ou trois pieds de profondeur.

Rondache , on dit qu'une feuille est en rondache , lorsque le pétiole s'attache au disque , & non à la base ou aux bords de la feuille.

Rosacées , on nomme ainsi des fleurs qui sont simples , polipétales , régulières , formées par un nombre indéterminé de pétales disposés en rose ; ces sortes de fleurs constituent la sixième classe de Tournefort.

Roue, on dit qu'une fleur est en roue, lorsque les lames de ses pétales y sont disposées.

Rubiacées, on nomme ainsi les plantes dont la fleur est d'une seule pièce, divisée en quatre ou en cinq parties à son extrémité supérieure, & dont les feuilles sont communément disposées en roue, ou en étoile autour de chaque nœud de la tige.

Rudiment, c'est le commencement, & pour ainsi dire, l'ébauche d'une plante entière ou de quelques-unes de ses parties.

S.

SARCLER, c'est en terme d'agriculture, atracher les mauvaises herbes qui naissent parmi les bonnes & les étouffent.

Sarcloir, c'est l'instrument dont on se sert pour sarcler; cet instrument est un petit crochet tranchant, emmanché à un bâton qui a trois ou quatre pieds de longueur.

Sarmenteuse, se dit d'une tige qui imite le sarment.

Sausfaie, *Saussis*, *Saucis*, c'est un lieu planté en saules ou en osiers.

Scie, une feuille est dite être à dents de scie, qui a à ses bords des pointes posées & recourbées les unes sur les autres.

Scutiforme, se dit d'une feuille qui est faite en écusson; telles sont y. g. les feuilles d'une petite oseille rampante, que Bauhin nomme *acetosa scutellata repens*.

Secrétion, les glandes & les poils dans les plantes paroissent destinés à être les organes de quelques sécrétions.

Semailles, on nomme ainsi la saison où l'on a coutume de semer diverses sortes de grains, & principalement les bleds; on donne aussi ce nom à l'opétation de semer les grains.

Semence , c'est une substance qui renferme en soi une nouvelle plante semblable à celle dont elle tire son origine : on en distingue de deux sortes , la graine , & la noix ; cette dernière approche de la dureté d'un os , & renferme la véritable semence. La première est de toute sorte de figures , & quelquefois ornée d'une couronne ; la couronne est simple ou aigretée , l'aigrete est ou sans pied ou avec un pied ; chacune de ces aigretes se divise encore en simple & en branchue. La simple est composée de rayons simples , & la branchue de rayons barbus , ou en forme de barbe de plumes. Voyez encore ce que nous avons dit des aigretes à l'article qui les concerne , & à l'article *Aigretée*.

Semidouble , se dit d'une fleur dont le nombre des pétales est moindre que dans la double , & plus multiplié que dans la simple.

Séminale , se dit de la feuille qui paroît immédiatement après que la semence est levée.

Semis , c'est l'endroit où l'on sème des graines d'arbres , soit pour y former un bois , soit pour les lever & mettre en pépinière , quand ils auront trois ou quatre ans.

Sep , c'est la souche ou pied de la vigne , qui porte des sarments & des pampres.

Serpette , c'est un petit couteau courbé en arc , dont on se sert pour tailler les arbres & la vigne.

Serre , c'est une galerie , ou grande salle , bien exposée & close , dans laquelle on tient renfermées en hiver les plantes qui craignent la gelée.

Sessile , se dit d'une aigrete , d'une fleur , d'un fruit , &c. qui n'ont point de pied , de pétirole , de péduncule , &c.

Sève , se dit en termes vagues de l'humeur qui se trouve dans le corps des plantes. Voyez ce que nous en avons dit dans notre premier volume du *Traité historique des plantes de la Lorraine* , qui se trouve chez Fetil.

Sexe des plantes. Pline parloit déjà de son temps du sexe des plantes, Rai & Camerarius ont fait mention de leurs parties mâles & femelles ; Cæsalpin de la poussière fécondante des étamines , dont Grew a déterminé encore plus positivement l'usage ; Linneus est cependant le premier qui les a considérées comme les parties les plus essentielles de la reproduction , & même comme les plus constantes dans toutes les espèces ; c'est ce qui l'a déterminé à y avoir recours pour les caractères génériques & classiques de sa méthode.

Siliculeux , se dit des plantes dont les siliques sont petites , sous-orbiculaires , & garnies d'un stile qui répond à toute leur longueur.

Sillon , en terme d'agriculture , signifie une raie profonde qu'on fait en labourant.

Simple , c'est le nom général qu'on donne aux plantes d'usage , parcequ'elles donnent un médicament simple.

Sinus , c'est en terme de botanique l'échancrure qui forme un angle rentrant dans une feuille.

Solaires , on nomme fleurs solaires celles qui s'épanouissent & se forment pendant le jour.

Soleil. (fleur en) Voyez *Radiées*.

Sommet des étamines ou *anthere* , c'est un petit sac ou capsule qui a une ou deux cavités , & qui est fixé à la pointe du filet ; c'est le vrai organe de la génération.

Sous-orbiculaires , se dit des feuilles qui ont plus de largeur que de longueur.

Souche , c'est le tronc d'un vieux arbre coupé à un ou deux pieds de terre.

Spathe , c'est ce qui enveloppe une ou plusieurs fleurs , qui ordinairement n'ont point de périanthe ; c'est une membrane adhérente à la tige , ouverte de bas en haut & d'un seul côté , ordinairement d'une seule pièce qui s'ouvre d'une manière indéterminée , rarement de deux pièces.

Sternutatoires , ce sont des remèdes qui font éternuer.

Stigmate , c'est ce qui termine le style ; il est tantôt arrondi , tantôt pointu , long , effilé , quelquefois divisé en plusieurs parties ; on le regarde comme l'organe extérieur de la génération , ou comme les lèvres du vagin ; il reçoit la poussière fécondante du sommet de l'étamine , & la transmet par le style dans l'intérieur du germe pour féconder les semences ; dans les fleurs qui n'ont point de style , le stigmate adhère au germe , & se nomme pour lors sessile.

Stipule , c'est une petite production qui naît à l'insertion des pétioles ou des péduncules , ou qui forme le bouton. Linnéus est le premier qui a distingué les stipules ; elles sont quelquefois de même nature que les feuilles , & placées à leur insertion ; elles sont deux à deux ou solitaires , & ont une forme ou ovale & obtuse , ou longue ou pointue ; les unes tombent avant les feuilles , les autres persistent jusqu'à leur maturité ; elles sont d'un grand secours en botanique pour distinguer les espèces de certains genres.

Stolonifère , c'est un nom qui vient de *stolones* , drageons , & qu'on applique en conséquence à une racine traçante qui jette ça & là des rejets ou drageons qui portent eux-mêmes des racines.

Stomachique , c'est un remède propre pour les maladies de l'estomac.

Style , c'est un petit corps plus ou moins allongé , qui porte sur le germe , & qui se termine par le stigmate ; il est ordinairement fistuleux , c'est-à-dire , creusé en tuyau , on le compare au vagin ; il n'existe pas dans toutes les plantes.

Subalaire , se dit d'une feuille qui vient sous les aisselles des branches.

Subulé , se dit pareillement d'une feuille , mais de celle qui est faite en forme d'alène.

Suc : on nomme *suc nourricier* la partie de la sève qui est propre à la nourriture des plantes ; *suc propre* , l'humour qui semble particulière à chaque plante , &c.

suc lymphatique, celui qui coule par la taille ou autres plaies, soit de la vigne, soit de quelques arbres, dans le temps où ils sont en pleine sève. Dans les pharmacies on tire par expression de presque toutes les plantes la partie liquide, qu'on nomme suc ; mais tous les sucs qu'on tire ainsi par expression, sont chargés de beaucoup de parties impures & grossières, ils ont besoin d'être dépurés : il y a deux méthodes différentes pour la députation ; la première se pratique en les faisant un peu bouillir, & en les passant ensuite par un linge plié en plusieurs doubles ; la seconde en les exposant un jour ou deux au soleil, & en les séparant ensuite par inclination d'avec leur sédiment. Quand on se sert de cette seconde méthode, on fera bien de mettre un lit de sel sous le vaisseau de verre exposé au soleil, & quand on veut clarifier la liqueur, on la passe par un linge six ou sept jours depuis celui auquel on l'a amassée ; si on veut ensuite conserver ces sucs, on les met dans des bouteilles de gros verre, que l'on remplit seulement jusqu'au cou, & l'on y ajoute la hauteur de deux doigts ou environ d'huile d'amandes douces, ou d'excellente huile d'olive, ou bien on les conserve encore, en y mettant simplement du clou de girofle enveloppé dans un linge.

Suçoir des feuilles & des racines : les feuilles sont pendant la nuit des espèces de racines aériennes, qui par les petites bouches de leur surface inférieure, pompent l'humidité & les sucs répandus dans l'atmosphère. Les trachées, dont l'air est resserré par la fraîcheur de la nuit, n'opposent aucun obstacle au passage des nouveaux sucs ; ils descendent vers les racines, avec le superflu de ceux qui s'étoient élevés dans la journée ; quant aux racines qui tiennent la plante fixée dans la terre, personne n'ignore qu'elles sont les premiers agens de la nutrition ; dès que la chaleur vient animer le jet de leurs organes, au moyen des pores qui sont placés à l'extrémité de leurs chevelus, qu'il faut considérer

comme l'orifice des vaisseaux de la plante, elles pompent les sucs nourriciers dissous dans une eau qui leur sert de véhicule, & qui paroît presque réduite en vapeur.

Succulent, c'est-à-dire, rempli de suc; la chair des fruits fondans est succulente & agréable.

Sudorifique, se dit d'un remède qui a la vertu de procurer la sueur.

Superflue, c'est l'épithète que Linnæus a donné à la polygamie, qui compose le second ordre de la dix-neuvième classe de son système: cet ordre comprend les fleurs dont les fleurons du disque sont hermaphrodites, & ceux de la circonférence femelles.

Support, c'est en Botanique la partie qui sert à en soutenir ou défendre quelqu'autre; telles sont les stipules, les feuilles florales, les vrilles, les épines, les aiguillons, les pétioles, les péduncules, les pédicules, la hampe, la tige, la glande & l'écaille; une tige chargée de supports est celle où l'on voit de petites éminences en console, qui sont à la naissance des feuilles, des fruits ou des semences, & qui servent à les supporter.

Surface, en Botanique, quand on veut décrire une plante, il faut avoir égard à la surface des feuilles, des fruits, des tiges, &c.

Surfeuille, ce mot signifie la membrane dont est couvert un bourgeon.

Surgeon, c'est le rejetton qui sort de la tige d'un arbre, principalement vers le pied.

Syngenesie, c'est le nom de la dix-neuvième classe du système de Linnæus.

Système Botanique. Voyez *Méthode Botanique*.

T.

TAILLE des arbres, c'est une opération qui consiste à retrancher avec art & connoissance certaines branches, pour que l'arbre en ait une plus belle forme, qu'il en

vive plus longtemps , & qu'il produise de plus beaux fruits , & en plus grande quantité.

Talles , ce sont les différens jets qui sortent des racines des plantes graminées.

Tanelé , *Marqueté* , *Tiqueté* , on se sert de l'un ou de l'autre de ces mots , pour faire entendre que la surface d'un fruit ou d'une fleur est semée de petits points différens du fond sur lequel ils sont.

Térébinthe , c'est la liqueur visqueuse , gluante , résineuse , huileuse , claire & transparente qui découle du tronc & des branches de plusieurs arbres qui croissent dans les pays chauds.

Ternée , se dit d'une feuille aîlée qui a trois folioles sessiles.

Testicules des végétaux , ce sont dans le système sexuel les sommets ou anthères des étamines.

Terreau , c'est du fumier si vieux & si consommé , qu'il paroît plutôt approcher de la nature d'une terre noire & meuble , que de tenir de la paille ou du fumier.

Terrer , c'est rapporter de la terre dans un endroit.

Tetards , on appelle ainsi les saules , peupliers , &c. qu'on étête tous les quatre ou cinq ans , & dont l'extrémité du tronc produit de nouvelles branches.

Tête , c'est l'une des branches garnies de feuilles & de fruits qu'on apperçoit au haut de la rige d'un arbre ; on nomme aussi tête en jardinage , routes les parties d'une plante qui prennent une grosseur considérable.

Tetradynamie , c'est le nom de la quinzième classe du système de Linnæus , qui renferme les plantes qui ont six étamines , dont deux sont plus petites , opposées l'une à l'autre , & les quatre autres plus grandes.

Tetragone , se dit d'une silique qui a quatre côtés ; une semence qui a aussi quatre côtés , se nomme encore de même.

Tetraginie , c'est l'ordre des classes du système sexuel qui renferme les plantes qui ont quatre pistiles.

Théiforme , se dit d'une infusion de quelques plantes

dans de l'eau commune , que l'on boit comme du thé.

Thyrsoïde en grappe ou panicule , se dit des fleurs dont les bouquets sont en piramides ovales , parceque les péduncules inférieurs s'étendent horizontalement , & sont plus longs , tandis que les supérieurs sont plus courts & montent verticalement.

Tige , c'est la production principale & verticale d'une plante ; elle est simple ou composée ; la simple est celle qui se continue sans interruption depuis le bas jusqu'au haut. On l'appelle entiet , quand elle ne pousse aucune branche , & elle est sans feuilles , ou garnie de feuilles ; elle s'élève droite , obliquement , en s'entortillant ou en se repliant , suivant les différentes espèces de plantes ; elle retombe encore dans quelques-unes , elle rampe ou pousse des sarmens ; elle est vivace , en arbrisseau ou sous-arbrisseau , annuelle ; elle est encore ou en cylindre , ou à deux angles , à trois angles , à plusieurs angles ; cannelée , en gouttière , lisse , velue , raboteuse ou hérissée de poils. Si cette tige pousse des branches latérales , elle se nomme branchue ; lorsque ses branches montent , on lui donne le nom de tige rameuse ascendante , & celui de dispersée , lorsque ses branches s'écartent ; elle porte souvent de grosses branches , quantité de petits rameaux , des supports ; ou elle est prolifique ; elle a d'ailleurs tous les attributs de la tige entière ; la tige composée est celle qui se perd en se ramifiant ; elle se fourche , se partage en deux rangs de branches , ou se subdivise.

Tondre , c'est un terme de jardinage , qui signifie , retrancher indistinctement toutes les branches , & même les sommités qui nuisent à la symétrie que l'on veut observer dans le port de certaines plantes.

Topique , c'est un remède que l'on applique à l'extérieur , & qui agit précisément sur la partie où il est appliqué.

Touffe , c'est un gros pied de plantes accompagné de

plusieurs petits , qui peuvent être séparés les uns des autres , & plantés séparément.

Tourné, se dit d'un fruit qui commence à mûrir.

Traçante , se dit d'une plante dont les tiges latérales jettent des racines , en rampant sur la terre.

Trachées, ce sont des vaisseaux spiraux , qu'on aperçoit dans la partie des jeunes rameaux , qui doit devenir ligneuse , & qu'on regarde communément comme destinés à contenir de l'air.

Transpiration des plantes : elle s'exécute pendant le jour par le moyen des feuilles , des jeunes tiges , des fleurs & des fruits , qui sont les fonctions d'organes excrétoires ; la transpiration est la seule véritable excrétion de la plante saine ; il est démontré qu'elle est dans les plantes dix-sept fois plus abondante que dans les animaux , comparée en temps égaux & à volume égal.

Treillage , terme de jardinage ; on entend par-là un ouvrage fait avec des échelas ou des perches de bois bien dressées , & qu'on attache les unes aux autres avec du fil de fer , en formant des mailles , soit à-peu-près carrées , soit en losange.

Triandrie , c'est le nom de la troisième classe du système sexuel.

Triangulaire , se dit d'une feuille faite en forme de triangle.

Tricapsulaire , se dit d'un péricarpe qui est à trois capsules.

Trigynie , c'est le nom d'un ordre du système sexuel , qui renferme les plantes qui ont trois pistiles.

Trilobée , se dit d'une feuille qui a trois lobes.

Triannuelle , c'est l'épithète qu'on donne à une plante qui périt après avoir vécu pendant trois années.

Triphille , se dit d'un périanthe qui a trois pièces : on donne encore cette épithète à une vrille qui est divisée en trois filets.

Trompe ou Vagin , c'est la partie du pistile qu'on nomme style.

Tronc , c'est la partie de la plante qui naît de la racine , & qui ordinairement soutient les feuilles , les fleurs & les fruits. Il est composé d'écorce & de bois ; on distingue de deux espèces de troncs , la tige & le chaume , voyez ces deux articles.

Tronquée , se dit d'une feuille dont l'extrémité supérieure est coupée par une ligne transversale.

Tropiques , on donne ce nom aux plantes qui s'ouvrent le matin & se ferment le soir , plutôt ou plus tard , selon la brièveté ou la longueur du jour.

Tubercule ou *Racine tubéreuse* , c'est un corps charnu , solide , dur , ordinairement plus gros que la tige , quelquefois composé de petits corps ronds , suspendus par des filets , comme des grains de chapelet.

Tubulée , se dit d'une corolle dont la partie inférieure est en forme de tube ; on donne encore ce nom aux espèces de fleurs campaniformes , qui ont le corps plus allongé , & le fond plus étroit.

Tunique , les Botanistes nomment ainsi les différentes peaux d'un oignon , qui se recouvrent les unes sur les autres ; on se sert toujours du mot de tunique , pour désigner une enveloppe.

Tuillées ou *Imbriquées* , se dit des feuilles qui sont rangées en forme de tuile.

Tuteur , c'est un pieu plus ou moins long & fort , que l'on pique auprès de la tige des jeunes arbres pour empêcher qu'ils ne soient abattus par le vent.

V.

VAISSEaux des plantes. Les plantes ont plusieurs vaisseaux qu'on peut nommer sécrétoires & excrétoires ; les uns sont appelés vaisseaux déférens , qui charroient le suc nourricier depuis les racines jusqu'aux sommités de la tige ; plusieurs naturalistes ont nommés ces vaisseaux vases propres ; les autres sont connus sous le nom d'utricules ; ils sont les continuations des vaisseaux défé-

rens : on en remarque aussi d'autres pleins d'air , & que pour cette raison on a appelé trachées ; la plupart de ces vaisseaux sont visibles dans les plantes. M. Ruisch nous a appris la méthode de les injecter.

Variétés , elles se distinguent des espèces, en ce que ces dernières sont constantes & ne changent point , tandis que les premières ne se perpétuent pas constamment par les semences.

Végétaux , se dit de toutes sortes de plantes , qui acquièrent de la grosseur , de la longueur , & de l'étendue.

Verger , c'est un lieu planté en toutes sortes d'espèces de fruits de plein vent , soit poiriers , pommiers , pruniers ou cerisiers ; un verger doit toujours être bien cultivé , c'est le vrai moyen de renouveler la terre auprès des racines des arbres.

Vermoulu , se dit d'un bois tout piqué ou percé de vers.

Verticillé , se dit des boutons , des branches , des feuilles , des fleurs & fruits , des péduncules qui sont rassemblés ensemble , souvent en forme de rond , autour d'une tige ou même d'une branche.

Vesiculeux , on appelle ainsi les petits corps qui se trouvent sur les feuilles & sur les jeunes tiges de plusieurs plantes ; ce sont des espèces de glandes.

Vivace , se dit d'une plante qui quoiqu'elle perde sa tige , subsiste pendant plusieurs années par ses racines.

Vives racines , c'est la même chose que *drageons enracinés*.

Umbilical , (*cordon*) c'est un filet auquel sont attachées les semences dans les siliques.

Umbiliqué , se dit d'une pomme qui a une petite cavité au bout opposé à celui qui tient au péduncule , c'est précisément cette cavité qu'on nomme ombilic , & à laquelle les jardiniers ont donné le nom d'*œil*.

Uniloculaire ; se dit d'une capsule qui n'a qu'une seule loge.

Vrilles , ce sont des productions filamenteuses , au moyen desquelles certaines plantes s'attachent à d'autres corps.

Usuelles , on donne ce nom aux plantes dont on connoît les vertus , ou propriétés pour les différens usages de la vie , principalement pour la médecine.

Vulnéraires , ce sont des plantes dont on tire du secours dans le traitement des plaies , pour conduire les abcès à cicatrice , &c.

Z.

Z*ESTE* , on donne ce nom à la membrane qui se trouve au milieu des noix. On appelle encore ainsi l'écorce superficielle de l'orange & du citron.



TRADUCTION FRANÇOISE

*Des termes latins employés dans le
Flora Gallica.*

A.

Acaulis, sans tige.

Acaulos, sans tige.

Acinaciformis, en forme d'épée, de glaive.

Acinus, grains rassemblés en grappe, tel que le grain de raisin, du Troëne, &c.

Aculeus, aiguillon ou piquant.

Acumen, pointe.

Acuminatus, pointu.

Acutus, aigu.

Adnascencia, cayeux.

Adnata, cayeux.

Aequalis polygamia, polygamie égale.

Aequinoctialis, équinoctial.

Ala seminum, aile des semences.

Alæ papilionaceæ, aîles des fleurs papilionacées.

Alatus, ailé.

Albus, blanc.

Alternus, alterne.

Amentaceus, amentacé ou à chaton.

Amentum, chaton.

Amplexicaulis, embrassant la tige.

Anceps, à deux tranchans.

Androgynus, androgyne.

Angiospermia, angiospermie.

Angulus, angle.

Annuus, annuel.

Anomalus,

Anomalus , anormale.

Anthéra , sommet ou anthère.

Apetalus , sans pétale.

Apex , sommet.

Arbor , arbre.

Arillus , épiderme.

Arista , barbe.

Articulatus , articulé.

Asperifolia , feuilles rudes au toucher.

Auriculatus , à oreilles.

Axillaris , axillaire.

B.

B*acca* , baie.

Bicapsularis , à deux capsules.

Bifer , qui porte deux fois l'année.

Bifidus , fendu en deux.

Biflorus , qui porte deux fleurs.

Bijugatus , bijugué.

Bilobatus , à deux lobes.

Binatus , biné.

Bipartitus , divisé en deux.

Braëea , feuille florale.

Bulbosus , bulbeux.

Bulbus , bulbe.

Bullatus , à côtés saillantes en-dessus , & creux en-dessous.

C.

C*aducus* , qui tombe avant les pétales.

Cæruleus , bleu.

Calix , calice.

Calyptra , coëffe.

Campaniformis , en forme de cloche.

Canaliculatus , cannelé.

Capitatus , capité , en forme de tête.

Capreolus , vrille , ou main.

Capsula , capsule.

Carina , carène.

Carinatus , en forme de carène.

Carnosus , charnu.

Cartilagineus , cartilagineux.

Caryophilleus , cariophillé , à œillet.

Caulis , tige.

Caulinaris , caulinaire , sortant de la tige.

Caulinus , caulinaire , tenant à la tige.

Cernuus , replié , argué.

Ciliatus , cilié , garni de poils parallèle comme des cils.

Cinereus , cendré.

Circinalis , roulé en-dessous , en spirales transversales.

Circumscriptio , circonscrit.

Cirrhosus , à vrilles.

Cirrhus , vrille.

Clavicula , vrille.

Coarctatus , resserré.

Coma , chevelure.

Compositum folium , feuille composée.

Compositus flos , fleur composée.

Compressus , comprimé.

Conceptaculum , coque.

Conduplicatus , se rapprochant parallèlement l'un de l'autre , double.

Confertus , conglobé , ramassé en boule.

Conjugatus , conjugué , attaché par paire.

Connata folia , feuilles cohérentes.

Convolutus , en manière de crosse.

Corculum , point de réunion.

Cordatus , en cœur , cordiforme.

Cordiformis , en forme de cœur.

Corolla , corolle.

Corollula , fleuron , ou petit corolle.

Corona , couronne.

Coronatum semen , semence couronnée.

- Corymbosus*, en bouquet.
Cotyledon, lobe d'une semence, feuille séminale.
Crenatus, crénelé.
Crispus, frisé.
Cruciformis, en forme de croix, crucifer.
Cryptogamia, cryptogamic.
Cuneiformis, en forme de coin.
Cymosus, disposé en corymbe, ou bouquet.

D.

- D***ECANDRIA*, decandrie.
Deciduus, qui tombe avec les pétales.
Decompositum folium, feuille recomposée.
Decurrens, courant.
Decursive pinnatus, ailé & courant.
Defoliatio, effeuillaison.
Deltoides, à quatre angles.
Dentatus, denté.
Denticulatus, dentelé.
Depressus, déprimé.
Diadelphia, diadelphie.
Diandria, diandrie.
Dichotomia, point de bifurcation.
Dichotomus, fourchu.
Didynamia, didynamie.
Diffusus, diffusé.
Digitatus, digité.
Digynia, digynie.
Diœcia, diœcie.
Diphyllus, diphyllé à deux pièces.
Directio, direction.
Discus, disc.
Distichus, partagé en deux.
Divaricatus, écarté l'un de l'autre.
Divisus, divisé.
Dodecandria, dodecandrie.

Dolabriformis , en forme de sabre , de couteau.

Drupa , fruit à noyau.

E.

*E*FFLORESCENTIA , floraison.

Ellipticus , elliptique.

Emarginatus , bordé.

Enneandria , enneandrie.

Enodis , sans nœud.

Equitans , en recouvrement.

Erectus , droit.

Erosus , rongé.

F.

*F*ACIES propria , port.

Fasciculatus , en faisceau.

Fastigiatus , en bouquets aplatis.

Faux , ouverture ou évasement d'une corolle tubulée;

Fibrosus , fibreux.

Filamentum , filament.

Filiformis , en forme de filet.

Fimbriatus , frangé.

Fistulosus , fistuleux.

Floralis , floral.

Florifera gemma , bouton à fleur ou à fruit.

Flos , fleur.

Flosculosus , à fleurons , flosculeux.

Foliatio , foliaison.

Foliatus , feuillé.

Folifera gemma , bouton à feuilles.

Folium , feuilles.

FronDESCENTIA , feuillaison.

Frons , feuillage.

Fructus , fruit.

FruSTANEA polygamia , polygamie superflue.

Frutescentia , maturation.

Frutex , arbruste.

Fruticosus , vivace.

Fulera , supports.

Fuscus , brun.

Fusiformis , fusiforme , imitant un fuseau.

G.

G*EMINUS* , geminé.

Gemma , bouton.

Germen , germe.

Glaber , glabre , sans poils.

Glandula , petite glande.

Gluma , balle.

Glumofus , glumeleux.

Gymnospermia , gymnospermie.

Gynandria , gynandrie.

H.

H*ABITUS plantæ* , port d'une plante.

Hastatus , en fer de pique.

Heptandria , heptandrie.

Herba , herbe.

Herbaceus , Herbacé.

Hermaphroditus , hermaphrodite.

Hexagynia , hexagync.

Hexandria , hexandrie.

Hispidus , hérissé.

Hyalinus , aqueux.

Hybernaculum , hybernacule , lieu à passer l'hiver.

Hybridus , hybride , bâtard.

Hypocrateriformis , en forme de soucoupe.

I.

I*COSANDRIA* , icosandrie.

Imbricatus , imbriqué , rangé en forme de tuile.

- Impari-pinnatum folium* , feuille ailée terminée par une impaire.
Imperfectus flos , fleur imparfaite.
Incrassatus , grossi.
Inflexus , argué.
Infundibuliformis , en forme d'entonnoir.
Insertio , insertion.
Integer , entier.
Internodium , espace contenu entre deux nœuds.
Interruptè pinnatum folium , feuille ailée par interruption.
Involucrum , enveloppe.
Involutus , replié.
Julus , châton.

L.

- L***ABIATUS* , labié , en forme de lèvres.
Laceratus , déchiré.
Laciniatus , lacinié , déchiqueté , en échancrures.
Lamina , épanouissement , lame.
Lanceolatus , en forme de lance.
Lanuginosus , semblable à de la laine par le toucher.
Latus , côté.
Legumen , légume.
Liber , livre , partie intérieure de l'écorce.
Lignosus , ligneux.
Ligulatus , à languette.
Liliaceus , lilacé.
Limbus , limbe.
Linearis , linéaire.
Locus , lieu.
Lunulatus , coupé comme une faux.
Luteus , jaune.
Luxurians flos , fleur monstrueuse.
Lyratus , en manière de lyre.

M.

- M***ARGO**, bordure.
Membranofus, membraneux.
Meteoricus, météorique.
Monadelpbia, monadelphie.
Monandria, monandrie.
Monæcia, monœcie.
Monogomia, monogamie.
Monogynia, monogynie.
Monophyllus, monophille, à une seule pièce.
Multi capsularis, à plusieurs capsules.
Multiſer, qui porte pluſieurs fois l'année.
Multiſlorus, qui fleurit pluſieurs fois.
Multiocularis, à pluſieurs loges.
Multiſer, double.
Mutilus, ſtérile.

N.

- N***APIFORMIS**, en forme de navet.
Natans, flottant.
Navicularis, naviculaire, creuſé en batteaux.
Neceſſaria polygamia, polygamie néceſſaire.
Nectarium, nectar.
Nervofus, nerveux.
Niger, noir.
Nodoſus, noueux.
Nudus, nud, dégarni, dépoüillé.
Nutans, penché.
Nux, noix.

O.

- O***BLIQUUS**, oblique.
Oblongus, oblong.
Obtuſus, obtus.
Obtuſus cum-acumine, obtus avec une pointe.

- Obverse ovatus* , en forme d'œuf renversé.
Obverse cordatus , en forme de cœur renversé.
Obvelutus , enveloppé.
Oëandria , oëandrie.
Oculus , bouton , bourse , œil.
Oppositus , opposé.
Orbiculatus , orbiculé.
Ovatus , oval.

P.

- P** *ALEA* , lame.
Palmatus , palmé , en main ouverte.
Panduræformis , en forme de violon.
Panicula , panicule.
Paniculatus , paniculé.
Papilionaceus , papillionacé.
Papillofus , garni de mammelons.
Pappus , aigrette.
Parabolicus , parabolique.
Parasiticus , parasite.
Patens , ouvert.
Patentissimus , très-ouvert.
Pedatus , sur un pied.
Pedunculus , péduncule.
Peltatus , en rondache.
Pentandria , pentandrie.
Pentagynia , pentagynie.
Perianthium , périanthe.
Pericarpium , péricarpe.
Perfectus flos , fleur en sa perfection.
Perfoliatus , perfeuillé.
Perennis , pérennel.
Perpendicularis , perpendiculaire.
Persistens , qui persiste après la fleur.
Personatus , personné , en masque.
Petalodes , petalé.
Petalum , pétale.

Petiolatus , pétiolé.
Petiolus , pétiole.
Pilus , poil.
Pinnatus , ailé.
Placenta , placenta.
Planta , plante.
Plantula , petite plante.
Planus , plan.
Plenus , plein.
Plicatus , plissé.
Pistillum , pistile.
Plumosus , plumeux.
Plumula , plumule.
Pollen , poussière séminale.
Polyadelphia , polyadelphie.
Polyandria , polyandrie.
Polygamia , polygamie.
Polygamus , polygame.
Polygynia , polygynie.
Polyphyllus , divisé en plusieurs parties.
Pomum , pomme.
Procumbens , penché.
Prolifer , prolifère.
Pulvis , poussière.
Purpureus , purpurin.

Q.

Q*UATERNUS* , à quatre.
Quinus , à cinq.

R.

R*ACEMOSUS* , en grappe.
Radiatus , radié.
Radicalis , radical.
Radicula , petite racine.
Radius , rayon.

Ramosus , rameux.
Ramus , rameau.
Receptaculum , receptacle.
Reclinatus , penché.
Reflexus , réfléchi.
Reniformis , en forme de reins.
Repens , rampant.
Retusus , émoussé.
Revolutus , replié.
Rhomboides , losange.
Rosaceus , rosacé , en forme de rose.
Rostellum , radicule.
Rotundus , rond.
Ruber , rouge.
Rugosus , ridé.

S.

S*AGITTATUS* , en forme de flèche.
Scaber , raboteux.
Scandens , grimpant.
Scapus , hampe.
Semen , semence.
Semistilosus , à demi-fleurons.
Seminalis , séminal.
Semper virens , toujours verd.
Serratus , en forme de scie.
Sessilis , sessile , sans queue , sans pied.
Seta , poil ou soie.
Siliculosus , siliculeux.
Siliqua , silique.
Silicosus , siliquieux.
Simplex , simple.
Sinuatus , sinue.
Sinus , sinus ou échancrures.
Situs , situation.
Solaris , solaire.
Solidus , solide.

- Solitarius*, solitaire.
Sparsus, dispersé.
Spatha, spathe.
Spatulatus, en spatule.
Spicatus, en épis.
Spina, épine.
Spinosus, épineux.
Squama, écaille.
Squamosus, écailleux.
Stamen, étamine.
Stellatus, étoilé.
Stigma, stigmaté.
Stipes, souche.
Stipula, stipule.
Striatus, en strie.
Strobilus, cone.
Stolonifer, qui donne des drageons.
Stylus, style.
Subalaris, subalaire.
Subrotundus, rond.
Subulatus, en forme d'ailène.
Suffrutex, sous-arbrisseau.
Sulcatus, sillonné.
Superficies, surface.
Superflua polygamia, polygamie superflue.
Supra decompositum folium, feuille surcomposée.
Surculus, bourgeon.
Syngenesia, syngénésie.

T.

- T***ectus*, couvert.
Teres, cylindrique.
Terminalis, placé à l'extrémité.
Ternus, terné.
Tetradynamia, tétradynamie.
Tetragonus, à quatre côtés.
Tetragynia, tétragynie.

Tetrandria , tétrandrie.
Thyrſus , grappe , panicule.
Tomentoſus , cotonneux.
Triandria , triandrie.
Triangularis , triangulaire.
Tricapsularis , à trois capsules.
Trifidus , fendu en trois.
Triflorus , à trois fleurs.
Trigynia , trigynie.
Trijugatus , trijogé.
Trilobatus , à trois lobes.
Tripartitus , diviſé en trois.
Triphyllus , à trois pièces.
Triqueter , à trois côtés.
Tropicus , tropique.
Truncatus , tronqué.
Truncus , tronc.
Tuber , truffe.
Tuberoſus , tubéreux.
Tubulatus , tubulé.
Tubuloſus , fiſtuleux.
Tubus , tube.
Tunicatus , à tunique.
Turio , bourgeon.

U.

U*MBELLATUS* , à ombelles.
Umbellifer , ombellifère.
Umbilicatus , ombiliqué.
Umbilicus , nombril.
Undulatus , ondé.
Unguis , onglet.
Uniſlorus , à une fleur.
Unilocularis , à une loge.
Uterus , matrice.

V.

VAGINEUS , en gaine.
Variegatus , panaché.
Venosus , veineux.
Verticillatus , verticillé , en anneau.
Vexillum , étendard.
Villosus , velu.
Viscidus , glatineux.
Volva , bourse.
Volubilis , entortillé.

Nota. Par le moyen de cette table , on entendra facilement tous les termes qui sont employés dans le *Flora Gallica* , & même dans le *Philosophia Botanica* de Linnæus.

C A T A L O G U E

*Des Ouvrages dont on a fait usage dans ce
 Dictionnaire.*

LINNEI *genera plantarum.*
Linnei species plantarum.
Linnei philosophia Botanica.
Institutiones rei herbariæ. Tourn.
 Histoire des plantes qui viennent aux environs de Paris,
 par Tournefort.
G. Bauh. Pinax.
J. Bauhini , Historia plantarum.
 Physique des arbres , par M. Duhamel.
 Traité des arbres & arboustes , par le même.
Flora Gallo provincialis , Gerard.

Flora Monspeliensis, Gouan.

Plantes des environs de Dijon, par Collet.

Plantes des environs d'Estampes, par M. Guettard.

Mappi, *Historia plantarum Alsaticarum*.

Tournefortius Lotharingæ.

Botanicon Parisiense, Vaill.

Traité historique des plantes de la Lorraine.

Dictionnaire des plantes de la Lorraine, par Marquet,
manus.

Icones plantarum Barrelarii.

Démonstrations à l'usage de l'école vétérinaire.

Dictionnaire économique.

Dictionnaire domestique portatif.

Matière médicale de Geoffroi.

Matière médicale de Cartheuser.

Botaniste François.

Manuel de Botanique.

Traité des Fraises, par M. Duchesne.

Ecole du Jardin potager.

Dictionnaire des drogues de Lémeri.

Culture du Pêcher, par M. Decombes.

Traité de la Garance, par M. Duhamel.

Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Paris.

Traité du Chanvre, par M. Marcaudier.

Gentilhomme Cultivateur.

Elémens d'Agriculture, de M. Duhamel.

Journal économique.

Journal de Médecine.

Gazette salulaire.

Hermanni Cynosura materiæ medicæ.

Abrégé des plantes, par Chomel.

Traité des Orangers & Citronniers.

Culture du Figuier.

Thé de l'Europe.

Traité des Billets.

Traité des Jacinthes.

Traité des Tulipes.

Traité des Renoncoles.

Traité de la Garance , par M. . . . de Marcon.

Traité du Mûrier , par le même.

Mémoire sur la culture du Sainfoin , par M. France.

L'Art de cultiver les Pommiers & faire le cidre , par
M. le marquis de Chambray.

Disertations sur les Truffes & les Champignons , par
M. de Longchamp.

Essai sur le Garou , par M. Leroy.

Prairies artificielles.

Observations sur le jardinage , par Bradley.

Traité des Arbres fruitiers , par la Société économique
de Berne.

Essai sur l'amélioration des terres , par M. Patull.

Mémoire raisonné sur l'avantage de semer du trèfle en
prairies ambulantes , par M. Ferrand.

Culture des Vignes , par Bidet.

Traité des Bois.

Dictionnaire du Cultivateur.

Pratique du Jardinage , par M. l'abbé Roger Schabol.

Traité des arbres résineux , par M. le baron de Tschudy.

Mémoire sur le Ray grass , par dom Miraudot.

L'Art de cultiver les Peupliers d'Italie , par M. de Saint-
Maurice.

Mémoire sur les Pommes de terre & le pain économi-
que , par M. Mustel.

Mémoire sur les Oliviers , par M. Sienne de Marseille.

Manuel d'Agriculture , par M. de la Salle de l'Etang.

Familles des plantes , par M. Adanson.

Dioscorides.

Theophrastus.

Matthiolum.

Observations sur les vertus des différenres espèces de
Solanum.

Observations sur l'usage interne du Colchique automnal,
de la feuille d'Oranger , &c. traduits du latin par
M. le Begue de Presse.

- Expériences & observations sur l'usage interne de la
 Pomme épineuse, de la Jusquiame & de l'Aconit.
 Matière médicale de Lieutaud.
 Traité du Tabac, par Neander.
Traſſatus de Cicuta, authore Storck.
 Chymie du goût & de l'odorat.
 Manuel médical & uſuel des plantes.
 Médecine Rurale.
 Lettres ſur la méthode de ſ'enrichir promptement & de
 conſerver ſa ſanté par la culture des végétaux.
Cicutæ aquaticæ Hiſtoria auctore Wepfer.
 Traité de la Colique néphrétique, par M. Quer.
 Traité du Jardinage, par la Quintinie.
 Pharmacopée de Londres.
Codex Pariſienſis.
 Gazette d'agriculture.
 Dalechamp.
 Plantes de Provence, par Garidel.
Cluſius & Pena.
Lobelius.
Plinius Naturaliſta.
Michielli nova genera plantarum.
Dillenii Hiſtoria Muſcorum.
 Diſtionnaire d'Histoire naturelle de Valmont de Bo-
 mare.
 Collection Académique de Dijon.
 Histoire des infeſtes des environs de Paris, par M.
 Geoffroi.
Linnei ſyſtema naturæ.
Linnæi amœnitates Academicæ.
 Mémoires de la Société économique de Berne.
 Mémoires de la Société d'agriculture de Paris.
 Mémoires de la Société d'agriculture de Rouen.
 Mémoires de la Société d'agriculture de Bretagne.
Amati Luſitani in lib. V. Diſcoridis enarrationes.
 Ephémérides d'Allemagne.
Acta eruditorum.

Camerarius in epitomen Matthioli.
Floræ Parisiensis prodromus.
Gaspardus Hoffmannus de medicamentis officinalibus.
Ferrarius de florum cultura.
Fuschsius.
Hippocrates.
Galenus.
Jonstonus , de arboribus & fruticibus.
Morisonii plantarum historia universalis.
Historia plantarum Raii.
Simonis Pauli Botanicon quadripartitum.
J. Tabernæmontani historia Germanica.

Nous nous sommes encore servis d'une infinité d'autres Ouvrages pour la rédaction de ce Dictionnaire. L'énumération en seroit trop longue pour pouvoit les rapporter tous ici ; on nous a en outre communiqué plusieurs manuscrits ; nous en avons marqué notre reconnoissance dans notre préface , & nous n'y avons nommés que les personnes qui ne nous ont pas interdit de les faire connoître.





TABLE GÉNÉRALE.

<i>E</i> PITRE Dédicatoire.	i
Préface.	iiij
<i>Didionnaire universel des plantes , arbres & arbrustes ,</i> T. I. 1-650. T. II. 1-651. T. III. 1-528.	

Tome III.

<i>Flora Gallica.</i>	531
Classe I. <i>Des Monandriques.</i>	532
Classe II. <i>Des Diandriques.</i>	ibid.
Classe III. <i>Des Triandriques.</i>	537
Classe IV. <i>Des Tetrandriques.</i>	543
Classe V. <i>Des Pentandriques.</i>	561
Classe VI. <i>Des Hexandriques.</i>	586
Classe VII. <i>Des Heptandriques.</i>	595
Classe VIII. <i>Des Octandriques.</i>	ibid.
Classe IX. <i>Des Enneandriques.</i>	600
Classe X. <i>Des Decandriques.</i>	ibid.
Classe XI. <i>Des Dodecandriques.</i>	612
Classe XII. <i>Des Icosandriques.</i>	616
Classe XIII. <i>Des Poliandriques.</i>	621
Classe XIV. <i>Des Didynamiques.</i>	631

Tome IV.

Classe XV. <i>Des Tetradynamiques.</i>	I
Classe XVI. <i>Des Monadelphiques.</i>	11
Classe XVII. <i>Des Diadelphiques.</i>	14
Classe XVIII. <i>Des Polyadelphiques.</i>	31
Classe XIX. <i>Des Syngenésiques.</i>	32

Classe XX. Des Gynandriques.	59
Classe XXI. Des Monarciques.	64
Classe XXII. Des Diœciques.	72
Classe XXIII. Des Polygamiques.	76
Classe XXIV. Des Chryptogamiques.	79
Appendix.	118
Table des genres rapportés dans le Flora.	121
Table des noms synonymes du Flora.	133
Table des noms françois du Flora.	153
Liste particuliere des plantes des provinces du royaume.	171
Liste des plantes de la Généralité de Soissons.	173
Liste des plantes de la Bourgogne.	202
Liste des arbres & arbrustes de la Bourgogne.	221
Extrait de l'ouvrage de M. Collet , sur les plantes des environs de Dijon.	224
Liste des plantes des environs de Rheims.	229
Liste de quelques plantes d'Alsace , oubliées dans les Botanicons de cette province.	232
Liste des plantes du Mont Pila , par M. Dulac.	233
Liste des plantes d'Auvergne , par Dom Emmanuel Four-	238
nault.	
Liste des plantes des environs de Souillac en Quercy & de Beaulieu en bas Limousin.	249
Liste des plantes qui se trouvent sur la route de Souillac à S. Jean d'Angely.	254
Liste des plantes des environs de Nantes.	ibid.
Liste des plantes des environs d'Angers.	258
Liste des plantes des environs de Rouen.	259
Liste des plantes des environs de Caen & des côtes de Normandie.	260
Liste des plantes de Picardie.	ibid.
Liste des plantes des environs de Beauvais.	263
Liste de différentes plantes découvertes par tout le royaume par différentes personnes.	ibid.
Liste des plantes des Alpes.	267
Liste des plantes des Pyrénées.	275

<i>Liste des plantes observées dans le Roussillon & dans le diocèse de Narbonne.</i>	277
<i>Liste des plantes du Berri.</i>	283
<i>Liste des plantes du Mont d'Or, du Puy de Domme & du Cantal.</i>	285
<i>Liste des plantes indiquées dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences.</i>	300
<i>Plantes observées par le P. Barrelier.</i>	302
<i>Liste des principales plantes de la France suivant M. l'abbé Rosier.</i>	307
<i>Liste des principaux arbres & arbrustes de la France, suivant M. Duhamel.</i>	313
<i>Liste des plantes qui croissent au Mont Pila & les lieux circonvoisins.</i>	315
<i>Catalogue des différens ouvrages qui ont paru sur la Botanique du Royaume.</i>	330
<i>Observations générales.</i>	335
<i>Liste des auteurs François qui ont écrit sur la Botanique.</i>	336
<i>Liste des professeurs actuels de Botanique de la France.</i>	350
<i>Liste des Jardins publics de Botanique du Royaume.</i>	ibid.
<i>Liste des Jardins particuliers de Botanique.</i>	351
<i>Liste des plantes dont on a expliqué la culture & les propriétés dans ce Dictionnaire.</i>	j
<i>Table des noms synonymes des plantes de ce Dictionnaire.</i>	x
<i>Table des maladies dans lesquelles conviennent les plantes de ce Dictionnaire.</i>	lxiii
<i>Table des plantes qui conviennent aux animaux domestiques, tant comme alimens que comme médicamens.</i>	lxxxi
<i>Table des plantes, arbres & arbrustes qui demandent une culture.</i>	lxxxv
<i>Table des plantes qui conviennent à l'homme pour alimens.</i>	lxxxvii]

T A B L E.

ccxxix

Table des plantes qu'on emploie pour les arts & métiers.

xcj

*Explication des termes de Botanique , de Médecine ,
d'Agriculture & de Jardinage employés dans ce
Dictionnaire.*

xciiij

*Traduction Françoisse des termes latins employés dans
le Flora Gallica.*

ccviiij

*Catalogue des ouvrages dont on a fait usage dans ce
Dictionnaire.*

Fin de la Table.

SUPPLÉMENT

AU DICTIONNAIRE

Des Plantes , Arbres & Arbustes de la France.

B U S S E R O L E.

LA Buſſerole eſt un excellent remède pour la colique néphrétique , ainſi que nous l'avons obſervé dans l'article qui la concerne. Nous avons déjà rapporté quelques cures qui ont été opérées par ſon moyen ; pour confirmer de plus en plus cette vérité , nous allons expoſer ici , comme par ſupplément , quelques nouveaux cas de pratique , dont nous n'avons eu connoiſſance qu'après l'impreſſion de l'article de cette plante ſalutaire , ou qui a été pour lors oublié. Les trois premières obſervations ſont tirées de l'ouvrage de M. Quer , Botaniſte Eſpagnol , ſur la colique néphrétique.

Première obſervation. En 1734 je fus conſulté , dit M. Quer , par le ſieur Joſeph Calvo , orſèvre de Naples ; il étoit attaqué depuis longtems de la gravelle , qui avoit réſiſté à tous les remèdes qu'il avoit pu prendre juſqu'alors ; les paroxiſmes de cette maladie étoient pour lui périodiques , & ſi douloureux qu'à peine pouvoit-il les ſupporter ; après avoir examiné attentivement la conſtitution du malade , la quantité & la qualité des matières calculeuſes qu'il dépoſoit par l'urètre , & tous les différens ſymptômes qui conſtituoient ſa maladie , je lui conſeillai de faire uſage des feuilles de Buſſerole , plus connues ſous le nom d'*Uva urſi* , je

lui en fit prendre tous les matins à jeun deux gros infusés dans un grand verre d'eau ; il s'en trouva si bien , qu'il en a toujours continué l'usage , & qu'il l'a même préconisé à tous ceux auxquels il a eu occasion de parler.

Seconde observation. En 1740 , me trouvant à Barcelonne , j'eus la curiosité , continue M. Quer , d'aller à la découverte des simples que produit la fameuse montagne de Notre Dame de Montserrat ; je pris pour compagnon de voyage le célèbre botaniste Dom Juan Minuart , mon collègue dans la place de professeur de Botanique que j'occupe ; nous employâmes ensemble 22 jours à nos herborisations ; pendant cet intervalle de temps , mon ami fut attaqué d'un accès de néphrétique , dont les douleurs étoient périodiques ; nous nous trouvions alors au sommet de la montagne sur laquelle nous étions allés à la découverte ; notre malade étoit si fortement tourmenté , qu'on ne put qu'avec peine le transporter au monastère voisin de cette montagne. En la descendant j'eus le bonheur de trouver de la Buissérole ; aussi-tôt l'arrivée du malade au monastère , je lui fis faire la décoction suivante.

Prenez deux gros de feuilles de Buissérole , un demi gros de fleurs de Camomille , un scrupule de nitre raffiné , mêlez le tout ensemble dans un vase sur lequel vous jetterez une livre d'eau de fontaine ; le vase étant bouché , mettez-le sur le feu , & faites lui faire plusieurs bouillons ; après l'avoir retiré du feu , laissez-le reposer sans le découvrir , ajoutez à la colature un morceau de sucre d'une demi-once.

Mon ami usa deux fois par jour de cette décoction , le matin & le soir , ce qui fit aussi-tôt évanouir les symptômes de sa maladie ; il en continua l'usage , & fut en état de poursuivre avec moi nos recherches botaniques.

Troisième observation. Un particulier de Madrid , d'un tempérament sec , bilieux , & d'une constitution délicate , accoutumé dès l'enfance à de violens exer-

cices pedestres & equestres , & ayant fait des excès de viandes salées & de grosses viandes , se ressentit à l'âge de 28 ans de grands maux de reins ; on qualifioit ces maux de rhumatismes ; au bout de deux ans ses douleurs augmentèrent ; on le traita pour lors comme une personne attaquée de maladies véneriennes ; on lui fit prendre en conséquence un purgatif mercuriel , & soit par la force de ce remède , soit par les évacuations de sang qui succédèrent , il tendit deux pierres d'inégale grandeur ; la maladie étant connue , on changea de batterie , on lui prescrivit tout ce qu'on a coutume de faire en pareil cas , & toujours sans succès ; il ne se passoit pas un mois d'un paroxysme à l'autre ; la saignée , les diurétiques , les laxatifs , & même les eaux minérales qu'on prescrivit au malade pendant deux printemps consécutifs , ne firent que le rebuter ; il passa deux ans dans cette triste situation , lorsqu'enfin il s'adressa à moi , je lui conseillai pour lors l'usage de la Buissérole ; il prit tous les jours un demi septier de décoction de deux ou trois gros de ses feuilles dans de l'eau ; insensiblement les symptômes se dissipèrent ainsi que les douleurs de reins ; cependant comme le malade ressentoit toujours dans cette région une espèce de pesanteur sourde & inquiétante , je présumois pour lors qu'il y avoit quelque pierre : l'événement justifia la conjecture , car peu de temps après il ressentit de cruelles douleurs dans l'urèthre ; & en effet , au moyen de la saignée , des laxatifs & des diurétiques anodins , le calcul descendit dans la vessie ; il passa delà au col de ce viscère , & eu égard à son volume , il resta quelque temps dans le détroit du sphincter ; mais à force de lavemens balsamiques , laxatifs , la pierre sortit enfin par l'urèthre. Cette pierre étoit de la grosseur d'une moyenne aveline , armée de pointes brillantes & aiguës. Après qu'on eut réparé les désordres intérieurs que cette pierre avoit causés , le malade continua l'usage de la Buissérole , & pendant deux ans & demi

qu'il ne cessa d'en prendre, il ne lui survint plus le plus léger paroxysme.

Quatrième observation. Le 19 avril de l'année 1748, on nous amena dans notre hôpital un enfant de 11 ans, dit M. Haen, auteur de cette observation; ses parens nous dirent que depuis quatre ans il éprouvoit les plus cruelles douleurs toutes les fois qu'il vouloit rendre ses urines; qu'elles ne venoient que goutte à goutte; qu'elles étoient pâles, chargées de glaires, & très-puantes; enfin qu'il avoit rendu deux petites pierres de la grosseur d'un pois; l'ayant sondé, nous découvrîmes en effet une pierre dans la vessie. Je le mis à l'usage de l'*uva ursi*, que je lui fis prendre deux fois par jour, à la dose d'un demi gros chaque fois: le soir je lui donnois un narcotique; au bout de quatre jours ses douleurs disparurent; il put retenir ses urines fort longtemps, en un mot il fut délivré de tous les symptômes dont il avoit été affligé. On le renvoya, après l'avoir gardé un mois dans l'hôpital; mais soit qu'il se fût écarté du régime qu'on lui avoit prescrit, soit qu'il eût négligé de faire usage du remède, soit enfin que l'habitude l'eût rendu moins efficace, il fut obligé d'y revenir. Ses premiers symptômes étant revenus avec plus de violence, je le remis à l'usage de la poudre, dont je lui fis prendre un demi gros trois fois le jour: toutes les fois qu'il éprouvoit des douleurs trop violentes, je lui prescrivois une dose d'opium; il faisoit sa boisson ordinaire d'une eau d'orge, à laquelle on ajoutoit un peu de miel: à peine eut-il été trois jours à cet usage que ses douleurs s'évanouirent, il retint & il rendit ses urines comme l'homme le plus sain; cependant nous lui retrouvâmes encore la pierre en le sondant; on le renvoya au bout de quinze jours. Il revint pour la troisième fois à la fin du mois d'août, & comme notre première méthode ne nous parut pas avoir le même succès, je lui fis injecter soir & matin de l'huile de lin dans la vessie; mais la poudre suffit

bientôt toute seule ; les symptômes ont disparu , son urine fut seulement chargée d'une espèce de sédiment farineux , & elle est manifestement alcaline.

Cinquième observation. Elle est de M. de Haen. Un enfant de 7 ans , attaqué depuis deux ans d'une difficulté d'uriner , & de grandes douleurs dans la vessie , douleurs qui avoient commencé à la suite d'une petite vérole , & d'une rougeole qu'il eut immédiatement l'une après l'autre , fut pris d'une fièvre quotidienne , qui dégénéra en continue remittente , & lui dura 13 jours : l'ayant sondé , nous lui trouvâmes la pierre , ce qui m'engagea à le recevoir à l'hôpital , & à lui prescrire la décoction d'orge mêlée avec l'*uva ursi* à la dose d'un demi gros , trois fois le jour ; j'eus recours aussi aux paregariques & aux injections d'huile de lin dans la vessie ; la fièvre & les symptômes de la pierre ont cessé en même temps ; il retient assez bien ses urines , qui ne sont ni si alcalines , ni si pâles que celles du sujet de l'observation précédente ; elles sont rarement muqueuses , mais elles déposent un sédiment surfuracé.

Sixième observation. Je fus appelé , continue M. Haen , pour voir un enfant de treize ans qui rendoit ses urines avec beaucoup de douleur depuis deux ans ; je le fis sonder ; on lui trouva une pierre qui étoit même sensible au toucher ; il fit usage pendant trois semaines de la poudre d'*uva ursi* & des narcotiques , cela lui procura la faculté de retenir ses urines , mais ne calma pas ses douleurs. Persuadé que c'étoit son mauvais régime qui étoit la cause de ce peu de succès , je le fis entrer à l'hôpital , où je lui fis injecter deux fois par jour de l'huile de lin dans la vessie ; je lui donnai un demi gros de poudre trois fois par jour , & un narcotique toutes les fois que ses douleurs étoient trop vives ; il est parvenu à retenir ses urines au point qu'il en rend dix à douze onces à la fois ; elles ne paroissent presque pas alcalines ; elles sont muqueuses , purulentes ou farineuses , ce qui m'engage encore à le retenir quelque temps à l'hôpital.

Septième observation. Un homme attaqué d'une hydrocèle, (c'est toujours M. Haen qui parle,) pour laquelle il fit usage pendant longtemps de diurétiques & de purgatifs hydragogues qui la diminuèrent & l'amollirent en effet, commença vers le milieu du mois d'août à rendre avec beaucoup de peine des urines pâles, qui presque aussitôt qu'elles étoient rendues, devenoient très-puantes & manifestement alkales, puisqu'elles verdissoient le sirop de violettes : la sonde fit découvrir une pierre dans la vessie ; deux mois d'usage de la poudre d'*uva ursi* détruisirent tous ces symptômes, sans cependant faire disparaître la pierre, on ne fut point obligé d'avoir recours à l'opium ni aux injections d'huile de lin dans la vessie.

Huitième observation. Il y avoit, ajoute M. de Haen, dans l'hôpital des Bourgeois, un homme de 60 ans qui avoit été attaqué, il y a 18 ans, d'une fièvre accompagnée d'alternative de chaud & de froid, qui lui étoit survenue à l'occasion d'une frayeur & d'un effort violent qu'il avoit fait pour éviter un coup de pied de cheval. Dès le premier frisson, il sentit une douleur violente dans le côté gauche de l'hypogastre, un peu au-dessus de l'anneau des muscles du bas-ventre, qui dura l'espace de trois mois, au bout de ce temps, on fit une incision dans cette partie, il en sortit environ douze livres de pus bien conditionné. Le mois suivant la plaie se cicatrisa & se sécha : à peine six mois furent ils écoulés, qu'il lui survint une incontinence d'urine qui dura 12 ans. La treizième année il éprouva des douleurs qui avoient leur siège dans l'urètre, & qui étoient accompagnées de coliques ; il ne vint cependant à l'hôpital qu'au bout de quatre ans, ses urines étoient purulentes, chargées de mucosité, & sentoient la saumure pourrie, immédiatement après qu'il les avoit rendues, elles faisoient effervescence avec les acides ; on ne trouva pas de pierre dans la vessie ; les grandes douleurs que cet homme souffroit, obligèrent d'avoir

souvent recourus à l'*opium* ; on lui donna l'*uva ursi* ; le quatrième jour il lui survint une difficulté d'uriner , accompagnée de douleurs insupportables dans l'urèthre , à l'anus & dans les intestins ; l'*opium* calma ces douleurs , & tout-à-coup il sortit avec une espèce d'explosion , comme si quelque chose s'étoit crevé dans l'intérieur de son corps , des urines épaisses qui contenoient une demi livre de pus , sans que cependant il y eût la moindre pierre , ni le moindre gravier ; depuis ce temps , la douleur s'évanouit peu-à-peu , & ses urines reprirent leurs cours ; au bout d'un mois & demi cet homme se trouva délivré de toutes ses douleurs & de son incontinence d'urine : il ne rendit plus de pus , mais ses urines étoient toujours alcalines ; ce symptôme céda encore au même remède , & il y a six mois , date de cette observation , qu'il jouit de la santé la plus parfaite.

Neuvième observation. N. N. attaqué de la phrysie pulmonaire , commença à pisser du sang , il parut que cet accident dépendoit d'un vice local au col de la vessie : en effet , il sentoit en urinant des douleurs très-violentes , & outre le sang , le malade rendoit encore en urine une matière purulente. Pour guérir de la pulmonie il prit le lait d'anesse & autres remèdes pareils ; le docteur Jacques Comte de Scovolo , auteur de cette observation & des deux suivantes , y ajouta , pour arrêter cette évacuation du sang , l'*uva ursi* , qu'il administra deux fois par jour à la dose d'un gros , dans un gobelet d'eau de *nocera*. Au bout de vingt jours ce malade se sentit considérablement soulagé , de sorte que peu à peu son urine devint claire , & dans l'espace de 80 jours il ne rendit plus de sang & ne sentit plus de douleur en urinant , néanmoins il mourut de la pulmonie.

Dixième observation. Une dame étoit attequée d'une envie très-incommode d'uriner , & rendoit une urine chargée de glaires , ce mal duroit déjà depuis long-

temps , quoiqu'on eût tenté toute sorte de remèdes ; outre cela elle rendoit toujours quelques gouttes de sang par l'*utérus* , même hors du période des menstrues ; ayant été appelé , dit le docteur Jacques , il y eut une consultation ; j'y proposai l'*uva ursi* ; on suivit mon conseil , & la malade après en avoir pris pendant deux mois , se trouva entièrement guérie.

Onzième & dernière observation. Un homme de 70 ans , tourmenté de douleurs arthritiques , rendoit avec l'urine beaucoup de sable , quelquefois même de petits calculs ; après avoir pris l'*uva ursi* pendant près de cinq ou six jours , il rendit beaucoup plus de calculs ; mais cette évacuation étoit si douloureuse , que n'y pouvant plus résister , il fut obligé d'abandonner entièrement ce remède.

D'après toutes ces observations jointes à celles qui se trouvent rapportées dans l'article de la Bussérole , on peut juger de l'utilité de cette plante , dont on ne connoît les vertus salutaires que depuis peu d'années.

CRESSON DE ROCHE.

Le Cresson de roche , Cresson doré , est une plante dont la racine est noueuse , blanchâtre , rampante , garnie de fibres capillaires ; sa tige part de sa racine , elle est herbacée , rameuse & écaillée ; ses feuilles sont opposées , pétiolées , arrondies , en forme d'oreilles , semblables à celles du lierre terrestre , mais plus petites , dentelées en leurs bords ; un peu velues , pleines de suc , d'un goût un peu styptique & amer ; aux extrémités de ses tiges & de ses rameaux , naissent de petites fleurs sans corolle , dont le calice est divisé en cinq parties , garnies de huit étamines très-courtes à sommets simples. Quand les fleurs sont passées , il leur succède des capsules à deux cornes , bivalves , qui ren-

ferment des semences menues d'un rouge brun. Cette plante se nomme chez les Botanistes *Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis*. Tourn. *Chrysosplenium oppositifolium*: Linn. Cette plante croît sur le Mont Pila , sur le Mont d'Or , aux environs de Rouen , & en plusieurs endroits de la France : (consultez les Botanicons particuliers.) On attribue à cette plante une propriété singulière pour guérir les obstructions de la rate , d'où lui est venu l'étimologie de son nom. Le continuateur de la matière médicale de Geoffroy , prétend aussi qu'elle a une qualité vulnéraire & apéritive ; sa dose est d'une poignée dans les bouillons apéritifs qu'on prescrit pour les maladies du foie & des autres viscères ; le même auteur ajoute que le Cresfon de roche a le même goût & les mêmes vertus que l'hépatique commun ; il divise les humeurs épaissies ; il donne du ton aux solides ; il adoucit l'acrimonie du sang & cicatrise souvent les plaies , pourvu cependant qu'elles ne soient pas considérables. Il n'est pas moins bon dans l'hérésie des enfans , la phthisie , la jaunisse & les maladies de la peau. Boulet le recommande dans le calcul , & lui attribue aussi une propriété splénique & hépatique ; telles sont les vertus de cette plante selon la plupart des auteurs. On a soutenu sur le Cresfon de roche une thèse dans les écoles de médecine de Strasbourg , dans laquelle on examine cette plante sous tous ses différens aspects : nous allons rapporter ici l'extrait abrégé de cette thèse.

Les feuilles de Cresfon de roche , dit l'auteur , ont une saveur légèrement âcre , & un peu astringente , sans cependant aucune amertume ; ses tiges sont d'une saveur plus douce ; quand la plante est desséchée & qu'on la prend en infusion , on s'apperoit beaucoup mieux de sa saveur , qui est même pour lors très-agréable , à un petit goût de moisi près qui se dissipe à l'instant. Les habitans de Strasbourg font souvent usage de cette infusion , & même avec grand plaisir ; ils la

ptéférent à celle de capillaire. Quant à l'odeur de cette plante , elle n'en a d'autre que celle d'herbacée.

L'auteur de la thèse citée a fait sur le Cresson de roche différentes expériences chymiques pour pouvoir être à même de juger plus particulièrement des vertus de cette plante ; il a d'abord commencé par en faire sécher 16 onces ; quand elles l'ont été suffisamment, elles se sont trouvées réduites à deux & demi ; il s'en manquoit cependant beaucoup que la plante fut desséchée au point de pouvoir se pulvériser ; il a pris ensuite 120 onces de la même plante , il en a exprimé le suc, & il en a tiré 72 onces ; ce suc étoit d'une saveur salée & néanmoins douceâtre ; il a fait dessécher le marc, & il l'a ensuite passé , il ne pesoit plus que 16 onces ; il a fait consommer le marc par le feu & il a fait bouillir les cendres qu'il en a tirées avec de l'eau , elles lui ont fourni par la lixivation 4 scrupules de sel alkali fixe, ce qui lui est resté de tous ces différens procédés, n'étoit plus qu'une simple terre morte.

De routes ces différentes expériences , il résulte que le Cresson de roche contient beaucoup de terre & d'eau , & qu'il renferme pareillement un acide & un principe inflammable ; car de l'aveu de tous les chymistes , c'est de ces deux derniers principes que se forme le sel alkali fixe. L'auteur de la thèse citée n'en est pas resté à ces seuls procédés , il s'est encore servi de la voie de la distillation ; il a pris à cet effet 12 onces du suc exprimé de Cresson de roche ; il a augmenté le feu par degrés ; il en a tiré d'abord une assez grande quantité d'une eau insipide , qui n'avoit d'autre odeur que celle qui est commune à toutes les eaux qu'on tire des sucs par la distillation ; il lui est ensuite venu une liqueur d'une légère saveur à la quantité d'environ une once ; cette liqueur étoit un peu empyreumatique , elle devint verdâtre par son mélange avec les sucs bleus des végétaux ; lorsque cette liqueur fut associée avec de l'alkali fixe , elle exhala une odeur très-forte ;

mise en effervescence avec l'acide nitreux, elle répandit une fumée blanchâtre ; a cette liqueur en succéda une autre qui étoit des plus empyreumatiques , mais qui n'a pas changé par son mélange la couleur du sirop de violettes ; cette même liqueur n'est pas non plus entrée en effervescence avec l'acide nitreux ; il lui fuma geoit seulement quelques gouttes d'une huile brune très-épaisse. Ce qui resta dans la cucurbite après la distillation , étoit d'une saveur évidemment salée , & par le moyen de la lixivation , on en obtint un gros & demi de sel alkali fixe.

De ces différens procédés notre auteur a passé ensuite à d'autres ; il a versé sur 4 onces de Cresson de roche autant d'esprit de vin qu'il en faut pour extraire la teinture ; celle qu'il en a obtenue par ce moyen , étoit très-verte , & n'avoit cependant d'autre saveur ni odeur que celle qui se trouve propre à l'esprit de vin ; il a laissé évaporer cette teinture , il en est resté 48 grains d'une résine verdâtre , qui étoit presque totalement dénuée de saveur & susceptible de l'humidité de l'air. Quant au résidu de la plante qui s'est trouvé après en avoir tiré la teinture à l'esprit de vin , il a versé de l'eau par-dessus , & il l'a renouvelé en la faisant même bouillir autant de fois qu'il a fallu , pour qu'elle s'en trouvât plus teinte & qu'elle n'eût plus aucune saveur. Il a fait ensuite évaporer toutes ces différentes teintures aqueuses à un feu lent , ce qui lui a donné 42 grains d'un extrait aqueux , connu en termes de l'art sous le nom de secondaire.

L'auteur a fait suivre ce dernier procédé d'un autre , il a pris à cet effet une demi once de Cresson de roche desséché , il a mis de l'eau par dessus de la même façon que précédemment , pour en tirer une teinture aqueuse ; celle qu'il en obtint par ce moyen étoit d'une couleur brune & d'une saveur spécialement propre à la plante ; il a fait évaporer cette teinture en l'exposant sur le feu , il lui est resté 104 grains d'un extrait aqueux ; il a versé
sur

sur le résidu de la plante qui a servi à la teinture , de l'esprit de vin & l'extraît résineux qu'il en a pour lors obtenu , se trouva en plus petite quantité que dans l'opération de la précédente , cela démontre invinciblement que l'eau est le vrai menstrue de cette plante.

Il a encore réduit par la coction , en consistance de gelée , 16 onces exprimées du suc de Cresson de roche , il l'a ensuite mis en digestion avec de l'esprit de vin ; il en a tiré dix grains de sel essentiel , & il restoit adhérent à ce sel une espèce de substance résineuse , dont il étoit même teint. Cette substance résineuse ne put jamais se dissoudre dans l'eau simple , ni même dans l'eau de chaux , d'où on doit conclure que l'acide se trouve dans le Cresson de roche sous deux formes différentes : une partie est unie avec l'huile , & prend la forme de résine : l'autre est développée & se trouve dispersée dans tout le suc de la plante.

En réunissant tous les différens résultats que nous venons de rapporter , il est facile d'en déduire les différentes propriétés du Cresson de roche ; l'extraît aqueux de cette plante est de beaucoup plus abondant que son extraît spiritueux , ce premier est même le seul qui en conserve la saveur : l'eau est par conséquent le vrai menstrue qui lui convienne. L'huile que contient le Cresson de roche devient résine par le moyen de l'acide avec lequel elle est unie , c'est ce qui résulte encore des procédés ci-dessus. L'extraît aqueux qu'on obtient par une première teinture , pèse beaucoup plus que l'extraît gommeux , qu'on ne se procure que secondaiement : il y a par conséquent dans le Cresson de roche quelque substance savonneuse adhérente à la résine ; car on appelle *savon* , ce qui rend la résine soluble dans l'eau. Le savon peut , il est vrai , se dissoudre dans l'esprit de vin , mais en très-petite quantité ; le Cresson de roche contient donc suivant les différens procédés chimiques , une gomme résine dissoute dans beaucoup de phlegme avec quantité de particules terrestres , &

unie en même temps avec un peu de sel essentiel.

La nature de cette plante connue , il est facile d'en découvrir les vertus ; par l'abondance de phlegme qu'elle contient , elle est propre pour relâcher les solides , diviser les fluides , & faciliter les différentes excrétions aqueuses ; l'expérience l'a aussi toujours démontré ; mais ce ne sont pas là toutes ses propriétés ; personne n'ignore que les gommés résines sont les meilleurs savonneux ; elles conviennent non seulement pour dissoudre les matières visqueuses qui se trouvent adhérentes aux premières voies , mais encore pour les évacuer ; elles produisent aussi de grands effets dans les différentes maladies aiguës & chroniques ; mais le Cresson de roche contient suivant l'analyse chymique que nous venons de rapporter , une gomme résine : il est donc très-bien indiqué dans tous les cas où l'on prescrit ces espèces de remèdes ; son usage est même alors d'autant plus sûr que celui des différentes gommés résines que nous tirons des Indes , & qui souvent , au lieu de produire l'effet que nous en attendons , ne font qu'augmenter la maladie. Le phlegme qui se trouve dans le Cresson de roche , uni avec la résine , ne contribue pas peu à le rendre résolutif , atténuant , absterif & apéritif. Les parties terrestres qui se rencontrent aussi dans cette plante , lui donnent encore d'autres vertus. Suivant ces principes de l'art , toute substance terrestre qui s'introduit dans notre corps , & qui s'incorpore à ses différentes parties solides , donne de la force à ces parties : c'est donc par cette raison qu'on peut dire que le Cresson de roche est doté d'une vertu roborative ; la faveur même de la plante fait connoître assez cette qualité , aussi la place-t-on dans la classe des remèdes toniques & roboratifs ; elle est par conséquent très-bien indiquée dans toutes les maladies où il faut employer les toniques , & c'est même en cette qualité de tonique qu'on lui a attribué une vertu apéritive ; l'expérience journalière confirme la plupart de ces vertus. On em-

plote en Alsace le Cresson de roche dans les différentes maladies dont nous avons parlé au commencement de cet article. La plupart des praticiens vantent sur-tout cette plante contre le calcul, & en effet qu'y a-t-il de meilleur pour cette maladie, qu'un médicament tout à la fois absterfif & roboratif, propre à prévenir la formation de la matière calculeuse, ou à empêcher que son volume augmente. Tous les auteurs se réunissent, ainsi que nous l'avons déjà observé, pour conseiller cette plante dans les obstructions du foie & dans les différentes maladies qui en sont les suites; & en effet, par les principes qu'elle contient, elle est très-propre pour donner de la fluidité aux humeurs qui sont trop épaisses, & en même temps pour donner du ton aux vaisseaux du bas-ventre, ce sont là précisément les vraies indications qui conviennent dans les maladies susdites.

En Alsace on n'est pas seulement dans l'habitude de prescrire le Cresson de roche contre les obstructions du foie; on l'ordonne encore avec succès dans les différentes maladies de poitrine; elle donne du ton aux poumons; elle divise la matière muqueuse; elle déterge les ulcères, les consolide; elle convient même, suivant les habitans de cette province, dans les pleurésies. Les habitans des environs de Saverne, de Phaltbourg, de la Marche, de Bourmont, ne se servent presque d'aucun autre remède dans la plupart de leurs maladies, nous en avons été témoins plusieurs fois. Le simple usage de cette plante en infusion guérit presque toutes les pleurésies qui régner dans le pays, sans même recourir à la saignée. Erhard lui attribue une vertu vulnéraire; elle convient, selon lui, dans toutes les plaies légères tant internes qu'externes. Et en effet, qui peut disputer cette qualité aux médicamens absterfifs & légèrement astringens, tel qu'est le Cresson de roche? Quelques praticiens le recommandent encore dans la suppression menstruelle; cette maladie n'est

occasionnée que par l'épaississement des humeurs, ou la foiblesse des vaisseaux de l'utérus, ou par un vice dans la circulation du sang par la veine-porte. Or dans ces différens cas, il est rare de trouver un aussi bon remède que le Cresson de roche; la vraie façon d'en faire usage est en infusion théiforme, la dose est d'une pincée par tasse.

Depuis que nous avons publié les vertus du Cresson de roche, plusieurs personnes en ont fait usage & s'en sont très-bien trouvées : quant aux usages économiques de cette plante, on n'en connoît aucun. Schwenfeld rapporte cependant que les vaches qui s'en nourrissent donnent du beurre beaucoup plus jaune.

Fia du Tome IV.

E R R A T A.

Dans le troisième volume de ce Dictionnaire, pag. 631, dans la seconde ligne, au lieu de *Gymnospermiques*, lisez *Didynamiques*.

